

22900314514

Med

K13270



VÉNYGYŰJTEMÉNY

A III. KIADÁSÚ MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV ALAPJÁN

TEKINTETTEL A LEGÚJABB GYÓGYSZEREKRE
S A GYERMEKGYAKORLATRA

ÖSSZEÁLLÍTOTTA

DR. BÓKAY ÁRPÁD

a gyógyszer-tan tanára a budapesti egyetemen



Barabás

TIZENEGYEDIK

TETEMESEN BŐVÍTETT KIADÁS

BUDAPEST 1912

SINGER ÉS WOLFNER KIADÁSA

MINDEN JOG SZIGORÚAN FENNTARTVA.

WELLCOME INSTITUTE LIBRARY	
Coll.	we!MOméc
Call	
No.	QV

Hornyánszky Viktor, Budapest.



ELŐSZÓ

A TIZENEGYEDIK KIADÁSHOZ.



A „Magyar Gyógyszerkönyv“ III-ik kiadása alapján átdolgozott tizedik kiadása ezen könyvecskémnek nem egészen egy év leforgása alatt teljesen elfogyott, a mit érthetővé tesz az új „Gyógyszerkönyv“ megjelenése, minek folytán e könyvecske kilencz előző kiadásainak példányai használhatlanokká lettek. Ezen tizenegyedik kiadásba rendkívül sok új gyógyszert vettem fel, hogy megfeleljek számos Collegám hozzám intézett azon kérésének, hogy legalább néhány sorral tájékoztassam őket a tömérdek új szer érdekesebbjeiről. Egyebekben minden maradt a régiben.

Budapest, 1912 január hava.

B. Á.



Az Országos Orvosi Szövetségnek 1900. év szeptember hó 2-án Esztergomban tartott congressusa a következő Orvosi Rendtartást fogadta el, mely minden orvos ténykedéseinek zsinórmértékéül szolgálhat:

Orvosi Rendtartás.

A) Az orvos magatartásáról általában.

1. Minden orvos őrizze meg hivatása méltóságát és tekintélyét. Hivatásunk azt az erkölcsi kötelezettséget rója reánk, hogy mindenkor és mindenütt, a nap és az éj bármely órájában készek legyünk a szenvedő emberiség segélyére sietni s egyúttal arra figyelmeztet, hogy a segélykeresőnek egészsége, talán élete lélek-jelenlétünkötől, orvosi tudásunktól függ. Ez az erkölcsi alap, melyen hivatásunk gyakorlata nyugszik, a melyen annak tekintélyét fejleszthetjük s a nagyközönségtől annak tiszteletben tartását követelhetjük. Hivatásunk magasztossága, fontos volta hasson át meg át bennünket, annál is inkább, mivel a legtöbb esetben csak saját lelkiismeretünk az egyedüli bíró. Magaviseletünkben gyöngédség párosuljon a határozottsággal, udvarias előzékenységgel a tekintélyvel: hogy meggyerhessük a beteg bizalmát, tiszteletét, háláját.

2. Legyünk a beteggel szemben, akár szegény, akár gazdag, egyaránt humanusak, figyelmesek, de kerüljük a lealázó hízelt.

3. Az orvosi titoktartás kötelezettsége mindig szemcink előtt lebegjen.

4. Látogatásaink gyakoriságát a beteg állapota szabja meg. Ok nélküli sürű látogatások, ha csak különben nem kívántatnak, nyugtalaníthatnák a beteget s környezetét, de az orvost is anyagi érdekltség gyanujába hozhatnák.

5. Ne állítsunk fel ok nélkül komor kórjóslatokat, de a valót ne hallgassuk el a környezet, a család előtt. Tartsuk tiszteletben mindenkinek vallásos meggyőződését.

6. Gyógyíthatlannak tartott betegektől ne tagadjuk meg orvosi közreműködésünket.

7. Megvonhatjuk szolgálatainkat, ha tanácsainknak folytonos makacs, kicsinylő figyelmen kívül hagyását tapasztaljuk, sőt ez kötelességünkkel válik akkor, ha orvosi ténykedésünknek tisztességtelen célokra való kihasználását vennők észre.

8. Az orvos megtelepedés, lakásváltoztatás, gyakorlatának megszakítása és újból való megkezdése esetén a száraz tény,

Sebészti műszerek, kórházi bútorok, testegyenészeti készülékek, betegápolási cikkek a legjobb minőségben beszerezhetők: H. Windler, kön. Hofflieferant, Berlin Nr. 24, Friedrichstr. 133a. (I. hird.).

esetleg speciális szakmájának megjelölésével, hirdlapokban (legfeljebb 3-szor) közölheti.

9. A hirdetésnek minden reklámos alakja sérti az orvosi hivatás méltóságát. Ilyenekről tekintendő:

a) az orvosi segítség felkínálása — még az ingyenesé is — hirdlapokban, falragaszok útján, vagy bármely más módon;

b) különös gyógyító módszerek felkínálása hirdlapokban, nyilvános előadások, röpiratok útján, vagy bármely más módon;

c) kórtörténetek és műtétek ismertetése nem orvosi lapokban;

d) megrendelt vagy felajánlott és elfogadott köszönetnyilvánítások és reklámcikkok hirdlapokban;

e) a közönség megtévesztésére alkalmas címek és czímtáblák.

10. Az orvos ne ígérjen s ne adjon jutalmat azért, hogy neki betegeket vagy orvosi állásokat szerezzenek.

11. Kizárólag levél útján ne orvosoljon betegeket.

12. Laikusokat ne hívjon meg szemlélőül orvosi ténykedéseihez (műtéteihez).

13. Titkos vagy általa nem eléggé ismert orvosságokról vagy gyógyipari termékekről ne adjon bizonyítványt.

14. Joga van az orvosnak minden ténykedéséért díjat követelni. Egyes valóban szegény betegeket, humánus hivatásának önként hódolva, díjtalanul kezelhet, de sérti az orvosi méltóságot, ha mellékes anyagi érdekekből vagy tisztességtelen versenyből szolgáltatást akár az egyesnek, akár testületeknek kedvezményes feltételek mellett vagy ingyen felajánlja. Tilos beöltött magán vagy hivatalos orvosi állások elhagyása iránt lépéseket tenni vagy másokkal tétetni.

15. Kerülje az orvos még látszatát is annak, mintha hasznos érdekközösségben állana valamely gyógyszerházzal, gyógyfürdővel, gyógyipari termékek gyártójával vagy elárusítójával.

16. A kuruzslók üzemeivel szemben kérelhetetlen legyen; ezeket oklevelével mentesíteni a legsúlyosabb megsértése az orvosi tisztességnek.

17. Az orvos a közönséggel ne akarja ellátni, ha csak erre klinikai, kórházi vagy kizárólag egy szaknak szentelt működésével jogot nem szerzett, hogy csupán ő ismer bizonyos szert valamely betegség ellen, vagy egyedül neki van meg a képessége bizonyos speciális szakban.

B) Az orvos magatartásáról kortársaival szemben.

1. Önmagát és az orvosi rendet megbecsülő orvos nem jár kortársai betegei után.

2. Semmivel sem menthető eljárás, ha orvos valamely kortársnak orvosi működését a közönség előtt kedvezőtlen bírálat

Sebészeti műszerek, kórházi bútorok; testegyenészeti készülékek, betegápolási cikkek a legjobb minőségben beszerezhetők: H. Windler, kőn. Hofferant, Berlin Nr. 21, Friedrichstr. 133a. (1. hird.).

tárgyává teszi; ellenkezőleg, kötelessége minden orvosnak, hogy kartársait laikusok ily bírálata ellenében mindenkor megvédje.

3. Orvos nem vehet állandó kezelésbe olyan beteget, a kiről tudja, vagy utólag értesül, hogy már más orvos gyógyítja.

Ha az elhívott orvos arról értesül, hogy a beteget e betegségében más orvos gyógyította, akkor tanácskozást ajánl elődjével. Ha a beteg nem egyezik a tanácskozásba, akkor az újonnan meghívott orvos gondoskodik arról, hogy a beteg vagy hozzátartozói kollégáját idejekorán értesítsék a változásról.

Sürgős szükség esetén más orvos betegeitől sem lehet az orvosi segélyt megtagadni; de a kezelő orvos erről utólag értesítendő.

4. Ha a kezelő orvos arról értesül, hogy betegéhez sürgős szükség nélkül, az ő értesítése mellőzésével más orvost hívtak, szüntesse be az ilyen félnél további látogatásait.

5. Ha az orvos más orvos betegét akár mint rokon vagy barát, akár pedig megbízásból meglátogatja, tartózkodjék a kórjelzésre vagy a gyógyításra vonatkozó ócsárló megjegyzéstől. Látogatásáról, különösen, ha az hivatalos minőségben történik, lehetőleg értesítse a kezelő orvost. Kötésváltoztatással járó vizsgálatot csakis a kezelő orvos beleegyezésével végezhet.

6. Az orvos kartársának, az ezzel közös háztartásban élő családtagjainak, vagy kartársa özvegyének orvosi kezeléseért díjat ne követeljen; de tényleges kiadásainak megtérítését kívánhatja.

C) A helyettesítésről.

1. Távollét, betegség vagy másnemű akadályozás esetén egyik orvost a másik közös megállapodás szerint helyettesíti. A helyettesítő orvos mindig úgy viselkedjék, hogy a betegnek régi orvosába helyezett bizalma ne csökkenjen.

2. A helyettesítő orvos a helyettesítés évében nem veheti át a beteg orvoslását, kivéve, ha erre a helyettesített orvos felkéri.

3. A helyettesítés idejére eső honoráriumok közös megállapodás hiján a helyettesített orvost illetik meg, kivéve, ha nagyobb műtételek vagy szülés vezetése fordult elő.

4. Valamely kartárs elbalálózása esetén, ha csak előzetes másnemű megegyezés nem történt, a helyettesítő orvos a helyettesi minőségben átvett betegről az év végéig járó díjat az özvegynek vagy az árváknak felajánlja.

D) Az orvosi tanácskozásokról.

1. A beteg vagy a hozzátartozók azon óhajának, hogy konzilium tartassék, eleget kell tenni.

2. Ha a kezelő orvos a beteg óhajtottá orvossal a tanácskozást megtagadja s a beteg ennek daczára megmarad óhajtásánál, úgy a kezelő orvos a beteg gyógyításáról lemond.

Sebészi műszerek, kórházi bútorok, testegyenészeti készülékek, betegápolási cikkek a legjobb minőségben beszerezhetők: H. Windler, kön. Hoflieferant, Berlin Nr. 24, Friedrichstr 133a.
(I. hird.)

3. A tanácskozáskor pontosan kell megjelenni. A korábban jött orvos rendszerint 15 percre vár kartársára. Csak igen sürgős esetek és *vis major* szolgálhatnak a késedelem mentségéül.

4. Ha csak a kezelő orvos jött el, úgy ő a szükség szerint rendel. A kezelő orvos elmaradása esetén a tanácskozásra elhívott orvos csak sürgős esetben vizsgálhat és rendelhet; különben a tanácskozásra újabb időt tűzvéni ki, visszavonul. Ha más helyről (pl. más városból) érkezett, rendeléseit közli a beteggel, véleményét pedig — zárt levélben — a meg nem jelent rendelő orvossal.

5. A tanácskozásra meghívott orvos kerülje a feljebbvalóság minden látszatát s az eddigi gyógyítás ócsárlását.

6. A tanácskozás szigorúan bizalmas jellegű.

7. Véleményeltérés esetén a konziliárius annak kijelentésére szorítkozik, hogy a megbeszéléskor nem létesült megállapodás, eltérő véleményét tapintatosan közli a beteggel vagy hozzátartozóival, kerülve mindent, ami a gyógyító orvosba vetett bizalmat ok nélkül megingathatná s ezután visszavonul.

8. A tanácskozás eredményét a megállapodás szerint a tanácskozó orvosok bármelyike közölheti. A beteg és a család csak az eredményről nyerjen tudomást.

9. A tanácskozásban megállapított gyógyeljárást a kezelő orvos csak szükség esetén változtathatja meg.

10. A tanácskozás megismétlése a házi orvos vagy a család kezdeményezésére bízandó és ezen elv értelmében a konziliárius a beteg vagy hozzátartozói előtt tartózkodik a látogatás ismétlésére vonatkozó minden észlézástól.

11. Orvosok között kartellszerű megegyezés orvosi tanácskozások tartására az orvosi tisztességgel meg nem egyezik.

12. A konziliárius, kivéve a speciálistákat, a beteg további gyógyítását csakis in consilio folytathatja vagy a régi, vagy egy új ordináriussal együtt.

II. Vényszerkesztési jegyzetek.

Az itt közölt szabályok a „M. Gyk.” III-ik kiadása és a hivatalos árszabvány intézkedései alapján állítottak össze és kötelezők minden orvosra s minden gyógyszerészre; áthágásuk kihágást vagy vétséget, esetleg büntetett jelent és büntetést von maga után.

A véný az orvos írásos rendelete a gyógyszerészhez. A vénýen legfelülre írandó a rendelés helye és napja. Ha egy véný kétszer

Sebészí műszerek, kórházi bútorok, testegýnészeti készílékek, betegápolási cikkek a legjobb minőségben beszerezhetők: H. Windler, kőm. Hoflieferant, Berlin Nr. 21, Friedrichstr. 133a. (I. hird.).

keresztezett szer tartalmaz, oly helységbeliek számára, ahol gyógytár van, csak 48 órán belül, oly helyen lakók számára, hol gyógytár nincs, a vény csak négy napon belül készíthető el s szolgáltatható ki. Tilos vénymásolatok alapján gyógyszert megkészíteni s kiszolgáltatni, ha az keresztezett szer is tartalmaz.

Vényeket ismételten megkészíteni, ha azokon kétszer keresztezett szer is rendeltetik, minden egyes esetben csak akkor szabad, ha az orvos az ismétlést repetatur vagy reiteretur szóval és újabb kelettel s aláírással ellátva rendeli el. Tilos a gyógyszerésznek bármiféle vényt is ismételten megkészíteni, ha arra az orvos a „*ne repetatur*“ jelzést felírta. Az orvos tartozik az egy- és kétkeresztű szerek rendelésénél azok mennyiségét betűvel is kiírni.* Ha az orvos a M. Gyk.-ben megállapított legnagyobb egyes és napi adagnál nagyobbat írna fel, köteles a szer mennyiségének jelzése után felkiáltójel-t írni, különben a gyógyszerész a vényt meg nem készítheti. A két keresztrel jelölt gyógyszereket por alakban tilos osztatlanul rendelni. Tilos a gyógyszerésznek oly vénynek elkészítése, a melynek rendelési módjából az orvossal fennálló titkos egyetértésre lehetne következtetni, pl. „*secundum meam prescriptionem*“. Ha egy vényen egy- vagy kétkeresztű szer van felírva, a gyógyszer szedésének és használatának módját a vényen tilzesen ki kell írni s nem szabad a „rendelet szerint“, „utasítás szerint“ s több efféle általános szólásmódokat használni. Külsőleg használandó gyógyszereknél mindig kiírandó a vényen a „külsőleg“ jelzés. A külsőleg használandó folyadékokat a gyógyszerész mindig hatszögletes üvegben köteles kiszolgáltatni, ha nem is rendeli azt el az orvos. A beteg neve s lehetőleg lakása is jelezve legyen a vényen, ha csak különös tekintetek nem követelik annak elhiagyását, amidőn az elcserelés kizárása szempontjából számmal vagy valamely jellel látjuk el a vényt. Az orvos neve tisztán, olvashatólag legyen aláírva. Egy papírszeletnek mindkét oldalára vény ne irassék. Sürgősség esetén a vényre felül *cito!* vagy *statim!* vagy *periculum in mora!* szavak irassanak feltűnő, erős betűkkel. Szegényeknek rendelés alkalmával a vény bal alsó szélére P. p (pro paupere) jegyeztetésék, vagy pedig „*fiat expedit. simpl.*“ Ugyaneseak „*fiat expeditio simplex*“ jelzéssel lássuk el a vényt akkor is, ha nem éppen szegénynek rendelünk, de nem akarjuk, hogy költséges legyen a gyógyszer, ha a fenti jelzés hiányzik a vényről, a gyógyszerész drága expeditiót számíthat fel. Az Orsz. betegáp. alap stb. költségére való rendelésről külön ezikkünk szól. Ha díszesebben ólajtunk a gyógyszer kiállítását, úgy *exp. eleg.* (expediatur eleganter) jelzéssel lássuk el a vényt.

* A vénygyűjtemény vényeiben a súlyok helykímélés végett csak számokkal vannak jelezve. Ha az ott közölt vények másolatnak, a súlyok betűvel kell, hogy kiírassanak. Tehát nem 0.5 gm., hanem „decim. quinque“ stb.

Hygiamae excelsa est vis lactogenica.

Összetett vénynél a szerek között első helyen álljon a főszer (basis), eme következzék a segítőszer (adjuvans), majd a corrigens virium, aztán a constituens, végre a corrigens odoris, vel coloris, vel saporis. A gyógyszer neveinek rövidítése így történjék, hogy összecserélés ne történhessék meg. Egyéb megszokott rövidítések betűrendben a következők:

aa, āā = anatica quantitas, egyenlő rész
ad chart. cerat. = ad chartam ceratam, viaszos papirosban.
ad rat. = ad rationem, . . . szám-
 lájára
ad scat. = ad scatulam, dobozban
aqu. cal. = aqua calida, langyos víz
aqu. ferv. = aqua fervida, forró víz
conc. = concide, vágd össze
concentr. = concentratus, tömény
consp. = consperge, hintsd be
cont. = contunde, zúzd össze
cort. = cortex, kéreg
D. = Detur, add, adassék
D. bis = adassék kétszer
dent. tal. dos. acqu. = dentur tales doses aequales, adj hasonló, egyenlő adagot
det. c. penic. (maj. min.) = detur enim penicillio (maiores, minores), adassék hozzá (nagy, kis) eset
dig. = digera, pállítsd
disp. = dispense, add ki
div. = divide, oszd el
div. in dos. acqu. = divide in doses aequales, oszd el egyenlő adagokra
exact. = exacte, pontosan
ext. s. lint. = extende super lintem, kend fel vászonra
f. l. a. = fiat lege artis, készítsd műszabály szerint
f. exp. simpl. = fiat expeditio simplex
gm. = gramma
gm. = gramma
grmta. = grammata
host. = hostia, ostya
in caps. amyl. = in capsulis amyloaceis, ostyatókokba

in caps. gelat. = in capsulis gelatinosis, gelatintokokba
in caps. gelat. operc. = in capsulis gelatinosis operculatis, fedeles gelatintokokba
in vitr. c. epist. vitr. ben. clauso. = in vitro cum epistomate vitro bene clauso, jól záró üveg dugós üvegbe
in vitr. colli lati = in vitro colli lati, szélesnyakú üvegbe
in vitr. fusc. (nigr., coerule.) = in vitro fusco, (nigro, coeruleo) barna (fekete, kék) üvegbe
M. = misce, keverd
mac. = macera, áztasd
mass. pil. = massa pilularis, labdaes anyag
mgm. = milligramm
neb. = nebula, ostya
ne rep. = ne repetatur, ne ismételtessék meg.
p. p. = pro paupere, szegény részére
qu. sat. = quantum sat est, a mennyi elég
qu. v. = quantum vis, a mennyit akarsz
reit. = reiteretur, ismételd meg
rep. = repetatur, ismételd meg
sacc. chart. = sacculus chartaceus, papiros zacskó
sacch. = saccharum, enkor
spl. = simplex, egyszerű
subt. = subtilis, finom
steril. = sterilisatur, tétessék csiramentessé
sub sigill. = sub sigillo, pecsét alatt
sub sig. ven. = sub signo veneni, méregjellet
vit. gutt. = vitrum guttatorium, csepegtető üveg

Species. Theakeverék. Ily alakban csak oly szereket rendeljünk, melyek még nagyobb adagban sem erős hatásúak; ki vannak zárva tehát p. o. a fol. belladonnae, fol. digitalis vagy fol. jaborandi. Speci-
esből egy csészére tetéztet evőkanálnyi vehető (7—10 gm.), p. o. a spec.
laxantes-ből. A theakeverékek legtöbb-ször forrázat, ritkábban macera-
tum (keserű theakeverékek) házilag való elkészítésére szolgálnak,
mire nézve a betegnek utasítás adandó. A növényrészek összemeté-
lését s összetörését concide, contunde (*conc. cont.*) szavakkal jelezzük.

Pulveres. Elosztatlanul dobozban (skatulyaporban) levesebb
hatású port, p. o. kali chloricmot, morphint, rad. ipecacuanhaet
nem szabad rendelni. Vízszívó vagy illó anyagokat tartalmazó el-
osztatlan porokat üveg dugós üvegben kell rendelni (in vitro cum
epist. vitreo clauso). Ösztött porok sohasem a dispenzáló, hanem
mindig a dividáló módszer szerint rendeltessenek; tehát nem M. f.
pulv. dent. tal. dos. Nr. X. — hanem, M. f. pulv. div. in dos. aequ.
Nr. X. Ösztött porok súlya rendszerint 0.3—0.5 gm. legyen, kivé-
telesen lehet több is, de legfeljebb csak 1.5 gm. Vízszívó szerek
vivőanyagául ne sacch. alb., hanem sacch. lactis vételessék s a porok
charta ceratában vagy paraffinában rendeltessenek. Hydrarg.
bichlor. corros., argent. nitr., ammo-natrium-chloratum, scopolaminum,
aconitinum, cocainum s az utóbbi alealoidok sóinak vivőanyaga
argilla alba legyen, mintfogly az említett szerek szerves anyagok
jelenlétében könnyen bomlanak s így hatásukból veszítenek. Va-
gyonosabb betegeknek az osztott port papírhüvely helyett capsula
amylacea-ban rendelhetjük (drága).

Pilula. Súlyuk átlag 0.2 gm. legyen, és kerek számmal
(30—50—60—100) rendeljük azokat. Gyermekeknek és oly felnőttek-
nek, kik a labdacsoakat lenyelni nem tudják, pilulák ne irassanak.
Jó pilula-excipiensek a következők: 1. Argilla alba néhány csepp
vízzel, vagy vízzel és glycerinnel aa. Kizárólag ezen excipiens hasz-
nálandó a poroknál már említett fémsók és alcaloidok rendelésekor,
midőn azután a behintés is argillával történjék. 2. Növényi porok
és ungu. glycerini vagy mucil. gummi arab. qu. s. 3. Pulv. liquir.
és succens liquir. depur. aa, ha kevés a basis, — ha pedig az utóbbi
sok, úgy pulv. liquir. kevesebb veendő. 4. Ha a basis rosszul ragadó
por s kiteszi a pilulatömeg felét, jó excipiens a sacchar. alb. és
gummi arab pulv. aa. néhány csepp vízzel. 5. Balzsamokhoz,
aetheres kivonatokhoz, illó olajokhoz cera flav. pulv. és sacch. alb.
aa. vételessenek. 6. Száraz gyanták, gummi-gyanták, vagy száraz
gyantaszerű növényi kivonatok néhány csepp borszeszszel már jó
labdacanyagot adnak; néha jó lesz kevés növényi port (p. o. pulv.
rad. althaeae) is hozzákeverni. 7. Natronsappan kevés növényi
porral és mucil. gummi arab.-vel vagy borszeszszel könnyen alakít-
ható labdacsokká. 8. Száraz vizes kivonatok néhány csepp vízzel
vagy borszeszszel lesznek jól gyúrlatókká. 9. Sűrű kivonatokhoz kevés
növényi por vételessék. 10. Fél-sűrű kivonatokhoz kétannyi növényi
por veendő. Behintés argillával, lycopodiummal, pulv. rad. liquirit.-
vel, pulv. rad. althaeaevel, pulv. cort. cinnamomival, magnes. carb.
v. uszával szokott történni. Labdacso bevonása (obductio) költsé-
ges és így az csak rossz szagú, vagy kellemetlen ízű, vagy levegőn

könnyen bomló szerekből készült labdacsoknál rendeltendő el. Leg-egyszerűbb a collodiummal, gelatinával, körülményesebb a tolubalzsammal, drágább az eziüsttel, arannyal való bevonás (*obduc. collodio, gelatina, bals. tolutano, auro foliato v. foliis auri, argento foliato v. foliis argenti*). A bevonás a labdacso oldékonyságát leszállítja. Csinosak a dragirozott labdacso (*obd. l. a. mucil. gummi arab. et amylo saccharato*), csak hogy a legtöbbszor lassan vagy egyáltalában nem oldódnak fel és ezért nem hatékonyak. Ha azt akarjuk, hogy a labdacso a gyomorban ne oldódjanak fel, hanem csak a bélmizamban, vonassuk be keratinnal azokat (*obd. l. a. keratino*).

Trochisci, pastilli, tablettae oly árúak, mint a pilulák; legtöbbször már készen mint gyógyszerkülönlegességek kaphatók. *Tablettae compressae* ha nincsenek készen specialitásképpen mint gyári árú, hanem külön a recipe alapján készítették: drágák s ezért csak vagyonosoknak rendelhetők.

Capsulae. Használatuk mind jobban terjed. *Capsula amylacea* csak porok felvételére szolgál. *Capsula gelatinosa elastica* folyó balzsamok, olajok (ol. ricini) számára használatos. *Capsula gelatinosa operculata* sűrű extractumok dispenzálására igen alkalmas. *Perlae gelatinosae* borsó- v. babmekkoraságú tokocskák. *Capsulae keratinosae* v. *Pohl-féle vékonybél-tokocskák* és hasonlóképen a *Capsulae glutoidales* is oly gyógyszereknek a tápcsőbe vitelére használtatnak, melyekre nézve kívánatos, hogy azok a gyomorral ne érintkezzenek s hatásukat csak a belekben fejtsék ki, csak ott oldódjanak fel; a keratin és glutoid n. i. a gyomornedvben lassan oldódik míg a pancreas-váladékban igen könnyen. A legtöbb gyógyszerárban készletben vannak némely gyógyszer meghatározott mennyiségével gyárilag már megtöltött tokocskák (p. o. ricinusolaj, extr. filicis, kreosot, gnajacol-capsulák).

Emplastra. Ha valamely emplastrum felkenve nem hivatalos, ily alakban azt szegényeknek ne rendeljük, kivétel az empl. cantharidum ordin., mely bőrdarabra (corium) vastagon (crasse) felkenve rendeltendő; a bőrdarab hossza, szélessége vagy formája jelzendő p. o. „extende crasse super corium extensione longit. centimetr. 10. latitud. centimetr. 8, v. magnitudine chartae lusoriae v. volae minus“ stb.

Suppositorium súlya rendszeren 2 grm. szokott lenni, de lehet 1.5 és 5 grm.-os is. Ha a végbélkúp csak arra szolgál, hogy a székletételt könnyítse, tisztán sebum ovi'elből v. natronsappanból is állhat; ha mint vívőanyag szerepel, úgy legtöbbször butyrum cacao-ból készítetik. *Suppositorium* a hüvelybe is bevihető. Némelyek cacao-vajból *globuli vaginales* név alatt 3.0–5.0, sőt 20.0 grm. súlyú golyókat is készítenek. Újabban cacao-vajból vagy gelatinából gyárilag is állítanak elő oly suppositoriumokat, melyek belül üresek s gyógyszerekkel tölthetők meg; megtöltés után megfelelő operculummal záratik el az ily csapocska. Ezen suppositoriumok majd kúp-, majd henger-, majd tojás-alakúak; ezek a hüvelybe vitelre is alkalmasak.

Electuaria. Ily alakban nem szabad könnyen bomló vagy gyorsan élenyilő szereket rendelni, vagy olyanokat, melyek növényi savakkal érintkezve, vegybomlást szenvednek, valamint olyanokat sem, melyek már kis adagban erősen hatékonyak. Növényporok 3–5 rész sziruppal,

mel depur.-al, 1—6 r. pulpa tamarind.-al jó electuariumot adnak; nehezen oldható porokhoz — r. syrup vagy 2 r. pulpa tamarind. vétes-sék. Mint vivőanyag szerepelhetnek még pulpa prunor., mel rosatum, electuar. aromat., hashajtókhoz az electuar. lenitivum. Egyszerre 50 grm.-nál többet ne rendeljünk. Bevétel kávéskanalanként történik. 2 napnál több napra elect. ne rendeltessék, mert megromlik.

Unguenta. Zsíros kenőcsökhöz, hogy azok ne avasodjanak (nyáron), kevés acid. benzoicumot lehet tétetni. Hosszú időre ne rendeljünk kenőcsöt, legfeljebb 3—4 napra. Szagjavítóul 30—50 gm. kenőcsre 1 csepp illó olaj, (pl. ol. lavand.) elegendő. Jodoformos kenőcs szagát legjobban elveszi a cumarin. A hivatalos kenőcsmassákon kívül, melyek mint excipiensek használatnak, jó kenőcs-alapanyagot ad a lanolin és axung. porci āā + aqua dest. qu. s. A kenőcs alapanyaghoz az excipendum csak bizonyos határok közötti mennyiségben keverhető: így pl. míg illó olajok és kámfor csak 1: 10—12, addig causticus alkaliák 1: 3 is vehetők; száraz v. sűrűn folyó anyagok, mint gyanták, porok, balzsamok, kivonatok 1:3—4, tincturák, chloroform 1: 6, ichthyol 1: 2.

Linimenta. Így nevezzük a higabb consistentiájú kenőcsöket, de melyek az olajnál mégis sűrűbbek. Jó linimentumot adnak: 1. Ammonia pura liquila 1 r. + oleum sesami 4 r. 2. Chloroform 1 r. + ol. sesami 4 r. 3. Kámfor vagy illó olajok 1 r. + axungia porci s más szilárdab zsirok vagy hivatalos kenőcs-anyagok 5. r. 4. Ol. lini + aqua calcis āā.

Mixturae et solutiones ad usum internum. Rossz szagú anyagokat illatos vízben, csipős szereket nyákos folyadékban (decoct. rad. althaeae, decoct. tuber. salep) oldva rendeljünk. Ízjavító a syrupok (1: 15). Rendelés 1—2 napra történjék. Erjedésre hajlamos folyadékok hűvös helyen, nyáron jeges vízben tartassanak. Savanyú mixturák, jódos oldatok porcellán vagy üvegkanálból vétessenek be. A bevételre szánt folyadék összes mennyisége 50—200 gm., leg-többször 150 gm. szokott lenni, gyermekeknek 80—100 gm. Vilá-gosságon bomló anyagok vitrum nigrumban vagy vitr. coeruleumban rendeltessenek. Bevétel evő-, gyermek-, kávéskanalanként történjék. L. a mértékeket. Újabban kalibrált poharacskákat is tartanak a gyógyszerészek s kívánatra mellékelnek is a kanalas orvossághoz.

Guttae. L. a táblázatot a cseppek súlyviszonyairól. A rendelt összes mennyiség 15—30 gm. szokott lenni. Ízjavító legtöbbször nem kell. Csak értelmes betegeknek rendeljünk cseppeket. Az oldat tiszta legyen, zavarodást ne mutasson; ha idővel csapadék mutatkoznék benne, elvetendő. Erősen ható szerekből oly mennyiség cseppek alakjában ne adassék a beteg kezébe, melylyel mérgezés történhetnék. Erős mérgek, mint p. o. strychnin. nitr., atropin sulf., eserin. salicyl. ily alakban lehetőleg ne adassanak a beteg kezébe, még akkor sem, ha külső használatra pl. szembecseppentésre szolgálnak; az ily cseppeket tartsa az orvos magánál (*Az orvos kezéhez*). Acid. hydrochlor. dilut. üveg dugós üvegben rendeltessék. Ha lehet, belső célokra 2^o/o-os vizes csepp-oldatok rendeltessenek, ekkor az oldat egy cseppjében megközelítőleg 1 milligramja foglal-tatik a hatékony anyagnak.

Collutorium és gargarisma mennyisége 500—1000 gm. legyen (6 szögletű üvegben dispenzálja a gyógyszerész). Felnőttek egyszeri öblítéskor 25—30 gmot fogyasztanak el. Kis gyermekeknél, kik a folyadékokat esetleg lenyelhetnék, ezeket puha vászondarabbal felítatva, mosogatások vagy enyhe kitörlés alakjában kell használni pl. a szájiüreg betegségeinél.

Mixturae agitandae seu mediae. Rázandó-keverék. Nem cél-szerű gyógyszeralak. Ha írjuk, ne felejtjük el a vényre feljegyezni: „*S. Használat előtt felrázni*“. Mást, mint flor. kusso-t és bismuth. subnitr.-ot alig rendelünk így.

Injectiones subcutaneae. Fecskendőt soha se adjunk a beteg kezébe; a befecskendés műveletére se a beteget, se a laikus környezetét meg ne tanítsuk, *így nem nevelünk morphinistákat.* Bujakórosok és tuberculosusok számára külön-külön fecskendőt tartunk. Helybelileg erősen izgató vagy maró szerek ily módon ne használtassanak. Mily töménységű oldatok s mily szerek használata a szokásos, arra nézve l. más helyen a táblázatot. Az oldat mindig tökéletes legyen, azért vényíráskor a szűrést (filtra) ehendelni ne felejtjük el. Ha a folyadék idővel megzavarodnék, úgy vagy az oldott szer csapódott ki, vagy gombavegetatio támadt a folyadékban; a szer mindkét esetben elvetendő. Legjobb szélesszájú üveg dugós üvegben rendelni e szereket azért, hogy a fecskendőt közvetlen az üvegből tölthessük meg. A szer mindig „*sub sigillo, az orvos kezéhez*“ rendeltessék; legjobb, ha azt az orvos azonnal magához veszi s nem hagyja a beteg kezében. A bőr alá fecskendésre szánt szereket utóbbi időben sterilizálják. Néhol készletben is vannak már beforrasztott üvegtubnsokban sterilizált oldatok (morphin, secale corn. kivonata, digalen, pilocarpin). A diphtheria elleni serum használatáról l. a megfelelő címet a gyógyszerek között.

Saturationes. A vényen mindig jelzendő „*f. saturatio*“, hogy a gyógyszerész az elkészítést szabály szerint eszközölhesse. A készítés részletes körirása a vényen szükségtelen. A telíték vívőanyaga 180—200 gm víz. Szénsavas sóból (kali. carbon., natr. carbon., natr. bicarbon) 5—10 gm. rendeltessék, míg a telítő savból (acid. citricum., vagy succus citri, vagy acid. tartarie.) „*qu. s. ut fiat saturatio*“. 1 gm. szénsavas só körülbelül 0.65 gm. acid. citricum és 0.625 gm. acid. tartar. telít; a succus citri változó savtartalmú, ezért a mennyisége előre meg sem határozható, hanem „*qu. s.*“ irandó. — Ha a jelzett savak helyett hatékonyabb savtartalmú anyagok képezik a telítő anyagot, p. o. acet. scillae, akkor az utóbbi mennyiségét ki kell írni. A telítésnek különben nem kell teljesnek lenni. Ha a telítékben csupán a szénsav hatására számí-tunk, úgy szegény betegeknek szódavizet, „*Kristály-vizet*“, „*Margit-szigeti áldítóvizet*“ szénsavval telített „*Artézi vizet*“ stb. is ren-delhetünk.

Emulsiones. Zsiros olajat tartalmazó magvak (amygdalae dul.-ces, sem. lini, sem. papaveris) 8—10 rész vízzel jó fejetet adnak (emulsiones verae); az emulgens itt a magvakban levő növényi fehérje. Emulsio spuria készítésénél az emulgens gummy arab. pulv. (nem mucilago!), v. pulv. tragacanthae, v. vitellum ovi szokott lenni,

A mi ezek fejetképező erejét illeti: gummi arab. 10 gm. = tragacantha 1 gm. = vitellum ovi unius. Illatos olajokhoz gummi arab. aā véte-sék, zsiros olajokhoz, gyanták és balzsamokhoz $\frac{1}{2}$ r. gummi arab. Víz 8-szor annyi véte-sék, mint amennyi az emulgendum. Syrupok, sacchar. album, mel depur. emelik a fejet tartósságát, sók, savak csökkentik s azért hozzátételük kerülendő. Gyantákhoz legjobb a vitellum ovi mint emulgens. Mindkét fajta emulsio írásakor „f. emulsio” kiteendő.

Maceratum s. Infusum frigide paratum. Illatos anyagoknál és digitalis leveleknél elegendő 2—3 órai maceratio, keserű anyagoknál 12—14 órai szükséges; szegények házálag készítsék azt s a kivonandó anyagot species alakjában írja fel az orvos; kivétel természetesen pl. a digitalis levél.

Digestum s. Infusum digestionis. A digestio (50—75 °C. mellett) 12—24 órán át történik. Jelzés a szerek felsorolása után a következő: „Stent in loco tepido in vaso l. a. clauso per horas 12 (v. 24) saepius agitando. Cola et filtra”.

Infusum. Lazább szövetű (levél, fű, virág, vékonyabb gyökerek p. o. rad. ipecacuanhae, rad. valerianae) vagy illatos olajat tartalmazó növényrészek kivonására alkalmas gyógyszeralak. A forró vehiculummal való leöntés után $\frac{1}{4}$ óráig álljon a keverék, vagy többször felrázva 5 percig legyen kitéve a forró vízfürdő gőzeinek. Infusum digitalis rendelkezésénél csak 60—70° C. vízzel infundálja a gyógyszerész a leveleket, mert 100° C. hő mellett elpusztulnak a hatóanyagok. Colatura, azaz a szüredék legyen 150 gm., gyermeknek 80—100 gm. Ízjavítóul syrupok 1 : 15.

Decoctum. Tömöttebb szövetű növényrészek (keményebb gyökerek, kérgek) kivonására alkalmas gyógyszeralak. Illatos olajat tartalmazó anyagok kivonására ne használtassék. A főzés többszöri felkeverés mellett $\frac{1}{2}$ óráig tartson, v. ugyanennyi időre tegye ki a gyógyszerész forró víz gőzeinek. Colatura, ízjavító stb. mint az infusumnál.

Ebullitio. Úgy készül, mint az infusum, csak hogy a meleg vízzel leöntött növényrészeket egyszer felforralva v. rögtön leszűrjük, v. levéve a tűzről, $\frac{1}{4}$ óráig még állni hagyjuk s azután szűrjük.

Ptisana. Decoctum, mely gyengén ható, főleg keményítőtartalmú (hordeum) anyagokból készül sok vízzel (500—1000 gm.) s italul (potio) szolgál a betegnek.

<i>Decocto-infusum</i>	}	Kombinálása a különböző kivonási eljárásoknak.
<i>Infuso-decoctum</i>		
<i>Macerato-decoctum</i>		
<i>Macerato-infusum</i>		

Klysma. Küürűő csőrének elég 200—500 gm. víz hűvösen vagy langyosan; lehet használni ugyanannyi infus. rad. valerianae-t vagy infusum chamomillae-t is. Növeli a hatást 1—2 kávéskanálnyi konyhasó, glaubersó, keserűsó hozzátétele. Ha zsiros olajat is akarunk a cső-

réhez tenni, 1 evőkanál olajat dörzsöljünk össze $\frac{1}{2}$ kávéskanálnyi szappanreszeléssel s úgy keverjük azt a folyadékhoz. *Oxyuris vermicularis* ellen jó klysmát nyeriünk, ha 100—150 gm. foghagymaforrázathoz (házilag készítendő) 1—2 kávéskanálnyi eczetet elegyítünk; különben naponta ismételt hidegvizes kiürítő beöntések is jól szolgálnak; ezeknél jobb az aqua calcis tisztán v. $\frac{1}{3}$ r. vízzel vegyítve. *Teniasmus* ellen jól ható klyσμα a langyos keményítőfőzet 200 gmja. Tápláló csőrének legjobb a *Leube—Rosenthal-féle húspankreas klystír*, mely következőleg készítendő el: Végy finomra vagdalt húsvakarékot 150—300 gmot, adj hozzá friss és lehetőleg finomra vagdalt marha-pankreast, mely zsíros kötőszövet-borítékától előzetesen megtisztított; keverd össze kanállal és habard 150 gm. meleg víz segélyével sűrű péppé s fecskendezd melegen az előbb bélsártól megtisztított végbélbe alkalmas fecskendő segélyével. Lehet 25—50 gm. zsírt is (többet nem) hozzátenni. Jól használható mesterseges táplálásra az *Ewald-féle tojásos csőre* is; egyrésztől 2—3 tojás egy evőkanálnyi hideg vízzel összehabartatik, másrésztől késhegynyi fehér liszt fél csésze 20%-os szőlőcukor-oldattal (krumplicukor) felforraltatik s a keverékhez egy pohárka piros bor öntetik; az egész 40° C-ra lehűtetik s a tojásoldattal lassan összeelegyítetik. A cukorliszt keverékhez egy evőkanálnyi peptont is lehet tenni. Az így elkészült és langyosra melegített csőre kétszerre használandó el egy nap alatt. *Boas* a köv. ajánlja: 150 gm. tej, 3 tojássárga, 1 késhegynyi só, 1 evők. vörösbor, 1 evők. liszt. *Donkin* csőréje: 75 gm. tej v. húsleves, 1 tojássárga, kávéskanálka rum, néhány csepp tinct. opii. *Jaccoud* csőréje: 250 gm. húsleves, 120 gm. bor, 2 tojássárga, 4—20 gm. pepton. Mindennél egyszerűbb a *Kussmaul-féle tojásos csőre*: 2—3 tojást sárgájával együtt felé mennyiségű vízzel, mely lassanként öntendő hozzá, tejszerű folyadékká habarunk össze, a keveréket 12 óra hosszat hűvös helyen tartjuk s használat előtt 35° C-ra melegítjük. Célt érhetünk különben langyos tejből álló csőrékkel is, vagy tojás és tej keverékével.

Bélinfusio, bélinrigatio. Kiürítési célokra legjobb, ha térd-könyök helyzetben vagy baloldali fekvésben (behajtott czombok) tiszta langyos víz 1— $1\frac{1}{2}$ literje öntetik a bélbe irrigateur segélyével. Ugyanezt teszszük bélelzáródásoknál is. Idült bélhurut, enteritis follicularis, vérhas eseteiben salicylsavas natrium, benzocsavas natrium, tannin, alumen segélyével készült oldatok jól használhatók. Colitis mucosa esetén dicsérik a meleg karlsbadi vízzel történő irrigációkat.

III. Némely mértékről.

Egy evőkanál víz 15.0—20.0 gmot tesz ki.

Egy gyermekkanálnyi víz = $\frac{1}{2}$ evőkanállal = 7.5—10.0 gmmal.

Egy kávé- v. teás kanálnyi víz = $\frac{1}{2}$ gyermekkanállal = 3.5—5.0 gmmal.

Egy csésze víz 120.0—150.0 gmot tesz ki.

Egy vizes ivópohár 200—250 gmot tesz ki.

Egy pálinkás pohár 20 gm.

Egy vörös boros pohár víz 90·0—100·0 gmot tesz ki.

Egy késhegynyi cukorpor = $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ kávéskanállyal = 0·3—0·6 grammal.

Egy Pravaz-féle fecskendő körülbelül 1 köbcentnyi folyadékot vesz fel. Nagyobb fecskendők is vannak.

Régi osztrák gyógyszerész-súlyok értéke.

régi orvosi font (libra)	= 12 uncia	= 420 gm., kikerekítve
uncia	= 8 drachma	35 „ „
drachma	= 3 scrupulum	4·3 „ „
scrupulum	= 20 granum	1·4 „ „
granum	= 0·07	„ „

megfordítva :

1 gramm.	= 13·7	granum
1 decigm.	= 1·3	„
1 centigm	= 0·13	„
1 milligm	= 0·013	„

Angol orvosi mértékek, melyek ott ma is használatosak :

1 Pound	= 12 Ounces	= 373·24 gm.
1 Ounce	= 8 Drams	= 31·10 „
1 Dram	= 3 Scruples	= 3·88 „
1 Scruple	= 20 Grains	= 1·29 „
1 Grain		= 0·064 „

Angol folyadék-mértékek :

1 Gallon	= 8 Pints	= 3785 gm.
1 Pint	= 16 Fluidounces	473 „
1 Fluidounce	= 8 Fluidrams	= 30 „
1 Fluid dram	= 3 Fluidscruples	= 10 „
1 Fluidscruple	= 20 Minims	= 3·33 gm.
1 Minim	=	0·06 „

IV. Cseppszám-tábla.

A cseppeknek egy grammot kitevő száma és az egyes csepp súlya, ha a 15° hőmérsékletű folyadék függőleges helyzetű csőből, 3 mm. átmérőjű, kereknyílású eszeppentőből szabadon csepeg le. (Nemzetközi megállapodás.)

A M. Gyk. III. kiadása szerint	1 gramm = csepp	1 csepp = gramm
Acidum carbolicum liqnefactum	36	0.028
Acidum hydrochloricum dilut.	26	0.050
Acidum phosphoricum	20	0.050
Aether	81	0.012
Amylenum hydratum	63	0.016
Amylium nitrosum	67	0.015
Aqua amygdalarum	33	0.030
Aqua destillata	20	0.050
Chloroformium	53	0.019
Kreosotum	38	0.026
Liquor acidus Halleri	52	0.019
Oleum crotonis	45	0.022
Oleum menthae piperitae . .	51	0.020
Oleum Rosae	50	0.020
Oleum Sinapis	44	0.023
Solutio arsenicalis Fowleri .	20	0.050
Spiritus aethereus	65	0.015
Spiritus ammoniatus anisatus .	54	0.019
Spiritus concentratus	61	0.017
Spiritus dilutus	55	0.018
Tinctura opii crocata	52	0.019
Tincturae spiritui concentrato .		
paratae	60	0.017
Tincturae spiritu diluto paratae	55	0.018
Tinctura Valerianae aetherea .	63	0.016

V. Czélszerűtlen és veszélyes gyógyszerkeverékek.

1. Alcaloidok hatását szabad Cl., Br., J., valamint más erősen éleenyítő anyagok pl. kalium hypermanganicum gyengítik, sőt meg is szüntetik. Csersav és csersavtartalmú anyagok is kiesaplatják az alkaloidokat (l. 3. pont), épp úgy a jód is. Natrium bicarbonat vagy natrium carbonat elbontja vagy kiesapja az alkaloidot.

Alimento Theinhardt incrementum infantum pro-
perrime procedit.

2. Belladonna- és aconitum-készítmények maró lúgokkal érintkezve elvesztik hatásukat, aconitum-készítmények már akkor is, ha vízzel hosszabb ideig állanak.

3. Tannin és tannin-tartalmú készítmények fém sókkal, alcaloidokkal, fehérjékkel, enyvével, dextrinnel, növényi nyákkal csapadékot adnak. Az alcaloidokkal adott csapadék azonban főlös tanninban oldódik.

4. Zsíros olajok és más zsíradékok lúgokkal (hacsak linimentumnak nem szükségesek), erős savakkal, fém sók savanyú oldataival ne kevertessenek.

5. Tincturák, melyek balzsamokat vagy gyantás anyagokat tartalmaznak, víz hozzáadására tejszerűen megzavarodnak.

6. Aqua chlori csak vízzel vagy legfeljebb syrupus simplex-el elegyíthető.

7. Kalium sulfuratumnhoz, calcium sulfuratumnhoz, ha savak vagy savanyú sók kevertetnek, kénhydrogén fejlődik kén kiválása mellett vagy anélkül. A nevezett szerek rendelésekor kerüldessenek a fémélegek s azok sói, Cl., Br., J., tannin és tannintartalmú anyagok.

8. Lúgos kémhatású folyadékok édesítésére csak színtelen syrupok használtassanak.

9. Ammonium chloratum és alkaliák v. földfémek szénsavas sói.

10. Antipyrin és natr. salicylicum porban egymással összekeverve elfolyósodnak.

11. Bismuthum subnitricum és csersav, calomel.

12. Digitalis fol. és bármiféle sav, jó d, jódkalium, ferrumsók, csersav.

13. Calomel és savak, szénsavas alkaliák, jó d, jódkali, kéksav-tartalmú anyagok, extractumok, antipyrin.

14. Hydrarg. bichlor. corr. l. calomel.

15. Kalium bromatum l. Kalium jodatum.

16. Kalium jodatum és savak, savanyú sók.

17. Kalium nitricum és kénsav (pl. liqn. acid. Halleri).

18. Diuretin natr. hydrocarbonattal, savakkal elbomlik.

19. Vaselinum és acid. carbol.

20. Zincum sulfuricum és plumbum acet.

21. Vasoldatokhoz ízjavításra csak syrupus simplex vagy syrupus aurantior. használtassék.

22. Ferr. sesquichl. solutum acid. carbolicummal kékszíntvé lesz.

23. Savak, savanyú sók, savanyú syrupok és savanyú tincturák rendelésekor kerüldessenek szénsavas sók, szappanok, jódkalium, bromkalium. Kivételesen a szénsavas sókat illetőleg, ha saturatiók állítandók elő.

24. Ezüstsókhoz, ólomsókhoz, higanyoxydulsókhoz nem szabad chlor-, bróm-, jódevgyületeket keverni.

25. Ólomkészítményekhez nem szabad kénsavas sókat keverni.

26. Plumbum aceticum s más fém sók növényi kivonatokkal csapadékot adnak.

27. Argentum nitricumhoz, jódkaliumhoz, auro-natrium-chloratumhoz sem syrupokat, sem más szerves anyagokat keverni nem szabad.

28. Higanysók elromolhatnak a legkülönbözőbb szerves vegyületek jelenlétében. Hydrargyrum bichlor. corrosivumhoz, ha azt porban vagy pilulában rendeljük, vivőanyagul csupán argilla alba használható; ugyanez áll a salétomsavas ezüstre nézve is. Corrosivot is, arg. nitricumot is csak destillált vízben szabad oldatni, közönséges vízzel homályos, sőt zavaros, csapadékos oldatot kapunk.

29. Jodkalium vagy bromkalium ne rendeltessék soha kali chloricummal egyidejűleg vagy az utóbbival keverve. Ha a szembe calomelt hintünk, bels. nem szabad jodkalit rendelni.

VI. Robbanó keverékek.

1. *Acid. carbol.* és arg. nitr. v. más ezüstsók vagy jód, vagy plumb. acet.

2. *Acid. chromicum* és glycerin, v. jód, v. kén, v. illó olajok v. szerves anyagok.

3. *Acid. nitricum* + *acid. hydrochlor.* + *tinct. nucis vom.* vagy *tinct. cardamomi* āā, néhány óra múlva robbannak; glycerin aether, chloroform is veszélyesek salétomsavval keverve.

4. *Acid. picricum* porban rendelve csaknem minden más anyaggal robban.

5. *Acid. sulfur. conc.* és ol. terebinth., v. spirit. vini, v. aether.

6. Brom és alkohol (bromaether képződik.)

7. *Calc. hypochloros.* és hypophosphitek, v. ammoniumsók, v. glycerin, v. kén, v. illó olajok, v. zsírok.

8. Jód, valamint *tinct. jodi* és ammonium v. ammoniumkészítmények (a higanyprecipitát is), némely illó olaj (ol. terebinth.).

9. Jodol és hydrarg. oxydat.

10. Jodoform és arg. nitr., v. salétrom, v. kali chloricum, v. tömény savak.

11. *Kali chloricum* porával nem szabad elegyíteni a következőket: szénpor, kén, katechin, kino gubacspor, tannin, lycopodium, anylum, cort. chinae, pulv. liquiritiae, saccharum, mel crud., thymol, alkohol, glycerin, carbolsav, salicylsav, ásványsavak, fémporok, ferro-sók, sulf. aurat. antim., hypophosphitek, jód, alkaloidák, nitrtek, opium, általában szerves anyagok.

12. *Kalium hypermanganicum*mal robbanhatnak: minden organikus sav és azok sói, illó olajok, extractumok, tincturák, syrupok, alkohol, glycerin, kén és kénes vegyületek (pl. sulfur aurat. antimon.).

13. *Kalium nitricum* és carbo, v. sulfur, v. szerves anyagok pora.

14. *Kreosotum* és arg. nitr.

15. *Nitroglycerin* nemcsak magában, hanem erős hígításokban is robbanhat.

VII. Fürdők.

	Liter
Teli-fürdőhöz (balneum totale) szükséges vízmennyiség	= 200—300
Félfürdőkhöz (semicupium)	" " = 100—150
Úlfürdőhöz (insessus)	" " = 40—50
Lábfürdőhöz (pedilavium)	" " = 10—20
Karlfürdőhöz (brachilavium)	" " = 5—10

Subalpin magaslati gyógyhely

MARILLA

(DÉLMAGYARORSZÁG)

sanatorium ideg- és légző-
szervi betegek részére.

Marilla szélről rendkívül védett fekvése, portól mentessége, általános normális időjárás mellett egyenletes hőmérséklete, a tartós esőzés ritkasága, végül üdítő és enyhe délkeleti éghajlata folytán nemcsak ideális magaslati gyógyhely, hanem egyszersmind szinte versenyen kívüli remek subalpin tavaszi állomás is, hol rendes meteorológiai viszonyok közt már a május is nagyon enyhe. ::

A sanatorium fel van szerelve az ideg és **légzőszervi** betegségek gyógyítására szolgáló valamennyi modern orvosi berendezéssel és pedig: pneumatikus kamrák **sűrített** levegővel, belégző-terem, svéd torna Zander-gépekkel, légfürdő (Lahmann szerint), masszázs, vibrációs masszázs, vizgyógyintézet, villamos fény-, hidroelektromos-, forró-lég-, oxigén- és szénsavas (nauheimi) fürdők, szabadlég-kezelés fekvő sátrakban, végül diaetikus kurák, mint hizókurák stb.

GYÓGYJAVALAT: Idegbajok, az erethikus Morbus Basedowii, asthma, emphysema, hörghurut és **kezdődő**, könnyű tüdőcsúcsshurut. ::

OZOFLUIN

(név törvényesen védve, eljárás szabad. bejel.)

fenyőlevél-készítmény, száraz, szemcsés, könnyen oldódó formában.

Ideális készítmény remek illatu, gyönyörűen fluoreszkáló fenyőlevél-fürdő készítésére a közönséges fenyőlevél-fürdők helyett.

OZOFLUIN a dresdai hygiénikus kiállításon minden érdeklődő elismerését és csodálatát nyerte meg.

Általánosan a legtökéletesebb ilyenfajta készítménynek mondják.

Árak: eredeti doboz á 10 fürdő 7 kor. 50 fill.

$\frac{1}{2}$, „ á 5 „ 4 „ 25 „

Kapható a gyógyszerárakban.

Ha nincs raktáron, tessék közvetlenül a gyárhoz fordulni:

Ozofluin-Centrale
Basel, St. Johannvorstadt 42.

Minták orvosok részére ingyen. — Szanatoriumok, gyógyintézetek, gondnokságok stb. részére különleges árak.

Hideg fürdő hőmérséke	10°—20° C. =	8°—16° R.
Hűvös fürdő	20°—28° C. =	16°—22° R.
Langyos fürdő	28°—35° C. =	22°—27° R.
Melegfürdő	35°—40° C. =	27°—32° R.
Forró fürdő	40°—45° C. =	32°—36° R.

Thermicusan indifferens fürdő a 34°—35° C. = 27° R. hőmérsékű; az ily hőfokú fürdő testiünk hőgazdaságára nem hat módosítólag, egyéb irányban (idegrendszer stb.) azonban van hatása.

Mesterséges fürdők.

Ásványsavas fürdő. Teli fürdőhöz kell acid. nitr. crud. 500—1000, vagy acid. nitr. crud. és acid. hydrochlor. crud. aa 300—500; lábfürdőhöz harmadrész. Fakád!

Diófalevél-fürdő. Friss diófalevelekből 5000—10000, szárazakból kétszer annyi forráztassék le. Forrázat gyorsan átszűrve, egy teli-fürdőhöz elegyítendő. (Gyermekek teli-fürdőjéhez 3000 friss diófalevél, vagy 6000 száraz vétessék.

Enyves fürdő. ¼—1 kilogr. enyv vagy gelatina egy teli-fürdőre.

Fenyőlevél-fürdő. 200—300 fenyőlevél-kivonat (drognistától) egy fürdőhöz.

Hangya-fürdő. Azelőtt erdei hangyák forrázatával készült; ma úgy készítik, hogy egy-egy fürdőhöz tíz-tizenöt gm. acidum formicium tételik.

Illatos (aromaticus) fürdő. Sokféle módon készíthető: a) Species aromaticae 200—500 gm-jából 2 liter vízzel forrázat készíttetik s az a fürdőhöz öntetik. b) Tinct. arnicae 1000 öntetik a fürdőhöz (gyakran okoz bőrbajokat, ezért nem tanácsos használni), vagy c) Ol. terebinthinae 40—50 gm. (jól el kell keverni, különben a víz felületén marad a mellet és nyakat erősen csípi), vagy d) Aqua coloniensis 100 gm.

Jódos fürdő a) Kalium jodatum vagy natrium jodatum 100—120 egy fürdőhöz (pharmatologicce irrationalis); b) 10—15 jodum purum 20—25 kalium jodatum vagy natrium jodatum segélyével oldandó elegendő mennyiségű vízben s ezen oldat öntendő a fürdőhöz; erősen izgatja a bőrt. Fakád!

Kénés fürdők. Kalium sulfuratum pro balneo (kali kénmáj) vagy helyette natrium vagy calcium sulfuratum 50—200 oldassék fel a teli fürdőben. Kénhydrogén fejlesztése sósavval felesleges, dús fejlődésnél veszedelmes is. Fakád!

Konyhasós-fürdő v. sósfürdő. A fürdő 2—3%-nyi sótartalmú

Iszapfürdők: A pöstyéni iszap házikúra céljaira mindenféle szétküldésre kerül és számos fürdőintézetben nyújtanak ezen eredeti pöstyéni iszappal fürdőkúrákat. Az iszappal együtt az eredeti kénés forrásvíz, valamint megfelelő kellékek és borogatózacsók is küldetnek.

Ozofluin ideális készítmény, remek illatú, fenyőlevél-fürdő készítéséhez gyönyörű fluoreszcenciával, a közönséges fenyőlevél-fürdők helyett (l. a túldalalon levő hirdetést).

legyen. Teli fürdőben oldassék fel 4—6 kilogr. anyahúsó vagy konyhasó, vagy tengerisó, vagy marhasó. Gyermekek sósfürdője ne legyen töményebb, mint 1—1½%-nyi sótartalmú.

Korpa-fürdő. Korpa (legjobb a búzakorpa) 2—3 kilogr. vászon-zacskóba kötve, 5—8 liter vízzel ½ órán át főzetik. Főzet a fürdőhöz öntetik és a korpás zacskó a vízben kifacsartatik.

Lúgos fürdő. Teli fürdőben 2000—5000 kereskedésségi szódát oldatnak fel, vagy natrium hydroxydatum solutumból 600 öntetik a fürdőhöz.

Maláta-fürdő. Árpamalátának 2—3 kilogr. 5—8 liter vízben ½ órán át főzetik. Főzet gyorsan szűrve, a fürdőhöz öntetik. Maláta sör- és szeszgyárakban kapható.

Mustáros fürdő. Teli fürdőre 500°C—800°C farina semm. sinapis vétessék, lábfürdőre 100°C—200°C. A lisztet nem zacskóban tétetik a fürdőhöz, hanem közvetlenül.

Oxygén-fürdő. Langyos fürdőbe kell hinteni a testhez közel 300 gr. natrium perborat ($Na BO_3$) port, azután 30 gr. mangán-sulfuricum crudum ($Mn SO_4$) port. A képződő buborékok oxigén.

Szappanfürdő. Egy fürdőre 100°C—200°C sapo kalinus venalis v. 300°C—500°C sapo albiss. droguist. vétessék.

Szénsavas fürdő v. pezsgő-fürdő. Oldassék fel a fürdőben 150°C—200°C natrium bicarbonic. s fürdés közben, folytonos keverés mellett, óvatosan, a testtől távol öntessék bele 150°C—200°C acid. hydrochlor. crnd.

Sublimátfürdő. Fürdő vétele orvos jelenlétében! Fürdőt az orvos készítse el! Fakád! Sublimat sub sigillo, sub signo veneni, orvos kezéhez rendeltessék! a) Felnőtteknek teli fürdőre 5°C—10°C hydrarg. bichlor. corros. b) Csecsemőknek — 2 éves gyermekeknek 0.5—0.8 hydrarg. bichlor. corros. Fürdés tartama 10 perc. Fürdőzt óvni, nehogy fürdővíz a szájába jusson!

Vasfürdő v. aczélfürdő. Pharmakologice irrationalis. Bőrön át vas nem szívódik fel. Bőrre sincsen helybeli hatása. Régebben a globuli martiales szolgáltak e célra (1—4 drb)

VIII. Bőr alá fecskendésre használt szerek oldatainak töménysége.

A Pravaz-féle fecskendők, melyek bőr alá fecskendéskor használatnak, nem mindig 1 köbctm. irtartalmúak, ezért megvételnél irtartalmuk meghatározandó. Befecskendés előtt és után a fecskendő és tűje 2%-os carbololdattal fecskendeztessék át, így elkerüljük a befecskendezés helyén lobnak keletkezését. Jó a tűt bor-

Szénsavas fürdőkészülékek a víznek cseppfolyós szénsavval való telítésére, különleges gyártmánya dr. Wágner és Társai egyesült gyárak m. b. t.-céznek, Budapest, IX., Tinódy-u. 3. (lásd hirdetést).

szeszlágon is áthúzni. Ujabban bőr alá fecskendezési célokra sterilizált oldatok is tartatnak készletben, beforrasztott üvegphiolákban; egy phiolában rendszeren 1 kcm. folyadék foglaltatik; igen ajánlhatók. A befecskendés helyét szappannal kell lemosni, utána borszeszszel és aetherrel.

S z e r	Szer- meny- nyi- sége	Oldó folya- dék mennyi- sége	Egyes adag a ható- anyagból	J e g y z e t
Acid. carbolicum li- quid.	0·1-0·2	10·0 Aqu.	0·01-0·01	Polyarthrititis rheu- maticánál, or- báncznál.
Aether sulfur. . . .	—	—	1/2—2 fecsk.	Excitans.
Antipyrinum	5·0	5·0 Aqu.	1·5-2·0	Fecskendés előtt felmelegítendő; fájdalmas.
Apomorphin. hydro- chlor. Felnőttnek	0·1	10·0 Aqu.	0·005-0·01	Hánytató.
Apomorphin. hydro- chlor. nagyobb gyermeknek . . .	0·02	10·0 Aqu.	0·001-0·002	3 éven alóli gyer- meknek nem sza- bad adni.
Atropin. sulfuricum	0·02	10·0 Aqu.	0·0004-0·0008	Morphinmérgezés- nél többet is lehet adni (0·002—0·003)
Camphora	1·0	10·0 Ol. se- sami	0·1	Borszeszben oldva fájdalmas.
Chininum bisulfur .	1·0	12·0 Aqu.	0·3-0·8	Fájdalmas. Ha per- os nem lehet adni, jobb klysmában.
Chinin. bimuriat. carbamidat . . .	2·0	10·0 Aqu.	0·5-1·0	Nem fájdalmas.
Cocain. hydrochlor.	0·1-1·0	10·0 Aqu.	0·01-0·05	Fenyegető tünetek jelentkezése ese- tén amylnitrit 5 cseppjét beléle- geztetni.
Codeinum hydro- chlor	0·5	10·0 Aqu.	0·05	
Coffein. natrio-ben- zoicum	2·0	10·0 Aqu.	0·1-0·2	
Coffein. natrio-sa- licylic				
Extr. secalis corn spissum	1·0	5·0 Aqu. 5 0 Glycerin	0·1-0·2—0·3	Szülés utáni ato- niás vérzés ellen szükség esetén még többet is.
Ferrum citric. oxydat hydrarg. bichlor.	1·0	10·0 Aqu.	0·05-0·1	
corros.	0·1	10·0 Aqu. + 0·3 Natr. chlor.	0·01-0·015	1. e czim alatt a vénygyűjtemény- ben is.

S z e r	Szer- meny- nyi- sége	Oldó folya- dék mennyi- sége	Egyes adag a ható- anyagból	J e g y z e t
Hydrarg. bichlor. carbamid. solut.	—	—	—	l. e czim alatt a vény- gyűjteményben.
Hydrarg. formami- dat solut	—	—	—	lásd e czim alatt a vénygyűjtemény- ben.
Hyoscinaminum crystallis	0·05	5·0 Aqu + 5·0 Glycerin	0·001-0·005	Megbízhatlan ké- szítmények is vannak. — Leg- jobb a Merek- féle. Vigyázat!
Liquor ammonii anisatus	—	—	1/2-1 fecsk.	Fájdalmas.
Liquor kalii arseni- cosi, l. sol. Fowleri	—	—	—	
Morphinum hydro- chlor	0·2	10·0 Aqu.	0·005-0·01	
Pilocarpinum hydro- chloric. felnőttnék	0·2	10·0 Aqu.	0·01-0·02	Atropin-mérgezés esetén több is
Pilocarpinum hydro- chloric. gyermek- nek	0·1	10·0 Aqu.	0·001-0·005	1/4—1/2 fecskendő.
Scopolanin. hydro- brom.	0·01	10·0 Aqu.	0·0002-0·0005	
Solutio Fowleri . .	5·0	10·0 Aqu.	2—4 gtt.	
Strychninum nitri- cum	0·05	10·0 Aqu.	0·001-0·005	Vigyázat! Kelle- metlen tünetek esetén paralde- hyd 3·0—6·0.

IX. Belégzésre használt szerek oldatainak töménysége.*)

<i>Acid. carbolicum</i>	0·5— 4·0 : 200·0	Aqua dest.
<i>Acid. lacticum</i>	5·0—15·0 : 200·0	„
<i>Acid. tannicum</i>	0·5— 4·0 : 200·0	„
<i>Amylnitrit</i>	5 csepp vattára vagy ken- dőre cseppentve légzendő be.	„
<i>Aqua amygdalar. amar.</i>	0·5— 5·0 : 200·0	Aqua dest.
<i>Aqua calcis</i>	tisztán v. 100·0 : 50·0	„
<i>Aqua chlori</i>	2·0—10·0 : 200·0	„
<i>Argentum n tr. cryst.</i>	0·04— 1·0 : 200·0	„
<i>Chininum bisulfuric.</i>	0·2— 0·5 : 200·0 ¹⁾	„

*) A belégzés Siegl-féle készülékből szokott történni; kivétel
az amylnitrit, az Ol. terebinth, az Ol. pinii silv. és a pyridin.

¹⁾ Tussis convulsiva.

<i>Cocainum hydrochlor</i>	0·5 : 100·0 ¹⁾	Aqua dest.
<i>Extractum Belladonnae</i>	0·02— 0·1 : 200·0	"
<i>Hydrargyr. bichlor. corros.</i>	0·04— 0·1 : 200·0	"
<i>Kalium bromatum</i>	0·4— 4·0 : 200·0	"
<i>Kalium chloricum</i>	0·4— 4·0 : 200·0	"
<i>Kalium hypermanganicum</i>	0·2— 2·0 : 200·0	"
<i>Kalium jodatum</i>	0·5— 1·0 : 200·0	"
<i>Liquor ferri sesquichlorati</i>	0·5— 3·0 : 200·0	"
<i>Natrium benzoicum</i>	5·0— 20·0 : 200·0	"
<i>Natrium bicarbonicum</i>	0·4— 4·0 : 200·0	"
<i>Natrium chloratum</i>	0·4— 4·0 : 200·0	"
<i>Oleum pini silvestris</i>	15—30 csepp ²⁾	
<i>Oleum terebinthinae</i>		
<i>Pyridinum</i>	3·0— 5·0	
<i>Thymolum</i>	0·2— 0·4 : 200·0 ³⁾	Aqua dest.
<i>Tinctura opii simplex és crocata</i> ⁴⁾	0·1— 1·0 : 200·0	"

X. Doses maximales.

Legnagyobb adagjai a Magyar Gyógyszerkönyv III. kiadásába felvett és belsőleg használt, méregként is ható szereknek, a melyeken túl felnőttek számára az orvos felkiáltójel (!) használata nélkül ne rendeljen.

A szer neve	Pro	
	dosi	die
	grammokban	
Acidum arsenicosum	0·005	0·015
Acidum carbolicum	0·1	0·5
Aethylmorphinum hydrochloricum s. Dionin	0·05	0·5
Amyleum hydratum	4·0	8·0
Amylium nitrosum pro inhalatione	5 csepp	—
Antifebrinum	0·5	1·5
Antipyrinum	2·0	6·0
Antipyrinum coffeino citricum	1·5	3·0
Antipyrinum salicylicum	2·0	6·0

¹⁾ 20 gmnál több folyadékot nem szabad belélegzeni, ez megfelel 0·1 gm. cocainsonak. A beteg a nyálát le ne nyelje, hanem köpje ki. Ezzel a gégébe nem jutott cocainnak a szervezetbe jutását elkerüli.

²⁾ Párolgó meleg vízre cseppentetni s a párákat belélegzeni.

³⁾ Vízben nem oldódik, ezért néhány csepp borszeszben oldandó előbb, aztán hígítandó fel vízzel.

⁴⁾ Irrationalis, mert helybelileg nem érzéstelenít.

A szer neve	Pro	
	dosi	die
	grammokban	
Apomorphinum hydrochloricum	0·01	0·05
Aqua amygdalarum amararum	1·5	5·0
Argentum nitricum crystallisatum	0·03	0·1
Atropinum sulfuricum	0·001	0·003
Belladonna folia	0·2	0·6
Cantharides	0·05	0·15
Chloralum hydratum	3·0	6·0
Cocainum hydrochloricum	0·03	0·15
Codeinum hydrochloricum	0·05	0·30
Coffeinum	0·3	1·0
Coffeinum citricum	0·6	2·0
Coffeinum natrium benzoicum	0·6	2·0
Coffeinum natrium salicylicum	0·6	2·0
Colocynthis fructus	0·3	1·0
Cuprum sulfuricum quæ emeticum	—	1·0
Digitalis folia	0·2	1·0
Dioninum l. Aethylmorphinum hydrochl	—	—
Diuretin l. Theobromin natr. salicylicum	—	—
Eucainum B.	0·03	0·15
Extractum belladonna	0·03	0·10
Extractum cannabis indicæ	0·03	0·10
Extractum colocynthis fructus	0·05	0·15
Extractum filicis maris æthiærenum	—	10·0
Extractum hyosciami	0·10	0·30
Extractum nucis vomicæ	0·05	0·10
Extractum opii	0·1	0·3
Extractum scillæ	0·2	0·8
Extractum secalis cornuti fluidum	1·0	3·0
Extractum secalis cornuti siccum	0·5	1·5
Extractum secalis cornuti spissum	0·5	1·5
Gnajakolum carbonicum	1·0	5·0
Hydrargyrum bichloratum ammoniatum	0·02	0·06
Hydrargyrum bichloratum corrosivum	0·02	0·06
Hydrargyrum bijodatatum rubrum	0·02	0·06
Hydrargyrum chloratum mite	—	1·0
Hydrargyrum oxydatum flavum	0·02	0·06
Hydrargyrum salicylicum	0·02	0·06
Hyosciami folia	0·3	1·0
Jodoformium pro usu interno	0·2	1·0
Jodum	0·03	0·1
Kalium chloricum	0·5	2·0
Kalium stibiato tartaricum	0·15	0·5
Kreosotum	0·3	1·5

Hygiama sexies valore superat optimam chocolatam.

A szer neve

Pro

dosi	die
grammokban	

Lactucarium	0.3	1.0
Lobelia herba	0.1	0.3
Morphinum hydrochloricum	0.03	0.10
Nitroglycerinum	0.0005	0.003
Nucis vomicae semina	0.1	0.2
Oleum crotonis	0.05	0.15
Opium pulveratum	0.15	0.5
Paraldehydum	5.0	10.0
Pastilli Nitroglycerinum	1 darab	6 darab
Phenacetin	1.0	3.0
Phosphorus	0.001	0.003
Physostigminum salicylicum	0.001	0.003
Pilocarpinum hydrochloricum	0.02	0.04
Plumbum aceticum	0.1	0.5
Podophylli resina s. Podophyllum	0.05	0.2
Pulvis Doveri	1.0	5.0
Resorcinum	0.5	5.0
Sabinae frondes	1.0	2.0
Salipyrinum l. Antipyrinum salicylicum	—	—
Salolum	1.5	5.0
Santoninum	0.1	0.3
Scilla siccata	0.2	1.0
Scopolaminum hydrobromicum	0.0005	0.0015
Secale cornutum	1.0	3.0
Solutio arsenicalis Fowleri	0.5	1.5
Strophanti semina	0.05	0.15
Strychninum nitricum	0.01	0.02
Theobrominum natrio salicylicum s. Diuretin	1.0	8.0
Tinctura belladonnae	1.0	3.0
Tinctura cannabis Indicae	1.0	4.0
Tinctura cantharidum	0.5	1.5
Tinctura colchici	1.5	5.0
Tinctura digitalis	1.5	5.0
Tinctura jodi pro usu interno	0.2	1.0
Tinctura lobeliae	1.0	3.0
Tinctura nucis vomicae	1.0	2.0
Tinctura opii crocata	1.5	5.0
Tinctura opii	1.5	5.0
Tinctura strophanti	0.5	2.0
Tinctura veratri	1.0	3.0
Trionalum	—	2.0
Vinum stibiatum	0.5	1.5
Zincum sulfuricum quia emeticum	—	1.0

XI. Kivonat a kézi gyógytárakra vonatkozó belügym. rendeletről.

A kézi gyógytárakat a törvényhatóság első tisztviselője engedélyezi orvosoknak ott, hol gyógyszerár nincs. Kézigyógytárból gyógyszer kiszolgáltatni utazás közben ott, hol gyógytár van, tilos. Jogositvány csak azon helyre szól, a hova engedélyezve lett; a birtokosnak más községbe telepedése esetén megszűnik. A k. gyógytár birtokosa idegen orvos rendelőnyére csak „*periculum in mora*” jelzés esetén szolgáltatni ki gyógyszert, de csakis olyat, mely a tartandó szerek közt szerepel; így esetben a gyógyszer bármely időben elkészítendő, ha a k. gyógytár birtokosa ottlón van. Csak a következő szereket és kötszereket szabad tartani és kiszolgáltatni:

A) Gyógyszerek.

Acid. boricum, Acid. tannicum, Aether depuratus, † Antipyrinum, Aqua destillata, †† Apomorphinum hydrochlor., † Argentum nitr., †† Atropinum sulf., Bismuthum subnitr., Camphora, Chinin. hydrochlor., † Chloralum hydrat., † Chloroformium ad narcosim, †† Cocainum hydrochlor., Collodium flexile, † Cuprum sulf., †† Cylindri hydrarg. bichlor. corr., † Digitalis fol., † Extr. nucis vom. cum dextrino exsicc., † Extr. secalis corn. spiss., † Hydrarg. chloratum mite sublin. paratum., † Jodoformium, † Ipecac. rad., † Kalium brom., Kalium hypermang., † Kalium jodat., † Liquor aminon. anis., †† Morphinum hydrochlor., Natrium hydrocarb., Natr. salicyl., Oleum ricini, Pilulae ferri carbon., Pilulae laxantes, † Pulv. Doveri, Saccharum, Species diureticae, Syrupus simplex, † Tinct. jodi, † Tinct. opii simpl., Unguent. acid. borici, Unguent. hydrarg., Unguent. zinci oxyd., Vaselineum flav., † Zincum sulfur.

B) Költözőszerek.

Collempastrum adhaesivum, Lana gossypii depur., Tela depur., Fasciae e tela paratae, Tela hydrarg. bichlor. impraegn., Tela jodoformio impraegn., Tela impraegn. sec. Billroth, Fasciae e tela amylo imbuta paratae, Filum sericeum hydrarg. bichlor. impraegn.

Más szereket, mint ez elősoroltakat, tartani nem szabad. Kivételt képez a serum antidiphtheriticum, mely tartható és kiszolgáltatható, az e tekintetben fennálló szabályok megtartásával. Ha bizonyos esetekben a felsorolt szereken kívül még más szereknek tartása is multhatatlannul szükségeltetnék, úgy azoknak engedélyezése esetről-esetre a belügyministertől kérendő. A szereket a törvényhatóság területén levő valamely gyógytárból kell beszerezni; külföldről v. droguistától beszerezni tilos. Beszerzésről pontos napló vezetendő, melyet a szert eladó gyógyszerész aláír. A gyógyszerkönyv és árszabvány a kézi gyógytárakra is kötelező. A kézi gyógytár e célra alkalmas helyiségben helyezendő el.

A szereket jól záró, üvegdugós, jól signált, a dosis maximalis-al

Clin-féle laboratorium Páris:

Adrenalin solut. Clin $\frac{1}{1000}$ üvegekben 5 és 30 gr.

" " " sterilizált ampullákban.
" " " suppositoriumok.

Kakodylsavas Natron-Clin sterilizált phiolákban à 0.05 és 0.10 pr. cm³.

Metharsinate Clin (új kakodylsavas natrium, Syn. Arrhenal).

Metharsinate de fer Clin (új kakodylsavas vas) 3 alakban, sterilizált phiolákban bőraláfecskendésre, pilulákban és csöppekben belső használatra. A kakodylsavas natron fölött az az előnye, hogy per os használva, nincs kellemetlen fok-hagyma szaga.

Lecithin Clin granulákban, pilulákban és subcután injekciók alakjában

Enesol (salicylarsensavas higany) intramuscularis befecskendésre, teljesen fájdalomtalan.

Electrargol (elektromos colloidezüst) sterilizált phiolákban à 5—10 cm³ subcután, intramuscularis vagy intravenózus injekciókhoz. Teljesen fájdalomtalan. Javalatok: septicaemia, scarlatina, typhus, puerperalis láz, pleuritis, endocarditis, erysipelas stb.

Thiarsol (colloidalis kénarzén) steril. amp és csöppekben belső használatra. Javalatok: Arsenintoxicatiók, rák, trypanosomiasis.

Soluro (tisztá thyminsav) a hűgysav physiolog. kiválasztó anyaga. Javalatok: hűgysavas diathesis, uratikus köszvény-rohamok arthritis deform, vesekólika, epekövek.

Phosphotal Clin (neutr. phosphorossavas kreosot) kapsulákban emulsióban és steril. amp. Javalatok influenza, bronchitis chr., tüdőhurut, tüdőtuberculosis.

Vin et Syroup Nourry (jódos tannin vegyileg megkötve), minden evőkanál tartalmaz 0.05 tiszta jódot és egyenlő értékű 0.75 natr. jod. Javalatok: Lymphatizmus, mirigydaganatok, arteriosclerosis, rheumat. chr., tertiär syphilis.

Elixir Deret (jódos tanninsavas higany) belső használatra. Javal: syphilis minden alakjában.

Liqueur Laville és Pilules Laville Javal: idült köszvény, ólom-köszvény, arthritis chr. gastritis et enteritis chr.

Scorogéne bélműködést szabályozó szer, nem purgans, nem laxans, moszatokból (florideák) áll, felnőtteknek 2—4 kávéskanállal naponta, szárazon a szájba veendő és kevés vízzel vagy levessal leöblítendő (gyermekeknek a fele).

Comar & Cie, Páris.

Vezérképviselő Ausztria-Magyarország részére: **Mag. Ph. M. Marcus**

Telefon: 5355. **Wien, VI., Köstlergasse I.** Telefon: 5355.

MAGYARHON ELSŐ, LEGNAGYOBB ÉS LEGIOBB HIRNEVŰ ÓRAÜZLETE.

Alapítator
1847



János Prausweden
szab. óronometer- és mőráss. szaktalálój
a remontrir ingóraknak
szb. stb.

ÓRÁK, EKSZERÉK 10-évi jólállással
RÉSZLETFIZETÉSRE

Képes árjegyzék bérmentve. Javítások pontosan eszközölteinek.

ellátott üvegekben kell tartani. A kiszolgáltatót rendelőnyek a beteg nevével, kelettel, árral együtt egész terjedelmükben naplóba vezetendők. A gyógyszerrel minden esetben szabályszerű rendelőny állítandó ki a beteg számára. A gyógyszereket megromlás, fertőzés és összekeveredés ellen szigorúan óvni kell. A szerek tisztaságáért, megfelelő minőségeért, a kiszolgáltatás helyességeért, az árszabvány megtartásaért a kézi gyógytár tulajdonosa felelős.

A felszereléshez szükséges tárgyak: Szekrény, mely zárható, és külön elzárható rekeszszel bír a $\ddagger\ddagger$ szerek számára; kézi mérleg (0,1—100 gm.); 2 db. centigm. mérleg (0,01—1,0 gm.), egyik külön jellel ellátva csak a $\ddagger\ddagger$ szerek számára; súly-szekrény 0,01—200 gmig, hitelesített súlyokkal; 3 db. dörzsmozsár, egy a $\ddagger\ddagger$ -tel jelölt szereknek; 3 osztag porkártya, egy a $\ddagger\ddagger$ -es poroknak; 3 db. szarukanál, egy a $\ddagger\ddagger$ -es szereknek; 3 db. üvegtölcsér, egy a $\ddagger\ddagger$ -es szereknek; 3 db. mensura; 2 db. készülék infusumok készítésére; borseszslámpa; háromláb; szűrőpapír; 2 db. szűrővászon; 4 db. törlőkendő, 1 db. a $\ddagger\ddagger$ szereknek; 3 db. kül. uagys. porcelláncsésze. 6 db. üvegbot, 2 db. a $\ddagger\ddagger$ szereknek; 4 db. üvegpohár; a Mgy. Gyszerkönyv; a hiv. árszabvány utolsó kiadása; a gyógyszerek csomagolására szükséges tárgyak (porlűvelyek, orvosságos üvegek, dugók stb.); beszerzési napló; dispenzáló napló.

A felszerelés mindenkor jó állapotban, kifogástalanul, tisztán, rendben és hiány nélkül tartassék; a mérlegek, edények, kanalak, szűrővászon stb. minden vény elkészítése után megtisztítandók, a mérlegcsészék kitörleendőek. Az elromlott, eltörött eszközöket azonnal újakkal kell pótolni.

XII. Az orsz. betegápolási-alap stb. költségére való rendelés szabályzatának kivonata. (1898. évi 99.000 sz. belügym. szabrend.)*

Csak az érvényben levő M. Gyk. gyógyszerei, tehát csak a hiv. szerek rendelhetők, a következők kivételével, *de melyeknek hiv. készítményei rendelhetők*, pl. cannabis ind. nem rendelhető, de extr. cannabis ind. igen; vagy morphiinum nem rendelhető, de morphin. hydrochlor. igen.

Nem rendelhetők:

Absynthium	Acid. acet. conc.	Acid. chromic.
Acetum	„ acet. dil.	„ citric.
„ arom.	„ arsenic.	„ hydrochlor. conc.

*) A M. Gyk. III. kiadása alapján módosításra szorulna ezen szab. rendelet. Mivel azonban ily módosított rendelet még nem jelent meg, kénytelenek vagyunk ezen ma tényleg még érvényesen fennálló rendelet kivonatát közölni.

Alimentum Theinhardt inopinato sanat scrophulosim.

Acidnitr. conc.	Cinnabaris fact.	Moselinus
„ sulf. conc.	Cinnamomum.	Natr. acet. cryst.
Aconitin. germ.	Citrus.	„ silicium
Aconitum.	Codeinum	Nux mosch.
Agarie. chirurg	Coffeinum	„ vom.
Alumen ust.	„ citr.	Ol. amygd. dulc.
Ammoniacum.	„ natr. benz	„ auisi
Ammon. acet. sol.	Cognac.	„ anr. cort
„ carb.	Colchicinum.	„ caryophyll.
Amygd. amar.	Collodium	„ cinnam.
„ dule	„ flexile.	„ citri
Angelica.	Colocynthis	„ encalypti
Anisum. stell.	Colophon. dep. fl.	„ foeniculi
„ vulg.	Coriandrum.	„ lauri
Aqua aur. fl.	Crocus gall.	„ lavand.
„ calcis sacch.	Cubeba	„ macid.
„ cinnam. simpl.	Cupr. alum.	„ majoran.
„ cinnam. spirit.	Decoct. Zittmanni fort	„ rosae
„ menthae pip.	„ „ mit	„ rosmarini
„ rosar.	Dextrinum	„ succini
Aurantium	Elaeosacchara omnia	„ valer.
Bals. peruv.	Empl. adh. lint. ext.	Oxymel simpl.
Belladonna	Empl. angl.	Papaver somn.
Benzoe	„ cerussae	Potio magn. citr.
Bismuth. tann.	„ diachyl. simpl.	Pulpa prunor.
Calamus.	„ minii adust.	Pulvis aeroph.
Calcium carb. prae.	„ sapon.	Ratanha
„ chlor. fus.	Emuls. amygd.	Ricinus.
Calcium oxyd.	Encalyptus	Rosa
Cannabis ind.	Euphorbium	Rosmarinus
Cantharis	Extr. centaur.	Syr. althaeae
Capillus vener.	„ cinnae	„ amygd.
Caragahen	„ taraxaci	„ capell. Ven.
Cardamomum	Foeniculum	„ cinnam.
Caryophylli	Gallae	Syr. citri.
Castoreum	Gentiana	„ ipecac.
Centaureum	Guajacum	„ Equir.
Ceratum Cetacei	Guttapercha	„ senegae
Cetaceum	Hyosciamus	Tamarindus
Charta sinap.	Ichthyocolla	Tragacantha
Cort. chin. calys. conv.	Linim. styracis	Ungu. emoll.
„ „ plan.	Lupulus	„ rosatum
Chininum	Maunitum	Vinum chiniae
„ bisulf.	Mastiche	„ malag.
„ hydrochlor.	Mel ros.	„ tokajense
Chlorodine	Morphinum	

A vény eljére a beteg neve, kora, lakhelye és betegsége (latinul) feljegyzendő. A rendelt szerek (nem vegyképletekkel), a haszu.

utasítás világosan kijelölendők, a mennyiség nem számokkal, hanem betűkkel kiírandó. Orvos neve tisztán, olvashatólag írandó alá hiv. állásával együtt. Rövidítések: *t. f.* = tiszti főorvos, *j. o.* = járásorvos, *v. o.* = városi orvos, *k. o.* = közs. v. körorv. Az orsz. betegáp. alap terhére a most említett hiv. orvosokon kívül csak a belügymín. által külön megbízott magánorvosok rendelhetnek; utóbbiak *mb. o.* jelzéssel lássák el aláírásukat.

Az állami gondozásban levő gyermekeknek is az orsz. betegáp. alap terhére rendelendő a gyógyszer az 1898. évi 99.000 szab. rend. szoros betartásával. A vényen mindig feltüntetendő az áll. gondozásban levő gyermek száma, a mi a gyermektartási v. dajkakönyvből, ill. a belügym. által kiadott fizetési könyvből írandó ki. Ezen könyv bemutatása nélkül gyógyszer az orsz. betegáp. alap terhére nem rendelhető. Az így kiállított vényen a szegénység igazolása nem szükséges (1902. évi 97.106. sz. belügym. rend.)

Mintaszerűleg (normaliter) rendelendők (másképen nem szabad) azon gyógyszerek, melyeknek vényei az alább köv. mellékletben foglaltaknak. A többször magistraliter rendelendő. Pillulában csak az arg. nitr., hydrarg. bichlor. és a kreosot rendelhetők; nadályok csak valódi szükség esetén; ízjavítók csak a 15-ik életévig; chinin. tannicum inspidum csak 15 éven alóliaknak; czukorból egy porra legfeljebb 0.3 gm.

Ugyanaz a gyógyszer több beteg számára külön-külön vényen rendelendő. Nyilván. ápoló intézet betegei számára rendelésnél a vényen az intézet neve, helye s a beteg neve, kora, betegsége is megjelölendők. A beteg szegénységének igazolása szükség esetén ideigl. pótolható azzal, ha az orvos a vényre írja: „sürgös veszély miatt azonnal kiszolgáltassék“. Ily esetben a szegénység bizonyítása utólag szerzendő be. Gyógyszerek ismétlésénél mindig új vény írandó. Az expeditio mindig a legegyszerűbb kell, hogy legyen. Ha a beteg már használt edényt visz a gyógytárba, a gyógyszerész azt használhatja fel, ha az orvos a vényre vezette: „adassék a mellékelt üvegbe — tégelybe“. Oly esetben, ha az orvos az előírtnál nagyobb adag rendelését tartja szükségesnek, a normaliter rendelendő vényekből egyszerre két, sőt több adagot is rendelhet.

E szabályok megtartásáért a rendelő orvosok anyagilag felelősek s kártérítéssel sújthatók. A szabályok megtartását első sorban a hatósági főorvos ellenőrzi.

Sérültek gyógykezelésénél a vényeken megjelölendő, hogy a fennálló szabályok értelmében ki kötelezhető a költségek megtérítésére.

A mintaszerűleg (normaliter) rendelendő gyógyszerek vénymintái.

**Aether sulfuricus pro
injectione sub-
cutanea.**

Rp. Aetheris sulfurici
grammata decem.

Aqua calcis pro infante.

Rp. Aquae calcis

Aquae destillatae

aa. grammata centum
quinginta.

Aqua carbolica fortior.

Rp. Acidi carbolici liquidi
grammata viginti quinque
Aquaë destillatae
grammata quingenta.

Aqua borica.

Rp. Acidi borici
grammata tringinta
Aquaë destillatae
grammata mille.

Aqua carbolica mitior.

Rp. Acidi carbolici liquidi
grammata decem
Aquaë destillatae
grammata quingenta.

Aqua emetica.

Rp. Tartari emetici
decigramma unum
Aquaë destillatae
grammata quinquaginta.

Aqua Goulardi.

Rp. Aquaë Goulardi
grammata centum quin-
quaginta.

Aqua kreosoti.

Rp. Kreosoti fagi
grammata quatuor
Aquaë destillatae
grammata tercenta.

Aqua plumbica.

Rp. Aquaë plumbicae
grammata tercenta.

Bacillus cupri sulfurici.

Rp. Cupri sulfurici crystallisati
in forma bacilli praepa-
rati Nr. unum.

**Chloroformium cam-
phoratum.**

Rp. Chloroformii
grammata decem
Camphorae
grammata duo.

Collyrium atropini.

Rp. Atropini sulfurici
centigrammata decem
Aquaë destillatae
grammata decem.

**Collyrium adstringens
luteum.**

Rp. Collyrii adstringentis lutei
grammata quinque
Aquaë destillatae
grammata decem.

Decoctum althaeae.

Rp. Radicis althaeae
grammata decem
Aquaë destillatae qu. s.
coque ad colaturam
grammatum ducento-
rum.

Decoctum chinae.

Rp. Corticis chinae succirubrae
grammata quindecim
Aquaë destillatae qu. s.
coque ad colaturam
grammatum ducento-
rum.

Decoctum ononidis.

Rp. Radicis ononidis spinosae
grammata quindecim
Aquaë destillatae qu. s.
coque ad colaturam
grammatum ducento-
rum.

Decoctum salep.

Rp. Tuberis salep rud. tusi
gramma unum
Aquaë destillatae qu. s.
coque ad colaturam
grammatum ducento-
rum.

**Electuarium lenitivum
pro infante.**

Rp. Electuarii lenitivi gram-
mata quadraginta.

Emplastrum adhaesivum.

Rp. Emplastri adhaesi-
grammata quindecim.

Emplastrum diachyli compositum.

Rp. Emplastri diachyli compositi
grammata triginta.

Emplastrum jodatum

Rp. Hydrargyri jodati flavi
centigrammata viginti
Emplastri saponati
grammata quinque.

Emulsio oleosa.

Rp. Emulsionis oleosae
grammata ducenta.

Extractum hydrastis canadensis.

Rp. Extracti fluidi hydrastis
grammata triginta

Ferrum sesquichloratum solutum.

Rp. Ferri sesquichlorati soluti
grammata triginta.

Hydromel infantum.

Rp. Hydromelis infantum
grammata sexaginta.

Infusum ipecacuanhae.

Rp. Radicis ipecacuanhae
gramma semis
Aquae destillatae qu. s. in-
funde ad colaturam
grammatum ducentorum
Liquoris ammonii anisati
grammata duo.

Infusum digitalis.

Rp. Foliorum digitalis purpureae
gramma unum
Aquae destillatae qu. s. in-
funde ad colaturam
grammatum ducentorum.

Infusum secalis cornuti.

Rp. Secalis cornuti
grammata quinque
Aquae destillatae qu. s.
infunde ad colaturam
grammatum centum quin-
quaginta
Acidi phosphorici diluti
gramma unum
Syrupi simplicis
grammata viginti.

Infusum sennae.

Rp. Foliorum sennae
grammata quindecim
Aquae destillatae qu. s. in-
funde ad colaturam
grammatum centum quin-
quaginta.

Jodoformium.

Rp. Jodoformii pulverisati
grammata quinque.

Linimentum chloroformii.

Rp. Camphorae
grammata duo
Chloroformii
Olei sesani
aa. grammata decem.

Linimentum ad combustiones.

Rp. Aquae calcis
Olei lini loti. aa. grammata
ducenta.

Linimentum ad pernici-ones.

Rp. Camphorae
grammata quinque
Collodii
Tincturae jodinae
Olei ricini
aa. grammata decem.

Mixtura cum acido phosphorico.

Rp. Acidi phosphorici
grammata duo
Aquae destillatae
grammata
centum quinquaginta.

Mixtura amara.

Rp. Extracti gentianae
grammata quinque
Aquae foeniculi
grammata centum
octoginta.

Mixtura bromata.

Rp. Kalii bromati
Natrii bromati
aa. grammata quinque
Aquae destillatae
grammata centum.

Mixtura salis ammoniaci.

Rp. Ammonii chlorati
gramma unum
Aquae destillatae
grammata centum quinquaginta
Succi liquiritiae depurati
grammata decem.

Mucilago camphorae.

Rp. Pulveris camphorae
grammata quinque
Pulveris gummi arabici
grammata decem
Aquae destillatae
grammata quindecim.

Oleum camphoratum pro injectione subcutanea.

Rp. Camphorae
gramma unum
Olei amygdalarum dulcium
grammata decem.

Oleum jecoris aselli pro infante

Rp. Olei jecoris aselli
grammata centum.

Oleum ricini pro infante.

Rp. Olei ricini
Syrupi mannati
aa. grammata triginta.

Pastilli hydrargyri bichlorati corrosivi.

Rp. Pastillorum hydrargyri bichlorati corrosivi
grammatis senis
Nr. quinque.
(Csakis az orvos kezéhez!)

Pilulae laxantes.

Rp. Pilularum laxantium
Nr. triginta.

Pulvis calomelanos ad insersionem.

Rp. Calomelanos pulverisati
Sacchari albi
aa. grammata quinque.

Pulvis pro cataplasmate.

Rp. Farinae placentarum lini
grammata tercenta
quinquaginta.

Pulvis chinini sulfurici

Rp. Chinini sulfurici
gramma unum
Pulveris sacchari albi
grammata duo
Misce divide in dos.
Nr. quinque.

Pulvis Doveri.

Rp. Pulveris Doveri
decigrammata quinque
Pulveris sacchari albi
grammata duo
M. div. in. dos.
Nr. quinque.

Pulvis emeticus.

Rp. Tartari emetici
centigrammata tria
Pulveris ipecacuanhae
decigrammata sex
M. Detur pro dosi una.

Pulvis ferratus.

Rp. Ferri lactici
Pulveris sacchari albi
aa. grammata unum et
semis
M. div. in dos.
Nr. quinque.

Pulvis morphini hydrochlorici.

Rp. Morphini hydrochlorici
centigrammata tria
Pulveris sacchari albi
grammata duo
M. div. in dos. Nr. sex.

Pulvis opii.

Rp. Pulveris opii
centigrammata quinque
Pulveris sacchari albi
grammata duo
M. div. in dos.
Nr. quinque.

Pulvis zinci aluminati.

Rp. Zinci sulfurici
grammata quinquaginta
Aluminis crudi
grammata centum quinquaginta
Detur ad chartam.

Solutio argenti nitrici ophthalmica.

Rp. Argenti nitrici crystallisati
centigrammata viginti
Aqua destillatae
grammata decem
DS. 2% lapisol dat ecsete-
lésre.

Solutio chinini sulfurici pro infante.

Rp. Chinini sulfurici
grammata unum
Acidi sulfurici diluti qu. s.
ad solutionem
Aqua destillatae
Syrupi rubi idaei aa. gram-
mata quinquaginta.

Solutio cocaini.

Rp. Cocaini hydrochlorici
centigrammata viginti
quinque
Aqua destillatae
grammata quinque.

Solutio ergotini pro injectione subcutanea.

Rp. Extracti secalis cornutispissi
grammata duo
Glycerini
Aqua destillatae aa.
grammata quatuor.

Solutio eserini.

Rp. Eserini (physostigmini) sa-
licylici
centigrammata duo
Aqua destillatae
grammata quatuor.

Solutio kalii chlorici pro infante.

Rp. Kalii chlorici
grammata tria
Aqua destillatae
grammata tercenta
Syrupi mororum
grammata triginta.

Solutio kalii hypermanganici pro infante.

Rp. Kalii hypermanganici crys-
tallisati
decigrammata duo
Aqua destillatae
grammata ducenta.

Solutio kalii jodati.

Rp. Kalii jodati
grammata quinque
Aquae destillatae
grammata centum quin-
quaginta.

Solutio morphini hydrochlorici pro injectione subcutanea.

Rp. Morphini hydrochlorici
centigrammata decem
Aquae destillatae
grammata decem.

Solutio (collutorium) natrii boracici pro infante.

Rp. Natrii boracici
grammata tria
Aquae destillatae
grammata tercenta.

Solutio pilocarpini.

Rp. Pilocarpini hydrochlorici
centigrammata decem
Aquae destillatae
grammata quinque.

Solutio hydrargyri bichlorati corrosivi ophthalmica.

Rp. Hydrargyri bichlorati corrosivi
centigrammata decem
Aqua destillatae
grammata quingenta.

Solutio sulfatis chinini.

Rp. Chinini sulfurici
gramma unum
Acidi sulfurici diluti
guttas decem
Aqua destillatae
grammata centum.

Species althaeae.

Rp. Specierum althaeae
grammata triginta.

Syrupus ferri jodati pro infante.

Rp. Syrupi ferri jodati
grammata quinquaginta.

Thea amara.

Rp. Herbae centaurii minoris
Foliorum menthae piperitae
aa. grammata decem.

Thea diuretica.

Rp. Baccharum juniperi rud. tus.
grammata triginta
Radici ononidis spinosae
grammata viginti

Thea sambuci.

Rp. Florum sambuci
grammata triginta.

Tinctura jodina.

Rp. Tincturae jodinae
grammata viginti.

Unguentum argent nitrici.

Rp. Argenti nitrici
centigrammata viginti
Vasellinae
grammata viginti.

Unguentum Arlti.

Rp. Extracti belladonnae
Hydrargyri bichlorati ammo-
niati aa. gramma unum
Unguenti simplicis
grammata decem.

Unguentum boricum.

Rp. Acidi borici
gramma unum
Vasellinae
grammata decem.

Unguentum frontale ophthalmicum.

Rp. Extracti opii aquosi
gramma unum
Unguenti hydrargyri
grammata decem.

Unguentum hydrargyri.

Rp. Unguenti hydrargyri
grammata quindecim.

**Unguentum ichthyoli
ophtalmicum.**

Rp. Ichthyoli centigrammata
quingenta
Lanolini grammata
decem.

Unguentum sabadillae.

Rp. Unguenti sabadillae
grammata viginti.

**Unguentum sulfuratum
(ad scabiem).**

Rp. Unguenti sulfurati
grammata centum.

**Unguentum zinci oxy-
dati.**

Rp. Zinci oxydati
grammata tria
Vaselinae
grammata viginti
quinque
Cerae albae
grammata quinque.

**Unguentum ophthalmi-
cum flavum.**

Rp. Hydrargyri oxydati flavi
centigrammata decem
Lanolini
grammata quinque
Misce exactissime.

XIII. Kivonat a vénykészítésnél előforduló gyógyszerészi munkadíjak és edények hiv. árszabványából.

Érvényes az 1912. évre s ha nem módosítatik, továbbra is.

I. Általános munkálatok:

Mérés és cseppszámlálás minden esetben, kivéve ha a munkálatban már be foglaltatik, 50 cgmg = 5 fil., 50 cgmon felül = 2 fil.
Eldörzsölés = 10 fil. *Oldás* = 20 fil. *Szűrés* = 6 fil. *Szűrlezés* 500 gmig = 10 fil. *Zúzás* 150 gmig = 6 fil., ezen felül 12 fil. *Bekötés és dugó, haszn. utasítás* = 20 fil., közalapok etc. részére = 10 fil. *Pecsetelés* = 4 fil.

II. Egyes gyógyszeralakoknál a munkálatok ára:

a) *Folyékony gyógyszeralakok.* Áztatás (*maceratio*), hideg felöntés 500 gm. szüredékgig mérés és szűréssel = 10 fil. *Fejétkészítés* szűrés és méréssel = 30 fil. *Forrázat és főzet (infus. és decoct.)* szűréssel s a szüredék mérésével 500 gmig = 40 fil.; ha a főzet előállítása egy órán túl tart, minden óráért még 20 fil. *Pállítás (digerálás)* ha 6 óráig 30 fil., 12 óráig 40 fil., 24 óráig 50 fil. *Telítés (saturatio)* az oldásokkal együtt = 30 fil. *Sterilizálás* 100 gmig 50 fil., 500 gmig 100 fil.

b) *Félfolyékony gyógyszeralakok.* Kenőcs v. kenet (*ungu. és linim.*) készítése, belcértve a szükséges melegítést és olvasztást is, 100 gmig = 40 fil., ezentúl minden 100 gm = 10 fil. *Kenőcs elosztásáért* a mérésekkel és viaszpapírral együtt 1 adag bezárólag 5 adagig = 6 fil. (telhát 5 adag 30 fil.), 5 adagon felül minden adag

4 fil. *Nyelet* (*electuar.* mustárv. v. pasta készítése = 20 fil. *Tapasz* gyúrás és kisodrással, de melegítés és olvasztás nélkül 150 gmg = 20 fil., minden további 50 gm = 4 fil., melegítés olvasztással 150 gmg 30 fil., 150 gmon túl 50 gmonként 6 fil. Ezenfelül minden tapasz kiszolgáltatásáért viaszpapir, papirboríték és haszn. utasításért 150 gmg 6 fil., ezen felül menny. 10 fil. Tapasznak 100 □ ctm. vászonra, 50 □ ctm. bőr v. selyemre való felkenéseért, lemérésért együtt 30 fil., minden további 100 □ ctm. vászon vagy 50 ctm. selyem v. bőr felkenéseért 10 fillér. Felkent tapasz csomagolása és kiszolgáltatásáért 8—18 fil. Hiv. készen tartott tapasznál a felkenés munkadíja nem számítható fel, csakis a lemérés.

c) *Szilárd gyógyszeralakok.* Komprimálás, minden munkával együtt (mérés is) 1 dbért 6 fil. *Pillulák, tabletták, pastillák, trochiscusok* készítéséért méréssel együtt, bármily súlyban v. mennyiségben 50 dbig = 60 fil., 50 dbon túl minden 10 db = 6 fil. Állat gyógyászatban külön ár szerint. — *Elaeosaccharum* készítése = 10 fil. *Porok, finom osztatlanok* keveréséért = 10 fil. *Porok, durvák és fűvegyülékek* keveréséért = 10 fil. *Porok, elosztandók*, keverése és elosztásáért tokkal, egyszerű papirborítékkal és haszn. utasítással minden adagért 10 adagig = 5 fil., 10 adagon felül minden adagért = 2 fil. *Suppositoriumok*ért, készítés, olvasztás, mérések, viaszpapírral v. ónlemezrel együtt 5 dbig 1 db = 20 fil., 5 dbon túl 1 db = 10 fil.

III. Edények árai:

Köz. heng. zöld üveg	}	100 gmg = 10 f.	Köz. heng. fehér üveg	}	50 gmg = 12 f.
		100—200-ig = 12 f.			50—100-ig = 14 f.
		200—300-ig = 16 f.			100—200-ig = 16 f.
		300—500-ig = 20 f.			200—300-ig = 20 f.
		500—750-ig = 28 f.			300—500-ig = 28 f.
Zöld hatszegl. üveg	}	750—1000-ig = 36 f.	Fehér hatszegl. üveg	}	500—750-ig = 38 f.
					750—1000-ig = 50 f.
		50 gmg = 10 f.			50 gmg = 18 f.
		50—200-ig = 12 f.			50—200-ig = 22 f.
		200—300-ig = 16 f.			200—300-ig = 26 f.
	}	300—500 ig = 24 f.		}	300—500 ig = 36 f.
		1000 gmos = 32 f.			1000 gmos = 48 f.

Fekete, kék v. sárga hatszegl. üvegek a felh. hatsz. üvegeknél félszer drágábbak.

Finom keltós fehér, fekete, kék v. sárga heng. üvegek, úgyszintén a *fadugaszszal* ellátott porüvegek, a köz. felh. üvegeknél félszer drágábbak.

Mindenemű *üveg dugós üveg* a köz. egyszerű fehér üvegeknél négyszer drágább.

Feh. cseppentő üvegek. 20 gmg = 40 f. 20—50 gmg = 50 f. 50—100 gmg = 60 f. Színesek 4 fill-rel drágábbak.

Gyógyszerüvegek, vegyészeti laboratóriumok részére szükséges összes üvegek a legjobb minőségben beszerezhetők Stölzle C. fiai üveggyárak r.-t. czégnél, Budapest, Király-u. 50. (1. hird.).

Légtegy. fémfedő- vel	}	20 gmig = 12 f.	Fémfed. porzell.- tégelyek	}	Legkisebbtől 20-ig = 24 f.
		50 gmig = 16 f.			20—50-ig = 32 f.
		50—100-ig = 20 f.			50—100-ig = 40 f.
		100—200-ig = 28 f.			100—150-ig = 60 f.

Porzellán tégely *nickelfedővel* kétszeres, *fafedővel* másfélszeres áruak.

Közöns. szegély nélk. kemény *papirdobozok* haszn. utas. együtt: 50 gmig = 10 f., 50—100 gmig = 12 f., 100—150 gmig = 14 f.

Finom szegélyes, mázpapiros *dobozok* haszn. utasítással együtt; 50 gmig = 12 f., 50—100 gmig = 16 f., 100—150 gmig = 20 f.

Köz. *portolodák* haszn. utas. együtt: 1—5 porig = 10 f. 5—15 porig = 20 f. Aranyszegélyűek kettős áruak, épúgy az ostyafokokhoz valók is.

Színes *portárczák* 1—5 porig = 8 f., 5—15 porig = 16 f. Aranyosak kettős áruak.

XIV. Gyermekgyakorlatban fontosabb és hatékonyabb szerek adagolása.

A gyermekek számára rendelendő gyógyszerek adagainak kiszámítása sok nehézséggel jár. Ennek könnyítésére sokan megkísérlették már, hogy egységes alapokat javasoljanak, azonban, tekintve azt, hogy a gyermekek a különböző szerek iránt korukhoz és testsúlyukhoz képest nagyon különbözően viselkednek, s tekintve azt, hogy az első két életévben az élethónapok, sőt az első életévben még a hetek is számítanak, az egyes ily javaslatok, bár némelyike ezeknek hosszú tapasztalaton nyugszik, szélesebb körökben követőkre nem találtak. A magyar orvosok a *budapesti Stefánia gyermekkórház* orvosainak több mint festszázados tapasztalatai alapján kifejldött dosológiáját követték, úgy a mint azt az alábbi táblázatokban összefoglaltuk. A tömördek új szerre való tekintettel, melyeket a gyermekgyakorlatban is igénybe kell vennünk, s melyekre vonatkozólag hazai empyriás adatok még esetleg nincsenek: szükségesnek véltük, hogy tájékoztatás céljából ideiktassuk azon fontosabb régibb és újabb általánosító javaslatokat, melyek az irodalomban felmerültek.

Junker és *Gambius* teljes adagnak és egységnek veszik a 20—60 életévek között adagolt dosisokat. A 20-on alóli életévekre nézve tapasztalataik alapján, ezen egység bizonyos töredékeiben állapítják meg az adagokat, a mint azt az alábbi táblázat mutatja. *Sickvis* a gyermeki testsúlyhoz viszonyítja az adagokat, a felnőtt ember átlagos súlyát 62 kiloban állapítván meg; a felnőtt ember számára való adagot 1-nek azaz $\frac{62}{62}$ veszi (egység). A kisebb testsúlyú egyénnek, tehát a gyermekeknek írjunk szerinte oly adagot, mely megfelel az egység oly törtjének, melynek számlálója a testsúly kilókban, nevezője pedig 62. Tehát a 3 kilós

Hygiama diaeticum exploratum et probatum est
typho abdominali laborantibus.

újszülöttnak $\frac{3}{62}$ része, 14 kilós gyermeknek (4-ik életévnek felel meg) $\frac{14}{62}$ része az egységnek stb. irandó. Az alábbi táblázatban parallel állítottuk össze a *Juncker-Gaubius* és a *Stokvis-féle* adatokat; kiderül ezekből, hogy a két javaslat a 4-ik életévtől fogva jól egyezik egymással.

Juncker-Gaubius.

Stokvis.

Életévek	Adag	Testsúly	Adag
0 (újszülött)	—	3 kilogm.	$\frac{3}{62} = \frac{1}{20}$
1	$\frac{1}{15} - \frac{1}{12}$	9 „	$\frac{9}{62} = \frac{1}{7}$
2	$\frac{1}{8}$	11 „	$\frac{11}{62} = \frac{1}{6}$
3	$\frac{1}{6}$	12 „	$\frac{12}{62} = \frac{1}{5}$
4	$\frac{1}{4}$	14 „	$\frac{14}{62} = \frac{1}{4}$
4—7	$\frac{1}{3}$	20 „	$\frac{20}{62} = \frac{1}{3}$
7—14	$\frac{1}{2}$	31 „	$\frac{31}{62} = \frac{1}{2}$
14—20	$\frac{2}{3}$	40 „	$\frac{40}{62} = \frac{2}{3}$
20—60	1	62 „	$\frac{62}{62} = 1$

Young az 1—12-ik életévekig a következő formula szerint számítja ki az adagot: $\frac{n}{n+12}$ midőn n = a gyermek életéveinek számával s az egység a felnőttnek szánt adag. Tehát pl. 3 éves gyermeknek $\frac{3}{3+12} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$ része adandó azon adagnak mely a felnőttnek való.

Durst azt ajánlja, hogy a 20 éven alóli egyéneknek irandó adag egy olyan törtje legyen a felnőttek számára való adagnak (az egységnek), melynek számlálója az egyén éveinek száma, neve zője pedig állandóan 20 legyen. Pl. 3 éves gyermeknek $\frac{3}{20}$ része az egységnek, 7 évesnek $\frac{7}{20}$ része adandó. Ő azonban *igen helyesen* az egy éven alóli kort még 10 egyenlő részre is felosztja s ehhez képest is redukálja az adagot következőképen: ha 1 éves gyermeknek a felnőtt adagának $\frac{1}{20} = \frac{10}{200}$ része adandó, akkor 2 hónapos gyermeknek (10 hetes) $\frac{2}{200}$ rész, 6 hónaposnak (25 hetes) $\frac{5}{200} - \frac{6}{200}$ rész adandó az egységből.

LIEBE-féle

Anämin vaspepsinsaccharatum, vérszaporító szer. Kitűnő izü, étvágygerjesztő, erősítő. Gyomornyomást, székszorulást sohasem okoz. Gyógyeredmények elsőrangúak.

Arsanämin. Anämin arsennel kombinálva. Kitűnően emésztethető. Tökéletes gyógyhatása mellett a gyomrot soha meg nem terheli. Vas-arzén adagolásának legtökéletesebb módja.

Sagradabor. Kellemes, nem izgató hashajtó. Hatása biztos. 10—12 óra alatt jelentkezik, minden koru egyéneknek, még terhesség alatt és után is.

Neutrális tápszer. Az anyatej ideális pótszere. Egészséges gyermekek táplálására, gyomorbélbeteg gyermekek kezelésénél kitűnően vált be.


Maláta kivonat-por. Nyálkaoldó hatása hurutoknál, köhögésnél kitűnő. Hízaló kuráknál fontos tápszer. Szoptatás közben táplál és erősít. Kitűnő izü, könnyen emészthető erősítő szer.

Kapható az összes gyógyszer-tárakban.

J. Paul Liebe, Tetschen a/E.
gyógyszer-készítmények gyára.

HAUBNER C. Angyal-Gyógyszertára.

WIEN, I., Bognergasse 9.



Eredeti BERNATZIK-féle sterilizált és konzervált subcután injekció folyadékok,
beforrasztott üvegphiolákban tetszés szerinti oldatokban és
legpontosabb adagolásban.

Hordozható tokok 6—8 phiola számára. Pravaz feeskendővel
vagy anélkül. — Továbbá: Egészségi kúpok nők részére.
(Supposit, anticoncep. C. H.) — Emésztést elősegítő Blanco
Tabletták Dr. Pál egyetemi tanár előírása szerint. — Eredeti
amerikai Cascara Sagrada Pastillák 0·5, C. H. védjeggyel.

Főraktár: Parke Dawis & Co. czégtől.

” Fellow Hypophosphit Syrup.

” Sandow-féle sók és fürdők.

Oxygen gummitömlőkben és pneumo inhalációs készülékek.
Főképviselet Ausztria és Magyarország részére: az összes
Hoechst Koch Tuberkulin subkutan injekció folyadékoknak
beforrasztott és konzervált üvegphiolákban, melyek Dr. Frese-
nius a/M. speziallaboratoriumában készíttetnek Hoechst-gyárak
ellenőrzése alatt.

Prospektusok és irodalom megküldetnek.

A budapesti Stefánia gyermekkórházzal kapcsolatos egyetemi gyermekklinikán szokásos adagolás.

Rövidítések: *gyerm.* = gyermeknek; *kk.* = kávéskanál; *gyk.* = gyermekkanál; *ór.* = óránként; *gtt.* = gutta; *l.* = lásd; *m.* = mint. A súlyokat jelző számok mellől a gm. többnyire elhagyatott.

S z e r	A d a g
Acid. acetylo salicyl	0·2—0·3 porban 3—6 éves gyermek. pro dos. 0·6—1·0 pro die.
Acid. arsenicosum	0,05—50 db. labdacstra. 1—3 pill. étkezés közben napj. egyszer.
Acid. benzoicum	3—6 éves gyermek. 0·05 pro dos. 0·25—0·3 pro die.
Acid. carbolicum	Helybelileg sebkezelésben nagy vigyázattal alkalmaztassék. Legjobb nem használni. Torokviznek és bels. nem.
Acid. citricum	0·5—1·0 : 100·0 2 ór. kk. v. gyk.
Acid. hydrochlor. dilut. . . .	Korhoz képest 8—15 gtt.: 80,0 2 ór. kk. v. gyk.
Acid. lacticum	Csecsemőknek 0·5—1·0 : 80,0 2 ór. 1 kk. nagyobb gyermek. 1 gyk.
Acid. phosphor	1·0 : 100·02 ór. kk. v. gyk.
Acid. pyrogallicum l. Pyrogallol	
Acid. salicyl.	Bels. nem. Küls. hintőpor 1,0 : 10,0.
Acid. sulfur. dilut.	5—6 éves gyermek. 10 gtt.: 100·02 ór. gyk.
Acid. tannicum	Korhoz képest 0·01—0·03 pro dos.; 0·05 - 0·15 pro die. Bélmosáshoz 1 késhegynyi 1/2 lit. vízre. Bels. ritk.
Acid. tartaricum	Mint az acid. citricum.
Agaricin	0·002—0·005—0·008 pro dos.
Agurin	Mint a diuretin.
Althaeae rad.	Decoct. 5·0 : 100·0 2 ór. gyk.
Alumen	Száj-, torokvíz 6·0 : 300,0. Bels. 1—2 éves gyermek. 0·5 : 100·0 2 ór. gyk.
Aluminium acet. sol.	L. Liquor alumin. acet.
Ammonium chlorat	{ 3—6 éves gyermek 0·5—1·0 : 100 0 2 ór. gyk.
Ammonium chlorat. ferrat. . .	
Amylenhydrat.	0·2—0·5 pro dos.
Antifebrin	Annycentigm. pro dos., a hány éves a gyermek., de 14 éven alul soha 0·1 gmon felül pro dos. és 0·5 gmon felül pro die.

S z e r

A d a g

Antimonium sulfuratum auratum	2—6 éves gyermek. 0·005—0·01 pro dos. 2 ór.; 0·025—0·05 pro die.
Antipyrinum	Mint antipyreticum annyi decim. pro dos., ahány éves a gyermek. 3—4-szer napj. v. egyszerre 3-szor annyi decim., ahány éves a gyermek.
Apomorph. hydrochlor.	Mint emetieumot csak nagyobb (5—6 éven felüli) gyermek nagy szükség (!) esetén subcután 0·001—0·002 gm. pro dos. Mint expectorans nem!
Aqua amygdalar. amar.	{ 2 éven aluli gyermek. 5 gtt. : 50,0 2 ór. 1 kk. 2 éven felüli gyermek. 5—10 gtt. : 50·0 2 ór. 1 gyk.
Aqua laurocerasi	
Aqua calcis	Száj-, torokviznek 100,0 : 50,0 v. 100·0 : 100,0. vízre.
Aqua laxativa viennensis	3—6 éves gyermek. ór. 1 gyk. míg hatás jelentkezik.
Aruicae flor.	4—8 éves gyermek. infus. 1·0 : 100·0 2 ór. 1 gyk. Fölösleges!
Argentum nitricum	Belsőleg. 3—6 éves gyermek. 0·002—0·003 pro dos.; 2—3-szor pro die.
Arsen-készítmények, l. Solutio arsen. Fowleri	
Asa foetida	Csörének 1,0 : 150,0 emulsióra.
Aspirin	L. Acid. acetylo salicyl.
Atropinum sulfur	Ne rendeltessék gyermeknek bels. Csak szembe cseppentesre.
Belladonna, l. Extract. bellad.	
Benzoe, l. Acid. benz.	
Bicarbon. natrii l. Natr. hydrocarb.	
Bismuthum subnitricum	1—6 éves gyermek. 0·1—0·2 pro dos.; 0·25—0·5 pro die.
Bismuth. subsalicyl.	0·1—0·2 pro dos. napj. 5—6-szor.
Bismuthum tannicum	Mint a bismuth. subnitr.
Borax veneta l. Natr. boracicum	
Bromidia	L. Mixtura chloralo-bromata.
Burovi solutio	L. Liquor alumin. acet.
Calcium carbon praecipit	Belsőleg 1—3 éves gyermek. 0·1—0·2 pro dos.

S z e r

A d a g

Calcium hypophosphit . . .	3-6 éves gyermek. 0,1-0,2 pro dos. 3-4 szer napj. oldatban.
Calcium phosphoricum . . .	Porban 0,2-0,5 napj. 3-4-szer.
Calomel	Mint hashajtót 4-8 éves gyermek. 0,05 pro dos., míg hatás nem jelentkezik. Dyspepsiánál csecsemőnek p. Do- ver-aa 0,004-0,006 pro dosi 2 ór. syphilis congenitánál csecsemőnek - 2 éven aluli gyermek. 0,005-0,01 felmenőleg pro dos. 2-szer nap.
Calumba rad.	2,0-3,0 : 100,0 decoctum, 1-4 éves gyermek. 2 ór. egy kk. v. gyk.
Camphora	3-6 éves gyermek. 0,01-0,02 pro dos. 2 ór.; 0,05-0,1 pro die.
Cannabis indica l. Extr. cannabis	
Cascarilla l. Tinct. casca- rilla.	
Chinae cortex	4-6 éves gyermek. decoct. 4,0 : 100,0 2 ór. 1 gyk.
Chininum ferro-citricum . .	3-6 éves gyermek. 0,03-0,05 pro dos. 2 ór.; 0,15-0,25 pro die.
Chininum sulfur	Mint antimalarietumot 2-4 éves gyermek. 0,2-0,3. 6-10 éves gyermek. 0,3-0,5 a lázrohame előtt 4-6 órá- val. Mint antipyreticumot ugyan- anyit pro die 4-5 részre elosztva. Chinin. tannicumból mindig há- romszor annyit.
Chininum bisulfur	
Chininum hydrochlor	
Chininum tannicum	
Chloralhydrat	Csecsemőnek 0,2-0,5 : 80,0 2 ór. kk.; esőrében 0,4-0,6 egyszerre nyá- kos oldatban.
Chloralum formamid.	Mint a chloralhydrat.
Chloralurethan	Valamivel több adható mint a chlo- ralhydratból.
Citrophen	Mint a phenacetin.
Cocainum hydrochloric . . .	Bels. nem. Küls. mint felnőttéknél. Vigyázat nehogy sok felszívódjék.
Codeinum hydrochlor. . . .	0,003-0,005 napj. 2-3-szor 3-6 éves gyermek. porban, oldatban.
Coffeinum natrio-benzoic. . .	0,02-0,05-0,1 pro dos.
Coffeinum natrio-salicyl . .	0,1-0,5 pro die.
Colombo rad.	L. Calumba.
Cremor tartari.	L. Kalium hydrotartaricum.
Cuprum sulfuricum	Mint emetieumot 2-6 éves gyermek. 0,2-0,4 : 100 0 1/4 ór. kk. v. gyk. a hatás beálltáig.

S z e r	A d a g
Digalen	Pro dosi 5–15 gtt; pro die 10–30 gtt.
Digitalis folia.	Csecsemőnek macer. 0·1 : 80, 2 ór. kk.; 3–6 éves gyermek. mac. 0·2–0·3 : 100·0 2 ór. gyk.
Diuretin	0·05–0·15 pro dos. 0·3–1·0 pro die.
Electuarium lenitivum	3–6 éves gyermek. 1–2 kávéskanállal; ha hatása nincs, 3–4 óra múlva ismét ugyanannyit.
Elixirium acidum Halleri	Mint az acid. sulf. dil.
Ergotinum	L. Extr. secalis corn. spiss.
Euchiminum	Chininsók helyett, mert iztelen, adag 0·4–0·5 pro dos. 1,0–2,0 pro die.
Extractum belladonnae	3–10 éves gyermek. 0·003–0·005 pro dos. napjában 1–2 szer.
Extractum cannabis indicae	4–8 éves gyermek. 0·005–0·02 pro dos. 2 ór.; 0·025–0·1 pro die.
Extr. calumbae	Oldatban 0·5 : 100·0 2 ór. kk. v. gyk.
Extr. chinae fluidum	0·5–1·0 : 100·0 napj. 3-szor 1 kk. v. gyk.
Extr. kolae fluidum	3–6 éves gyermek. 10–30 cseppet napj. 3-szor.
Extr. ferri pomati.	0·3–0·6 pro die oldatban.
Extract. filicis maris aethe- renum	4–8 éves gyermek. electuáriumban 2·5– 4·0 egy óra alatt; utána ricinus ola- jat nem szabad adni!
Extract. hyosciami	2–6 éves gyermek. 0·005–0·01 pro dos. 2 ór.; 0·025–0·05 pro die.
Extract. nucis vomicae	1–6 éves gyermek. 0·003–0·005 pro dos. 2 ór.; 0·015–0·025 pro die. 6–10 éves gyermek. 0·005–0·007 pro dos. 2 ór.; 0·025–0·035 pro die. Enuresis noct. esetén nagyobb gyermeknek este 0·01 pro dos.
Extract. opii aquos.	Nem rendeljük, helyette tinct. opii simpl. l. ott.
Extract. ratanhiaep.	Csecsemőnek s 3 éven aluli gyermek. 0·2–0·4 : 100·0 2 ór. kk. v. gyk.
Extr. secalis cornuti spiss.	5 éven túli gyermek. 0·05 pro dos. 2 ór.; 0·20 pro die.
Extr. secalis corn. fluid.	5 éven túli gyermek. 5–15 cseppet kor szerint 2–3 szor napj.
Ferratinum	0·1–0·2 pro die porban.
Ferrum reduct.	Serdülő gyermeknek 0·03 pro dos., 0·15 pro die.
Ferrum iodatum l. Sympus ferri iodati.	

S z e r

A d a g

Ferrum lacticum	{ Csecsemőnek 0·01—0·02 pro dos.; 0·02—0·05 pro die. 2—6 éves gyermek. 0·03—0·05 pro dos.; 0·15—0·3 pro die.
Ferrum natrio-pyrophosphoric	
Ferrum oxyd. dialys	2—4 év. gyermek. 2·0 : 100·0 2 ór. 1 kk. v. gyk.
Ferrum sesquichlorat. solutum	1—4 éves gyermek. 8—10 gtt. : 100·0 2 ór. gyk. 4—8 éves gyermek. 10—15 gtt. : 100·0 2 ór. gyk. Nem rationalis.
Ferrum sulfuricum oxydul.	0·5—1·0 : 15,0—20,0 napj. 3×10 cseppet.
Filix mas l. Extr. filic. mar. aeth.	
Flores Kouso	L. Kusso flor.
Flores salis ammoniaci martiales l. Ammon. chlor. ferrat.	
Flores zinci l. Zincum oxydat.	
Fructus tamarindorum l. Tamarindus.	
Granati cortex l. Punicae granati cortex.	
Guajacolum carbon.	6—12 éves gyermek. 0·2 pro dos. porban, napj. 3—4 port.
Gummi Kino	Mint az extr. ratanhae.
Hydrargyr. bichlorat. corrosivum	Csak fürdőben, l. mesterséges fürdők.
Hydrargyr. chlorat. mite l. Calomel.	
Hydrargyr. jodatum flavum.	4—6 éves gyermek. belsőleg 0·005—0·01 pro dos. porban 2-szer napjában.
Hydrargyrum tannic. oxydul.	0·01—0·02 pro dos. 2× napj. bels.
Hydromel infantum	2—3 éves gyermek. 2 ór. gyk., míg hatás jelentkezik.
Hyosciamus l. Extr. hyosciami.	
Ipecacuanhae radix	Mint expectorans infusumban csecsemőnek 0·1 : 80·0 2 ór. kk.; 2—6 éves gyermek. 0·15—0·25 : 100·0 2 ór. gyk. Mint emeticum infusumban 1·0—2·0 : 50, 1/4 ór. csecsemőnek kk., 2—6 éves gyermek. gyk. míg hatás jelentkezik.
Jodipin	5—10—15 csepp napj. 3-szor.
Jodoformium	Bels. nem. Kenőcs, hintőpor, mint felnőtteknek. Vigyázat! Keveset hintünk!

S z e r

A d a g

Kalium aceticum solutum .	3—6 éves gyermek. 1'0—3'0—5'0 : 100 2 ór. kk. v. gyk.
Kalium bromatum	Csecsemőnek 0'5—1'0 : 80,0 2 ór. kk. 2—6 éves gyermek. 1'0—2'0 : 100'0 2 ór. gyk. Porban 2—6 éves gyermek. 0'1—0'2 pro dos.; 0'5—1'5 pro die.
Kalium chloricum	Vigyzat! Száj-, torokvizben 1'0—3'0. 200,0. Belsőleg 2—6 éves gyermek. 1'0—2'0 : 100'0 2 ór. gyk. Nem ra- tionalis.
Kalium hydrotartaricum . .	4—8 éves gyermek. 1'0—2'0 pro die.
Kalium hypermanganicum .	Száj-, torokvíznek 0'2—0'3 : 200,0; ha lenyeine a gyermek, esetelés alak- jában (gyapot-pamattal).
Kalium jodatum	Kenőcsnek 2'0 : 30,0 hozzá 0'1 jodum purum. Belsőleg 1—4 éves gyer- meknek 0'5—1'0 : 80,0 2 ór. kk. v. gyk.; 4—8 éves gyermek. 1'0—2'0 : 100'0 négy gyk. napj.
Kalium natrio-tartaricum . .	3—5 éves gyermek. 10'0 : 100,0 ór. gyk.
Kalium stibio-tartaricum . .	Mint emeticum 1—2 éves gyermek. 0.05 : 50,0 1/4 ór. kk. míg hatás jelentke- zik. Gyenge gyermekeknek v. gyó- mor- és bélizgalom esetén ne ren- deltessék (!).
Kamala depuratum	2—6 éves gyermek. 2'0—4'0 electuarium- ban; 1 1/2 óra alatt elfogyasztandó.
Koso flores s. Kusso flor. . .	4—8 éves gyermek. 6'0—10'0 electuarium- ban; 1 1/2 óra alatt elfogyasztandó.
Kreosotum	0'5 : 150,0 ol. jecorisra. napj. 2-szer 1 kk. v. gyk.
Lactas ferri l. Ferrum lactic.	
Lactophenin	Mint a phenacetin.
Lactucarium germanicum . .	4—6 éves gyermek. 0'02—0'03 pro dos.; 0'1—0'15 pro die.
Lichen islandicus	Decoctumban 2'0—4'0 : 80,0 2 ór. gyk.
Lignum campechian	Decoct. 5'0 : 100 2 ór. 1 gyk. 2—4 csepp tinct. opiival.
Liparin	Mint az ol. jecoris aselli.
Liquor alumin. acet.	5—7 év. gyermek. 30,0 : 100,0 2 ór. 1 kk. v. gyk. Bélbeöntésre 300,0 : 1000'0.
Liquor ammonii anisatus . .	Csecsemőnek — 2 év. n aluli gyermek. 8—10 gtt. : 80,0 2 ór. kk.; 2—6 éves gyermek. 10—15 gtt. : 100'0 2 ór. gyk.
Liquor ferri albuminati . .	} Kávéskanalanként napj. 3-szor.
Liquor ferri album. sacchar.	

S z e r

A d a g

Liquor ferri sesquichlor. l. Ferrum sesquichlor. sol.	
Liquor hydrogen. superoxyd (30%)	6'0:600,0 szájvíz, torokvíz alakjában fecskendesre.
Liquor kalii acet. l. Kalium acet. solut.	
Magisterium bismuthi l. Bis- muth. subnit.	
Magnesium carbonicum . . .	} Késhegynyit napjában 2—3-szor.
Magnesium oxydatum s. Mag- nesia usta	
Mannitum	Csecsemőnek 5'0 : 50,0 (aqua ferv.) ór. gyk., míg hatás jelentkezik.
Mixtura chloralo bromata .	20—40 cseppet 3—6 éves gyermek napj. 3-szor.
Morphinum hydrochloricum	Gyermekeknél egyáltalán ne használ- tassék (!!). Legfeljebb uraemiás gör- csök eseteiben nagyobb gyermek. bőr alá 0'05 : 10,0, ebből 1/2 Pravaz.
Moschus	0'01—0'02 pro dos.; 0'05—0'1 pro die.
Natrium hydrocarbon. seu bicarb.	Csecsemőnek 0'4 : 80,0 2 ór. kk.; 2—6 éves gyermek. 0'5—1'0 : 100'0 2 ór. gyk.
Natrium boracicum	Száj, torokvíznek (soor) 1'0—2'0 : 100,0. Puha vázondarabbal moso- gatások.
Natrium bromatum	1—2 év. gyermek. 1'0 : 100'0 2 ór. kk.
Natrium citricum	1'0—2'0 : 100 oldatban 2 ór. 1 gyk.
Natrium nitricum	3—6 éves gyermek. 0'5—1'0 : 100'0 2 ór. gyk.
Natrium phosphoricum . .	3—6 éves gyermek. 1'0—2'0 : 100'0 2 ór. gyk.
Natrium salicylicum	Mint antipyreticum 2—4 éves gyermek. 1'0—2'0 : 100'0 ór. gyk.
Nux vomica l. Extr. nucis vom. és tinct. nucis vom.	
Opium purum	Ne rendeltessék; helyette tinctura opii simpl. l. ott.
Oxymel scillae	Hánytatókban syrup helyett 10'0—20'0.
Oleum jecoris aselli	Napjában 2-szer korhoz képest kk. v. gyk.
Oleum ricini	Korhoz képest kk. v. gyk.
Oleum terebinthinae	L. belélegzésre szolgáló szerek táblá- ját.
Paraldehydum	0'5—1'0 pro dos. és pro die.

S z e r	A d a g
Paullinia sorbilis s. Pasta	1—5 éves gyermek. 0·03—0·05 pro dos.
Guarana	0·15—0·25 pro die.
Pepsinum germanicum . . .	Csecsemőnek 0·05. pro dos. szopás előtt; 2—5 éves gyermek. 0·1 pro dos. étkezés előtt. Utána sósav (1. ott).
Phenacetinum	Mint antipyreticum bels. 2—5 éves gyermek. 0·1—0·15; 6—10 éves gyermek. 0·2 pro dos. napj. 3—4-szer.
Phosphorus	0·0002—0·0005 pro dos. és pro die.
Pilocarpinum hydrochlor. . .	Subcutan 1—5 éves gyermek. 0·002—0·005 pro dos.; 5—12 éves gyermek. 0·006—0·01 pro dos. Uraemia ellen több.
Polygalae Senegae rad. . .	1 éven alnl 1·0—2·0 : 80·0, 1 éven felül 2·0—4·0 : 100·0 2 ór. kk., ill. 1 gyk.
Protojoduretum hydrargyri l.	
Hydrarg. jodat. flav.	
Pulpa tamarindorum l. Tamarindus.	
Pulvis Doveri	Csecsemőnek 0·005—0·01 pro dos. és 0·025—0·06 pro die; 1—5 éves gyermek. 0·01—0·03 pro dos.; 0·06—0·2 pro die; 6—10 éves gyermek. 0·05 pro dos.; 0·4 pro die.
Punicae granati cortex radices	4—8 éves gyermek. 15·0 gmból mace-rato decoctum 150,0 vízre: 1½ óra alatt bevenni.
Purgo	Purgo mitiorból ½—1 pastilla.
Pyramidonum	0·1—0·2 pro dos. napj. 2—3 × porban.
Pyrogallol	Kenőcs. 1 : 20. (Vigyázat!)
Ratanhae radix l. Extr. ratanh. dep. és tinct. ratanli.	
Resorcinum	0·2 : 80 inf. chamomillae-re 2 ór. 1 kk. v. gyk.
Rhei chinensis radix.	3—8 éves gyermek. 0·05—0·1 pro dos. 0·25—0·5 pro die.
Sal ammoniacus dep. l. Ammon. chlor.	
Sal. Seignetti l. Kalium nat-rio-tartar.	
Salep tubera	0·5 : 80,0 decoct. 2 ór. kk. v. gyk.
Salolum	Bels. 0·2—0·3 pro dos. 3—5 × napj.
Santoninum	2—4 éves gyermek. 0·02—0·03 pro dos. 0·06—0·1 pro die. 4—8 éves gyermek. 0·03—0·04 pro dos.; 0·15—0·2 pro die.
Senega l. Polygalae senegae radix.	

S z e r

A d a g

Serum antidiphther. l. a rend-
delvények közt.

Sirolin
Solutio arsenicalis Fowleri .

Solutio Burowi l. Liquor alu-
minii acetic.

Strophanthus l. Tinct. stroph.
Strychninum nitricum . . .

Sulfonal

Sulfur auratum antimonii l.
antimon. sulfur. aurat.

Syrupus hypophosph. comp.

Syrupus ferri jodati.

Syrupus kalii sulfoguajacoli
Tamarindus.

Tannalbin

Tanninum albumin. keratin
Tannigen

Tannocol
Tanninum pur. l. Acid. tannic.

Tannas chinini l. Chinin tan-
nic.

Tartarus emeticus l. Kalium
stibio-tartaricum.

Terpinum hydratum.

Thynolum

Tinctura belladonnae

Tinctura cascarillae

Tinct. castorei

L. Syrupus kalii sulfoguajacoli.
5—12 éves gyermek. 3 gtt. pro die. fo-
kozatosan emelkedőleg 8—10—12
gtt-ig pro die oldatban.

Diphtheriás hűdésnél 0·01: 10·0 napj.
1×1 cm³ (0·001!) bőr alá.

0 25—0·3 pro dos. és pro die mint hyp-
noticum és 0·1—0·15 pro dos. napj.
3—4-szer mint sedativum. Gyerme-
nem czélszerű!

3—6 éves gyermek. 1²kk. napj. 2—3-
szor.

2—4 éves gyermek. 3—5 gtt. 3—4-szer
napjában czukros vízben.
Napj. 1—3 kk. kor szerint.

4—8 éves gyermek. decoctum 10·0:100,0
2 ór. gyk.

0·3—0·5 pro dos. napj. 2—4-szer.
3—6 éves gyermek. porban.

Mint a tannalbint.

0·2—0·3 pro dos. 2 ór. porban 1—2
éves gyermek.

Mint a tannalbin.

0·5 : 80,0 2 ór. 1 kk. v. gyk.

0·5 : 500 vízre spir. vini és glycerin
segélyével oldva belehelésül.

1—5 éves gyermek. 2—5 gtt.: 100·0 2 ór.
kk. v. gyk.

1—2 éves gyermek. 15 gtt.: 80,0 2 ór. kk.
v. gyk.

Mint a tinct. moschi.

Alimentum Theinhardt amyllum non continet nisi
solubile.

S z e r	A d a g
Tinct. chinae composita . . .	1—3 éves gyermek. 1'0—2'0 : 80,0 2 ór. kk. v. gyk., később naponta 3× 10—15—20 csepp
Tinct. moschi	1—2 éves gyermek. 10 gtt. : 80'0, 2 ór. kk. v. gyk.
Tinct. nucis vomicae	Csecsemőknek 1—2 gtt. : 80,0 2 ór. kk.; 1—3 éves gyermek. 3—4 gtt. : 100 0 2 ór. gyk.; 3—6 éves gyermek. 3—5 gtt. : 100'0 2 ór. gyk.
Tinct. opii simplex	{ Csecsemőknek 1—2 gtt. : 80,0 2 ór. kk.; 2—6 éves gyermek. 3—5 gtt. : 100'0 2 ór. gyk.; újszülöttnék és csecsemőknek az első 2 hónapban ne rendeltessék.
Tinct. opii crocata	
Tinctura ratanhiaie	Csecsemőknek 10—15 gtt. : 80,0 2 ór. kk.
Tinct. rhei aquosa	{ Csecsemőknek 1'0—2'0 : 80,0 2 ór. kk. később Tinct. Chinae. comp. v. tinct. Amaraval együtt 3-szor napj. 10 csepp
Tinct. rhei vinosa s. Darelli	
Tinct. strophanthi	2 éven aluli gyermek. nem!! 2—10 évesnek 3—4× napj 2—4 gtt. : 100'0 napj. 3—4× kk. v. gyk. Nagy vigyázat!
Tinct. valerianae spirit. . . .	Csecsemőknek 10 gtt. : 80,0 2 ór. kk. 2—5 éves gyermek. 15 gtt. : 100'0 2 ór. gyk.
Unguentum hydrargyri cinereum	Bedörzsölési gyógymódra 3—6 éves gyermeknek 0'5—1'0 pro die unguent. simplex-szel aa.
Urethamm	Mint sedativum 1—3 éves gyermek. 0'1—0'3 pro dos. és 0'5—1'0 pro die. Mint hypnoticum 12—18 hónapos gyermek. 0'25. 2—3 évesnek 0'5, 5—6 évesnek 1'0, 10 éven felülének 1,5.
Uvae ursi folia	4—8 éves gyermek. decoct. 5'0 : 80,0 2 ór. gyk.
Valerianae radix	4—8 éves gyermek. infus. 4'0 : 100'0 2 ór. gyk.
Zincum oxydatum	{ Csecsemőknek 0'02 pro dos.; 0'08—0'1 pro die; 2—5 éves gyermek. 0'03—0'04 pro dos.; 0'1—0'15 pro die.
Zincum valerianicum	

XV. Vénygyűjtemény.

H = hivatalos; † = kézi eladásban ki nem adható gyógyszer, melyek a többiektől elkülönítve tartandók; †† = erősen ható mérgek, melyek külön és elzárt helyen tartandók.

Ahol a szövegben az adagok után ! jel látható, külön megjegyzés nélkül = dos. maxim. singula.

Teufel Universal háskötői világszerte ismeretesek és kiváló orvosi autoritásoktól a legjobban ajánltnak. (L. hird.)

Abanon. Fehér, vízben nehezen old., íztelen por. Magnesiumphosphortartarat. Enyhe hashajtó, mint a Seignette-só. Adag 1—2 kk. vízben v. syrupban. Tabletták készen.

Abrastol l. Asaprol.

Abrin. L. Jequiritol.

Abrotanol. Az *Artemisia Abrotanum* (Compositae) leveleinek és ágvégeinek kivonata. Csersav-tartalmú készítmény. Anti-diarrhoeicum. Menthollal és cacaoporról készült tabletták készen, melyekből adag napj. 2—3×2—3 db.

H. Absinthii herba. (*Artemisia Absinthium*. Compositae.) Hatóanyagok: 1. absinthin, jegeczíthető keserű anyag, 2. illó olaj, mely a camphorral isomer absintholt is magában foglalja. Amarum, excitans. Porban 0,5—1,0 pro dos napj. 3—4-szer; infusumban 5,0 : 150,0 2 ór. evőkanállal.

H. Tinctura Absinthii composita. (Hb. absinth. cort. aurant. rh. calami, r. gentian. cort. cinnam.) Amarum 20—40 csepp napj. 2—3-szor, borban, likőrben.

1 <i>Rp.</i> Infus. herb. Absinthii e 5,0—10,0. l. a p. ad colat. 150,0. Syr. Aurantii 10,0. <i>MDS.</i> 2 ór. 1 evőkan.	2 <i>Rp.</i> Tinct. Absinthii comp. 5,0. Tinct. Rhei Darellii 40,0. <i>MDS.</i> 3—4-szer napj. 30—50. cseppet.
--	---

Acerdol l. Calcium permanganicum.

Acetal. (Diaethylacetal.) [CH_3 . CH . (C_2H_5) $_2$] Színtelen folyadék. Hypnoticum, sedativum chloralhydrat helyett. Adag. 5,0—10,0 pro dos.

†**H. Acetanilid.** L. Antifebrin.

Acetoncollodium. L. Filmogen.

Acetonchloroformium s. **Chloreton.** (OH C [CH_3] $_2$. CH_3 + $1\frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$). Fehér, kámforszagú jegeczpor, vízben nehezen, alkoh. aetherben könnyen old. L. *Aneson*.

3 <i>Rp.</i> Acetonchloroformii 0,3. Det. in caps. anyl. Dent. tal. dos. No. XX. S. 3—4 ór. 1 dbot Tengeri betegség ellen.	4 <i>Rp.</i> Acetonchloroformii Camphorae aa 2,0. Tinct. Cinnam. 0,5. Olei Cajeputi 5,0. <i>MDS.</i> Fogcseppek. Gyapoton cariosus üregbe helyezni.
--	--

Acetophenon seu Hypnon (C_6H_5 . CO . CH_3). Színtelen, olajszerű folyadék, keserű mandulaolajra s gyöngyvirágra emlékeztető szagú, csipős ízű; vízben nem, borszeszben, chloroformban, aetherben, zsíros olajokban jól oldódik. Egy csepp súlya 0,025. Hypnoticum. Chloralhydrát pótszere. Értéke felől eltérő vélemények. Nem biztos hatású. Helybeli lobokozó hatása folytán vigyázat! Adag 3—6 csepp egyszerre fejetben v. caps. gelat.-ban.

Acetopyrin. (Acetylsalicylsav és antipyrin). Hideg vízben nehezen old. Haszn. mint az antipyriné és az acetylsalicylsavé. Dos. sing. felnőtteknek porban 0,5—1,0 napj. 3—4-szer.

II. Acetum aromaticum. Illatos olajokat tartalmazó szer; különben úgy használtatik, mint az acetum.

5 Rp. Decoct. rad. Althaeae e

10,0.

l. a. p. ad colat. 200,0.

Aceti arom. 30,0.

MDS. Csőrének.

6 Rp. Infus. fol. Salviae seu.

Malvae e 20,0.

l. a. p. ad colat. 300,0.

Aceti aromat. 10,0.

Syr. simpl. 20,0.

DMS. Száj-, torokvíz.

H. Acetum pyrolignosum rectificatum. Szintelen v. sárgás, eczet- és kátrányszagú folyadék. Vizes oldata eczetsavnak, methylneszesnek, kozmáscatechinnek, hangyasavnak, kresol-, phenol és kreosolnak. Adstringens, gyenge desiniciens. Küls. üszkös sebek borogatására 1:20. hüvelyirrigatiókra egy evőkanállal 1 liter vízben. Bels. nem.

†**H. Acetum Scillae**, l. Scilla.

Acetyltannin l. Tannigen.

Acidol. Betain sósavas sója. Szintelen, kristályos, vízben jól oldódó anyag, mely 23·8% sósavat tartalmaz; haszn. gyomorbadjoknál, mint a sósav. Adag: 0·5 gm., mely megfelel 10 csepp acid. hydrochlor. dil.-nak. Pepsinnel együtt adagolható oldatban v. pastillában.

7 Rp. Acidoli

Pepsini aa 0,5.

Pastae cacaot. sacch. qu. s.

F. pastillum

Dent. tal. dos. No. 20.

DS. Étkezés közben egy drbot.

H. Acidum aceticum bisdilutum s. Acetum seu Acetum vini. Eczet. (300 r. híg eczetsav + 700 r. víz) Lázas betegeknek hűtő mosogatások acetum + víz aa; kiürítő vagy analepticus célból csőrének 20,0—30,0 eczet + 150,0 víz; száj- és torokvíznek infus. malvae- v. salviae-hez 10,0—20,0. Antidot. chemicum a maró és szénsavas égvényekkel történt mérgezések alkalmával. Pediculosisnál a peték eltávolítását eczetbe mártott sűrű fésűvel eszközölhetjük.

H. Acidum acetylo-salicylicum. ($C_6H_4.O.CO.CH_3.COOH$). Fehér, kissé savanyú ízű, eczetsav szagú kristályos por. Vízben nehezen oldódik, alkoholban, aetherben könnyen. Jó antipyreticum, antirheumaticum, izzasztó. Dos. sing. 0,5—1,0; pro die 3·0—5·0.

Arsan (As-növényfehérje), arsen a mucleinmentes Glidin növényfehérjéhez kötve, távolról sem oly toxicus, mint a szervesetlen arsen-vegyületek, az emésztőszerveket nem támadja meg, kitűnő tonicum anaemia, chlorosis, morbus Basedowi, neurasthenia eseteiben. (L. hird.)

LABORATOIRES ROBIN,

13, Rue de Poissy, Paris.

Glycérophosphate granulé Robin

az egyedüli assimilálódó phosphorsavas só, mely a gyomrot nem bántja. Kitünő hatása: angolkór, csontgyöngeség eseteiben, a gyermekek növése idejében, a szoptatás és terhesség időszakában, neurastheniánál, szellemi megerőltetésnél stb.

Peptonate de Fer Robin

teljesen assimilálódó vaskészítmény, a gyomrot nem terheli, a fogakat nem feketíti és sohasem okoz bélrekedést. Kitünő hatása: vérszegénység, sápkór, gyöngeség eseteiben.

Bromone Robin

(Bromo-Peptide vagy Peptonate de Brome). A brom és a pepton fiziológ. kombinációja. Kitünő hatása: idegbajok, nők és fiatal leányok ideges izgékonyasága, gyermekek idegzavarai, öregek álmatlansága, hysteria, epilepsia eseteiben.

Jodone Robin

(Jod-peptonat). Szerves assimilálódó jódkészítmény, szabad jódot nem tartalmaz. Kitünő hatása: érelmeszesedés, asthma, syphilis, csúsz eseteiben.

Nucléatol granulé Robin.

Növényi eredetű nucleophosphat. Kitünő hatása: neurasthenia, phosphaturia, neuralgia, migrén stb. eseteiben. Az idegrendszer helyreállítója. Befecskendés alakjában javalt: lázas betegségeknek, mint preventív szer sebészi műtéteknél. Fokozza a phagocytosist.

Nucléarsitol Robin.

Nucleophosphat methylarsínáttal. Tabletta alakjában: tuberkulosis, malaria stb. ellen. Befecskendés alakjában: tuberkulózis, általános fertőzés, syphilis, gyanús betegségek eseteiben.

Klinikailag elismert készítmények

a.

„Zum heiligen Geist“ cz. gyógyszerútból

WIEN, I., OPERNGASSE 16.

Sagrada Barber. Ideális hashajtó! Nem drasticum! Sem narkoticum! Igen hosszú használat mellett sem vezet megszokáshoz! 1 vagy 3 pastillát esténként lenyelni. Javalva: heveny és idült habitualis székszorulás.

Arsoferrin-Tektolette-k. Szerves tömör vas-származék arsen- és glycerinphosphorsavval. 1 tektolette = egy csepp Sol. arsen. Fowleri = 0.0005 arsensavval. Adag: 3—12 db. emelkedőleg és csökkentőleg. Javalva: Chlorosis, elsődleges és másodlagos vérszegénység, hysteria, bőrbetegségek, üdülők vérszegénysége.

Regenerol, az emberi vérsavó sóinak Natrium citric. effervers.-cel való kombinációja tablettaalakban. Fokozza a diuresist, csökkenti a fokozott vérnyomást, kiválóan húgysavoldó és ekkoprotikus hatású. Javalva: érelmeszesedés, köszvény, uraturia és oxaluria, májaffekciók, anyagcsere-bántalmak.

Hydrastis-Tektolette-k egy tektolette = 30 csepp extr. fluid-al, az undorító íz kakaó által fedve. Adag: 1—2 tektolette naponta háromszor lenyelendő. Javalva: metrorrhagia, dysmenorrhoea, vértodulás.

Vegetalin, Katheter-Creme, Prof. Dr. Zuckerkandl O. által bevezetve és rendelve steril. vízben oldódó csúsztató szer katheterezés-nél légmentesen elzárt tubusokban.

8 *Rp.* Acid. acetylo-salicyl. 5,0
Coffeini natrio-benzoici 0,5.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
DS. 1—2 ór. egy port.

10 *Rp.* Acid. acetylo-salicyl. 3,0.
Aquaë dest. 50,0.
Spir. vini 100,0.
M. f. solut.
DS. Külsőleg bedörzsölésre.
Pruritus. Urticaria.

††H. **Acidum arsenicosum seu Arsenicum album.**
(As₂ O₃) Fehér, porcellánszerű v. átteisző darabok; szagtalan;
vízben nehezen, borszeszben alig oldódik. Küls. kenőcsben cau-
sticum 1:20—30. Bels. pilulában (sohasem üres gyomorba) 0'001
—0'005! pro dos. napj. 3—4-szer; 0'015! pro die.

††H. **Solutio arsenicalis Fowleri s. Liquor Kalii arse-
nicosi.** Színtelen, átlátszó, erősen lúgos kémhatású folyadék.
1% os oldata kalium arsenicosumnak. Bels. acid. arsenicosum
helyett. Felnőtteknek 2—10! csepp pro dos. 2—3-szor napjában
(10 csepp = 0,50); nem éhgyomorral! Adagot a dos. maxim. hatá-
rán belül fokozatosan emelni czélszerű. Dos. maxim. pro die 1'5!
Gyermekeknek (5—12 éves) 3 csepp pro die oldatban, melyet
fokozatosan emelhetni 10 cseppig pro die.

12 *Rp.* Acid arsenic. 1,0.
Cinnabaris fact. 3,0.
Ungu. emoll. 26,0.
M. f. pasta.

DS. Küls. Vásonra kenve
lupusnála beteg helyre alkal-
mazni, s 24 óránként vál-
toztatni, míg a lupusgöcsök
el nem pörkösödtek. Hebra
módosított pasta Cosmi-ja.

9 *Rp.* Acid. acetylo-salic 20,0.
Div. indos. aequ. No. 20.
Det. in caps. amylac.
S. Suo nomine. 1-gmos porok.
Felnőtteknek. Gyerme-
kek 1/3—1/2 része
veendő pro dosi.

11 *Rp.* Acid acetylo-salicyl. 5,0.
Pulv. fol. Digitalis 1,0
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.

DS. Napj. 3—4 port. Palpi-
tatio cordis nerv.

13 *Rp.* Acid. arsen. 0,05.
Piperis nigri 1,5.
Succi et pulv. Liquir.
aa qu. s.
ut f. pil. No. 50.

DS. Naponta 3-szor 1 szemét.
Emelni lehet az adagot 3+3
szemig. Egy darabban 0,001
acid. arsen. Intermittens ma-
larica, ichthyosis, psoriasis,
lichen ruber, sarcoma idio-
path. multipl. cutis, lym-
phoma malignum, chlorosis.

Arsoferrin-Tektoettes szerves [vas-arsen-vegyület glyce-
rophosphorsavval, egy tektoette megfelel egy csepp sol. arsenic.
Fowleri-nek. (L. hird.)

Ascher-féle javított mesterséges fogzománczot szállít
a General Dental Manufacturing Co. m. b. H., Berlin W/8.,
Jägerstrasse 61. (L. hird.)

Anaemia perniciosa, chlorosis:

Rp. Gelodurat „Pohl“
scat. orig. c. acid. arsenicos. 0,001.
Ferr. carb. Blaud 0,2.
S. 3-szor naponta 2 darabot.

- 14 *Rp.* Acid. arsenic. 0,5.
Cocaini hydrochlor. 0,5.
Kreosoti qu. s.
ut. f. pasta.
DS. Küls. Fogidegölő pasta,
fogorvosok számára; belőle
a fogba gombostűfejnyi helyezendő, az ür gyapottal s
foggyantával elzárandó.
- 17 *Rp.* Solut. arsen. Fowleri 5,0!
Tinct. amarae 10,0.
MDS. 3-szor napj. 3—9 cseppet.
Lymphoma, lymphosarcoma, tuberculosis, scrophulosis, idült bőrbajok, neuralgiák, malaria, diabetes, chorea minor.
- 15 *Rp.* Solut. arsen. Fowleri 2,0!
Aqua dest. 10,0.
MDS. Bőr alá fecskendésre.
1—2 naponként 1 fecskendővel. Psoriasis vulg, lichen rub. sarcoma idiopath. cutis.
- 16 *Rp.* Solut. arsen. Fowleri 2,0!
Tinct. Ferri pomati
Aqua Menthae piper. aa 50,0.
MDS. 3-szor napj. 1 kk.
Chlorosis, idült bőrbajok.
- 18 *Rp.* Solut. arsen. Fowleri 1,0.
Tinct. Valer. 10,0.
MDS. Napj. 3-szor 5—10 cseppet.
Gyerm. diabetes insipidus.
- 19 *Rp.* Sol. arsen. Fowleri gtt. 3.
Aqua dest. 30,0.
MDS. Reggel, este 1 evők.

5—12 éves gyermek chorea minor esetén. Minden 3-ik nap egy cseppel növeljük az adagot, felmenve 8—10 cseppre pro die; ezen arányban a víz mennyisége is szaporítandó, úgy hogy 1 cseppet 1 evők. vízre számítunk; 8—10 cseppről ismét visszatérünk 2 cseppig. 2—3 ily turnust végeztethetünk. Torokfájás, emésztési zavarok esetén a szer néhány napra kihagyandó.

H. **Acidum benzoicum seu Flores Benzoës.** ($C_6H_5, COOH$)
Fehér-sárgás, lemezes v. tűalakú, selymfényű, benzoegyantához hasonló szagú jegecekből álló por. Vízen nehezen, borszeszben, aetherben könnyen oldódik. Expectorans, excitaus. Bels. ostyában, labdacspan 0,05—0,3 pro dos. napj. többször. Bőr alá fecskendés híg borszeszes oldatban tájdosmas.

- 20 *Rp.* Acid. benzoici 0,5—2,0.
Sacchar. alb. 5,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
DS. 1—2 ór. 1 port.
- 21 *Rp.* Acid. benzoici
Rad. Ipecac. pulv. aa 1,0.
Pulv. et extr. Liquirit.
aa qu. s.
F. pil. No. 30.
Cousp. cum pulv. Liquirit.
DS. 2 ór. 1—2 szemet.
Expectorans.
- 22 *Rp.* Acid. benzoici
Camphor. trit. aa 0,5.
Sacchar. alb. 4,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
DS. 1—2 ór. 1 port. Excitans.

Inj. Natr. kakodyl. Egger a leghatásosabb arzén-készítmény. (L. hird.)

23 Rp. Acid. benzoici 1,5.
Camphoræ 1,0.
Spir. dil. 12,0.
MDS. Bőr alá fecskendésre.
Egyszerre 1 fecskendővel.
Excitans.

25 Rp. Acid. benzoici 1,0.
Moschi 0,5.
Sacchar. alb. 4,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
DS. 3 ór. 1 port. Excitans.

H. Acidum boricum (H_3BO_3). Fehér, lemezes, gyöngyláz-fényű, alig savanyú ízű jegeczpor. 25 r. hideg, 3 r. forró vízben, 15 r. borszeszben oldódik. Antisepticum. Bels. ritkán (hányás, sarcina ventriculi ellen); adag porban 0,3–1,0 pro dos. vagy 3%-os vizes oldatban evőkanalanként; pro die 1,0–3,0. Helybeli s külső használatra: sebkezeléshez, torok- és szájvíznek 2–4%-os oldat, hólyagmosásra 2%-os langyos oldat; gégebe, fülbe befúvásokra porítva; kenőcsökhöz 1 : 5–10.

H. Unguentum acidi borici. 475 gm. kenőcsanyagban 25 gm. bórsavat tartalmaz. Kittinően szerkesztett kenőcsmassza. Fölöslegessé teszi egyszerű bőrkenőcs részletes fölírását.

H. Vaselineum cum acido borico. 10%-os bórvaselin.

26 Rp. Acid. borici 6,0.
Aquæ dest. 300,0.
Olci Menthae pip.gtt.3.
MDS. Száj-, torokvíz.

28 Rp. Acid. borici
Sulfur. praecip aa 1,0.
Vasellini 48,0.
M. f. ungu.

DS. Kenőcs. Herpes tonsu-ransnál 2-szer napj a beteg-helyeket szappannal lemosás után bedörzsölni.

31 Rp. Acid. borici 0,3.
Vasellini
Lanolini aa 5,0.
M. f. ungu.
DS. Szemhéjkeuőcs.

24 Rp. Acid. benzoici 3,0.
Camphor. trit.
Sulfur. aurat. Autimonii aa 0,5.
Elaeosacch. Foenic. 5,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.

D. in chart. cerat.
S. 2 ór. 1 port. Expectorans.

27 Rp. Acid. borici subtil pulv. 10,0.
D. in scatul.
S. Szembe hintésre.

29 Rp. Acid. borici 20,0.
Aquæ dest. 1000,0.
MDS. Hólyagmosásra. Használat előtt langyosra melegítendő.

30 Rp. Acid. borici 15,0.
Aquæ dest. 500,0.
MDS. Szemborogató melegen.

32 Rp. Acid. borici 5,0–10,0.
Glycerini 100,0.
MDS. Küls. Linimentum bőrlobok ellen. Fülébe anylmos behintés.

Teufel-féle „Mars-öv“ Odyssens-tricot-szövetből, nagyon rugalmas és tágulékony, igen alk. kövérek részére és a hasfalak ernyedtségénél. (L. hird.)

33 <i>Rp.</i> Acid. borici	3,0.	34 <i>Rp.</i> Acid. borici	—
Talc. venet.	30,0.	Zinci oxyd.	aa 5,0.
Magnes. carb.	15,0	Vaselini	50,0.
M. f. pulv. det. in scat.		M. f. ungu.	
<i>S.</i> Hintőpor. Hyperidrosis,		<i>D.S.</i> Kenőcs.	
intertrigo.		Acut bőrlobok.	

Acidum camphoricum (C_6H_5 , $C_2H_5(COOH)_2$) Színtelen jegecslapok, v. fehér, savanyú-keserű, szagtalan por. 140 r. hideg, 8 r. forró vízben, 1:3 r. borszeszben old. Izgató, desinficiáló, összehúzó és izzadáslollesen szer. Utóbbi hatása bels. is. Haszn. garat, gége, orr hurutos és fekélyes bántalmainál, cystitissnél $\frac{1}{2}$ —2%-os oldatokban spray, ecsetelés. kifecskendés alakjában; idiült folyamatoknál erősebb oldatok. Befúvásra 2—3%-os porkeverék. Izzadás ellen bels. 2,0—3,0 este többször.

† **H. Acidum carbolicum seu Acid. phenylicum, s. Phenolum** [$C_6H_5(OH)$.] Fehér v. kissé vöröses, áttetsző, jegesz tömeg; szaga jellemző, íze maró. 35—40° C.-nál megolvad. Oldható 20 r. vízben; borszeszben, aetherben, chloroformban, glycerinben, zsíros és illó olajokban minden arányban. Antisepicum. Bőrről, nyálkahártyákról, sebekről könnyen felszívódik, ezért vigyázat! különösen gyermekeknél! Sebek mosására, öblítésére, borogatásokra, eszközök tisztítására $2\frac{1}{2}$ —3%-os oldatok, hólyagmosásra, húgycsőbe fecskendésre $\frac{1}{2}$ %-os oldat, bőr alá fecskendésre v. parenchymába befecskendésre 1—2%-os oldatokból 1—2 köbctm. Eszközök, drainsövek 5%-os vizes oldatban tartandók. Belsőleg 0.01—0.10! pro dos. napj. többször. Dos. maxim. pro die 0.5!

Acidum carbolicum crudum. Sárgásbarna folyadék. Csupán desinfectióra használtatik (árnyékszékkel, pöczegödörök, istállók sth.) vízoldatban (5%) v. gypsszel, szénnel, krétával porrá alakítva. Jó keverék p. o. acid. carbol. crud. 2 r., calcium hydroxyd. 5 r., gypsum ust. 20 r., kőszén 10 r. Szobák meszelésére 100 r., mésztejhez 2 r. acid. carbol. crud.

† **H. Acidum carbolicum liquefactum.** Ebből, 1,1 grm. = 1,0 grm. acid carbol. cryst.

H. Aqua carbolisata (form. int.) 2%-os oldat.

Carbolos kötőzőszerek.

H. Gaze carbolatum s. Tela acid. carbol. impraegn. 105 gm. szövetben 5 gm. acid. carb. legyen.

H. Tubuli praeparati carbolati. (Drainage-csővek). 5%-os carbol. oldatban tartandók.

35 <i>Rp.</i> Acid. carbol. liqu.	1,0.	36 <i>Rp.</i> Acid. carbol. liqu.	
Ungu. simpl.	10,0.		6,0—9,0.
M. f. ungu.		Aquae dest.	300,0.
<i>MDS.</i> Bőrre dörzsölni parasítás bőrbántalmak ellen.		<i>MDS.</i> Külsőleg. Sebkezelésre.	

Mikroboform sec. Kleewein, kitünően bevált, szagtalan, de azért igen hatásos fertőtlenítőszer.

37 *Rp.* Acid. carbol. liqu. 5,0.
Hyrarg. bichlor. corr. 0,05.
Ungu. diachylon Hebrae
100,0.

M. f. ungu.

DS. Kenőcs. Lichen ruber
planusnál, pruritusnál
viszketés ellen.

39 *Rp.* Acid. carbol. liqu. 5,0.
Spiritus 10,0.

MDS. 5—8 cseppet a Cursch-
mann-féle álarcz segélyével
belégezni. Gangraena pul-
mon. Bronchitis foetida.

41 *Rp.* Acid. carbol. liqu. 2,0.
Aquae dest. 150,0.
Olei Menthae pip. gtt. 5.
Spirit dil. 20,0.

MDS. Belégzésre. Siegle-féle
készülékkel. Gangraena pul-
mon. Bronchitis foetida.

43 *Rp.* Acid. carbol. liqu.
2,5—5,0.

Glycerini 100,0.

MDS. Külsőleg ecsetelésre.
Diphtheritis.

45 *Rp.* Acid. carbol. liqu. 1,5.

Extr. Liquir dep.

Pulv. rad. Liquir. aa
qu. s.

ut. f. pil. Nr. 30.

Consp. pulv. Liquir.

DS. 2 ór. egy szemet.

Prurigo, psoriasis.

38 *Rp.* Acid. carbol. liqu.
Naphtholi β. aa 1,0—2,0.
Sulf. praecip. 5,0.
Zinci oxyd. 10,0—20,0.
Vasellini 100,0.

M. f. ungu.

DS. Kenőcs. Prurigo Hebrae-
nél és pruritusnál mint
viszketés-csillapító.

40 *Rp.* Acid. carbol. liqu.
Collodii aa 5,0.

MDS. Caries dentium, Gya-
potra felvéve a fogűrbe.

42 *Rp.* Acid. carbol. liqu. 0,2.
Aquae dest. 10,0.

MDS. Bőr alá fecskendésre.
1/2—1 fecskendővel polyarth-
ritis rheumatica esetén a fáj-
dalmas ízület tájékán fecs-
kendeztessék be.

44 *Rp.* Acid. carbol. liqu.
Ammou. pur. liq. aa 50,0.

Spiritus.

Aquae dest. aa 10,0.

MDS. Szaglószer heveny co-
ryzánál.

46 *Rp.* Acid. carb. liqu. 1,0.
Chloroformii 3,0.

MDS. Külsőleg. Fogcseppek.
1—2 csepp vattára fel-
véve cariosus fog üre-
gébe teendő. Fájdalom-
csillapító.

Acidum chinicum ($C_6H_7(OH)COOH$). Fehér, jegezes por,
vízben oldh. Chinakéregben fordul elő. Hugsavképződést csök-
kenti, ezért köszvény, húgysavas diathesis, uratkövek esetén
haszn. adag: 0,5 pro dos. porban, pilulában, tablettákban
napj. 6—10-szer. L. sidonal és urosin.

Acidum chromicum (CrO_3). Piros, fénylő, szagtalan, légen
elfolyósodó prizmás jegeczek; vízben, borszeszben jól oldódik.
Causticum. Küls. condylomák, szemölcsök teleangiectasiák, poly-

Ascher-féle javított mesterséges fogzománczot szállít
a General Dental Manufacturing Co. m. b. H., Berliu W/8.,
Jägerstrasse 61. (L. hird.)

Bengué-balzsam (menthol, methylsalicylat, lanolin) kitiűő fáj-
dalomesillap. csűz, migrén, lumbago, pruritus eseteiben. (L. hird.)

pusok étetésére. Kutatóra ráolvasztandó. Ha oldatban alkalmaztatik, a környező bőr v. nyálkahártyafelület védelmi szempontból olajjal beecsetelendő. Bels. nem. Erős mérég. Küls. is csak kis terjedelemben alkalmazható. Legjobb, ha nem használjuk!

Acidum cinnamylicum ($C_6H_5CH = CH-COOH$). Színtelen (!) jegeczlapocskák, hideg vízben nehezen, forróban könnyen, borszeszben, aetherben, glycerinben, olajban, boraxtartalmú vízben könnyen oldódik. Íztelen, kellemes szagú. Gümőkórellenes hatásúnak mondják (Landerer). Gégetuberc. ecsetelésére, lupusgöcsökbe fecskendésre 1 : 10 borszeszre; tályogokba fecskendésre 1 : 10—20 glycerinre; izületekbe fecsk. 5%-os égvényes emulsió. U. ez intraven. befecsk. Ezekből 0,1—0,3—0,5 köbct. használtassék el egyszerre; 2—4 naponként ismételjük az adagot. L. *Helol.*

47 Rp. Acid. cinnamyl. 1,0.
Cocaini hydrochlor. 0,5.
Spir. vini 20,0.
MDS Lupusgöcsökbe egyszerre 2—3 csepp fecskendezendő.

49 Rp. Acid. cinnamyl. 2,0.
Spir. vini dil. 20,0.
MDS Tuberculosus gégefekélyek ecsetelésére.

48 Rp. Acid. cinnamyl. 5,0.
Olei Amygdal. dulc. 10 0.
Vitellum ovi unius
Solut. Natr. chlor. (0,7%)
qu. s.
ut f. emuls 100,0.

DS Venába fecsk. Befecsk. előtt 25%-os kalilúgoldattal gyengén lugossá kell tenni. Dos. 0,1—1,0 köbctm. hetenként 2-szer.

H. Acidum citricum [$C_6H_8O_7 + H_2O$]. Nagy, színtelen, rhombos jegeczék, savanyú ízűek, vízben, borszeszben jól oldódnak. Gyenge antipyreticum, inkább hűsítő; substantiában kevésbé maró. Bels. oldatban adag: 2,0—5,0 : 150,0 2 ór. 1 evők. Saturatiókhoz succus citri helyett; 1,0 szénsavas sót telít 0,65 acid. citricum.

†H. Acidum hydrochloricum concentratum. Színtelen, füstölő folyadék. 25%-os. Külsőleg edzésre. Bels. i. em.

H. Acidum hydrochloricum dilutum (HCl). (Tömény sósav 4 r. + víz 6 r. = 10%). Víziszta, savanyú folyadék. Bels. mint gyenge antipyreticum 2,0 : 150,0 2 ór. 1 evők. Digestivum dyspepsiák bizonyos eseteiben 10—15 csepp 1 pohár vízre, étkezés közben fogyasztandó ol.

50 Rp. Acid. hydrochlor. dil. 20,0.
D. in vitro cum epist. vitreo bene clauso.
S. 10 cseppet 1 vörösboros pohár vízre.

51 Rp. Acid. hydrochlor. dil. gtt. 5—8.
Aquae dest. 80,0.
Syrup simpl. 8,0.
MD 2 ór. 1 kk., — gyk.
Gyermekek dyspepsiájánál, ha a hányadék alcalicus kémhatású.

Hygiama omnia alimenti perfecti continet elementa optima ratione mixta.

Acidum glyconicum. ($OH, CH_2 (CH, OH)_4, CO_2H$). Szőlő v. nádcukor élelyülési terméke. Sárgás-fehér, szörpszerű. Vízben oldh. 50,0—70,0 keverve natrium bicarb.-al vízben coma diabeticumnál per os vagy klysmában. Állítólag életmentő.

Acidum kakodylicum, l. Kakodyl.

Acidum jodicum (HJO_3). Fehér, kristályos por, vízben könnyen oldh. Maró hatású. Trachoma kezelésére ajánlották. Egyéb haszn. fölösleges.

52 *Rp.* Acidi jodici 5,0
Aquae dest. 95,0.

MDS 5%-os jódsavoldat.

Az orvos kezéhez. Trachomáskötőhártya ecsetelésére. Előzetesen 6%-os IK. oldattal ecseteljük a kötőhártyát.

53 *Rp.* Acidi jodici 3,0.
Vasellini 60,0.

M. f. ungu.

DS. 5%-os jódsav-kenőcs. Resorbens lobos exsudatmok, mirigydaganatok esetén.

H. Acidum lacticum ($CH_3, CH(OH), COOH$) Tejsav. Színtelen, szörpsűrűségű, savanyú, szagtalan folyadék; vízben, borszeszben, aetherben, glycerinben jól oldódik. Oldja a croup-hártyát. Töményen maró. Concentráltabb oldatokban gümős gégefekélyek edzésére. Bels. diabetes mellit.-ellen CANTANI ajánlotta. Adag: belégzésekre 5,0—10,0 : 200,0. Bels. 5,0 : 150,0 egy napra.

54 *Rp.* Acid. lactici 10,0.
Aquae dest. 200,0.

MDS. Belégzésre (Siegle-féle porlasztóval) $\frac{1}{2}$ —1 óránként. Diphtheritis laryngis.

55 *Rp.* Acid. lactici
Aquae dest. aa 30,0.

MDS. Lupus vulgaris, lupus erythematodes és gümős fekélyek ecsetelésére.

56 *Rp.* Acid. lactici 5,0.
Aquae dest. 150,0.
Syrup. cort. Aurant 50,0.

MDS. 3-szorra elfogyasztani 1 nap alatt. Diabetes mellit.

57 *Rp.* Acid. lactici 5,0.
Sacchar. alb. 50,0.
Tragacanth. pulv.

Aquae dest. aa qu. s. ut. f. pastilli No. 50.

DS. Étkezés előtt 2 dbot. Dyspepsiánál sósav helyett.

†**H. Acidum nitricum concentratum purum** (HNO_3). Színtelen, maró, hevítve elillanó folyadék. 50%-os oldata causticum condylomák, szemölcsök, marási sebek, méhszáji erosiók, noma étetésére; üvegbot v. üvegcset! Bels. nem.

Acidum nitricum fumans. Pirosas-barnás v. sárgás, fojtó szagú, vörös gőzöket bocsátó folyadék. Küls. mint az acid. nitr. conc. pur. Bels. nem.

H. Acidum nitricum dilutum. (200,0 töm. salétromsav + 800,0 víz). Küls. edzésre. Bels. gyenge antipyreticum; adják morbus Brighti-nél és icterus catarrh. chron.-nál is. Adag oldatban: 1,0—2,0 : 150,0 2 ór. 1 evők.

Acidum nucleinicum. Fehér, vízben nem, alkaliakban jól oldható jegeczes por. Mint leucocytosist előidéző szer a sebészetben nem vált be. Urátoldó lúgsavas diathesis eseteiben. Adag: 0.05—0.1 napj. 3-szor. Bőr alá is natr. nucleinicum alakjában l. utóbbi neve alatt.

Acidum oleinicum purissimum. Olajsav, mely linolsavmentes. Olajos, szintelen folyadék. Faolaj helyett epekólika ellen reggel és este 1,0 caps. gelat.-ban. Praeventive lónaponként 10 egymásutáni napon át 0,5—1,0 pro die.

Acidum oxynaphtoicum seu. a Naphtolcarbolsav, [$C_{10}H_6(OH).COOH$]. Szintelen, finom jegecztűk; naphtolszagú, hideg vízben nem, forróban rosszul, alkoholban 10% oldható, glycerinben 1 $\frac{1}{2}$ %. Antisepticum, 5-ször erősebb, mint a salicylsav. Nagy adagban mérgező (!). Bels. nem. Küls. edények, árnyékszékék fertőtlenítésére substantiában; sebek, stb. kezelésére $\frac{1}{3}$ —1%-os oldatok. Kenőcsökben 1 : 20, collodiumban 0,5 : 100.

Acidum phenylo-aceticum. ($C_6H_5.CH_2.COOH$). Fehér, fénylő, meleg vízben, borszeszben, aetherben oldh. $\frac{1}{2}$ %-os oldata a tuberculosus genyet fertőtleníti. Gümőkórosoknak Williams ajánlja a tömény szeszes oldat 10 cseppjét 30 gm. vízben napj. 3-szor. Lehet emelkedni 20 cseppig.

Acidum phenylo-propionicum. ($C_6H_5.CH_2.CH_2.COOH$) Fehér, finom jegeczek; oldékonyság, használat niint az acid. phenylo-acet.-nál.

H. Acidum phosphoricum. (H_3PO_4) Orthophosphorsav 20%-os vizes oldata. Szintelen, szagtalan, savanyú folyadék. Bels. gyenge antipyreticum. Adag 2,0—4,0 : 150,0, 2 ór. 1 evők.

58 Rp. Acid. phosphor. 3,0.

Aquae dest. 130,0.

Syrup. Rubi Idae 20,0.

MDS. 2 ór. 1 evők. Mér-
sékes láznál temperans.

59 Rp. Acid. phosphor. 1,0.

Aquae dest. 100,0.

Syrup. simpl. 10,0.

MDS. 2 ór. 1 gyk.

Gyermekeknek cystitis catarrh.-nál alcalicus kémhat. vizelet esetén.

†H. Acidum pyrogallicum s. Pyrogallolum [$C_6H_3(OH)_3$].

Fehér, könnyű, erősen fénylő, lemez vagy tűalakú jegeczek. Vízben elég könnyen, borszeszben, aetherben igen jól oldódik. Bels. nem. Küls. némely időült bőrbaj ellen kenőcs 1 : 10—20. Nagyobb bőrfelületeket óvakodjunk bekenni, felszívódik a beteg sérült bőrén át; vesevérzések nem ritkák. Phagedaenicus fekélyekre hintőpor alakjában.

„Diakon“-pólya (Teufel-féle) porózus, tartósan rugalmas pólya, oldalt zárt szegélylyel, nem foszlik fel. (L. hird.)

Rohitsch

Tempel

-forrás. Szénsavban leg-
gazdagabb **dietétikus** asz-
tali ital. Elősegíti az emész-
tést és az anyagcserét.

Styria

-**gyógyforrás**, javalt:
idült gyomorhurut, szék-
rekedés, Bright-kór, máj-
betegség, sárgaság, anyag-
csere-betegségek, légző-
szervi hurutok eseteiben.

Donati

-forrás, a **legtartalma-
sabb gyógyvíz a maga
nemében**. Főjavulatok:
idült bélhurut, epekövek,
elhájasodás, köszvény, dia-
betes.

**Legdusabb,
természetes magnézium-
glaubersós források.**

Nagybani lerakat Magyarország részére:
Hoffmann József Budapest, V., Báthory-u. 8. sz.

**Rohitsch-
Sauerbrunn
gyógyfürdő**

228 méter.
Déli Stájerország.
Vasuti állomás.

Legmodernebb fürdőintézetek.
(Szánsavas, fenyő- és sósfürdők,
gőz- és forrólég-fürdők,
elektromos fény- és kádfürdők,
inhalatórium, hydrotherapia,
gyógygimnasztika.)

Magaslati forrás-ivóvíz.
Étrendi vendéglő.

Tejkurák. □ Terrénkurák.
Mindenféle kényelem.

RICHTER GEDEON, BUDAPEST X.

vegyészeti gyára.

Hyperol. Hydrogen peroxydatum szilárd állapotban. 35% H_2O_2 -t tartalmaz. A **Hyperol** vízben könnyen oldódik s így rendkívül alkalmas tetszésszerű koncentratioju Hydrogen peroxydatum gyors előállítására. Poralakban és 1 gr.-os tablettákban kerül forgalomba.

Peroxygenol. 30%-os vegytiszta Hydrogenium peroxydatum. Eredeti 10, 50 és 200 grammos parafinnal bélelt üvegekben kerül forgalomba.

Novocol. Vízben oldható guajacolphosphor-savas natrium. Kedvezően egyesíti magában a guajacol és phosphor ismert therapiái hatását. Forgalomba kerül mint Novocol-syrup, Novocol-por, Novocol-tabletta.

Hydropyrin. Vízben oldható acetyl-salicylsav-készítmény. Specifikus szer influenzánál, ízületi loboknál. Lázellenes, lobellenes fájdalomcsillapító. A **Hydropyrin** por és tablettákban kerül forgalomba.

Bromlecithin. Javallatok: neurasthenia, anaemia, chlorosis, rachitis, scrophulosis, diabetes mellitus, gyengeségi állapotok. 1 üveg = 100 tabletta ára 5.— korona.

Jodlecithin. Főbb javallatai: Asthma, bronchiale, Emphysema, Arteriosclerosis, Tertiär lues, Scrophulosis. Forgalomba kerül mint Pilulae Jodlecithini 0.10 gr. és Tabletta Jodlecithini 0.25 gr.

Aether pro Narcosi Richter.

Tonogen Suprarenale Richter.

Lecithin Richter.

Proteoferrin Richter.

Chloroform pro Narcosi Richter.

Tonocain Suprarenale Richter.

Kalmopyrin.

Arsenproteoferrin Richter.

60 *Rp.* Acid. pyrogallici 1,5—3,0.
Vasellini 30,0.
M. f. ungu.
DS. Kenőcs. Psoriasis.

62 *Rp.* Acid pyrogallici 3,0.
Axung. porci 2,0.
Lanolini 20,0.
M. f. ungu.
DS. Kenőcs. Psoriasis,
eczema margin. esetén.

64 *Rp.* Acid. pyrogall. 1,0—2,0.
Traumaticini 20,0.
MDS. Külsőleg. Sörteecset-
tel a beteg bőrre dörzsö-
lendő. Psoriasis vulg.

H. Acidum salicylicum crystallisatum. [$C_6H_4.OH.CO_2H$].
Fehér, tűalakú jegecekből álló por, íze édeses-savanyú, fanyar;
538 r. hideg vízben, melegben könnyebben, glicerínben, bor-
szeszben igen könnyen old. Küls. antisepticum. Kenőcsnek
1:20—30; sebmosó víznek 1:300; hintőporba 1:30 talcum,
vagy amylum, v. bolus alba-hoz; hólyagmosásra 1:500—1000.
Bels. nem.

65 *Rp.* Acid. salicyl. 1,0.
Axung. porci 2,0.
Lanolini 7,0.
M. f. ungu.
DS. Kenőcs.
Eczema, ichthyosis.

67 *Rp.* Acid. salicyl. 1,0.
Vasellini 30,0.
Tint. Benzoes 2,0.
M. f. ungu.
DS. Kenőcs. 3-szor napj.
használandó.
Atonicus fekélyek, eczema
capitis, impetigo, prurigo.

70 *Rp.* Acidi salicyl.
Acidi lact. aa 1,0.
Collodii flex. 8,0.
MDS. Tyúkszemcollodium.

61 *Rp.* Acid. pyrogallici 10,0.
Amyli 40,0.
M. f. pulv.
S. Hintőpor.

Kautschuk-ballon segélyé-
vel 1—2 millimeter vasta-
gon ráhinteni phagedaeni-
cus fekélyre; vattával be-
födni.

63 *Rp.* Acid. pyrogallici 2,5.
Acid. salicyl. 1,0.
Ichthyoli 2,5.
Vasellini 44,0.
M. f. ungu.

DS. Külsőleg; kenőcs. Pso-
riasis, eczema marg.

66 *Rp.* Acid. salicyl. 1,0
Vasellini 25,0
Amyli
Zinci oxyd aa 20,0
M. f. pasta.

DS. Külsőleg.

Eczema, impetigo, prurigo.

68 *Rp.* Acid. salicyl. 1,0
Collodii flexil. 10,0
MDS. Külsőleg ecsetelésre.
Tyúkszemek, verrucák kiír-
tására.

69 *Rp.* Acid. salicyl. 3,0.
Amyli 10,0.
Talcu venet. 87,0.

M. f. pulv. det. in scatul.
S. Hintőpor. Lábak izzadása,
phtlusicusok éjjeli izzadása
ellen.

Alcuentum salicylatum vízben oldódó kenőcs c. 30% acid.
salicyl., eltartható, nem avasodik, gyorsabban szívódik föl mint
a zsíros kenőcsök.

Salicyl-gyógyszappan a kolozsvári (Heinrich József) gyógy-
szappangyárból kitiűnő hatású idültebb bőrbajoknál, a hol a
bőr hámlasztása mellett a beteg területen a faggyúmirigyek
összehúzódását is elő akarjuk segíteni. (L. hird)

- 71 *Rp.* Acid. salicyl.
 Resorcini aa 1,0.
 Glycerini 3,0.
 Aetheris sulf. 15,0.
 Spirit. vini. 85,0.
MDS. Külsőleg. Sörteecsettel
 a bőrre dörzsölendő.
 Alopecia pityrodes.
- 74 *Rp.* Acid. salicyl. 0,4.
 Amyli 20,0
 M. f. pulv. det. in scat.
 S. Köldök-lintőpor.
- 76 *Rp.* Acid. salicyl.
 Lanolini
 Ol. Terebinth aa 10,0.
 Axung. porci 70,0.
 M. f. ungu.
DS. Este bedörzsölni. Poly
 arthritis.
- 78 *Rp.* Acid. salicyl. 5,0—10,0.
 Olei Sesami. 20,0.
 Empl. sapon 80,0.
 leni calore misce ut f.
 emplastrum.
DS. Tapasz, felkenve haszn.
 Eczema chron., verruca, cla-
 vus, impetigo, ecthyma, furun-
 culosis trichophyton, kerato-
 ma palm. et plant. eseteiben
- 72 *Rp.* Acid. salicyl. 1,0.
 Aquae dest. 500,0.
MDS. Hólyagmosásra. Hasz-
 nálat előtt langyosra mele-
 gítendő.
- 73 *Rp.* Acid. salicyl. 1,0.
 Acid. borici 6,0.
 Aquae dest. ferv. 300,0.
MDS. Sebköltözéshez Hasz-
 nálat előtt langyosra mele-
 gítendő.
- 75 *Rp.* Acid. salicyl. 40,0.
 Sprit. vini. 100,0.
DS. Külsőleg. Suo nomine.
 Endometritisnél Playfair ke-
 zeléshez.
- 77 *Rp.* Acid. salicyl. 5,0.
 Sapon. kalini 100,0.
 M. f. ungu.
DS. Kenőcs. Eczema tylo-
 cumnál keshátvástagon vá-
 szonra kenve alkalmazandó.
- 79 *Rp.* Acid. salicyl. 1,0.
 Olei Menthae pip.
 Olei Anisi stell. aa 0,5.
 Spiritus vini dil. 100,0.
MDS. Fogvíz. $\frac{1}{2}$ —1 kk.
 fogmosáskor egy pohár
 vízbe.

Acidum sozójodolicum. ($C_6H_5I_2.OH. SO_3H + 1\frac{1}{2}H_2O$). Víz-
 ben oldh. Antisepticum 2—3% oldatban. Inkább sói. L. sozo-
 jodol ez. a.

Acidum sozolicum L. Aseptolum.

Acidum sulfanilicum ($C_6H_4. NH_2. SO_3H$). Paraamidobenzol-
 sulfonsav. Acut jodismus ellen haszn. Szintelen, prizmás jege-
 czek. Vízben neh. old., alkalisói könnyen. Az orr nyálkahár-
 tyáján képződő nitriteket megköti s így ott a szabad jód
 leválását gátolja. Adag. bels. oldatban 1,0—5,0 napj. egyszer.

Rheumatismus articulorum :

Rp. Gelodurat „Pohl“

scat. orig. c. acid. salicyl. 0,5.

S. 3—4-szer naponta 2 darabot.

80 *Rp.* Acid. sulfanilici 2,0—5,0.
 Natrii bicarb. 2,5.
 Aquae dest 150,0.

MDS. Rendelet szerint.

†*H. Acidum sulfuricum concentratum* (H_2SO_4). Színtelen szagtalan, olajszerű folyadék. Mint gyógyszer nem haszn.

H. Acidum sulfuricum dilutum. (Tömény kénsav 10 sr. 100 sr.-vízben.) Színtelen, áttetsző folyadék. Küls. mint izgató, összehúzó vérzékeny fekélyekre 1 : 10—30. Bels. gyenge antipyreicum; szokásos szer palpitatio cordis nervosa, menorrhagia, metrorrhagia eseteiben. Adag 2,0—3,0 : 150,0 2 ór. 1 evők.

†*H. Liquor acidus Halleri s. Elixirium acidum Halleri.* (Spiritus conc. 150 gm. + acid. sulfur. conc. 50 gm.) Atlátszó, sárgás színű, szesz és aetherszagú (aethylkénsavat tartalmaz) folyadék. Küls. a bőr mosogatására urticariánál 1 : 100; scorbutos foghús esetelésére 1 : 10. Bels. mint az acid. sulfur. dilut., melynél az étvágyat állítólag kevésbé rontja.

81 *Rp.* Liquor. acid. Halleri 4,0.
 Syr. Rubi Idaei 60,0.

MDS. 1 kk. — gyk. egy pohár vízre, napj. 2-szer.

Középkorú gyermekeknek
 haemophilia v. morb. macul. Werlhofii esetén.

82 *Rp.* Acid. sulfur. dil. 50,0.
 Aceti 300,0.
 Spirit. dil. 130,0.
 Mel. dep. 100,0.

MDS. Külsőleg
 (Aqua vulneraria Thedeni.)

83 *Rp.* Acid. sulfur. dil. 1,0.
 Aquae dest. 80,0.
 Syrup Rubi Idaei 20,0.
MDS. 2 ór. 1 kk. v. gyk.
 3—6 éves gyermeknek.

84 *Rp.* Liquor acid. Halleri
 Tinct. Opii crocatae aa 2,0
 Tinct. Cinnam. 15,0.
MDS. Ór. 20 cseppet kis pohárnyi vízben. Metrorrhagia.

85 *Rp.* Acid. sulfur. dil. 2,0.
 Aquae dest. 130,0.
 Sy up. Rubi Idaei 20,0.

MDS. 2 ór. 1 evők. Felnőttek.

Acidum sulfurosum anhydricum. (SO_2). Keletkezik, ha kén elégetünk. Színtelen, tojtó szagú gáz. Erős antisepticum. Helyiségek fertőtlenítésére 1 köbméter légtérre 9—10 gm. kén kell, mely agyagedényben égetendő el; lehet a kén szénporral keverve, vastalczán is elégetni. Egyidejűleg vízgőzöket is fejlesztünk. Vigyázat, belélegezve igen ártalmas (!).

H. Acidum tannicum s. Tanninum. ($C_{14}H_{10}O_6$) Sárgás-fehér, fanyar, összehúzó ízű por. Egyenlő mennyiségű langyos vízben, kétannyi borszeszben oldódik, 6 r. glicerinben. Adstrin-

„Retenta“ szülési pólya (Tenfel-féle) a hasfalak rendezésére és fejlődésnek elősegítésére és formás alak megtartására. (L. hird.)
 Ascher-féle javított mesterséges fogzománczot szállít a General Dental Manufacturing Co. m. b. H., Berlin W/S., Jägerstr. 61. (L. hird.)

gens, stypticum. Küls. száj-, torok-, szemvíznek, klismának, húgycsőbe fecskendésre, hólyagmosásra 1 : 100—200; permete alakjában belégzésére 0,5—4,0 : 200; kenőcsbe 1 : 5—10; torok vagy a gége ecsetelésére 1 : 15—10. Choléránál Cantani-féle enteroklysis czéljaira 5,0—20,0 : 500—2000 gm. 38—40° C vízre, 20—30 csepp tinct. opiival. Bels. 0,05—0,5 pro dos. többször napj. porban, pilulában. Gyomoremésztést megrontja, a pepsint és a peptonokat lecsapja.

86 Rp. Acid. tannici 0,3—0,5
Sacchari alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.

DS. 2 ór. 1 port.

1—5 éves gyermeknek nephritis scarlatinosa esetén.

88 Rp. Acid. tannici 3,0.
Butyri Cacao qu. s. ut
f. l. a glob. vagin No. 10.

DS. Tanninglobulusok.

90 Rp. Acid. tannici 2,0.
Pulv. Doveri 1,0.
Elaeosacchar. Menth. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.

DS. 2 ór. 1 port.
Diarrhoea ellen.

92 Rp. Acid. tannici 1,5.
Opii puri 0,5.
Extr. Nucis. vom. 0,15.
Extr. Cascarillae qu. s.
ut f. pil. No. 30.
Consp. pulv. Cassiae Cin-
namomi.

DS. 3-szor nap. 3 szemet.
Diarrhoea ellen.

94 Rp. Acid. tannici 0,03—0,1.
Aquae dest. 10,0.

MDS. Szemcseppek.
Conjunct. catarrh. chron.

87 Rp. Acid. tannici 2,0.
Ungu. simpl. 20,0—30,0.

M. f. ungu.

DS. Kenőcs.

Méhszáji erosióknál tamponozásra.

89 Rp. Acid. tannici 1,5.
Butyri Cacao qu. s. (10,0).
ut f. l. a suppositoria.
No. 5.

DS. Tanninesapocskák.

91 Rp. Acid. tannici 1,0.
Aquae Amygd. amar. 20,0.
Aquae dest. 100,0

MDS. Szemvíz.
Conjunctivis catarrh.

93 Rp. Acid. tannici 0,3—0,4.
Pulv. Doveri 0,1—0,3.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No 10.
DS. 2. ór. 1 port.
1—5 éves gyermekek-
nek bélhurut esetén.

95 Rp. Acid. tannici 3,0.
Extr. Aloes aquos. 1,0.
Extr. Graminis qu. s.
ut f. pilul. Nr. 100.
Consp. Lycopod.
DS. 3-szor napj. 4 szemet.
Morbus Brighti.

Vichy Célestin-forrás kitűnő hatású vesebajoknál. (L. hird.)
Sztraka-féle tannin-eszkoládé kis gyermekek és felnőttek hasmenése ellen kitűnő hatású és kellemes ízű. (L. hird.)
Catarrhus intestinalis:

Rp. Gelodurat „Pohl“
scat. orig. c. acid. tannic. 0,3.
S. 3-szor naponta 1 darabot.

96 *Rp.* Acid. tannici
 Chinin. sulfur. \overline{aa} 2,5.
 Bals. peruviani 1,0.
 Aquae Coloniensis 5,0.
 Ung. rosati. 50,0.
 M. f. ungu.

DS. Hajkenőcs. Hajhullás ellen.

98 *Rp.* Acid. tannici 4,0.
 Aquae picis 80,0.
 Aquae dest. 400,0.

MDS. Permete alakjában belégzésre. Bronchiectasia, bronchitis putrida.

97 *Rp.* Acidi tannici 20,0.
 Glycerini 100,0.
MDS. Hívely tamponokhoz.

99 *Rp.* Acid tannici 0,2—0,5.
 Aquae dest. 90,0.
 Vini Tokayens. 15,0.
 Glycerini 10,0.
 Tinct. Opii simpl. gtt. 2—4.

MDS. 2 ó. 1 kk.
 Gyermeknek catarrh. intest. chron esetén.

H. **Acidum tartaricum** [$C_2H_2(OH)_2.(COOH)_2$]. Hasábalakú, kéreggő összenőtt, színtelen, áttetsző jégcszek; íze savanyú. Oldódik = sr. vízben, $2\frac{1}{2}$ sr. borszeszben. Használat, adag, mint az acid. citricumnál.

100 *Rp.* Acidi tartar. 2,0.
 Aquae dest. 130,0.
 Syrupi Moror. 20,0.
MDS. Ór. 1 evőlk. Enyhe antipyreticum.

101 *Rp.* Acid. tartar. 5,0.
 Olei Citri gtt. 5.
 Sacchari alb. 100,0.
 M. f. pulv. det. in scat.
 S. Limonade-por. 1—2 kk.
 egy pohár vízre.

Acidum trichloraceticum ($CCl_3.COOH$). Színtelen, hygroskopos kristályok, vízben jól old. Causticum; 50% oldatban szemölcsök stb. edzésére; 1%—3% oldata haemostaticum, adstringens.

Acidum Thymenicum. A nucleinsav hasadási terméke, más néven nucleotínphosphorsav, gyári neve *solurob.* Barnássárga, hideg vízben is old. por; kissé savanykás ízű. Húgysavat megköti s azzal jól oldh. vegyületet alkot. Köszvényellenes szer. Adag napj. 3—4×0,5 gm. porban, pilulában, v. kész tabletták alakjában.

Acocantherae Schimperi lignum. Hatóanyaga a *quabain* nevű glycosida, mely alighanem azonos a strophantinnal. Hatás, haszn. mint a strophantusé és digitalisé. Adag: infus. v. decoct. alakjában 1—1,5 gm.: 150. 2 ór. 1 evőlk.

Dysenteria:

Rp. Gelodurat „Pohl“
 scat orig. c. acid. tannic. 0,3.
 S. 3-szor naponta 1 darabot.

102 *Rp.* Infus. ligni *Acocantherae* e 1,5.
 l. a. p. ad. colat. 150,0.
 Syrupi *Menthae* 20,0.
MDS. 2 ór. 1 evők.

Acotin (Dipara-anisyl-monoparaphenetylguanidin-chlorhydrat) Fehér, vízben 6%-ig oldh. por. Helybeli anaestheticum, mint a cocain. 0,1—1%-os oldatokban subcután, v. nyálkahártyákra ecsetelve 1—2 p. mulva anaesthesia, mely tovább tart, mint cocain után. Schleich-féle anaesthesiához 0,1:100+0,8 natr. chlorid. Szemészetben a cyanhigany subconjunctivalis befecskendését fájdalomtalaná teszi.

103 *Rp.* Hydrarg. cyanati 0,01. 104 *Rp.* *Acotini* 0,1.
 Natrii chlorati 1,0. Natrii chlorati 0,8.
 Aquae dest. 50,0. Aquae dest. 100,0.
 Solut. *Acotini* 1% gtt. 1. *MDS.* Schleich-féle anaes-
MDS. 1/4 fecskendővel sub- thesiához.
 conjunctivalisan be-
 fecskendezni.

105 *Rp.* *Acotini* 0,05.
 Cocaini hydrochlor. 0,1.
 Solut. Natr. chlor. 0,8% 5,0.
MDS. A subconjunctivalisan használandó folyadékhoz egy v. két tized Pravaz-fecskendővel hozzátéverni.

Aconitum Napellus. Tubera. (Ranunculaceae). Ható anyagai 1. aconitin. 2. pseudoaconitin. Nem használtatik; helyette köv. készítményei:

Extractum Aconiti. Borszeszes kivonat dextrinnel szárítva; fájdalomcsillapító neuralgiáknál; haszn. mind küls., mind bels. Kenőcshöz 1:5—10. Bels. 0,005—0,03! pro dos., 0,025—0,12! pro die. Változó erélyű, megbízhatlan készítmény.

Tinctura Aconiti. Haszn. mint az extractum. Adag bels. 3—5 csepp pro dos. többször napj. Dos. maxim. sing 0,5! Dos. maxim. pro die 1,5!

Aconitinum germanicum. ($C_{30}H_{47}O_7N$). Fehér vagy sárgás, szagtalan por, keserű, égető ízű; hideg vízben kevésbé, forróban 50—60 részben, borszeszben, sósavas vízben jól oldódik. Haszn. mint az extr. aconiti. Küls. kenőcshöz 0,02—0,04:100, melyből borsónyi használandó el egyszerre. Bels. 0,0005—0,001! pro dos. 2—3-szor napj. Rendkívül heves mérég. Nélkülözhető. Nagy óvatosság! Czélszerűek a Mousette-féle pilulák; ezekből 2—5 pil pro die. Dos. maxim. pro die. 0,002!

Neuralgia: *Rp.* Gelodurat „Pohl“
 scat. orig. c. chin. sulf. 0,25.
 S. 2—3-szor naponta 1 dbot.

106 *Rp.* Aconitini german. 0,05.
solve in
Chloroformio qu. s. adde
Ungu. emollient. 20,0.
M. f. ungu.

DS. Aconitin - kenőcs. Sub
signo veneni et sub si-
gillo. Borsónyi hasz-
nálándó el 2-szer na-
ponk. Neuralgia.

107 *Rp.* Aconitini germ. 0,1.
Spiritus vini gtt. 10.
Lanolini 20,0.
M. f. ungu.

MDS. Aconitin-kenőcs. Sub
signo veneni et sub
sigillo. Külsőleg egy
borsónyi haszn. Neu-
ralgia.

Acopyrin l. Acetopyrin.

Actol. ($AgC_3H_5O_3 + H_2O$). Tejsavas ezüst. Credé ajánlotta.
Fehér, szagtalan, majdnem íztelen, vízben oldható por. Antisepti-
cum, ad-stringens; sebeket kissé izgatja, égő érzést okoz. A sub-
limat-pastillák helyett vannak 0,2 gmos actol-pastillák a sebkezelés
céljaira. Oldatok 1—2 : 1000. sebekre, torokvíznek.

Adalin. Két C_2H_5 csoportot s egy NH_2 csoportot tartalmazó
brómozott hypnoticum-sedativum. Bromdiethyl-acetylureum.
Haszn. mint a veronalé. Hypnoticus adag 0,5—1,0 este lefek-
vés előtt. Sedativ adag 0,25—0,5 napj. 3-szor. Tabletták készen.
Meleg vízben oldódik.

II. *Adeps lanae. L. Lanolinum.*

Adonis vernalis. Herba. (Ranunculaceae) Hatóanyaga az
adonidin (glycosida), melynek vegyképlete még nincs pontosan
meghatározva. Hatása, mint a fol. digitalisé, de gyengébb, bizony-
talanabb. Nem cumulatív hatású. Adag: infus. 3,0—6,0 : 150,0
2 ór. 1 evők.

Adonidinum. Színtelen v. fehéres-sárga, amorph por, keserű,
borszeszben jól, vízben, aetherben kevésbé oldódik. Hatás, mint
a herba adonid. vern. Adag porban, pilulában 0,005 pro dos.
2—4-szer napj.

108 *Rp.* Infus. herb. Adonid.
vern. e. 3,0.

l. a p. ad colat. 150,0.

Coffeini natr. benz.

Natrii iodati aa 2,0.

Theocini 1,20.

Digaleni 3,0.

Glycerini 10,0.

MDS. 3 ór. 1 evők. Erőlyes
diureticum.

109 *Rp.* Infus. herb. Adonid.
vern. e 3,0—6,0.
l. a p. ad colat. 140,0.
Oxymel. Scillae 10,0.

MDS. 2 ór. 1 evők.

110 *Rp.* Adonidini 0,15.
Pulv. et extr. Liquirit.
qu. s.

ut, f. pil. No. 30.

Cousp. pulv. Liquir.

DS. 3 ór. 1 szemet.

Adrenalin. A mellékvesének állítólag tiszta, kristályos hatóanyaga, mely a vérnyomást általános edényszűkítő hatásánál fogva emeli. Sokszorta erőlyesebb hatású, mint más mellékvese kivonatok. Leginkább mint helybeli edényszűkítő használtatik a szemészetben, rhinológiában, gégészetben, urologiában műtét előtt v. alatt, szondázásnál, loboknál; a nagy anaemia miatt némi érzéstelenség is áll be. 1:10,000 oldatból 1 csepp egy perc alatt vérteleníti a conjunctivát. Forgalomban az adrenalin sósavas v. bórsavas oldatai vannak 1:1000, 1:2000, és 1:5000, melyekből 1—2 csepp használandó. Helybeli anaesthesia céljaira cocainnal s más hasonló szerrel együtt gyakran haszn. L. cocain-recepteket. Belsőleg nem ajánlható. Veszélyes melléktünetek gyakoriak. Küls. haszn. is nagy óvatosságot igényel! — Orvos kezéhez! — L. *Tonogen* ez. a. is. — Az Adrenalin-Poehl szintén jól használható. Kaplható tubusokban (0.002) és oldatban (1:1000) a 10 kctm. és 30 kctm.

Aescorcin. A vadgesztenye aesculinjének egy származéka. 10%-os vízes oldata a szemészetben diagnosticus szer. U. i. a kötőhártya lámhiányos helyeit s a cornea-defectusokat pirosra festi. Nem izgat helybelileg.

Aesculin. A vadgesztenye glycosidája. Vízben neh. old. Natrium carbonattal (2—3%) készült 5%-os vízes oldatából 0.3 köbcm. lapus ellen bőr alá fecsk. Fájdalmas.

H. Aether aceticus [$CH_3.CO.O C_2H_5$]. Tiszta, átlátszó, könnyen mozgó, erősen illó, kellemes zamatú folyadék. Küls. bedörzsölésre rheumaticus fájdalmaknál. Bels. mint az aether. sulfur.

† **H. Aether bromatus. s. Bromoethyl** ($C_2H_5.Br$). Színtelen, erősen fénytörő, illó, kellemes szagú folyadék; vízben nem, borszeszben, aetherben oldható; 38—40° C-nál forr. Levegőn és napfény belatása alatt megbomlik (!). Belégezve analgeticum; tapintóérzés, eszmélet megmarad. Kisebb műtéteknél (fogászat) belégzésre 8—15 gm használandó el. Hysteriás, epilepsiás görcsök esetén 4—5 gm. kendőre csepegtetve belégzendő. Szív- és vesebetegyek, tüdővészések kerüljék. Gyomorba nem! 50 gmos üvegcsékben van készletben. Kevesebb nem is rendelhető.

H. Aether chloratus. L. Aethylum chloratum.

H. Aether depuratus seu sulfuricus [$(C_2H_5)_2O$]. Tiszta, átlátszó, színtelen, könnyen mozgó, erősen illó folyadék, sajátos szaggal: 34—36° C-nál forr. Küls. bedörzsölésre rheumaticus fájdalmaknál. Bels. 5—20 csepp v. 1—2 fecskendővel pro dos. subcután, mint excitans.

Narcosis céljaira a mi pharmacopoeánk külön aethert tart **H. Aether ad narcosim** név alatt, mely sav-, aldehyd- és hydrogensuperoxydmentes kell, hogy legyen s barna, telitöltött

Adrenalin-Clin. — Adrenalin-suppositorium-Clin.

Adrenal-Poehl edényszűkítő anaemicum, antiphlogisticum nyákhártyaloboknál, vérzéseknél, műtéteknél.

Alimentum Theinhardt certum est remedium.

és ki nem bontott 100 gmos üvegekben hűvös, sötét helyen tartandó. Narcosisra csak ezt szabad használni. Jól pótolja az eddig használt külföldieket.

111 *Rp.* Aether. dep. 20,0.
Olei Terebinth. 8,0.

MDS. 15—30 cseppet.
3—4-szer napjában.
Durand-féle szer
epekövöklikáunál.

112 *Rp.* Aether dep.
Tinct. Valerian. aeth.
aa 15,0.

MDS. 15—30 cseppet egy-
szerre.
Excitans.

H. Spiritus aethereus s. Liqueur anodynus Hoffmanni.
(Aether dep. 250 gm. + Spiritus 750 gm.) Szaglószer. Azonkívül
bels. 10—30 csepp czukorra cseppentve v. mixturában excitans.
Aether glycerino-salicylicus. l. Glycosal.

Aether Petrolei s. Ligroine. $C_nH_{(2n+2)}$ képletű szénhydro-
gének keveréke; főleg amylhydrogén. Színtelen, illó, könnyen
lobbanó folyadék (vigyázat gyertyával, gyúfával!). Haszn. helyi
anaesthesia eszközésére. A Richardson-féle „Compound anaesthetic
fluid for local anaesthesia” nevű szerben van; Aether
Petrolei 4 r + Aether dep. 1 r.

Aethoxy-Coffeinum. ($C_8H_9OC_2H_5N_4O_2$). Olyforma hatása van,
mint a cocainnak. 2%-os oldatból 1 fecskendővel bőr alá fecs-
kendve helybeli érzéketlenség jelentkezik. (Ceola.) DUJARDIN-
BEAUMETZ hemieraniánál dicsérte hatását. 0.2—0.5-os adagokra
az ütőerekben a feszülés emelkedik, pulsus 2—6-al szaporo-
dik, közérzet javul; később az arcz kipirul, csekély izzadás.
Némelyek szerint az alvást is előmozdítaná. (?)

Aethylenum chloratum s. Liqueur hollandicus. [CH_2Cl .
 CH_2Cl]. Színtelen, chloroformszagú folyadék. Küls. elvonó be-
dörzsölésekre tisztán v. mint linimentum 1:3—5. Belégezve
narcosis. Ritkán használtatik.

**Aethylidenum chloratum s. Aethylidenum bichlorat-
um.** [CH_3CHCl_2]. Színtelen, chloroformra emlékeztető szagú
folyadék. Belégeztetve jó narcosist ad; állítólag a szívre kevésbé
veszélyes, mint a chloroform. (LIEBREICH).

†† **H. Aethylmorphinum hydrochloricum s. Dioninum.**
Fehér, keserű por, alkoholban könnyen old. Morphin- és codein-
pótszer, főleg köhögéscsillapító. Mint anodynum kétes hatású.
Szemészetben lymphagog hatása miatt haszn.; friss, valamint
régí cornealis homályok felvilágosítására és ulcus corneae, vala-
mint disjunctio epithelii corneae eseteiben 5%-os oldatban szemi-
cseppek alakjában, vagy 2—5%-os vaselines kenőcsben, vagy
tisztán por alakjában a kötőhártyaszákba helyezendő, vagy bőr-
savval aa finoman porítva nyanyígy használandó.

Cholelithiasis: *Rp.* Gelodurat „Pohl”
scat. orig. c. Aether
Ol. Terebinth. aa 0,25.
S. többször napjában 2 dbot.

- 113 *Rp.* Aethylmorphini hydrochlor. 0,2.
Sacchar. albi. 4,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
D.S. 2—4 port napjában.
Köhögéscsillapító.
- 114 *Rp.* Aethylmorphini hydrochlor. 0,5.
Aquae destill. 10,0.
M.D.S. Szemcsepek.
- 115 *Rp.* Aethylmorphini hydrochlor. 0,5.
Vasellini 10,0.
M.D.S. Szemkenőcs.
- 116 *Rp.* Aethylmorphini hydrochlor. 0,5.
Aquae dest. 10,0.
M.D.S. 1/2—1 Pravaz-fecskendővel bőr alá.
Tabeses fájdalmak ellen (?)
- 117 *Rp.* Aethylmorphini hydrochlor. $\overline{\pi}$ 1,0.
Acid. borici $\overline{\pi}$ 1,0.
M. f. pulv. subtilissimus.
D in vitro.
S. Küls. A kötőhártyaszákba egy kevés sondával beléhelyezendő.

H. Aethylum chloratum s. Aether chloratus s. Monochloraethan s. Chloroethyl, s. Aethylchlorid. (C_2H_5Cl).
Víziszta, könnyen mozgó, igen erősen illó, 12° C-nál már forró, vízben nehezen, borszeszben igen jól oldható folyadék, könnyen gyulad. (Vigyázat!) Helybeli anaestheticum kisebb műtéteknél. Beforrasztott üvegcsővekbe zárva van forgalomban. A forrasztási hely letörendő, vagy a kupak leesavarandó, midőn az illó anyag vékony sugár alakjában önként áramlik ki a műteendő felületre, azt lehűti s érzésteleníti. KELEN, ANESTYLE, CHLORYL, CORYL, METAETHYL név alatt ezen készítménynek ehlormethyllel való keverékei jönnek forgalomba.

Agar-Agar. A Gelidium corneum nevű keletázsiai tengeri algából készülő colloid anyag. Ujabb időben anthrachinon-tartalmú hashajtókkal (caseara, aloe, sennapor) keverve használják (l. regulin), hogy azok felszívódását késleltessék s így azok eljutását a vastagbelekbe biztosítsák. Úgy látszik önállóan is bir eccoproticus hatással, mert vízűnsabbá s lágyabbá tudja tenni a bélsarat. Beleket nem izgatja; peristaltikára nincs hatása. Adag napj. 1 kk—1—2 evők. Két háromnapi adagolás után rendszeren hatásos enyhébb obsipatio habitualis eseteiben.

Agarase. Agar-agar + bulgár lactofermentum keveréke. Eccoproticus tabletták készen. Adag 3 drb étkezés közben.

Agaricinum. A fungus Loricis v. agaricus albus hatóanyaga; nem más, mint kissé tisztátlan agaricinsav [$C_{14}H_{27}OH(COOH)_2 + H_2O$]. Fehér, jegeczes por. Antihydroticum, különösen phthisicusok éjjeli izzadása ellen. Hatás 5—6 óra múlva. Gyenge diureti-


Chloroethyl-Bengué a legjobb helyi érzéstelenítő üveg- és fémmedényekben önműködő zárókészülékkel (l. hird.).

Chloroethyl dr. Robisch pro narcosi, Chloroethyl-Rapid üveg- és fémmedényekben: Chem. techn. Laborat. Dr. G. Robisch, München. (L. hird.)

CHLORAETHYL BENGUÉ

üveg-
edényekben

Anesthésie locale



D^r Bengué 47 rue Blanche Paris.

10 gr., 30 gr.



csappantyú-zárral.

50 gr.



Kapható a gyógyszertárakban.

Tessék kifejezetten Chloraethyl Bengué-t kérni!

DRAGÉES BENGUÉ

AU MENTHOL

(Marque déposée)

Menthol 0.02, Natr. boracic. 0.10

6 à 10 par jour. 6—10 tägl.

6—10 naponta. 6—10 dennē. 6—10 dziennie.

6 a 10 al giorno.

D^r BENGUÉ. PARIS. 47. rue Blanche.

Kapható a gyógyszertárakban.

Az orvos uraknak mintákat ingyen és bérmentve küld
a főlerakat:

Apotheke zum Heiligen Geist. Wien I. Operngasse.

Dr. BENGUÉ, 47 RUE BLANCHE, PARIS.

BENGUELIMENT

Marque déposée.

Schmerzstillende Einreibung — Fájdalomcsillapító bedörzsölés — Bo-
tiseca urbana — Bolesiti utišujci mazánj — Wcleranie bóli ušmierzajaco

-- Frlzione lenitive.

Linimentum Mentholi compositum.

Rp.: Menth. 12·0, Ol. Gaulth. 10·0, Lanol. anhyd. 10·0, Cerae albae 2·0.

Dépôt général: Apotheke „Zum heil. Geist“, Wien, I. Operngasse 16.

Kapható a gyógyszerházakban.

Az orvos uraknak mintákat ingyen és bérmentesen küld a főlerakat:
Apotheke zum Heiligen Geist, Wien I. Operngasse 16.

K 2.40.

cum. Adag bels. 0'005—0'04 pro dos. egyszer-kétszer; gyermekeknek 0,002—0,005—0,008 pro dos. Subcután igen fájdalmas ezért pilulában v. porban.

118 *Rp.* Agaricini 0,15.

Pulv. Liquirit.

Mucil. Gummi arab.

aa qu. s.

ut. f pil. No. 30.

DS. Este lefekvés előtt
2—3 órával 1—3 szemet; hajnalban ismét.

119 *Rp.* Agaricini 0,02—0,05.

Sacchar. alb. 4,0.

M. f. pulv. div. in dos.

aequ. No. 10.

DS. Este egy port. Gyermekeknek.

Agaricus chirurgorum. (Polyporus fomentarius. Fungi. Hymenonycetes.) Taplógomba. Hajszáledényes külső vérzéseknél vérzéscsillapító. Fölösleges; ha piszkos a készítmény, veszélyes is, sebfertőzést okozhat. Ne használjuk.

Agathin. (Salicyl α -methylyl-phenyl-hydrazon). Színtelen, szag- és íztelen jegeczlapocskák, vízben nem, borszeszben, aetherben oldh. Antinenralgicum, antirheumaticum, mint az antipyrin. Adag. 0,3—0,5 napj. 2—3-szor porban. Hatás bizonytalan, néha késik. Kellemetlen mellékhatások gyakoriak.

Agurin. (Theobromin-natrium-natrium-acetat.) Fehér, víz-szívó, vízben jól oldh. por. Diureticum, mint a diuretin. Adag bels. 0,3—0,5 pro dos. 2,0—4,0 pro die. oldatban.

120 *Rp.* Agurini 6,0.

Aquae Menthae pip.

Aquae dest. aa. 70,0.

MDS. Napj. 4—5 evők.

Diureticum.

121 *Rp.* Agurini 5,0.

Coff. natr. benzoic. 2,0.

M. f. pulv. div. in dos.

aequ. No. 10.

DS. Naponta 4—5 port.

Diureticum.

Aiodin. l. Thyreoidea készítm.

Airol (Basicus gallussavas jod-bismuth). Sziürkés-zöldes, szagtalan, íztelen, vízben, alkoholban és aetherben oldhatlan, natronlúgban, ásványsavakban oldh. por. Óvd nedvességtől, bomlik! Haszn. mint a jodoform és dermatol; hintőporban, glycerines oldatban, collodiumban, kenőcsben.

122 *Rp.* Airol 2,0.

Aquae dest. 5,0.

Glycerini 15,0.

MDS. Küls. Gonorrhoeánál
2-szerre a húgy-
csőbe fecskendezni.

123 *Rp.* Airol 5,0.

Collodii flexil. 45,0.

MDS. Airol-collodium. Kül-
sőleg.

124 *Rp.* Airol 15,0

Talci venet. 85,0.

M. f. pulv.

DS. Hintőpor.

125 *Rp.* Airol 5,0.

Vasellini 15,0.

M. f. ungu.

DS. Airolos szemkenőcs.

Urobalkan, karlsbadi húgyhajtó tea, gyorsan hat a szív- és a vesebajok nyomában föllépő hydropsnál (l. hird.).

126 *Rp.* Airoli

Mucil. gummi arab.
Glycerini aa 10,0.
Bolus alb. 20,0.
M. f. pasta.

DS. Bruns-féle pasta. Seb-
varratokra occlusiv-
pasta. Spatulával vas-
tagon felkenni.

127 *Rp.* Airoli

2,5.
Camphorae tritae 0,5.
Vasellini 50,0.
M. f. ungu.

DS. Airokenőcs. Ulcus cr-
risra kenni. Sarjadzást
előmozdítja.

Alantol. l. Helenin.

Albargin. Ezüstnek gelatose-val (enyvszármazék) való össze-
kötetése. Haszn. mint a protargolé és argoniné. Gonorrhoea
ellen 2%-os oldatban befecskendések.

Alboferrin. l. Ferri praeparata.

Alcarnose. Tápszer. Barna, szívós, vízben jól oldh. Kenyérizű,
majdnem szagtalan tömeg. 24% albumosok, 67% maltose, 6%
zsír, 3% sók. 12 gmos gelatin capsulák alakjában van kereske-
désben. Napj. 1—10 db. tejben, levesben, cacaóban, ha erősebb
táplálás szükséges. Tápláló csőrének is igen jó.

Alcumentum. Folyékony kenőcsanyag, mely alkoholt tartalmaz
és vízben oldható. Készen kapható kénesóval, kali jodatummal,
salicylsavval készült alcumentum.

Aleuronat-készítmények. Az al.-liszt, mely növényi fehérje-
féle, íztelen, sárgás por és diabetes-kenyér készítésére haszn.
A sebészetben a leucocytákra gyakorolt chemotacticus hatása
alapján folytonossági hiányok beragasztására összetapadás
elérése céljából haszn.

Alexipon. Acetylsalicylsavas aethylester. Sárga, olajszerű folya-
dék. Küls. bedörzsölésre rheumatismus ellen tisztán vagy aa olajjal.

Allergin. A tuberculosis ophthalmi- és Pirquet-reactiói számára
szolgáló Altuberculin oldat, mely capillaris üvegcsővekben steril
alakban kapható.

† **H. Aloe.** Különböző aloe-fajok leveleinek sűrített tejnedve.
Gyantaszerű, fénylő, fekete vagy feketésbarna, kagylós törésű,
rossz szagú, keserű ízű darabok. Hatóanyaga az aloin (l. alant).
Bels. 0.02—0.05 pro dos. 2—4-szer napj. mint amarum, 0,2—
0,3 pro dos. mint laxans, 0.5—1,0 pro dos. mint drasticum
hat; utóbbi adagokban ellenjavalt hórszám, terhesség, könnyen
vérző aranyér eseteiben.

† **H. Extractum Aloes.** Vizes kivonat, száraz, porítható. Két-
szer oly hatékony, mint az aloe, ezért felényiek az adagok.

† **H. Tinctura Aloes.** Amarum. Adag 5—20 csepp pro dos.

H. Pilulae laxantes. Tartalmaznak aloet, jalapa-gumót, natron-
szappant. Hashajtó-adag 2—3 szem.

Aloinum. Az aloe hatóanyaga s az anthrachinonok csoport-
jába tartozik. Sárgás, hideg vízben nehezen, forróban könnyen

Noffke oldódó bougie-jai a gonorrhoea (urethritis auter. et
post., prostatitis chr.) kezelésére c. Albargin 0.5—10% (l. hird.)

oldódik, jegeszes, keserű ízű. Hatása mint az aloe-é. Adag bels. laxans célból 0,1—0,2 pro dos. pilulában. Angliában igen használatos obstip. habit. eseteiben.

128 *Rp.* Extr. Aloes 10,0.
Extr. Rhei
Extr. Cascarae \overline{aa} 5,0.
M. f. l. a. pilulae
No. 100.
Obduc. fol. Argenti.
DS. 1—2 szemet este. Obstip.
habit.

130 *Rp.* Extr. Aloes.
Pulv. rad. Rhei. chin.
 \overline{aa} 1,0.
Extr. Colocynth.
Gummi Gutti \overline{aa} 0,5.
Pulv. rad. Althaeae.
Mucil. Gummi arab.
 \overline{aa} qu. s.
ut. f. pilul. No. 30.
DS. 1—2 szemet naponta.
Drasticum.

132 *Rp.* Extr. Aloes
Extr. rad. Rhei. chin.
Ferri lactici \overline{aa} 2,0.
Pulv. et succi Liquirit.
 \overline{aa} qu. s.
ut. f. pilul. No. 30.
Consp. pulv. Liquirit.
DS. 1—3 szemet reggel
és este.
Chlorosis et obstip habit.

129 *Rp.* Aloes pulv. 10,0.
Extr. Chinae 5,0.
Pulv. cort. Cinnam. 2,0.
Syrup. cort. Aurant.
3,0.
M. f. pilul. No. 100.
Consp. pulv. Cassiae
Cinnam.
DS. Evés előtt 1—2 sze-
met. Tonicum, sto-
machicum.

131 *Rp.* Aloes pulv.
Extr. rad. Rhei chin.
 \overline{aa} 2,0.
Extr. Belladonn. 0,1.
Extr. Taraxaci qu. s.
ut. f. pilul. No. 30.
Consp. pulv. Cassiae
Cinnam.
DS. 2—3 szemet egyszerre.
Laxans.

133 *Rp.* Extr. Aloes
Fel Tanri inspiss.
 \overline{aa} 2,0.
M. f. pilul. No. 30.
Obduc. Keratino.
DS. 3 \times napj. 3 szemet.
Icterus cum obstipatione.

134 *Rp.* Tinct. Aloes.
Tinct. Chinae comp.
 \overline{aa} 15,0.
MDS. 3 \times napj 15—30.
cseppet.
Amarum.

Allosan. A santalol allophiansavestere. Fehér, íztelen por. Bélben lehasad belőle santalol vagy gonorol s ez a hatékony rész. Antigonorrhoeicum. Adag napj. 3—4 \times 1—2 gm. Félgnos tableták készen. L. Gonorol cz. a. is.

Almatein. A haematoxylin és formaldehyd kondenzációs terméke. Könnyű, vörhenyes, szagtalan, íztelen por, vízben nem.

Joricin (jóízű ricinusolaj) a legjobb hashajtó!

glycerinben és alkoholban jól old. por. Antibacteriticum, bél-desinficiens. (?) Küls. mint hintőpor v. glycerines oldatban (1%-os). Bels. pro dos. 0,2—0,6 napj. többször.

134 *Rp.* Almateini 0,5.
Glycerini 50,0
M. f. sol.

DS. *Suo nomine.* Küls.

Alphol. (Salicylsavas α -naphtylester.) Fehér, vízben neh., aetherben könnyen old. por. Haszn. s adaga mint a salolé és betolé.

Alsol (Alumin. acet. tartar). Szintelen, fénylő, gunnmiszertű, eczetsav-szagú, összehúzó, édeses-fanyar ízű darabkák. Vízben jól oldódik, borszeszben, glycerinben nem. Adstringens, antisepticum. A liquor alumin. aceticit (Burow-oldat) jól pótolja (l. ezen cz. alatt). Küls. sebmosó-folyadéknak 2—3%-os oldat; szájvíznek, húgycsőbe, hüvelybe, orrba fecskendésre, lábak mosogatására (bűzös izzadás) 1—2% oldat.

135 *Rp.* Alsoli 6,0.
Aqua dest. 300,0.
Syrup. simpl. 20,0.

MDS. Száj-torokvíz.

136 *Rp.* Alsoli 2,0.
Aqua dest. 150,0.

MDS. Húgycsőbe fecskendésre. Gonorrhoea.

137 *Rp.* Alsoli 4,0.
Aqua dest. 200,0.
Aqua Amygdal. amar. 10,0.

MDS. Permete alakjában belélegzendő.

Bronchitis putrida, gang-raena pulmon.

138 *Rp.* Alsoli 2,0.
Aqua dest. 130,0.
Syrup. cort. Aurant. 20,0.

MDS. ór. v. 2 ór. 1 evőkan. Gyomor-, bélvérzések.

H. Althaeae radix. (Malvaceae). Hatóanyaga növényi nyálka és keményítő. Pora jó pilulaanyag mncil. gummi arab.-val; pilula-hintőpor. Decoct. 1:10 nyákos, bevonó folyadék, száj-, torokvíznek; csípős anyagoknak jó veliculum.

H. Althaeae folia. Hatóanyaga növényi nyálka. Decoct. 1:10 nyákos, bevonó folyadék.

H. Species Althaeae. (Rad. és fol. Althaeae, rad. Liquirit flor. Malvae.) Egy csésze theára (infus.) tetézt evőkanálnyi, veendő.

Syrupus Althaeae. Kellemes ízjavító.

139 *Rp.* Decoct. rad. Althaeae 10,0.
e 10,0.
1 a. p. ad. colat. 300,0.
Syrup. Althaeae 20,0.

MDS. Száj-, torokvíz.

Stomatitis- v. angina catarrh.

140 *Rp.* Rad. Althaeae 20,0.
Rad. Liquir. decort. 10,0.

Rhizom. Iridis.

Fruct. Foeniculi.

aa 1,0.

Cosc. cont. m. f. spec.

DS. 2 evők. 1 csésze theára.

Tinctura Ferri Athenstaedt

0.2% Fe jóízű oldatban

Tinctura Ferri Athenstaedt arsenica

0.2% Fe + 0.004% As, O₂

kitünően beváltak anaemia, chlorosis, gyöngeségi állapotok, neuresthenia és idegesség eseteiben. Rendkívül könnyű assimilatio anélkül, hogy a gyomrot és belet a legkisebb mértékben megtámadná. Étvágyserkentő, a fogakat nem bántja és igen kellemes ízű.

Alsol 50%

mint nem mérgező desiniciens és antisepticum kiterjedten kipróbáltatott a sebészeti, nőgyógyászati, gégészeti gyakorlatban, bőrbajoknál és nemi betegségeknel, a szemészetben és foggyógyászatban.

Alsol-Creme és Alsol-puder

a bőrhigienikus ápolására, bőrbajok-, hyperhydrosis- és különféle dermatitiseknél a legjobb eredménnyel használt készítmények.

Kaphatók a gyógyszertárakban.

Vezérképviselet Magyarország részére :

Dr. Rosenberg Sándor „Csillag“-
gyógyszertára

Budapest, VIII., Rákóczi-ut 39. sz. (József-Körút sarok)

Irodalmat és kísérleti mintát az orvosuraknak díjmentesen bocsát rendelkezésükre

Athenstaedt & Redeker

Chemische Fabrik Hemelingen bei Bremen (Németország).

SORISIN

Törv. védve!

Javalt: a légzőszervek hurutos bántalmai, mint: bronchitis, pertussis, tüdőcsucshurut, kezdődő tuberculosis.

Adagolás: felnőtteknek 3—4 kávéskanállal napjában, gyermekeknek a felét.

Egy üveg ára 2.— korona.

Kapható minden gyógyszertárban.

Vas-Sorisin

(Syr. ferri sulfoguaiacol.)

Sorisin-Ferrarsenat

(Syr. ferri sulfoguaiacol-arsen.)

Javalt: a légzőszervek hurutos bántalmai, különösen epidemikus betegségek után fellépő anaemia, chlorosis, rhachitis, scrophulosis.

Adagolás: felnőtteknek 3—4 gyermekkanállal napjában, gyermekeknek a felét.

Egy üveg ára 2 kor. 50 fillér.

Kapható minden gyógyszertárban.

SORISIN-WERKE

Herbabny-Scholz, Wien, I. Lugeck 7.

141 *Rp.* Decoct. rad. Althaeae
e 5,0.
l. a. p. ad. colat 100,0.
Salis Ammon. dep. 0,5.
Tinct. Opii simpl. gtt. 3.
Succi. Liquir. 5,0.
MDS. 2 ór. 1 gyk. 3—6 év.
gyerm. bronchitis esetén.

H. **Alumen.** $[AlK(SO_4)_2 + 12H_2O]$. Szintelen, áttetsző, kemény octaederek vagy kristálydarabok, levegőn könnyen elmúlnak. $10\frac{1}{2}$ sr. vízben oldódik, oldat savanyú kémhatású, összehúzó, fanyar ízű. Adstringens, stypticum, gyenge antisepticum. Küls. teli fürdőre 100—150 gm.; száj-, torokvíznek, hiively kimosására 2,0—5,0 : 100,0; húgycsőbe fecskendésre 0,5 : 100,0; kenőcsnek 1 : 10—20. Bels. porban, pilulában, nyákos oldatban 0,1—0,5 pro dos. 0,5—2,0 pro die.

H. **Alumen ustum.** $[AlK(SO_4)_2]$. Fehér por, 25 sr. vízben lassan oldódik Substantiában hintőpor vérző sebekre.

143 *Rp.* Aluminis 5,0.
Aqua dest. 300,0.
Syrup. Moror. 30,0.
MDS. Száj-, torokvíz.

145 *Rp.* Aluminis 0,5.
Aqua Foeniculi 50,0.
MDS. Szemcseppek.
Conjunct. catarrh.

147 *Rp.* Aluminis 5,0.
Aqua dest. 250,0.
Syrup. Moror. 20,0.

MDS. Gyermeknek száj-torokvíz.

Stomat. catarrh. és aphthosa, angina catarrh., tonsillitis follicul. Ha lenyelnek, pulva rongyra itatni a folyadékot s így mosogatni a beteg helyet.

142 *Rp.* Syrup. Althaeae 50,0.
Oxymel Scillae 5,0.
Aqua Melissae 25,0.
MDS. 1—2 ór. 1 kk. 2—3.
év. gyermek köptető.

144 *Rp.* Aluminis 10,0.
Plumb. acet. bas. sol. 20,0.
Aqua dest. 200,0.

MDS. Külsőleg 2—3 liter vízzel felhígítva borogatások alakjában haszn. hevenyész bőrlobok, égési sebek ellen a liquor Burrowi helyett.

146 *Rp.* Aluminis
Zinci sulfur.
Acid. carbol.
aa 0,3—0,6.
Aqua dest. 200,0.
MDS. Húgycsőbe fecskendésre. Gonorrhoea.

148 *Rp.* Aluminis
Cupri sulf.
Pulv. frond. Sabinae
aa 10,0.
M. f. pulv. det. in scat.
DS. Hintőpor. Condylomata acumin. esetében növedékekre hinteni (ép bőr vattával védessék).

Stypticum : *Rp.* Gelodurat „Pohl”
scat. orig. c. Extr. Hydrast. 1,0.
S. 3—1-szer naponta 1 dbot.

149 *Rp.* Aluminis 4,0.
Morphini hydrochlor. 0,05.
Sacchar. alb. 2,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.

DS. 3—4 port naponta.
Phthisicusok csillapít-
hatlan hasmenése
ellen.

152 *Rp.* Zinci sulf. 5,0.
Alumin. pulv. 30,0.

MDS. Külsőleg. Kávéskan.
1½ l. vízben oldva hű-
velyöblítésre.

154 *Rp.* Aluminis 1,0—2,0.
Pulv. Doveri 2,0
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.

DS. 2 ór. 1 port.
Diarrhoea, haemoptoe,
vesevérzés.

150 *Rp.* Aluminis
Zinci sulfo-carbol.
aa 0,5—2,0.
Aquae dest. 250,0.
MDS. Hűgycsőbe, hólyagba
fecskendésre blennorrhoea-
nál.

151 *Rp.* Aluminis 1,0.
Camphorae trit. 0,5.
Ungu. emoll. 30,0.
M. f. ungu.

DS. Kenőcs.
Puritus vulvae et ani.

153 *Rp.* Decoct. tuber. Salep
e 0,5.
l. a. p. ad colat 80,0.
Aluminis 0,4.
Tinct. Opii simpl. gtt. 2.
Syrupi simpl. 8,0.

MDS. 2 ór. 1 kk.
1—2 éves gyermeknek heveny
bélhurut ellen. Ha collap-
sus volna, tinct. opii he-
lyett tinct. valer. aeth. gtt. 10.
vétessék.

II. Aluminium aceticum solutum seu liquor Burowi

Tiszta, színtelen, eczetsav-szagú folyadék. Körülbelül 5% bázisos
alumin. acetatot tartalmaz. Antisepticum, adstringens. Haszn.
küls. renyhe, eves sebek mosogatására (1:5), blennorrhoea-
urethrae, bűzös hüvelyhurut, ozaena esetén befecskendésre (1:20),
szájvíznek (1:30). Bels. ritkán; hasmenések ellen 5—20 csepp
syrupban, napj. többször.

155 *Rp.* Alum. acet. sol. 10,0.
Aquae dest. 80,0.
Syrup. simpl. 20,0.

MDS. 2 ór. 1 gyk.
Gyermekeknek dysenteria
catarrh. és diphteritica
esetén.

156 *Rp.* Aluminii acet. sol.
20,0.
Aquae dest. 400,0.

MDS. Csőrének.
Gyermekeknek dysenteria
catarrh. és diphteritica
esetén.

Aluminium aceticum basicum pulvis l. Eston.

Aluminium acetico-tartaricum. l. Alsol.

Aluminium borobenzoicum tart. liquidum. l. Sudoral.

Aluminium caseinicum. Sárgásfehér, íztelen por, vízben
oldhatatlan. Belsőleg adstringens. Bélbajok esetén porban 0,25—
0,3 pro dos. többször napjában. Gyermekeknek 0,03 pro dos.

Myrticol „Csatádi“ igen kell. ízű guajacol-áfonya-készítmény,
tüdőbajosok gyomorzavarai és bélbántalmai ellen specificum.
(L. hird.)

Aluminium hydrooxydatum. [$Al_2(OH)_6$]. Fehér, könnyű, nyelvhez tapadó por, vízzel semleges hatású péppé elegyedik. Csak mint szűrítő hintőpor használtatik.

Aluminium paraphenolo sulfuricum l. Sozal.

Aluminium subgallicum seu Gallal. Barna, amorfi por, vízben oldódik. Antisepticum. Ozaenánál befúvásra haszn.

Aluminium subtannicum. l. Tannalum insolubile.

Alumnolum. Aluminium β naphtholo-disulfonicum. Fehér, hideg vízben, glycerinben jól, borszeszben nehezebben s kékesen oldódó por. Adstringens, antisepticum. Küls. 10—20%-os hintőpor talcum v. anyiummal. Sebmosogatásra, kifecskendésre a sebeszetben s nőgyógyászatban 0,5—2%-os oldatok. A húgycsőbe fecsk., valamint orr- és gégebántalmaknál 0,5—1%-os, szemcseppeknek 2—4%-os oldatok. Bels. nem.

157 *Rp.* Alumnoli
0,25—0,5—1,0.
Aquae dest 100—150,0.
M. f. sol.

D.S. Külsőleg. Húgycsőbe fecsk.

158 *Rp.* Alumnoli 10,0.
Olei Ricini 10,0.
Collodii 80,0.

M.D.S. 10%-os Alumnol-Collodium. B. rgyógyászatban haszn.

Alypin. Bonyolult structurájú, vízben jól oldható, kristályos helyi anaestheticum. Cocain helyett haszn. Nem okoz mydriasiszt. 1—3%-os old. nyálkahártyákat érzéstelenít.

Amenyl. Methyllhydrastin-imidochlorhydrat. Sárgás, neh. oldh. por. Emmenagogum Véredenytágító. Adag. napj. 2—3×0,05 gm. Pro die 0,1—0,15 gm.

Amidoazotoluol. A rubrum scarlatinum (l. ott) tartalmazza. Barna por. 5—8%-os zsíros kenőcsben haszn. Hintőpornak is.

Ammoniaci gummiresina. Izgató, oszlató tapaszok alkatrésze. Bels. azelőtt mint expectorans használtatott emulsió vagy pilula alakjában. Adag 0,3—0,5 pro dos., 1,5—3,0 pro die.

H. Ammonii liquor. (HN_3). Tiszta, átlátszó, színtelen, átható szagú, maró folyadék. 100 részben 10 sr. ammoniagáz van. Causticum. Küls. rovar-, scorpio-csipések kiégetésére. Bels. nem.

II. Linimentum ammoniatum s. Linim. volatile. (Liquor. Ammon. 40,0. + Ol. Sesami 160,0) Bőrvörösítő, bőrizgató.

H. Ammonium aceticum solutum s. Liquor Ammonii acet. s. Spiritus Mindereri [$NH_4.C_2H_3O_2$]. 15% ammonium aceticumot tartalmaz. Tiszta, átlátszó, színtelen, illó folyadék. Küls. mint antisepticum; sebek kötözéséhez 1:4, szájj, orr, hiively kiöblítésére 1:20—30. Bels. mint diaphoreticum nyákos folyadéokban, syrupban 0,5—1,0 pro dos. napj. 3—4-szer.

159 *Rp.* Infus. flor. Sambuci
e 10,0.
l. a. p. ad colat. 150,0.
Ammon. acet. soluti 10,0.
Syrup simpl. 20,0.
MDS. ór. 1—2 evők.
Diaphoreticum.

160 *Rp.* Ammon. acet. sol. 10,0.
Aquaе Menthae pip. 100,0.
Spir. Aether. nitr. 2,0.
Syrup. cort. Aurant. 25,0.
MDS. ór. 1 evők.
Diaphoreticum.

†H. **Ammonii anisati liquor s. Spiritus salis ammoniaci anisatus** (Ammonium 20 + Spirit. 75 + Ol. Anisi 3.) Bels. kitűnő expectorans. Adag 5—20 csepp pro dos. napj. többször, nyákos oldatban. Köptetőkhathatós adjuvansa.

161 *Rp.* Decoct. rad. Althaeae
e 10,0.
l. a. p. ad colat. 150,0.
Liquor. Ammon. anisat.
Vini stibiati aa 5,0.
Syrup. Ipecac. 10,0.
MDS. 2 ór. 1 evők.
Expectorans.

162 *Rp.* Liquor Ammon anisati
1,0.
Syrup. Althaeae 50,0.
Syrup. Ipecac. 10,0.
MDS. 2 ór. 1 kk.
2—4 éves gyermeknek.
Bronchitis capill. Pneumon. catarrh.

†H. **Ammonium bromatum** [NH_4Br .] Fehér, jegeczes por, vízben könnyen oldódik. Antispasmodicum, sedativum. Adag : 0,1—1,0 pro dos. 3—4-szer napj. oldatban; leginkább kalium bromat. v. natrium bromat.-mal együtt.

163 *Rp.* Ammon. brom.
Natr. brom. aa 5,0.
Aquaе Menthae pip. 150,0.
MDS. Reggel, este 1 evők.

164 *Rp.* Ammon brom.
Kalii brom. aa 3,0.
M. f. pulv. div. in dos. aequ. Nr. 10.
Det. in chart. cerat.
S. Nap. 2—3 port cukros vízben.

Epilepsia, hystero-epilepsia,
delirium tremens.

H. **Ammonium carbonicum.** (Primaer ammonium carb. s. bicarb. összeköttetése carbaminsavas ammoniummal.) Ammoniumszagú, erősen lúgos, színtelen, kemény, szálasan jegeczes, légen el-málló, illó. 4 r. vízben lassan oldódik. Küls. bőrizgató kenőcs-höz, linimentumhoz 1 : 30—50. Bels. analepticum, excitans; oldatban 1,0—2,5 : 150. 2 ór. 1 evők.

165 *Rp.* Ammon. carb. 5,0.
Camphorae trit. 1,0.
Ungu. simpl. 30,0.
M. f. ungu.
DS. Kenőcs.

166 *Rp.* Ammon. carb. 2,0.
Aquaе dest. 130,0.
Syrup. simpl. 20,0.
MDS. ór. 1 evők.
Excitans.

167 *Rp.* Ammon. carb. 2,0.
Camphorae trit. 0,2.
Gummi arab. pulv. 10,0,
subige et solve in
Aqua dest. 180,0.
adde
Syrup. Althaeae 20,0.

MDS. 2 ór. 1 evőkán
Excitans.

168 *Rp.* Infus. rad. Ipecac. e 0,3.
l. a. p. ad colat. 80,0.
Ammon. carb. 0,5.
Syrup. simpl. 20,0.
MDS. 2 ór. 1 kk. v. gyk.
2—5 éves gyermek. Pneumon.
catarrh.

H. Ammonium chloratum s. Sal ammoniacum depur.
s. Salmiak. (*H₄N.Cl.*) Fehér, jegeczes por, szagtalan, sós ízű;
egyenlő r. forró vízben, 3 r. hidegben oldódik. Expectorans.
Ellenjavalt magas láznál. Adag: permiete alakjában belégzésre
1%-os oldat; bels. oldatban 2,0—4,0: 150,0 2 ór. 1 evők.

169 *Rp.* Ammon. chlorati 4,0.
Aquae dest. 150,0.
Syrup. Ipecac. 10,0.

MDS. 2 ór. 1 evők. Expectorans.

171 *Rp.* Decoct. rad. Althaeae
e 5,0.

l. a. p. ad colat. 100,0.

Ammon. chlor. 0,5.

Tinct. Opii simpl. gtt. 3.

Succi Liquirit. dep. 5,0.

MDS. 2 ór. 1 gyk.

3—6 éves gyermeknek.

170 *Rp.* Ammon. chlor. 0,4—0,5.

Aquae dest. 100,0.

Syrup. Althaeae 15,0.

MDS. 2 ór. 1 gyk.

3—6 éves gyermeknek

Expectorans.

172 *Rp.* Ammon chlorati 5,0.

Tartar. stibiat.

0,03—0,05.

Aquae Foeniculi 150,0.

Syrup. Senegae 10,0.

MDS. 2 ór. 1 evők.

Erős expectorans.

Ammonium chloratum ferratum s. Flores salis ammoniaci martiales. Piros-sárga, vízszívó, vízben jól oldódó por.
Kombinálja az ammon. chlor. és a vas hatásait. Adag bels. mint
az ammon. chlor.

173 *Rp.* Ammon chlor. ferrati
2,0.

Chinin. sulf. 2,5.

Extr. Aloes 1,25.

Pulv. et succi Li-

quirit. dep. an qu. s.

ut. f. pilul. No. 60.

Consp. Lycopod.

DS. 3 × napj. 4—6 szemet.

Chlorosis és mellette fenn-
álló hörghurut esetén.

174 *Rp.* Ammon chlor. ferrat.
0,5.

Aquae dest. 100,0.

Syrup. simpl. 10,0.

MDS. 2 ór. 1 gyk.

3—6 éves gyermek. Idült
hörghurut és vérszegény-
ség esetén.

Ammonium jodatum. [*H₄N.I.*] Haszn. mint a kalium és a
natrium jodatum, csakhogy bels. kevesebb adandó.

Pneumonia catarrh.: *Rp.* Gelodurat „Poli“

scat. orig. c. Creosotal comp.

S. 3-szor naponta 1—2 dbot.

Ammonii succinici liquor. [$C_4H_4O_4(NH_4)_2$]. Tiszta, barnás, igen kellemetlen szagú folyadék. Használat, adag, mint a liquor ammonii anisatusnál.

175 *Rp.* Liquor. Ammon. succin.

1,0.

Aquae Melissae 80,0.

Syrupi simpl. 20,0.

MDS. Ór. 1 evők.

Hagymázosak hörghurutja ellen.

176 *Rp.* Liquor. Ammon. succin.

Aether. sulf. aa 3,0.

Olei Menthae pip. gtt. 3.

MDS. Chamomilla teaiban

20 cseppet egyszerre.

Antispasmodicum.

II. Ammonium sulfo-ichthyolicum l. Ichthyolum.

H. Amygdalae amarae. Tartalmaz zsíros olajat, emulsint, amygdalint. Belőle készül az

†**H. Aqua Amygdalarum amararum.** 0,1% kéksavat tartalmaz, ezenkívül benzaldehidet. Bels. az érzékenység, reflex-tevékenység csökkentésére haszn. Adag 10—20 csepp pro dos. 3—4-szer napj. Dos. maxim. sing. 1,5! dos. maxim. pro die 5,0! Kék v. fekete üvegben rendeltessék. Megszokott, de nélkülözhető. Szokott adagban alig hatásos, nagyobb adagban mérgező (!!).

177 *Rp.* Aquae Amygdal.

amar. 15,0.

Morphini hydrochlor. 0,05.

MD. in vitro coerul.

S. 4 × napj. 10—15

cseppet.

178 *Rp.* Emuls. Amygdal.

100,0.

Aquae Amygd. amar. 5,0.

Extr. Hyosciami 0,1.

Syrup. amygdal. 10,0.

MDS. 2 ór. 1 kk.

Izgatott köhögés ellen.

H. Amygdalae dulces. Tartalmaz zsíros olajat, fehérjét, cukrot, mézgát. Belőle készülnek:

H. Emulsio amygdalina. Mandulatej. Bevonószer. Adag: evőkanalanként.

H. Syrupus amygdalinus. Tejszerű, kellemes ízű, nyákos ízjavító. Főleg fejetekhez.

H. Oleum Amygdalarum dulcium. Átlátszó, sárgás, szagtalan zsíros olaj. Belőle készül az

II. Emulsio oleosa. Bevonószer. Adag: evőkanalanként.

Amygdophenin. A phenacetin helyettesítője épp úgy, mint a lactophenin és citrophen. Mandulasavas phenetidín. Adag. 0,5—1,0 gm. pro dos. 2,0—3,0 pro die.

†**H Amylenum hydratum seu Dimethyl-aethyl-carbinol.** [$C(H)_3.C_2H_5.CO(H)$]. Színtelen, könnyen mozgó, camphor- és

Hygiama haud facile caretur in morbis ventriculi et intestini.

Gyomorbajoknál, vérszegénység és sápkór,
lázás, sorvasztó megbetegedések
utáni reconvalescentia,
phthisis esetében, 16 év
óta kitűnően
bevált

NURAL

kiváló
diaetetikai
digestivum

és mesterségesen emésztett táp- és erősítő-szer

vala-
mint kachek-
tikus és puerperalis
gyengeségi állapotoknál,
hyperemesis gravidarum esetében.

16 év óta igen sokszor rendelik az orvosok,
kórházakban, klinikákon és gyógyintézetek-
ben állandóan használják.

*Azon orvos urakat, akik a Nuralt még
nem próbálták ki, igen kérjük, hogy szives-
kedjenek kísérletet tenni vele.*

*Kísérleti minta és irodalom az orvos
uraknak kívánatra díjtalanul.*

KLEWE & Co., Nural-Laboratorium

DRESDEN M. 741.

Ára $\frac{1}{4}$ üvegnek ($\frac{1}{2}$ kg. tartalommal) 4.50 korona.

Betegsegélyző pénztárak részére árengedmény.

Kapható a gyógyszertárakban.

Raktár: Lederer gyógyszertár, Budapest.

Készítője Duret és Raby Marly-Le-Roi (Franciaország).
Főraktár „Kerpel“-gyógyszertár Budapest, V., Lipót-körút 28.

A THAOLAXINE

az idült székrekedés okszerű kezelésére való.

A Thaolaxine használata javulva van a szokványos idült székrekedés, a nyálkás bélhurut, a méh- és függeléknek lobos folyamataiból fásult székrekedés, ideges székrekedés, ülő foglalkozásuak, öregek székrekedése (a heveny- és idült féregnyulványtól) kezelés esetén. A terhesség idején, sérültek és műtétek után való hosszú ideig tartó ágyban fekvés esetén. Az aranyeres csomók fájdalmas székkürölését szünteti meg és megakadályozza a gőrcsök kifejlődését. — Minden mérgező hatástól ment és ezért gyermekeknek is adható.

□□□

Használati utasítás.

A Thaolaxine négy különböző alakban van meg és így adagolható.

1. **Pikkelyecskék.** — Minden étkezés alkalmával keverjünk el 1—5 kávé kanálnyi Thaolaxine-t burgonya péppel vagy zöld főzelék pépével, avagy pedig különböző (alma, szilva, barack) gyümölcs-izzel. Lehet azonban egyszerűen kevés tejjel vagy hideg folyadékkal is elkeverni. Kezdjük egy kávékanállyal és fokozzuk a mennyiséget addig, amíg elérjük a hatásos adagot.

Nem szükséges öt kávé kanálnyiál több.

2. **Ostyatok.** — 1—5 egész darabot étkezés közben vagy után.

3. **Pasztilla.** — 2—4 egész darabot étkezésnél.

4. **Törmelék (Granulé).** — Minden hozzáadás nélkül épp ily adagban szedhető. Egy-egy kávé kanálnyi mennyiségűt kevés vízzel nyeljük le.

Gyermekek ható adagja a felnőtt adagok fele.

□□□

Fontos megjegyzés.

A Thaolaxine nem lévén sem purgans, sem laxans, hanem egyszerű módon való szabályozója a székkürölésnek: hatása nem rögtönös és állandó eredményt csak néhány napl kezelés után ad.

menthaszagú és ízű folyadék. 8 r. vízben oldódik, borszeszben minden arányban. Hypnoticum; a chloralhydrátnál gyengébb. 1,0 chloralhydrát = 2,0 amylenehydráttal = 3,0 paraldehyddel (MERING). Adag. 2,5—5,0 pro dos. caps. gelat.-ban v. vízben ízjavítóval, v. csőrében. Gyermekeknek kornikhoz képest 0,2—0,5 pro dos. Dos. maxim. sing. 4,0! pro die 8,0!

179 *Rp.* Amyleni hydrati. 7,0.
Aqua dest. 50,0.
Extr. Liquirit. 10,0.
MDS. Este lefekvés előtt
felét bevenni.

181 *Rp.* Amyleni hydrati 5,0.
Aqua dest. 50,0.
Mucilag. Gummi
arab. 20,0.
MDS. Csőrének

182 *Rp.* Amyleni hydrati 7,0.
Aqua flor. Aurant.
50,0.
Syrup. cort. Aurant.
30,0.
MDS. Este felétegyserre.
bevenni.

180 *Rp.* Amyleni hydrati
6,0—7,0.
Morphini hydro-
chlor 0,02·0,03.
Aqua dest. 60,0.
Extr. Liquirit. 10,0.
MDS. Este lefekvés előtt
felét bevenni.
Álmatlanság ellen, mely
fájdalmak következ-
tében áll fenn.

183 *Rp.* Amyleni hydrati 1,0.
Det. in caps. gelat.
elast.
Dent. tal. dos. No. 10.
S. Este 2—4 dbot elfo-
gyasztani.

†H. Amylium, nitrosum s. Amylnitrit [$C_6H_{11}(NO_2)$]. Kö-
zömbös kémhatású v. gyengén savanyú, könnyen mozgó,
sárgás, sajátos gyümölcszagú folyadék. Vízben nem, bor-
szeszben jól oldható. Edényhűdítő. Cocainmérgezésnél dynamiás
ellenszer. Adag: kendőre cseppentve belégzendő 3—5 csepp pro
dos. (Vigyázat!) Per os sohasem rendeltetik. Fekete v. kék
üvegben egyszerre kevés rendeltessék. Dos. maxim. sing.
5 csepp! Kényelmesek az *Egger-féle* capsulák.

184 *Rp.* Amylii nitrosi 5,0.
Det. in vitro nigro.
S. 3—5 cseppet rendelet
szerint belégezni.
Stenocardia. Epilep-
sia. Acut cocain-
mérgezés.

Amylium salicylicum. Salicylsavas amylester. Színtelen v.
sárgás folyadék. Vízben nem, alkoholban, aetherben oldh.
Helybelileg ecsetelések alakjában haszn. rheumaticus bán-
talmaknál. Ecsetelések helye gyorsan befödendő. Bels. mint
antirheumaticum napj. 5—10 × 0,2 capsulában.

Caps. Amyli nitrosi Egger, 3 cseppenként üvegfiólákba
forrasztva és vattapárnácskába varrva, czélszerű és biztos ada-
golási forma belégzésre.

Amyloform. (Formaldehyd és keményítő condensatiós terméke). Fehér, szagtalan, oldhatlan por. Antisepticum, jodoform helyett hintőpor sebekre.

185 *Rp.* Amyloformii

Amyli Oryzae \overline{aa} 5,0.

MD. ad scat.

Szippantópor nátha ellen.

11. **Amylum Triticum.** Buzakeményítő. Finom, fehér por, szag- és íztelen, hideg vízben és borszeszben oldhatlan; 96 r. forró vízzel nyúlós, áttetsző, tejszerű, szagtalan folyadékot képez. Hintőpor. Forró vízzel készült oldata bevonó csőrének.

Anaesthesin (Paraamido-benzoésavas aethylester). Fehér, íz- és szag nélküli por. Vízben rosszul, alkoholban jól oldódik, olajban csak 2—3%. Ártalmatlan helybeli anaestheticum; hatása órákig, sőt napokig eltart. Bels. alig ártalmas. Bactericid hatása is van. Főleg orr-, torokbajok és gégefekélyek esetén befúvás alakjában. Belsőleg gyomorhyperaesthesiánál, ulcusnál, carcinománál, oesophagus fekélynél 0,3—0,5 gm 2-szer napjában porban. Köhögési inger ellen, mely a garatból indul ki, 0,02—0,05 gmos pastillákban. Suppositoriumok, húgycsőpálcák készen is kaphatók. **Antemesin** név alatt 0,1 gm. anaesthesint tart. gelatin kapsulák vannak forgalomban.

186 *Rp.* Anaesthesini 0,5.

Sacch. alb.

Amyli \overline{aa} qu. s.

f. pastilli No. 20.

DS. Napj. 3—5 szőr 1 dbot szopogatva elolvastatani a szájban. Garatizgalom ellen.

187 *Rp.* Thymoli 0,1.

Glycerini 45,0.

Anaesthesini 2,0.

Spir. vini conc. 5,0.

M. f. sol.

DS. Külsőleg. Becsepegtetésre középfül betegségeknel.

188 *Rp.* Anaesthesini 10,0.

Amyli trit. 90,0.

M. f. pulv. det. in scat.

S. Hintőpor v. befúvásra orrba, garatba.

189 *Rp.* Anaesthesini

Dermatoli

Talci ven. \overline{aa} 10,0

M. f. pulv. det. in scat.

S. Hintőpor égett sebekre.

190 *Rp.* Acid. arsenicosi 4,0!

Anaesthesini 2,0.

Olei Caryophyll. 1,0.

Kreosoti qu. s. nt f. pasta.

DS. Külsőleg. Fogidegölő pasta fogorvosok részére. Orvos kezéhez.

191 *Rp.* Anaesthesini 3,0.

Sacch. albi 2,0.

M. f. pulv. div. in. dos. aequ. No. 10.

DS. Napj. 2-szer egy port. Gyomoranaestheticum.

Ascher-féle javított mesterséges fogzománczot szállít a General Dental Manufacturing Co. m. b. H., Berlin W/S., Jägerstrasse 61. (L. hird.)

192 *Rp.* Anaesthesini 5,0.

Alipini

Extr. Bellad. aa 0,1.

M. f. pulv. div. in dos.

aequ. No. 10.

D.S. Napj. 2-szer 1 port.

Anaesthol. Helyi érzéstelenítő. Keveréke aethylum chloratum-nak (l. ott) és methylechloridnak.

Analgen. Chinolinszármazék. Fehér, jegeczes, íztelen, vízben oldhatlan, borszeszben és lúg savakban oldódó por. Analgeticum köszvény és csúz ellen. Mint antipyreticum nem vált be. A vizeletet sötétre vagy vöröstre festi, utóbbi szín eczetsavra még élénkebb lesz. Adag bels. porban 0,5—1,0 pro dos. 2,0—3,0 pro die.

Anesin, l. Aneson.

Aneson. Acetonchloroform 1%-os vizes oldata. Helybeli érzéstelenítő, sebészetben, fogászatban cocain helyett. Befecskendések veszélytelenek. Gyermekek aphtáinál ecsetelések.

Anestyle l. Aether chloratus.

II. Angelicae radix. (Archangelica offic. Umbelliferae). Hatóanyagai: illó olaj, angelikasav, angelicin (camphorszerű anyag). Stomachicum, stimulans. Adag: infus. 1 : 10.

II. Anisum stellatum. Fructus. (Illicium anisatum. Magnoliaceae.) Hatóanyaga illó olaj. Illatos theakeverékhez.

II. Anisum vulgare. Fructus. (Pimpinella Anisum. Umbelliferae). Hatóanyaga illó olaj. Carminativum, galactogogum, ízjavító. Adag porban, infusumban 0,5—2,0 pro dos.

Anogon. 30% jodot és kb. 50% higanyt tart. vegvület. (dijod-parasulfonsavas higanyoxydul) Antisymphiliticum. 10%-os olajos suspensiók haszn. 5—8 naponként ebből $\frac{2}{10}$ Pravaz-fecskendőnyi használandó el intramuscularis befecskendés alakjában. Fájdalmas.

Antemesin l. Anaesthesin.

Anthrrobin. (Keveréke $C_{14}H_{10}O_3$ és $C_{14}H_{12}O_3$ -nak). Alizarinből állítatik elő. Sárgás-fehér por; vízben nem oldódik, jól borszeszben, glicerinben, zsírokban. Hatása redukáló, mint a chrysarobiné, csak hogy gyengébb, míg a pyrogallussavnál erősebb. Kenőcsben, tincturában 1,0—2,0 : 10,0 eczema margin. psoriasis, herpes tonsurans, pityriasis versicolor ellen.

Anestyle-Bengué (chloraethyl és chlormethyl) helyi érzéstelenítő, önműködő zárral fogorvosok részére. (L. hird.)

193 *Rp.* Anthrarobini 10,0–20,0.
 Ol. Sesami 30,0.
 Lanolini 60,0.
 M. f. ungu.

D.S. Kenőcs.

195 *Rp.* Anthrarobini 20,0.
 Boracis venet. 35,0.
 Glycerini
 Spirit. vini aa 90,0.

M.D.S. Anthrarobin-borax-oldat. Külsőleg.

Anthrasol. Tisztított kőszénkátrány és pix ligni juniperi keveréke oleum menthaevel szagositva. Világossárga, olajszerű anyag. Használatlik, mint a kátrányok, kenőcsben, szappanban, vagy tisztán ecsetelésre is bőrizgatónak v. antiparasiticumnak.

197 *Rp.* Anthrasoli 5,0.
 Vaselini
 Lanolini aa 30,0.
 M. f. ungu.

D.S. Kenőcs.

199 *Rp.* Anthrasoli 10,0.
 Sulfur. praecip. 20,0.
 Acid. salicyl. 4,0.
 Pasta Zinci 100,0.
 M. f. pasta.

D.S. Külsőleg. Bőrparsiták ellen.

194 *Rp.* Anthrarobini 10,0–20,0.
 Spiritus dil. 90,0–80,0.
 solve ebulliendo.

D.S. 10–20%-os anthrarobin tinctura. Külsőleg.

196 *Rp.* Anthrarobini 10,0.
 Collodii flexil. 90,0.
 M. f. solut.

D.S. 10%-os anthrarobin-collodium. Küls.

198 *Rp.* Anthrasoli 5,0.
 Mentholi 1,0.
 Bromocolli 10,0.
 Pasta Zinci 50,0.
 M. f. pasta.

D.S. Külsőleg.

200 *Rp.* Anthrasoli 1,5.
 Lenigalloli 3,0.
 Pasta Zinci 50,0.
 M. f. pasta.

D.S. Külsőleg.

H. Antidotum Arsenici. Vízben keveréke ferrum oxychloridnak és magnes. hydroxydatum-nak. Hatóanyaga a keverés közben képződő vasoxydhydrazat [$\text{Fe}_2\text{O}_2\text{H}_2$]. Barna, zavaros folyadék. Adag arsén-mérgezés esetén 10 perczenként, majd 15–20 perczenként 2–3–5 evőkanállal. Használatkor felrázandó. Hánytatókat, gyomormosást nem teszi feleslegessé.

201 *Rp.* Antidoti Arsenici 300,0.

D.S. Rendelet szerint.

Exped. statim!!

†**H. Antifebrin s. Acetanilid.** ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 \cdot \text{CO} \cdot \text{CH}_3$) Színtelen selyemfényű, szagtalan, rhombos jeccezlapocskák, csipős ízűek. Vízben nehezen (1 : 180), borszeszben (erős borban, cognacban) könnyen oldható. Antipyreticum, antirheumaticum, analgeticum: főleg az utóbbi javallat alapján! Antipyreticus hatása = 3 annyi

Anthrasol fehér kátrány gyógyszerzappan a kolozsvári (Heinrich József) gyógyszerzappan-gyárból, az arczbőr, a kézbőr, a fejbőr kátrányos gyógykezelésére igen alkalmas. (L. hird.)

Kátrány-Mattan cuticular (Mattan + 10% Anthrasol) a bőrön nem látszó pasta a fedetlen testrészek nappali kezelésére. (L. hird.)

antipyrinnel és = $1\frac{1}{2}$ annyi phenacetinnel. Adag 0.1—0.2—0.5! pro dosi 1—2 ór.; 0.5—1.5! pro die porban, tokajiban, cognacban. Gyermeknek annyi centigm. pro dos. a hány éves a gyermek; de 14 éven alul soha 0.1 on felül pro dos. és 0.5-on felül pro die.

202 *Rp.* Antifebrini 1,0—2,0.
Sacchari alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 5.

DS. 1—2 ór. 1 port.

204 *Rp.* Antifebrini 1,0.
Cognac
Syrup cort. Aurant.
aa 30,0.
M. f. solut.

DS. ór. v. 2 ór. evőkan. (0,2).

Antiformin. Natriumhypochlorosum és natronlúg keveréke. Antibactericum. Tuberculum bacillus ellentáll a szernek, más nem saválló baktériumokat fel tudja oldani. Víz, ürülékek stb. fertőtlenítésére 2—4%-os oldatok haszn. Emberi testtel ne hozzuk érintkezésbe, mert töményebb oldatok marók.

Antinervin. (Keverék: 1 r. ammon brom. 1 r. acid. salicyl. 2 r. antifebrin.) Antineuralgicum. Pro dos 0.3—0.5.

Antinosin 1 Nosophenum.

†H. **Antipyrin** s. phenyldimethyl-pyrazolon. ($C_{11}H_{12}N_2O$). Fehér, jegeczes por, v. nagyobb, hasábos, színtelen, csaknem szagtalan jegeczek. Vízben igen jól, egyenlő r. borszeszben oldódik. Antipyreticum, antirheumaticum, analgeticum, influenzaelenes; helybelileg haemostaticum és érzéstelenítő. Szívbetegknél, szívgyengeségnél vigyázat! Adag bels. 0.5—2,0! pro dos., 2,0—6,0! pro die porban, oldatban. Czélszerű klysma alakjában is. Subcután fájdalmas.

206 *Rp.* Antipyrini 5,0.
Div. in dos. aequ.
No. 10.
Det. in caps. amyloc.
S. Rendelet szerint.
Antipyreticum.

208 *Rp.* Antipyrini 0,5—1,0.
Vini tokajensis
Aqua dest. aa 25,0.
Syrup. cort. Aurant.
50,0.

MDS. 2 ór 1 gyk. 2—3 éves
gyerm. Pertussis.

203 *Rp.* Antifebrini 3,0.
Pulv. et succi Liquir.
aa qn. s
ut. f. pilul. No. 30.

DS. 1—2 szemet ór. v. 2 ór.

205 *Rp.* Antifebrini 0,5.
Sacchari albi 2,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.

DS. 4—5 éves gyermekek-
nek 2 ór. 1 port.

207 *Rp.* Antipyrini 5,0.
Aqua Menthae pip.
100,0.
Syrup. cort. Aurant.
45,0.

MDS. Rendelet szerint.
1 evőkanálban 0,5
antipyrin.

209 *Rp.* Antipyrini
Aqua dest. aa 10,0.
M. f. solut.

DS. Bőr alá fecsk.
1—2 fecskendővel egy-
szerre. Fájdalmas.

Influenza: *Rp.* Gelodurat „Pohl“
scat. orig. c. acid. salicyl. 0,25.
S. 3—1-szer naponta 2 dbot.

210 *Rp.* Antipyrini —
 Aquae dest. aa 10,0,
 Cocaini hydrochlor.
 0,05.
 M. f. solut. filtra.
DS. Bőr alá fecskendésre $\frac{1}{2}$ –1 fecskendővel egyszerre.

211 *Rp.* Antipyrini 5,0.
 Aquae dest. 150,0.
 Tinct. Opii simpl.
 gtt. 6.
MDS. Csőrének felét egyszerre langyosan elhasználni.

†H. **Antipyrinum coffeino citricum** (Migraenin.) Tartalmaz 85 r. antipyrint, 10 r. coffeint és 5 r. citromsavat. Fehér, kristályos por. Nyirkosodik. Vízben, szeszben oldható. Főfájások ellen anodynum 0,5–1,5! pro dos, 3,0! pro die porban (caps. amyloc.).

†H. **Antipyrinum salicylicum s. Salipyrin.** ($C_{17}H_{12}N_2O \cdot C_7H_5O_2$) Fehér, jegeces, szagtalan, tintaízű por; vízben nehezen, borszeszben könnyen oldódik. Antipyreticum, antineuralgicum. Haszn. különben mint az antipyrin és a salicylkészítményeké. Adag. bels. 0,5–2,0! gm. pro dos, 4,0–6,0! pro die napj. többször.

Antipyrinum tannicum (Dr. Stankay). ($C_{11}H_{12}N_2O \cdot C_{14}H_{10}O_8$). Íztelen, sárgás, vízben oldhatatlan por; tartalmaz 37% antipyrint és 6% cersavát. Íztelen s ezért gyermekgyógyaszatban jól haszn. Dos. felnőtteknek 1,5–3,0 gr, gyermekeknek napj. többször. 0,5.

212 *Rp.* Antipyrini tannici 10,0.
 Pulv. gummosi 3,0.
 Div. in dos aequal. No. 10.
DS. 3 port naponta.

Antiseptin, s. Asepsin. Parabromacetanilid. ($C_6H_4Br \cdot NH_2 \cdot CH_2CO_2$) Színtelen, vízben nem, borszeszben jól oldható prismák. Antisepticum, antipyreticum, sedativum, antineuralgicum. Küls. hintőporban, különösen fekélyekre. Bels. 0,02–0,05 pro dos. 3 ór. porban (Cattani).

Antiseptin. Változó összetételű folyadék v. por. Zinksulfat, timsó, thymol, jodzink, phenol, jodoform, sublimat, kovasavas natrium v. kalium váltakoznak különböző összetételben az egyes készítményekben. Ne használjuk!

Antispasmin. Narcein-natriumsalicylat. Vízszívó, fehér por, mely 50% narceint (opiunalcaloidea) tartalmaz. Antispasmodicum, sedativum görcsös köhögéskor, főleg gyermek számlálmuruttjánál. Bels. adag gyermek 1 éven alól 0,01–0,015 pro dos. napj. 3–4-szer. 2–3 éves gyermek 0,015–0,02 pro dos. Felnőtteknek 0,2–0,5 hypnoticum, 0,1 sedativum. Oldatban v. cseppekben adandó, nem porban.

Rheumat. musculi: *Rp.* Gelodurat „Pohl“
 scat. orig. c. ac. salicyl. 0,5.
S. 3–4-szer naponta 2 dbot.

213 *Rp.* Antispasmini 0,5.
 Aquae dest.
 Cognac
 Syr. Aurant. aa 30,0.
MDS. 3 × napj. 1 evők.
 Felnőttnék gör-
 csös köhögés
 ellen.

214 *Rp.* Antispasmini 0,5.
 Aquae Amygdal.
 amar. 10,0.
MDS. Gyerm. tussis convuls.
 esetén. 6 hónapos korig
 3–5 csepp. $\frac{1}{2}$ évtől 1
 évig 5–8 csepp. 1–2 évig
 8–12 csepp, 3-tól 5 évig
 15–20 csepp napj. 3-szor.

Antithermin (Phenylhydrazin-laevulinsav-anhydrid). Színtelen, kemény, vízben nem oldh. kristályok. Antipyreticum, analgeticum. Bels. adag: 0,25–0,5 porban.

Antithyreoidin serum (Moebius). Pajzsmirigyüktől megfosztott juhok vérsavója 0,5% acid. carbolicummal konzerválva, 10 köbctm. üvegekben. Baseřow-kór esetén 0,5–3,0 gm pro dosi 3-szor napjában per os, borban.

Anytin s. Anytol. Az ichthyol borszeszes száraz kivonatának vizes oldata (2 : 1). Némely különben vízben oldhatlan anyag oldódását elősegíti (phenolok, kresolok, aether, olajok, kámfor, jód). Eucalyptol-anytolban v. eucasolban 35% eucalyptol van oldva (ecsetelések stomatitis mercurialis ellen), a jodanytolban 10% jód foglaltatik (jodoform helyett).

Anusol. (Jodresorcinsulfosavas bismuth.) Aranyeres csomók esetében snpp. alakjában.

215 *Rp.* Anusoli 7,5.
 Zinci oxyd. 6,0.
 Bals. peruv. 1,5.
 Olei Cacao 19,0.
 Ungu. cerat. 2,5.
 M. f. snpp. No. 12.
DS. Esténként egy db.

Aperitol. A phenolphthalein (purgo) helyettesítője, annak acetyl-valenyl ö-szeköttetése. Íztelen, vízben nem oldh. por. Hashajtó mint a phenolphthalein. Adag is ugyanaz. Különös előnyei nincsenek. L. purgo.

Apiolum album crystallisatum. ($C_{12}H_{14}O_4$) Petroselinum sativum (Umbelliferae) gyümölcséből nyert illó olajnak stearoptenje (camphen). Hosszú, fehér tűkben jéged, gyengén petrezselyem szagú. Vízben nem, borszeszben, aetherben, zsíros és illó olajokban jól oldódik. Antimalaricum; jól hat dysmenorrhoeás tünetek ellen is. Adag bels. malaria ell-n 0,5–1,0 pro dos. caps. gelat.-ban; dysmenorrhoea esetén 0,2–0,3 pro dos. Nagyobb adagok oly mellékhatási tüneteket idéznek elő, mint a chinin nagy adagai.

Apocodeinum hydrochloricum. Sziürkéssárga, vízben jól oldható por; expectorans, sedativum és hypnoticum. Használatik codein helyett, melynél erősebben hat. Adag 0,02–0,04 pro dos. porban, oldatban bels. Subcután 0,02–0,03 hashajtó esetleg hánytató is.

Apolysin. Citromsav és monophenetidin összeköttetése. Sárgás savanyú, vízben nehezen oldható jegeczpor. Haszn. mint a phenacetiné. Adag porban 0,5—1,0 napj. többször.

†H. **Apomorphinum hydrochloricum.** ($C_{17}H_{17}NO_2$, HCl)
 Kristályos, sziürkés por, nedves levegőn, világosságon könnyen zöldül, bomlik; 30 r. vízben, 20 r. borszeszben oldódik. Subcután alkalmazva 0,005—0,01! hánytató; per os 0,001—0,003 pro dos. expectorans. 5—6 éves gyermeknél csak nagy szükség esetén hánytatónak subcután 0,001—0,002. Kisebb gyermeknek nem (!). Dos maxim. pro die felnőttnek bels. 0,05! Fekete iüvegben rendeltessék.

216 *Rp.* Apomorphini hydrochlor. 0,1.
 Aquae dest. 10,0.
 M. filtra det. in vitro nigro.

S. Bőr alá fecsk. Az orvos kezéhez.
 $\frac{1}{2}$ —1 fecskendővel emeticum felnőttnek.

217 *Rp.* Apomorphini hydrochlor. 0,03.
 Argillae albae qu. s. ut. f. pil.

No. 30.
 Consp. pulv. argillae alb.
 DS. 1—2 ór. 1—3 szemet.
 Expectorans.

†H. **Aqua Amygdalarum amar.** l. Amygdala amar.

Aquae aromaticae. Szag- és ízjavító vivőfolyadékok. Hiv. a köv

H. **Aqua Cinnamomi spirituosa.** Főleg keserű mixturákhoz.

H. **Aqua Foeniculi.** Csecsemőknek carminativum.

218 *Rp.* Aquae Foeniculi
 Aquae dest. aa 40,0.
 Natrii bicarb. 0,4.
 Syrup. simpl. 8,0.
 MDS. 2 ór. 1 kk. Csecsemőknek dyspepsia acida esetén.

219 *Rp.* Aquae Foeniculi
 Aquae dest. aa 40,0.
 Tinct. Rhei aquos. 1,0—2,0.
 Syrup. simpl.
 MDS. ór. 1 kk. Csecsemőknek. Dyspepsia.

H. **Aquae Menthae piperitae.** Íz- és szagjavító veliculum.

H. **Aqua Rosarum.** Szagjavító

*

H. **Aqua Chlorata.** Zöldes-sárga, átlátszó, fojtó szagú folyadék; 5‰ chlórt tartalmaz. Fekete iüvegben rendeltessék. Bels. nem. Küls. mint antisepticum fekélyek, hüvely. méh mosogatására, öblítésére, szembe cseppentésre aa vízzel, v. 1 : 2 vízhez. Szemborogatónak 1 evők. egy csésze vízre 2—3 × napj.

Aqua coloniensis sec. Brázay kiváló alkatrészeivel, szerencsés összetételével és igen finom illatával felülmul minden más kölni vizet. (L. hird.)

H. Aqua Calcis. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ -ot 0.13%-t tartalmaz. Lúgos kémhatású, tiszta, szagtalan, színtelen folyadék. Szárító, összehúzó gyengén antisepticus, oldja a nyálkát, a croup- és diphtheritis-lártyát. Küls. száj-, torokvíznek tisztán; belégzésre, húgycsőbe befecskendezésre 3 : 1 vízhez, v. vízzel aa; égési sebekre ol. linivel aa. Bels. adag: kk. v. evőkanalanként tisztán v. tejjel, sziruppal.

220 Rp. Aquae Calcis
Ol. Lini aa 100,0.
M. f. linim.

DS. Külsőleg. Égési sebek, eczema, excoriatio.

222 Rp. Aquae Calcis
Aqua dest. aa 100,0.
MDS. Szájvíz gyermeknek. Stomatitis aphthosa.

221 Rp. Aquae Calcis 150,0.
Aqua dest. 50,0.
Liquor. Natrii canst. gtt. 15.

MDS. Permetezéssel belégzendő. Gyermekeknek pseudocroup esetén.

Aqua Calcis saccharata. Chemiai ellenszer carbolsav (ha gyomron át történt a mérgezés) és oxalsav mérgezésnél. Adag 2—5 perczenként 2—4 kanállal. Nem megfelelő ellenszer.

II. Aqua carbolisata l. Acidum carbolicum.

II. Aqua chloroformiata. 1%-os chlorof. tart. Kávés-, evőkanalanként hyperemesis, tengeri betegség, ólomkólika, epekökólika eseteiben. Cholerajárvány alkalmával mint prophylacticum.

H. Aqua laxativa viennensis l. Senna.

Aqua Laurocerasi. Obsolet, helyette **Aqua Amygdalar. amar. l. Amygdala cz. a.**

H. Aqua plumbica }
H. Aqua Goulardi } l. Plumb. acet. basic.

Aqua phagedaenica. Frissen készül. (1 r. hydrarg. bichlor. + 300 r. aqua calcis.) Zavaros folyadék. Küls. renyhe bujakóros fekélyek kötőzésére. Felrázendő haszn. előtt.

Aqua phagedaenica nigra. Frissen készül. (l.-r. hydrarg. chlorat. mite + 60 r. aqua calcis.) Küls. syphilitis fekélyek kötőzésére.

Araroba s. Pulvis Goa s. Po de Bahia. Finom, barnasárga, néha sötétbarna por, gyakran tisztátalanítva van farostokkal. Hatóanyaga chrysarobin. Erősebb bőrizgató. Redukáló anyag. Haszn. a bőrgyógyászatban. Adag kenőcsben 1,5—3.0:30,0. Belőle készül a

Chrysarobinum. Nem tiszta anyag, legtöbb benne $\text{C}_{30}\text{H}_{27}\text{O}_8$ vegyület. Sárga, könnyű, jegeczes por, vízben rosszul, forró borszeszben, chloroformban, benzolban, kalilíngban jól oldódik. Bels. nem haszn. (mérgező!) Küls. bőrizgató, lobokozó, redu-

Bardella, Bardelaben dr. bismutos égési pólyája igen jól bevált lefo rázásoknál, mindenfokú égési sebeknél, a fájdalmat rögtön csillapítja és a gyógyulást gyorsan megindítja, a nélkül, hogy a különbeni gyakori kötésváltozásra szükség lenne. (L. hird.)

káló. Bőrgyógyászatban psoriasis, herpes tonsurans, eczema marginatum, pityriasis versicolor eseteiben. Adag kenőcsben, linimentumban, collodiumban 0,5–1,0 : 10,0. Nagy bőrfelületek ne kenessenek be egyszerre. Barna foltot okoz a bőrön.

223 Rp. Chrysarobini 1,0.
Vasellini 20,0.

M. f. ungu.

DS. Kenőcs. Arcz, fejbőr, kezek bekenése kerülendő

224 Rp. Chrysarobini 0,5.
Collodii flexil. 10,0.

MD.S. Chrysarobin-collodium. Külsőleg.

225 Rp. Chrysarobini

Ichthyoli

aa 5,0.

Acid. salicyl.

3,0.

Vasellini

100,0.

M. f. ungu.

DS. Kenőcs. Favus, trichophytia.

Arbutin l. Uvae Ursi fol.

†H. **Arecolinum hydrobromicum.** A betel-dió vagy areca catechu gyümölcsének alcaloidája. Fehér jegeczek. Anthelminticus hatását a szívre való muscarinszerű hatása miatt ki nem használhatjuk. Myoticum, mint az eserin és pilocarpin. 1%-os oldatok haszn. glaucománál szembe cseppentésre.

Arenariae rubrae extract. aquos. spissum et fluidum. (Caryophyllaceae.) Cystitis, húgykő esetén 2,0 gm. pro dosi vizes oldatban, 3–1-szer napjában.

Argentaminum. Ezüstphosphat + aethylendiaminból készül. Színtelen, lúgos folyadék. Erős desiniciens, összehúzó. Fehérjét és konyhasót tartalmazó folyadékokban csapadékot nem okoz. Főleg mint antgonorrhoeicum befecsk. alakjában (fájdalmas) Adag 1 : 100–1000. Szemészetben 3–5%-os old. arg. nitr. helyett. Nőgyógyászatban 10%-os old. hüvelyi kidörzsölésére.

Argentum citricum. l. Itrol.

Argentum colloidal. Collargolum. Oldható fémezüst, 25 r. vízben oldódik, a fehérjét nem csapja ki. Ungu. Credé belőle 15%-ot tartalmaz. Bels. mint pilul. argenti Credé majores (0.10). Általános fertőzésekben, sebzési, gyermekági lázban, meningitisben a Credé-féle kenőcsből 1,0–3,0 napj. 1–3-szor alaposan bedörzsölendő, mint az ungu. ciner. A pilulákból 1–3 naponta.

226 Rp. Argenti colloidalis 2,0.

Argillae albae qu. s.

ut f. pil. No. 20.

DS. 1–3 pil. naponta.

227 Rp. Argenti colloidalis 15,0.

Aquae dest. 5,0.

Lanolini anhydr. 80,0.

Tinct. benzoës 10,0

f. ungu.

DS. Külsőleg.

Electrargol (elektromos Arg. colloidal) subcutan, intramuscularis és intravenosus injectiókhoz, javalatok: septicaemia, scarlatina, typhus, erysipelas, endocarditis, puerperalis láz stb. **Thiarsol-Clin** (colloidalis kénarzen) steril ampullákban és csöppekben, javal.: arsenintoxicatiók, rák, trypanosomiasis.

Argentum lacticum l. Actol.

†H. **Argentum nitricum crystallisatum.** ($AgNO_3$). Lemezes, színtelen, szagtalan, maró, fémcs ízű jegecszek. Substantiában, töményebb oldatokban causticum, hígabb oldatokban erős adstringens, bacteriumellenes. Torok, gége, orrnyákhártya ecsetelésre 1,0—5,0 : 100,0; kötőhártya ecsetelésre 0,2 : 10,0. Credé újszülötteknél 1—2%-os oldatot használt mint prophylacticumot blennorrhoea neonatorum ellen. Csőrének 0,5—1,0 : 100,0; húgycsőbe fecskendésre 0,05 : 100,0—150,0; Janet-féle öblítésre 0,2—0,5 : 1000,0; hólyagmosásra 0,4—2,0 : 400,0 langyosan. Oldatok tékete üvegben rendeltessenek. Bels. adag : 0,005—0,03! pro dos. 2—3 × napj. porban, pilulában argilla alba-val. Dos. maxim. pro die bels. 0,1!

†H. **Argentum nitricum fusum.** Fehér v. szürkés rudacskák. Causticum.

Argentum nitricum cum kalio nitrico. Rudacskák. Enyhébb causticum, mint az argentum nitr. fusum.

228 Rp. Argent. nitr. cryst. 0,30.

Argillae alb.
Aqua dest. qn. s. ut f.
pilul. No. 30.
obduc. fol. Argenti.

DS. Naponta 2—3-szor 1 szemet. Tabes dorsalis. Ulcus ventriculi.

230 Rp. Argent. nitr. cryst. 0,05.

Argillae alb. 5,0.
M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10.

DS. Naponta 2—4 port. Tabes. Ulcus ventr.

232 Rp. Argent. nitr. cryst. 0,4—2,0.

Aqua dest. 400,0.

MD. in vitro nigro.

S. Hólyagmosásra.

Egyszerre 100

gm. fogyasztandó

el. Cystitis chronica.

229 Rp. Argent. nitr. cryst. 0,2.

Aqua dest. 10,0.

MD. in vitro nigro.

S. 2%-os pokolkő oldat kötőhártya ecsetelésre és idült férfi és női húgycsőkankónál Gnyon és Ultzmann-féle instillatióra.

231 Rp. Argent. nitr. cryst. 0,15—0,5.

Aqua dest. 120,0—150,0.

MD. in vitro nigro.

S. Csőrének; egyszerre felét elfogyasztani. Dysenteria.

233 Rp. Argent. nitr. cryst. 0,05—0,2.

Talci venet. sub tiliss. pulv. 50,0.

M. f. pulv. det. in vitro.

S. Torokba, fülbe befúvásra.

Noffke oldódó bougiejai a gonorrhoea (urethritis anter. et post., prostat. chr.) kezelésére c. Arg. nitr. 0,25—5%. (L. hird.)
Vichy Célestine-forrás kit. hat. hólyagbajoknál. (L. hird.)

234 *Rp.* Argent. nitr. cryst.
1,0—5,0.
Aqua dest. 100,0.
MD. in vitro nigro.
S. Gége, torok, orrnyák-
hártya ecsetelé-
sére.

235 *Rp.* Argenti nitr.
0,25—0,4.
Aqua dest. 120,0.
MDS. 3-szor napj. üres gyomor-
ra 1 evők. 1
pohár dest. vízben
(Ulcus ventr.).

†II. **Argentum proteinicum s. Protargolum.** 8,3% ezüstöt tart. Fehérjés, szerves ezüstösszeköttetés. Sárga, vízben oldható por. Gonorrhoea ellen $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{10}$ -os oldatok húgycsőbe fecsk. napj 3—4-szer. Hintőpornak is.

236 *Rp.* Argenti protein. 10,0.
Aqua dest. 90,0.
MDS. $\frac{1}{10}$ -os protargol old.
Az orvos kezéhez.
Szemészetben arg.
nitr. helyett a kö-
tőhártya ecsete-
lésére.

237 *Rp.* Argenti protein. 0,2.
Aqua dest. 10,0.
MDS. Szemcseppek. 1—3X
napj. 1—2 cseppet.

238 *Rp.* Argenti protein 20,0.
Glycerini 20,0.
Sol. Gelatinae (7%)
80,0.

M. f. l. a. ungu.

DS. Arg. protein-pép. Kiüls.

239 *Rp.* Argenti proteinici 2,0.
tere cum Glycer. 2,0.
adde Aque frig. 6,0.
DS. Coicus után húgycsőbe
csepegtetni.

240 *Rp.* Argenti proteinici 1,0.
Vasellini 10,0.
M. f. ungu.

DS. Szemkenőcs.

H. **Argilla alba s. Bolus alba.** Fehér agyag. Aluminium-silicat. Idomtalan, fehér, földes, könnyű, törékeny, zsíros tapintatú, agyagszagú, vízben széteső darabok. Pilula- v. por-constituens argent. nitr., auro-natr. chlorat, hyd. arg. bichlor. corr. scopolamin, cocainsók, és aconitinum rendelésekor.

Argoninum. Ezüst és natriumcasein összeköttetése. 4-28% arg. tartalmú. Finom, fehér, vízben oldh. por. Híg oldatban nem maró, bacteriumellenes. Fejérvéssel, *NaCl*-al nem ad csapadékot. $\frac{1}{2}$ %-os oldatok haszn., melyek opalizálnak. Oldás melegben. Színes üveghen rendeltessék. Gonorrhoeánál húgycsőbe fecsk.

241 *Rp.* Argonini 1,5—2,0.
Aqua dest. 100,0.

MD. in vitro nigro.
S. Húgycsőbe fecsk.
napj. 3—5-ször.
Gonorrhoea.

242 *Rp.* Argonini 10,0.
Glycerini 10,0.
Solutio Gelatinae (7%)
80,0.

M. f. l. a. ungu.

DS. Argonin-pép. Kiüls.

Argyrol. Ezüstvegyület 30% ezüst t rtalommal. Antigonorhoeicum. Hasz. mint az Arg. protein. Argentamin stb.

Noffke oldódó bougie-jai a gonorrhoea (urethris anter. et post., prostatitis et r.) kezelésére c. Argonin 2—10%. (L. hird.)
Syrgol a gonorrhoea specifikuma, kipróbált és bevált ezüst-készítmény, gyors és nem izgató hatásával felülmulja a többi hasonló készítményt. (L. hird.)

Arheol. ($C_{15}H_{25}O$.) Az oleum santali-ból előállított vegyület. Antigonorrhoeicum, mint a santalol, a melylyel talán azonos. Adag belsőleg capsulában 0.2 pro dosi.

Arhovin. Állítólag diphenylamin és thymylbenzoesav additíós terméke. (Lehet, hogy csak keveréke thymolnak, benzoesavaethyles-ternek és diphenylaminnak). Aromás-szagú, hűtő-csípős ízű folyadék, vízben oldhatatlan. Antigonorrhoeicum. Adag 0,25 belsőleg (de csak caps. gelatinosában) többször napjában.

Aristochin. Dichininszénsavas ester. Vízben oldhatatlan, íztelen por. Alkoholban oldódik. Chinin pótszere, főleg malária ellen. Gyomorban HCl -al jól oldh. sőt alkot. Állítólag kevesebb mellékhatási tünetek, mint chinin után (?). Adagja 0.5—1.0 gm. porban mint antina'rieum, három órával a várt roham előtt.

Aristolum. Dithymoldijodid. Jodoform és jodol pótszere. Szagtalan, pirosas barna; vízben, glicerinben nem, borszeszben kevésbé, aetherben, zsíros olajokban jól oldh. por. Haszn. mint a jodoform. Bels. nem. Küls. kenőcshez és collodiumhoz 8—10%, hintőpornak és befúvásra töményen vagy 5—10%.

243 *Rp.* Aristoli 5,0.
Ol. Sesami 20,0.
Lanolini 75,0.
M. f. ungu.
DS. Kenőcs égési sebekre.

244 *Rp.* Aristoli 3,0°
Sacch. lactis 30,0.
M. f. pulv.
DS. Külsőleg. Hintőpor.

Arnicae montanae flores (Compositae). Hatóanyagok: illatos olaj, arnicin (keserű anyag) és gyanta. Excitans, diaphoreticum. Bels. adag infusumban 5.0—10.0 : 150,0 ór. 1 evők.

Arnicae montanae folia. Hatóanyagok csekélyebb mennyiségben, mint a virágokban. Használat, adag, l a virágok.

Arnicae montanae rhizoma. Illatos olaj több, arnicin kevesebb, mint a virágokban; haszn. mint ott. Bels. adag infus. 7.0—15.0 : 150,0 ór. v. 2 ór. 1 evők.

Tinctura Arnicae. Küls. nem ajánlatos, mert heves dermatitist okoz. Bels. excitans. Adag bels. 10—40 csepp napj. többször.

245 *Rp.* Infus. flor. Arnicae e 7,0.
l. a. p. ad colat. 150,0.
Liquor. Animon.
anisati 2,0.
Syrup. cort. Aurant. 10,0.

MDS. ór. v. 2 ór. 1 evők.
Öregek bronchitise,
oedema pulm. esetén expectorans,
excitans.

246 *Rp.* Infus. rhiz. Arnicae e 10,0.
l. a. p. ad colat 150,0.
f. enm.
Camphor. trit. 1,0.
Gummi arab. 5,0.
l. a. emulsio.
adde
Syrup. simpl. 15,0

MDS. 2 ór. 1 evők. Excitans typhus abdom.-nál, pneum. crouposánál támadó collapsus esetén.

Alimentum Theinhardt lacti materno est simillimum,

247 *Rp.* Tinct. Arnicae.

Tinct. Valerianae aa 15,0.

Olei Menthae pip. gtt. 5.

MDS. 15—30 cseppet 2 ór. ó-borban v. cognacban.

Erős excitans.

Arrhenal. Methylarsensavas natrium. *Arsynal.* *Methylarsinat.*
Vízben jól oldh. kristályos por. Oldata lúgos. Haszn. mint az acid. arsenicosumé. Adag: 0.005 pro dos. 4—5-ször napj. vizes oldatban.

Arsacetin. Az atoxyl (l. ott) acetyles vegyületének natriumsója. Fehér por, hideg víz 10 részében oldh. 3 r. forróban. Kevésbbé mérges mint az atoxyl. Haszn. ugyanolyan.

Arsan. 1% arsen tart. glidinvegyület Barnás por. Adag 0.001—0.002 gm. napj. 2—3-szor, mindenütt a hol As. van javalva. Állítólag nem bántja a gyomrot (?)

Arsenferratin. Vasalbuminsav (ferratin) arsenes vegyülete. Barna, vízben oldh. por, melyben 7% Fe és 0.06% arsenessav van. Chlorosis, anaemiák, chorea min., eseteiben adag felnőtteknek 0.25 gm. napj. 3—4-szer, nagyobb gyermeknek fele.

Arsenferratose. Az arsenferratin (l. ott) syrupos oldata. Tart. 0.3% Fe-ot és 0.003% As-t. Adag 2—4-szer napj. 1 kk.

Arsenogen. Phosphort, arsen és vasat tart. fehérjés vegyület, melyben 15% Fe, 12% As, 2% P. van. Sárga por. Önállóan nem haszn., hanem triferrinnel keverve (l. ott) mint *Arsentriferrin* (0.3 gmos tabletták 3-szor napj. 1 db.) és *arsentriferrol* (elixir, 3-szor napj. 1 evők.).

Arsenophenylglycin. Sárga, vízben jól oldh. por. Ehrlich és Jaffé jól használhatták állatok tripanosomiasisa ellen. Embernél bizonytalanak mondják hatását. Szemészetben pannus és keratitis ellen 5% os kenőcsben.

Arsentriferrin } l. *Arsenogen.*
Arsentriferrol }

Arsycodile l. Kakodyl-készítmények.

Arsylin. Arsen- és phosphortartalmú fehérjevegyület (0.1% As, 2.6% P.). Sárgás-fehér, vízben oldhatlan, kissé savanyú ízű por. Roboransnak haszn. Belsőleg 1,0 napj. 3-szor porban (caps aml.).

Arsynal. l. Arrhenal.

Arterenolum hydrochloricum. Az adrenalinul rokon kózmás katechin vegyület. Haszn. mint az adrenalin. Forgalomban 1%₀₀ oldatban.

Metharsinate-Clin (syn. Arrhenal), új kakodyls. natr.

Metharsinate de fer-Clin új kakodylsavas vas.

Nucléarsitol Robin (nucleophosphat + methylarsinat) tabl. és inj. alakjában jav.: tuberk., malaria, syphilis stb. ellen. (L. hird.)

Asa foetida. Beszáradt tejnedv. Barnás, foghagymaszagú, keserű, csípős ízű gyantás anyag. Hatóanyaga egy kén tartalmú illó olaj és gyanta. Antispasmodicum, néha mint analepticum és expectorans. Bels. klystirben (emulsió) 4,0—8,0 pro dos. Per os pilulában 0,2—0,5 pro dos. napj. többször.

248 Rp. Asae foetidae 6,0.
Rad. Valerian. pulv.
Mucilag. Gummi
arab. aa qu. s.
ut. f. pilul. No. 60.
Obduc. fol. Argenti.
S. 3-szor napj. 3—5
szemet.

250 Rp. Asae foetidae 5,0.
Camphorae tritae 1,0.
Opii pur. pulv. 0,5.
Extr. Taraxaci qu. s.
ut. f. pilul. No. 50.
Consperg. pulv. Irid.
flor.

DS. 3-szor napj. 2—3 szemet.
Antispasmodicum.

Asaprol. (β naphthol α -monosulfonsavas calcinm.) Fehér, kö-
zömbös kémhatású, szagtalan por, keserű, majd édeses, vízben,
alkoholban jól oldh. Küls. antisepticum; torokvíznek 5% oldat-
ban. Bels. antipyreticum, antirheumaticum, bédésinficiens,
0,5—1,0 pro dos. 4,0—6,0 pro die porban.

Asepsin l. Antisepsin.

Aseptolum s. Acidum sozolicum [$C_6H_4.OH.HSO_3$]. A ke-
reskedésbeli 33 $\frac{1}{2}$ % savat tartalmazó pirosas-barna folyadék s
keveréke az ortho- és parasozolsavnak. Vízben, borszeszben,
glycerinben oldható, zsíros olajokban nem. Antisepticum. Ajánl-
tatott sebkezelési célokra 3—10%-os oldata. Gyomor-, bél-
huzam fertőztelenítésére 4,0—5,0 pro die potio alakjában. Nem
mérgező, nem maró. Rövid időn a hatásos orthosav a hatás-
talan parasavba megy át.

252 Rp. Acid. sozolicum 25,0.
Aquae dest. 475,0.
M. det. in vitro nigro.
S. 5%-os sozolsavoldat
sebkezelési cé-
lokra.

249 Rp. Asae foetidae 8,0.
Vitellum ovi unius
f. l. a. emulsió. cum
Aqua dest. 200,0.
DS. Csőrének; egyszerre
felét elfogyasz-
tani.

251 Rp. Infus. flor. Chamom.
e 8,0.
l. a. p. ad colat 100,0.
Asae foetidae 1,0.
Vitellum ovi unius
f. l. a. emulsió.
DS. Csőrének. Gyermek-
eknek. Spasmus.
glottidis.

253 Rp. Acid sozolicum 5,0.
Aquae dest. 500,0.
Succi Citri
Sacchar. alb. aa qu. s.
M. f. limonada.
DS. Egy napi italul. Gyo-
mor-bélhuzam fer-
tőztelenítésére (?).

Aspidii spinulosi extractum. Az extr. filicis maris pótszere
taeniák ellen. Adag 4,0 egy kúrara caps. gelatinosában ép úgy,
mint az extr. filicis. Utána laxans (de nem ol. ricipi).

Aspidosperminum l. Quebracho cortex.

Aspirin l. Acidum acetylo-salicylicum.

Asterol. (Parasulfosavas kéneső-ammonium tartarat). Vörhenyes-fehér por, forró vízben jól oldható. 15% kéneső-oxydot tart. Desinficiens 2–5‰ oldatban; 2‰ asterololdat = $\frac{1}{2}\%$ sublimat oldattal. Sem a fehérjét nem csapja ki, sem a fémtárgyakat nem rontja.

Astrolin. Antipyrin pótszer. Főleg hemicrania ellen. Nem más mint az antipyrinnek methyläethylglycolsavas összeköttetése. Előbbiből 61% van benne. Adag: 0.5–1.0 porban.

Asurol. Higanykészítmény, mely 40% Hg-ot tart. Amidooxyvajsav és a higany natr. salicylicumos összeköttetéséből állítják elő. Antisyphiliticum. Bőr alá fecskendésre czélszerű, mert a fehérjét nem csapja ki. Vízben jól oldh. fehér jegeczpor. 5‰-os oldatának 1 ccm-ében van 0.02 Hg.

254 Rp. Asurol 1,0.
Novocaini 0,1.
Aqua dest. 20,0.
M. f. sol. det. in vitro
nigro.

S 5‰-os asurol oldat. Bőr
alá fecskendésre.

Minden 3 napban egy
Pravaz-fecskendővel.

Atophan. Chinolinderivatum. Fokozza az uratok kiürülését. Adag 0.5–1.0 napj. 3–4-szer porban natr. bicarb. al együtt.

Atoxyl. (Metaarsensavas anilid). Kevésbé mérgező az acid. arsenicosumnál. Per os nem. Intramuscularis befecskendések alakjában 20%-os oldatból $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ Pravaz-al 2–3 naponként bőrgyógyászatban, továbbá syphilis és álomkór ellen. Mellékhatási tünetek mint arsenessavra nem ritkák; fordult elő néhány atrophia nervi optici eset is, mint intoxicatiós tünet. Nagy vigyázat!

Atropinum methylobromatum l. Belladonna.

††H. **Atropinum sulfuricum, l. Belladonna.**

H. **Aurantii pericarpium.** Narancshéj. Tart. hesperidint (keserű anyag) és ol. aurant. cort. ot. Keserű aromás anyag.

H. **Syrupus Aurantii.** Aromás, kellemes ízű ízjavító.

H **Tinctura Aurantii.** Keserű aromás anyag. Stomachicum. 20–30 csepp — 1 kk. napj. többször.

H **Tinctura Aurantii pro syrupo.** A syrupekészítéshez haszn. Önállóan nem.

Auro-Natrium chloratum ($AuNaCl_4 + H_2O$). Sárga, jegeczes por. vízszívó, vízben könnyen oldható. Bels. hysteria, chorea, tabes dorsalis ellen ajánlották. Adag pilulában argilla alba-val 0.003–0.006 pro dos. 2–3-szor napj.

Syphilis: Rp. Gelodurat „Pohl“

scat. orig. c. Kal. jod. 0.5.

S. 3-szor naponta 1–2 dbot.

Bengen-féle steril oldatok

a legpontosabb adagolásban és elismert kiváló hatással és tisztaságban, állandóan eltarthatók.

Bengen-féle Ozoniment-készítmények

egyenlő értékűek a vasogennel, azonban jelentékenyen olcsóbbak! Kitűnnek *nagyfoku mélybe való hatásuk* által, Prof. Dr. Arnold és más szaktekintélyek véleménye szerint. *Jod-, Jodoform-, Carboxol-, Kreosot-Ozoniment* stb., stb.

Bengen-féle 90%-os Vaginál-golyócskák

elismerten legjobb és legolcsóbb szer a *szarvasmarhák fertőző hüvelyhurutjának és járványos elvetélésének* kezelésére. Szaktekintélyek ajánlják. Lásd Prof. Dr. Dammann titk. kormánytanácsos cikkét az „Amtl. Kreisblatt Klostal” cz. lapban. Ezenfelül az összes többi orvosszerek a hüvelyhurut kezelésére, mint *vaginál-golyócskák cum pyoktanin coerule., antisterilitáskapszulák, Chinisol-vaginál-golyócskák, vaginál-kapszulák* poralakban, *vaginál-kenőcs, vaginál-rudacskák, sapoformál, carboxol* stb.

Bengen-féle Salunguene

kipróbált resorbens és antirheumaticum, bevált vállbénaság, in- és inhüvelyloboknál, phlegmonék eseteiben stb.

Bengen-féle Salicyltannarabin

elismerten kiváló antidiarrhoicum és bélfertőtlenítő, *nagyfoku gyomorresistentia, összehúzó és fertőtlenítő hatás a bél legalsóbb részéig.*

Bengen-féle Salicyltannarabin cum Argent

kitűnően bevált borjúk, csikók és nagyobb állatok heves hasmenése ellen.

Bengen-féle Carboxol I., Sapoformál, Neurogen

fertőtlenítő szerek.

Bengen & Co. G. m. b. H.

vegyész-gyógyszerészeti termékek gyára. Gyógyszerészeti droguák nagykereskedése. Különlegesség: Állatorvosi gyógyszerárak és dispensáló intézetek borendezése.

Hannover, Ludwigstrasse 20. és 20/a.

Alapítottatott 1859. Sürgőnyczim: Begenco. Telefon 1977.

Ausztriában beszerezhetők: Adler-Apotheke, k. u. k. Hoflieferant, Komotau (Böhmen).

Magyarországon beszerezhetők: Magyar Állatorvosok Gazdasági Szövetkezete útján Budapest, VI., Bulyovszky-utca 40.

Pivako

hatásos belső anti-
gonorrhoeum és
anticystiticum. *sa*

Dr. med. H., Wien, a következőket mondja:
Ezen készítménynyel megejtett kísérletek mind
sikerültek. „Pivako“ eltartható, nem kellemetlen,
aromatikus ízű emulsio a Bals. Copaivae és Extr.
Cubebae szerekből. Az észlelt esetekben **soha-**
sem volt tapasztalható a copaiva-balzsam
kellemetlen hatása.

„Pivako“ fokozza a vizelet aciditását és bacteri-
cid és összehúzó hatásúvá teszi azt.
Emulsio alakja következtében igen gyorsan sziva-
tlik föl, anélkül, hogy izgalmi tüneteket
és emésztési zavarokat hozna létre.
Érzéstelenítően hat, megszünteti a vizelésnél az
égési érzést és megakadályozza fájdalmas
erectiók létrejöttét.

A kóros elválasztást csökkenti.

A nyálkahártyákat a gonokokkusok fejlődésére
alkalmatlanokká teszi.

Hugyhajtó hatása.

Elejét veszi a lobosodós tovaterjedésének és compli-
catiók keletkezésének.

Vizzel hígítva injectióra, klysmának és öblögetésre
is használható, vagy tömören tampon-
ok stb. megnedvesítésére.

Olcsobb, mint a legtöbb ilyenfajta készítmény,
mert egy eredeti üveg ára 3 márka 50 és
körülbelül 10—12 napra elég.

Irodalom és mintatípusok díjtalanul!

HOHNHORST & SCHLINZIGK

chem. Laboratorium, Tangermünde E. Telefon 18.

Vezérképviselő Ausztria—Magyarország részére:

Apotheke zur Heiligen Corona, O. Sverak.

Wien XIII. Sechshauserstrasse 104.

255 *Rp.* Auro-natrii chlorati
0,03.

Argyllae alb. qu. s.
ut f. cum gutt. nonnull.

Aquae dest.

Pilulae No. 30.

Consp. pulv. Argyllae.

DS. Napj. 3-szor 1 szemet.

Autan. Formaldehydet fejlesztő fehér por. Keveréke 29 rész paraformnak és 71 rész baryumsuperoxydnak. Vízrel kell leönteni formald. fejlesztése czéljából. Desinficiens szobák stb. számára.

Autoform. Hasonló jelentőségű mint az autan (l. ott). A formaldehydgáz fejlesztése festoformból és kali hypermangból. történik víz segélyével. A festoform szappan + formaldehyd.

Automors. Desinficiens. Kresolok keveréke kénsavval. Nem sokat ér. 1%-os oldatban használják.

Bacillol. Sötétbarna, kissé kreozotszagú, lúgos folyadék. Kát-rányolajok oldata szappanban. Olcsó és hatásos desinficiens. Haszn. 1% os oldatban.

Bactoform. Folyékony v. gelatinosus, sárgás, szűrő szagú formaldehyd készítmény, melyben a form. neutralis natronszappannal és szénhydrogénekkel vegyítve fordul elő. Desinficiens 1—2%-os oldatban. Haszn. eszközök s a kéz tisztítására mint a lysoform.

Balsamum canadense. Méz-sűrű, terpentinszagú, sárga, ragadós balzsam. Terebintliina comm. helyett haszn. mint hurutellenes szer. 0,5—1,5 pro dos. pilulában.

H. Balsamum Copaivae. Illó olajos és gyantás, sárgás-barna, átlátszó, faolaj sűrűségű, balzsamos illatú, kesernyészapós ízű, borszeszben, aetherben oldható növénynedv. Bels. adag emulsióban, caps. gelat opercul.-ban, pilulában gonorrhoea, idült cystitis, pyelitis, bronchoblennorrhoea ellen 0,5—2,0 pro dos 3—4-szer, vagy 20—40 csepp 2—4-szer napj.

256 *Rp.* Bals. Copaiv. gtt. 10.
Det. in caps. gelat.
opercul.
Dent. tal. dos. No. 30.
S. 3 × napj. 2—4 kapsulát.

257 *Rp.* Bals. Copaiv. 15,0.
Det in lagen.
S. 3 × napj. étkezés után
15 cseppet ostyában.

Pivako, hatásos intern antigonorrh., a Bals. copaivae és az Extr. Cubebaurumból készült aromat. emulsió, emeli a vizelet aciditását és baktericid, adstring. hatásúvá teszi, a diuresist fokozza, a lobosodás tovaterjedését meggátolja, olcsóbb mint a legtöbb hasonló készítmény (lásd szemben levő hirdetést).

258 *Rp.* Bals. Copaiv. 20,0.
 Gummi arab. qu. s.
 Aquae Menthae pip. 160,0.
 f. l. a. emuls., adde
 Syrup. cort. Aurant. 20,0.

MDS. 2 ór. 1 evők.

259 *Rp.* Cerae flav. 2,0.
 leni calore liquefac.
 adde
 Bals. Copaiv. 8,0.
 refrigerat. admisce
 Cubebae. pulv. 8,0.
 M. f. l. a. pilul. No. 100.
 Consp. pulv. Cinnamomi

DS. 3 × napj. 5–10 szemet.

II. Balsamum peruvianum. Sötétbarna, kissé áttetsző, sűrű, levegőn nem száradó, savanyú kémhatású, kellemes illatú. nem ragadós, keserű, csipős ízű növénynedv. Keveréke fahéjsavas benzylaethernek, fahéjsavnak, benzoesavnak, gyantának. Küls. antisepticum, antiparasiticum (scabies, phthiriasis). Bels. mint a bals. copaivae porban (czukorral), pilulában, emulsióban, capsul. gelat. opercul. ban; adag 3–16 csepp pro dos. napj. többször.

260 *Rp.* Bals. peruviani gtt. 4.
 Det. in caps. gelat.
 opercul.

Dent. tal. dos. No 20.

S. 3–4 × napj. egy capsulát.

262 *Rp.* Bals. peruviani
 Olei Ricini aa 15,0.

MDS. Külsőleg. Scabies.

264 *Rp.* Bals. peruviani 2,0.
 Pulv. Gummi arab. qu. s.

Aquae dest. 130,0.

f. l. emuls., adde

Syrup. simpl. 20,0.

DS. 2 ór. 1 evők.

261 *Rp.* Bals. peruviani 2,0.
 Ungu. simpl. 50,0.
 M. f. ungu.

DS. Hajkenőcs.

263 *Rp.* Bals. peruv. 15,0.
 Epicarini 10,0.
 Ungu., simpl. 100,0.

M. f. ungu.

DS. Kenőcs. Scabies.

265 *Rp.* Bals. peruviani 5,0.
 Spirit. dil. 200,0.

MDS. Külsőleg. Hajhullás ellen 2 × napj. a fő hajas része be-dörzsölendő.

266 *Rp.* Bals. peruviani
 Boracis ven. aa 5,0.
 Vitellum ovi unius
 Ol. Amygdal dulc. 30,0.

M. f. linim.

DS. Sebes mellbimbók ecsetelésére.

267 *Rp.* Bals. peruviani
 Mitini aa 25,0.
 M. f. ungu.

DS. Kenőcs, fagydagatok, scabies ellen.

H. Balsamum Styrax, l. Styrax liquid.

H. Balsamum toltutanum. Pilulák bevonására haszn. Mint gyógyszer nem szerepel.

Balsamum vitae Hoffmanni s. Mixtura oleoso-balsamica. Spiritus aromaticus-ban oldata több illó olajnak s bals. peruvianumnak. Küls. mint bőrvörösítő.

Barutin. Baryumtheobromin-natriumsalicylicum. Fehér, vízben oldh. por. Diureticum; vérnyomást is emeli. Adag: 2,0—2,5 : 200,0 3-szor napj. 1 evők.

Basicin. Coffeintartalmú chininsó. Fehér, vízben oldh. por. A chininnél erősebben hat. Antipyreticum, de mint anodynum is szerepel. Adag felnőttek: 0,3—0,5 pro dos. 2,0 pro die. Kerülendő savak és alkaliák egyidejű adagolása.

268 Rp. Basicini
Citropheni aa 5,0
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No 10.
DS. Neuralgiáknál 1—2
port napj.

269 Rp. Basicini 5,0.
Chloroformii 37,5.
Alkohol absol. 12,5.
Ol. Serami 45,0.
M. f. linim.
DS. Külsőleg, bedörzsölésre rheumás fájdalmak ellen.

270 Rp. Basicini 0,3.
Aquae dest. 30,0.
adde.
Adrenalini hydrochlor (1‰).
Cocaini hydrochlor.
aa 0,15.
MDS. 4—6 cseppet szembe cseppenteni s hígítva az ornyáلكahártya ecsetelésére szénaláz esetén.

†**H. Belladonnae folia.** (Atropa Belladonna. Solanaceae.) Főhatóanyagai az atropin és a hyosciamin. Készítményei használatnak. Ezek:

†**H. Extractum Belladonnae.** A levelekből készült borszeszes kivonat dextrinnel beszárítva. Az alkaloidokból kb. 1%-ot tartalmaz. Küls. kenőcsben 1 : 10—20 fájdalomcsillapító. Bels. colica saturnina, cardialgia, izgatott köhögés, pertussis, epilepsia, hyperhydrosis, salivatio. enuresis nocturna, diabetes eseteiben porban, pilulában adag 0,01—0,03! pro dos. 3—4 × napj. Dos. maxim. pro die 0,1! Suppositoriumban 0,01—0,02 napj. 1—2-szer.

†**H. Tinctura Belladonnae.** A levelekből készül. Haszn. mint az extractum. Küls. kenőcshöz 1 : 10. Bels. adag 2—10 csepp pro dos. 2—4 × napj Dos. maxim. sing. 1,0! Dos maxim. pro die 3,0.

††**H. Atropinum sulfuricum.** [(C₁₇H₂₃NO₃)H₂SO₄]. Fehér, jegecsez por. Egyenlő r. vízben, 3 r. borszeszben oldható. Mydriaticum 0,01—0,1 : 10,0—20,0 a kötőhártya redőbe cseppentve. Bels. haszn. mint az extr. bellad. Adag 0,0005—0,001! pro dos. 2—3 × napj. (nagy vigyázat!) pilulában vagy subcután. Dos. maxim. sing. 0,001! Dos. maxim. pro die 0,003!

Atropinum boracicum. Úgy haszn. mint az atr. sulf. Szemészek azt tartják, hogy az atropin-conjunctivis ritkább használata közben.

Atropinum methylobromatum. Vízben jól oldható kristályok; hatása mint az atropiné. Adagja belsőleg izzadás ellen 0.0005 pilulában. Szemészetben 1%-os oldat becseppentésre; ebből 2—4 csepp mydriaticum; hatás 4 óra múlva megszűnik. Előnye alig van. Hemicrania esetén bels. acid. acet. salicyl.-al v. antipyrinnel együtt.

Homatropinum hydrobromicum } Oxytoluyltropein sói. Szemészetben
Homatropinum sulfuricum } mydriaticum. Oldat, mint az atropinnál. Kevésbé mérges, mint az atropin.

271 *Rp.* Extr. Belladonnae 1,0.
 Ungu. emollient. 20,0.
 M. f. ungu.

DS. Belladonna-kenőcs.

273 *Rp.* Extr. Bellad. 1,0.
 Ungu. Hydrargyri 20,0.
 M. f. ungu.

DS. Homlokbedörzsölésre.

274 *Rp.* Extr. Belladonnae.
 Extr. Nucis vomic. 0,05.
 Sacchar. alb. 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos. aqu. No. 10.

DS. Este lefekvés előtt 1. port. 3—10 éves gyermeknek.
 Enuresis nocturna.

276 *Rp.* Atropini sulf. 0,01.
 Pulv. rad. Liquirit.
 Extr. Liquirit. \overline{aa} qu. s.
 ut f. pilul. No. 30.
 Consp. pulv. Liquirit.

DS. Este 1, legfeljebb 2 szemet.

Phthisicusok izzadása esetén. U. e. pilulák (3 \times napj. 1 szemet) diabetes, epilepsia, salivatio ellen is.

272 *Rp.* Extr. Belladonnae 0,1.
 Butyri Cacao qu. s.
 ut. f. l. a. supposit. No. 5.

DS. Belladonna-kúpok.
 Tenesmus, prostatitis, gonorrhoea, hólyag-görcs.

275 *Rp.* Atropini sulf. 0,01.
 Aquae dest. 10,0.
 M. filtra

DS. 0,1%-os atropin-oldat bőr alá fecskendésre. Sub sigillo. Az orvos kezéhez. 1 fecskendőben 0,001. atrop. sulf. $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{2}$ fecskendővel egyszerre.

277 *Rp.* Atropini boracici
 Cocaini hydrochlor. \overline{aa} 0,1.
 Aquae dest. 10,0.

MDS. Szemcseppek. Az orvos kezéhez. Sub sigillo.

- 278 *Rp.* Extr. Belladonn. 1,0!
Zinci oxyd.
Pulv. rad. Valerian.
aa 2,5.
Extr. Liquirit. qu. s.
ut f. pilul. No. 50.
Consp. pulv. Cinna-
momi.
DS. 3 × napj. 1—2 szemet.
Chorea, epilepsia.
Felnőtteknek.
- 281 *Rp.* Atropini sulf. 0,01.
Morphini hydro-
chlor. 0,3.
Extr. Taraxaci qu. s.
ut f. pilul. No. 30.
Consp. pulv. Liquirit.
DS. 3 × napj. 1 szemet.
Colica saturnina.
Pruritus.
- 283 *Rp.* Atropini sulf.
0,01—0,1.
Aquae dest. 20,0.
M. filtra.
DS. Atropincseppek,
szembe cseppen-
tésre. Sub sigillo.
Az orvos kezéhez.
- 285 *Rp.* Tinct. Belladonnae.
gtt. 2—5.
Aquae dest. 80,0.
Syrup. Rubi Idaei
10,0.
MDS. 2 ór. 1 kk. v. gyk.
1—5 éves gyer-
meknek. Pertussis.
- 287 *Rp.* Atropini sulf. 0,01.
Morphini hydro-
chlor. 0,10.
Aquae destill. 10,0.
MDS. Bőr alá fecskendésre
a tiszta morphiin-
oldat helyett aján-
latos.
- 279 *Rp.* Atropini boracici
0,1.
Aquae dest. 10,0.
MDS. Szemcseppek. Sub
sigillo. Az orvos
kezéhez.
- 280 *Rp.* Extr. Belladonnae 0,2.
Sacchar. alb. 5,0.
M. f. pulv. div. in.
dos. aequ. No. 10.
DS. 3—4 port naponta.
- 282 *Rp.* Atropini boracici 0,1.
Vaselinæ 10,0.
M. f. ungu.
DS. 1%-os atropinkenőcs.
Az orvos kezéhez.
Gyermekeknél at-
ropin-szemcseppek
helyett egy ken-
dermagnyi szon-
dával a kötőhár-
tyazsákba viendő.
- 284 *Rp.* Tinct. Belladonnae.
gtt. 2—4.
Kalii bromati
Natrii bicarb.
aa 0,5—1,0.
Aquae dest.
80,0—100,0.
Syrup. simpl. 10,0.
MDS. 2 ór. 1 kk. v. gyk.
1—5 éves gyermek-
nek. Pertussis.
- 286 *Rp.* Homatropini hydro-
bromici 0,1.
Aquae dest. 10,0.
M. filtra.
DS. Suo nomine. Szembe-
cseppentésre. Az orvos
kezéhez. Mydriaticum.
- 288 *Rp.* Atropini methylo-bro-
mati 0,01.
Acid. acetylosalicyl. 10,0.
M. f. pulv. div. in
dos aequ. 10.
DS. Fej- és fogfájás esetén
1 port bevenni.

Belloform. Barna, szagos, vízben oldh. formaldehyd + szén-hidrogének oleat-oldata. Desinficiens mint a lysoform 2—3% os oldatban.

Bengué-balzsam = methylum salicylicum.

Benzacetin. (Acetamidomethylsalicylsav). Színtelen jegeczpor. Vízben nem oldh. Hatása, haszn. mint a phenacetiné. Adag bels. porban 0,5—1,0 pro dos. napj. többször.†

Benzanilidum. ($C_6H_5NH[C_6H_5CO]$). Fehér, jegeczes, vízben oldhatlan por; 58 r. hideg borszeszben oldható. Hatása mint az antifebriné, de gyengébb. Gyermekeknél használt antipyreticum (Calin). Adag bels. 1—3 éves gyerm. 0,1—0,2 gm. pro dos. porban, 4—8 évesnek, 0,2—0,4 gm. Felnőttnek 0,5—1,0 gm pro dos.

H. Benzoe. Gyanta. Vörösbarna, fénylő, kellemes illatú, szemcsés darabok. Hatóanyaga a benzoesav; 5 r. borszeszben csekély maradékkal oldható. Nem haszn. bels.; helyette az acid. benzoicum. Készítménye a

Tinctura benzoës. Szépítőszerek gyakori alkatrésze.

289 Rp. Tinct. Benzoës 30,0.

Aquae Rosar. 30,0.

MDS. Lac virginum. Küls.

Mosdóvízhez levő-

kanálnyi öntendő.

Cosmeticum.

290 Rp. Tinct. Benzoës 5,0.

Spir. aetheris 50,0.

MDS. Külsőleg. A fej hajas

részének bedör-

zsölésére. Sebor-

rheoa.

Benzolum (C_6H_6). Színtelen, kellemetlen szagú, könnyen mozgó folyadék. Küls. scabies ellen, (nem megbízható). Bels. sarcina ventriculi, trichiniasis ellen. (Mosler.) Adag. 0,5—1,0 pro dos. 3—4-szer napj. nyákos folyadékban, emulsióban, caps. gelat.-ban.

Benzonaphtholum. [$C_{10}H_7O(C_6H_5O)$]. Benzoesavas β naphthol. Fehér, jegeczes, szagtalan, íztelen por. Vízben nem, borszeszben, chloroformban old. Bélben benzoesavra és β naphtholra hasad. Bélantisepticum a betol és salol helyett. Adag porban 0,5—1,0 pro dos. és 5,0 pro die. Gyerm. fele, harmada.

Benzosalin. Benzoylsalicylsav s methylester. Kevéssé aromás-szagú, tűalakú kristályok. Bélben hasad benzoesavra és salicylsavra. Haszn. belsőleg mint a salicylkészítményeké. Bélantisepticum, mint a salol. Adag 0,5—1,0 napj. 3—4-szer. 0,5 gnos tabletták készen (Hoffmann-La Roche).

Benzosol. (Benzoesavas guajacol). Színtelen, szagtalan és íztelen, vízben nem oldh. por. Guajacol és kreosot helyett 10—10,0 pro die. tuberculosusoknak. Mint bélantisepticum is használható.

Berberinum l. Calumbae radix.

Benzoe-gyógyszappan a kolozsvári (Heinrich József) gyógy-szappangyárból a bőrt simává és puhává teszi, a bőr korpázását megakadályozza és így kitűnő toilette-szappan (l. hird.).

Betolum. s. Naphtalolum. ($C_6H_4[OH]CO.C_{10}H_7$). A salolhoz vegyileg is, hatásra nézve is igen közel áll. Fehér, fénylő jegecekből álló, szagtalan, íztelen por. Hideg v. forró vízben oldhatlan. A bélhuzamban salicylsavra és naphtholra hasad. Hólyaghurutoknál (alcalicus, bomló vizelet esetén), polyarthritiseknél, hasmenéseknél használták jó sikerrel. Adag bels. porban 0,3—0,5—1,0 pro dos. 3—5-ször napj.

291 *Rp.* Betoli 3,0—10,0.

Sacchar. albi 3,0.

M. f. pulv div. in dos.

aequ. No. 10.

DS 3—5 ször napj. 1 port;

Biocitin. 10% lecithint tartalmazó jól oldh. táppor. 3-szor napj. 1 kk. tejben, kávéban, levesben.

Bioferrin. Piros, jóságú és jó ízű, folyékony haemoglobin-készítmény. Használtatik anaemia esetén; adag: gyermeknek 1—3 kkan., felnőttnek 1—3 evőkan. pro die, vízben v. tejben étkezés elején.

Biogen l. Magn. peroxyd.

Bioglobin. 15—20% haemoglobint 7% szeszt és 13% czukrot tartalmazó borszerű folyadék. Roboransnak, vérképző szernek ajánlották (?) Adag kanalanként 3—4 szer napj.

Bioson. Kaseint, lecithint és vasat tart. szürkésbarna, vízben oldh. por. Vastart. 1/4%, lecithin tart. 1/2%. Napj. 20—30—50 gm. tejben, kávéban, levesben.

Bismal. (Methylendigallussavas bismuth). Szürkészöld, vízben oldhatatlan por. 29% bismuthot tart. Haszn. küls. hintőpor-nak, mint a dermatol. Bels. antidiarrhoeicum 0,1—0,3 pro dos. porban 3—5 × napj.

Bismon. (Bismuthum oxydat. colloidal.) Vízben jól oldható, sárga, áttűnő, amorph-anyag, mely 22-30% bismuthoxydot tartalmaz. Antidiarrhoeicum. Adagul 10% os vizes oldatból gyermeknek 20—40 cseppet, felnőttnek 1/2—2 kk. pro dosi napj. 2—3 × ajánlanak. (Nincs kizárva káros, sőt mérgező hatása, mert felszívódása lehető; ezért nem is ajánlom használatát.)

Bismutan s. Isutan. (Bismuth, resorcin és tannin keveréke). Sárgás, vízben oldhatlan, szagtalan, édeses por. Adstringens; hintőpor-nak substantiában. Bels. 0,5—1,0 porban; gyermeknek 1,5—2,5 : 100,0 mixtura gummosában suspensio alakjában, 2 ór. 1 kk.

Bismuthum β-naphtolicum basicum [($C_{10}H_7O_3$)₂ + Bi_2O_3]. Világos barna, vízben nem oldh. por. Adstringens és bélantisepticum. Bels. porban 1,0—2,0 pro die.

Bardella, Bardeleben dr. bismutos égési pólyája, határtalan ideig eltartható, legolcsóbb kötőszers, igen czélszerűnek elismert kötelek mindenfokú égéseknél és leforrázásoknál, nedvező eczémánál, ulcus crurisnál, nyitott fagyási sebeknél, elfagyásoknál, gyermekek fölsebesedésénél, pemphigus, urticaria eseteiben stb. (L. hird.)

Bismuthum subgallicum s. Dermatolum. Basicus gallus-savas bismuth. [$C_5H_2(OH)_3CO_2Bi(OH)_2$]. Sárga, finom, légálló, világosságon meg nem változó, szagtalan, oldhatlan anyag, mely 55% bismuthoxydot tartalmaz. Jodoformi pótszere, szárító, exsudatum csökkentő, sebgyógyulást elősegítő, gyengébb antibacteriosum. Nem izgat, nem mérgező. Haszn. küls. lühtőpor alakjában vagy kenőcsben sebek, fekélyek, combustio, nedvező eczema eseteiben. Bels. a bism. subn. helyett ajánlják 0.5 grmos dosisban, napj. 4—8-szor.

292 Rp. Bismuthi subgall. 30,0.

Talci venet. 70,0.

Amyli trit. 10,0.

MDS. Híntőpor bőzös izzadáshoz ellen.

293 Rp. Bismuthi subgall. 10,0.

Ungu. emoll. 90,0.

M. f. ungu.

DS. Külsőleg.

294 Rp. Bismuthi subgall.

Zinci oxyd. aa 5,0.

Gelatinae

Glycerini

Aquae dest. aa 30,0.

M. f. gelatina.

DS. Dermatolzingenye.

H. Bismuthum subnitricum s. Magisterium Bismuthi.

$Bi(OH)_2NO_3$. Fehér, szagtalan, jegecses por, gyengén savanyú hatású; vízben oldhatlan. Küls. fedőszers, kissé összehúzó. Bels. haszn. cardialgia, ulcus ventriculi, diarrhoeák némely alakja, bélfekélyek esetén. Adag porban 0,2—1,5 pro dos. 3—5-ször napj.

295 Rp. Bismuthi subnitr. 5,0.

Aquae dest. 200,0.

MDS. Húgycsőbe fecskendezésre. Használat előtt felrázandó.

296 Rp. Bismuthi subnitr.

30,0.

Div. in dos. aequ.

No. 10.

DS. Reggel éhgyomorral 1 port $\frac{1}{2}$ pohár langyos vízben.

Ulcus ventr. Erosiones ventr.

297 Rp. Bismuthi subnitr. 10,0.

Div. in dos. aequ. No. 20.

DS. Napj. 3-szor 1 órával az étkezés előtt $\frac{1}{2}$ pohár állott vízben 1 port. Fekélyedő carcinoma ventr., idiült ulcus ventric., secretorius fájdalommasság ellen.

298 Rp. Bismuthi subnitr.

0,5—1,0.

Palv. Doveri 0,1—0,3.

Sacchar. alb. 3,0.

M. f. pulv. div. in dos.

aequ. No. 10.

DS. 2 ór. 1 port.

1—6 éves gyermek. Helyi bélhurut.

Pankreón javalt a resorptio emelésére carcinoma ventric., tuberculosis stb. folytán fellépő cachexia eseteiben. (L. hird.)

299 *Rp.* Aquae Foeniculi 75,0.
 Aquae Calcis 6,0.
 Bismuthi subnitr. 3,0.
 Syrupi. cort. Auraut.
 15,0.

MDS. Használat előtt fel-
 rázandó. 2 ór. 1 kk.
 Csecsemők diar-
 rhoeája (ha zöld a
 székletét) ellen.

301 *Rp.* Bismuthi subnitr. 5,0.
 Glycerini 50,0.
 M. f. linimentum

DS. Külsőleg.

302 *Rp.* Bismuth. subnitr. 3,0.
 Pulv. Doveri 1,0.
 Elaeosacch. Menthae
 2,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 No. 10.

DS. 2 ór. 1 port
 Diarrhoea felnőttnek.

304 *Rp.* Bismuthi subnitr. 3,0.
 Extr. Belladonnae 0,1.
 Sacchari alb. 4,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.

DS. 3-szor napj. 1 por.
 Cardialgia.

300 *Rp.* Bismuthi subnitr.
 0,5—1,0.
 Pulv. Doveri 0,1—0,4.
 Extr. Nucis vom.
 0,03—0,05.

Sacchar. alb. 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.

DS. 2 ór. 1 port.
 1—8 éves gyermek. Idült
 bélhurut.

303 *Rp.* Bismuthi subnitr. 3,0.
 Extr. Nucis. vom. 0,1.
 Magnes. carbon. 2,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.

DS. 2 ór. 1 port.
 Cardialgia, ulcus ven-
 triculi.

305 *Rp.* Bismuthi subnitr.
 Pulv. rhiz. Rhei chin.
 aa 5,0.
 Natrii hydrocarb. 20,0.
 M. f. pulv. det. in scat.

S. 3-szor napj. egy tetézt
 késhegygel.

H. Bismuthum subsalicylicum. $BiO(C_7H_5O_2)$ Alaktalan,
 fehér, vízben oldhatlan por. Savak könnyen felbontják. Küls.
 nem. Bels., mint a bismuth. subnitr. Vulpian typhus abdomina-
 lisnál jó eredményt látott, ha 1,0—2,0 pro dos. 3—4-szer napj.
 rendelt.; mások phthisicusok hasmenésénél rendelnek 0,5 pro
 dos. 2—3-szor napj. Gyermekeknek enteritis choleriformis és
 follicularis esetén 0,2—0,25 pro dos. napj. 5—6-szor porban v.
 rázandó keverék alakjában.

Myrticol „Csatádi“ igen kell. ízű guajacol-áfonya-készítmény,
 tüdőbetegek gyomorzavarai és bélbántalmai ellen specificum.
 (L. hird.)

Carcinoma ventric: *Rp.* Gelodurat „Pohl“
 scat. orig. c. Pancreatin. pur. 0.5
S. 3-szor naponta 1 dbot.

- 306 *Rp.* Bismuthi subsalicyl.
5,0.
Opīi puri 0,2.
Sacchar. alb. 2,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. Nr. 10.
DS. 3. ór. 1 port.
Phthisicusok has-
menése ellen.
- 308 *Rp.* Bismuthi subsalicyl.
10,0.
Aquae dest. 140,0.
Syrup. simpl. 10,0.
MDS. 1—2 ór. 1 evőkan.
Bevétel előtt felrázandó.
Typhus abdom.
- 307 *Rp.* Bismuthi subsalicyl.
2,0.
Aquae dest. 100,0.
Glycerini pur.
Cognac aa 8,0.
MDS. Felrázva 2 ór. 1 kk.
— gyk.
Gyermeknek acut ca-
tarrh. intest., enteritis
choleriformis, enteri-
tis follicularis esetén.
- 309 *Rp.* Bismuthi subsalicyl.
Sacchar. lact. aa 25,0.
M. exact. f. pulv. div.
in dos. aequ. No. 40.
DS. 3 ór. 1 port. Gyomor-, bél-
fekélyek, idült bélluhrut.

11. **Bismuthum tannicum.** Sárgás v. barnássárga por, íztelen, vízben oldhatlan. Antidiarrhoeicum Adag porban: 0,2—1,0, pro dos. 3—5-ször napi.

- | | |
|---|--|
| <p>310 <i>Rp.</i> Bismuthi tannici 3.0.
 Morphini hydrochlor. 0.05.
 Sacchar. alb. 3.0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.
 <i>DS.</i> 2 ór. 1 port.
 Diarrhoea.</p> | <p>311 <i>Rp.</i> Bismuthi tannici 0.5—1.0.
 Pulv. Doveri 0.1—0.4.
 Sacchar. alb. 3.0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.
 <i>DS.</i> 2 ór. 1 port.
 1—8 éves gyermek. Idült
 bélhurut.</p> |
|---|--|

Bismutose. Bismuthfehérje összeköttetés. Vízben oldhatlan, fehér por, 22% bismuthot tartalmaz. Világosságon megbarnul. Külsőleg lintőpornak intertrigo, égések esetén; belsőleg ajánlják gyermekek bélbetegségeinél egyéb bismuthgyűletek helyett. Adag lenne 1/2 éven aluli gyerm. 1,0—2,0, idősebbeknek kávéskanalként. U. a. okból, mint a Bismont nem ajánlhatom bels. használatra!!

- 312 *Rp.* Bismutose 15,0.
 Linetus gummos. 100,0.
 M. exact.
DS. Ór. 1—2 kk. Csece-
 mőknek, kisebb
 gyermek. bélbevonó.

Nural diétetikus digestivum és mesterségesen megemésztett tápláló és erősítő szer, igen jó hatású gyomorhajoknál, anaemia, chlorosis, reconvalescentia, phthisis, cachexia, hyperemesis eseteiben. (L. hird.)

Blenal. A santalol szénsavestere. Sárga, olajszerű, íztelen; vízben nem oldh., szeszben oldh. folyadék. Haszn. mint az ol. santali, vagy a hozzá hasonló santyl. Antigonorrhoeicum. Adag: 3—4-szer napj. 15 gtt. Capsulák 0.3 gm. tartalommal készen.

Boldo s. Boldu s. Boldoa folia. *Peumus Boldus s. Boldua fragrans* (Monimiaceae). Hatóanyagai illatos olaj (2%), boldin nevű alcaloid (0,1%), kevés tannin. Dyspepsia atonica eseteiben jól használható. Adag bels. infus. 10,0:150,0 2 ór. 1 evők.

Tinctura Boldo (20 : 100). Adag bels. 5—15 csepp pro dos. 3—4 × napj.

Extractum fluidum Boldo. Adag bels. 10—20 csepp pro dos. 3—4 × napj.

Blatta orientalis. Svábbogár. Szárított, porított rovarok. Oroszországban népies antihydropicus szer. Diaphoreticum, diureticum. Adag: 0,3—1,0 pro dos. 3—4 × napj.

H. Bolus Alba, l. Argilla alba.

Boral. (Aluminium borotartaricum) Vízben könnyen old. fehér jegeczek, ízük savanykás, összehúzó. Adstringens és gyenge antisepticum. Fülgyógyászatban fecskendésre 1/2—1%-os oldatok. Ulcus crurisra 5—10%-os kenőcs.

H. Borax venetus, l. Natr. boricum.

Bornyval. Valeriansavas-borneolester. Víziszta, a valeriansavra emlékeztető szagú folyadék. Vízben oldhatlan, alkoholban, aetherben oldódik. Sedativum, antihystericum valeriana készítm. helyett. Adag bels. caps. gelat.-ban 0,25 pro dosi 3—4 × napj.

Boroform. Formaldehyd oldata natr. boroglycerinicum oldatban. Desinficiens. Sebekre 0.3%-os, eszközök és kéz tisztítására 2—3%-os oldatok haszn.

Boroveritin. Urotropin (1 ott) összeköttetése borsavval. Sós ízű, vízben oldh. fehér por. Előbbiből 51.5%, utóbbiból 48.5% van benne. Húgyútak desinfiense. Adag: 1,0—4,0 pro die. étkezés közben. Üres gyomrot izgatja.

H. Bromaeethyl, l. Aether bromatus.

Bromalin. (Bromaeethylformin. $C_6H_{12}N_4$, C_2H_5Br). Színtelen, íztelen, vízben oldh. lemezkék v. por. 32% bromtalmú. Ajánlották brómkali helyett. Nem czélszerű. Adag 1,0—8,0 pro die ostyában.

Bromalum hydratum. [$CBra.COH + H_2O$]. Színtelen, közömbös, tűalakú, vízben oldható jegeczek. Chloralhydrat pótszere,

Neurolin Balla (Syrup hypophosph.-polybromat.) egyesíti a hypophosphit zsengítő és a brom csillapító hatását; igen jó eredménnyel használható idegesség, neurasthenia, hystéria, hypochondria, melancholia eseteiben, kitiűző szer lábbadozók részére (L. hird.)

Sedativum: *Rp.* Gelodurat „Pohl“

scat. orig. c. Bornyval valerianat. 0.25.

S. 3-szor naponta 1—2 dbot.

de annál gyengébb hypnoticum és sedativum. Szívre hevesen hat. Adag. bels. oldatban 0,1—0,2 napj. többször, mind sedativum; 0,5—1,0 pro dos. mint hypnoticum.

313 Rp. Bromali hydrati 1,0.

Aquae dest. 100,0.

Mucil. Gummi arab.

Syrup. Rubi Idaei

aa 50,0.

MDS. 3× napj. 1 evők.

Sedativum.

314 Rp. Bromali hydrati.

Succi Liquir. aa 3,0.

M. f. l. a. pilul. No. 50.

Obduc. gelatina,

DS. 1—3 szemet napj.

2—3 szor.

Bromglidin. A brómnak növényi fehérjével való összeköttetése helybelileg nem izgat. Sedativum más brómkészítmények helyett. A bróm a szervezetben leválik. 0,5 gmot tartalmazó tabletták alakjában jó forgalomba, melyek mindenike 0,05 gm. bromot tud leadni. Adag 2—3-szor napj. 1—2 drb. A dresden-leubitz-i Dr. Klopfer-féle chem. gyár készíti.

Bromidia. Kész angol készítmény, eredeti üvegekben. L. helyette a hozzá hasonló liv. Mixture chloralo-bromatát.

Bromipin. 10% brómtartalmú additívós terméke a sesamolajnak. Sárgás, olajos ízű folyadék. Antiepilepticum a bromkali helyett. Adag: 1—2 kk. (4,0—8,0) napj.

315 Rp Bromipini 100,0

Vitell. ovor. duorum.

F. l. a. emulsio, adde.

Spir. vini Cognac

15,0.

Mentholi 0,15.

MDS. Napj. 3—4-szer 1

evők.

H. Bromkalium l. Kalium bromatum.

Bromocoll. Brómnak enyvvvel és tanninnal való összeköttetése, 20% brómot tart. Íztelen és szagtalan sárgás por; vízben nem old., de suspendálható. Epilepsiásoknak pro die 10,0—30,0.

316 Rp. Bromocolli 10,0

Resorbini 20,3.

M. f. ungu.

DS. Pruritus ellen, kül.

pruritus vulvae, ani.

317 Rp. Bromocolli 10,0.

Zinci oxyd.

Amyli aa 20,0.

Glycerini 20,0.

Aquae dest. 200,0.

MDS. Külsőleg. Jól felrázva haszn. sabacut és chrou. eccemák ellen.

Bromoformium. (CHBr₃). Színtelen, kellemes szagú, édeses ízű folyadék, vízben nehezen, borszeszben könnyen old. Fény

Brom-Fersan-Pastillák, vasat és foszfort tartalmazó acid-albumin brómmal, javalva neurasthénianál, hysteriánál anémiás alapon. (L. hird II.)

behatására bomlik, megbarnul, ekkor elvetendő. Fekete üvegben tartandó. Hatása mint a chloroformé. Nem veszélytelen (!). Bels. tussis convulsivánál annyi csepp pro dos., a hány éves a gyermek, napj. 3—5-ször, kanál cukros vízben. Felnőttnek mint sedativum 0,5 gm. pro dos. 2—3 × napj. capsulában.”

318 Rp. Bromoformii	0,5
Cognac	5,0
Glycerini	15,0
Syr. spl.	100,0

MDS. 3-szor naponta 1 kávéskanállal.

Bromopan. Brómsókkal készült kenyér. Epilepsia gyógyítására ajánlják használatát.

Bromopyrin. ($CuH_{11}BrN_2O$) Fehér kristályok, hideg vízben nem, meleg vízben és alkoholban jól old. Erősebb anodynum, mint az antipyrin. Adaga porban, caps. amyl.-ban kisebb, mint az utóbbié.

Bromotan. Brom-tannin methylen ureum. Sárgásbarna, vízben nem oldh. por. Talcummal, amylummal és zinkoxyddal keverve 10—15%-ban hintőpor vizketés, nedvedző eccemák esetén, vagy 10%-os kenőcsben.

Bromural. α monobromisovalerianyl-ureum. Fehér, kevésbé kesernyés tűk, forró vízben, szeszben, aetherben oldh. Kereskedésben 0,3 gminos tablettáktól (egy üvegcsőben 20 db) fordul elő. Hypnoticum. Pro dos. és die 2 tablettá, melyek meleg cukros vízben oldandók fel.

†H. **Bulbus Scillae** l. **Scilla**.

Burowi solutio s. liquor. L. Alum. acet. solutum.

Butyl-chloralum hydratum (Croton-chloral-hydrat). ($C_4H_5Cl_3O + H_2O$). Kicsiny, selyemfényű, fehér jegeczlapocskák, jellegző szagúak, hideg vízben nehezen, melegben könnyebben, bor-szeszben könnyen oldódnak. Chloralhydrát pótszere. Sedativum-hypnoticum, anodynum (?). Szívre alig hat. Bels. adag vizes-glicerines oldatban v. porban, v. pilulában 0,2—0,4 pro dos. 2 ór. sedativum, anodynum; 0,5—2,0 pro dos. hypnoticum.

319 Rp. Butyl-chlorali hydrati
5,0—10,0.

Glycerini 20,0.

Aquae dest. 130,0.

MDS. Egyszerre 1 evők.,
ha kell 5 p. múlva ismét,
s 10 p. múlva ismét.

Anodynum.

Tic douloureux.

320 Rp. Butyl-chlorali hydrati
2,0.

Glycerini 10,0.

Aquae Foenic. 90,0.

MDS. Este lefekvés előtt
2—3 evőkanállal.

Hypnoticum.

Bromone Robin (Bromo-Peptide vagy Peptonate de Brome) javalt: idegbajok, nők és fiatal lányok ideges izgatottsága, gyermekek ideges zavarai, öregek álmatlansága, hysteria, epilepsia ellen. (L. hird.)

H. Butyrum Cacao l. Ol. Cacao.

Cacaol. Táplisztt gyermekek számára. Tartalmaz: cacaolisztet, melybe $\frac{1}{2}\%$ na.r. chlorid., 17% cukor és 25% zabliszt van keverve.

Cadmium salicylicum. [$Cd(C_7H_5O_2)_2 + H_2O$]. Feh., vízben jól old. tűcskék. Haszn. l. cadm. sulf.

Cadmium sulfuricum. ($CdSO_4 + aq.$) Színtelen, vízben old. jegeczek. Haszn. küls. mint a zinc. sulf.

H. Calamus Acorus. Rhizoma. (Aroideae). Hatóanyagok: acorin (keserű anyag) és illatos olaj. Amarum. Belső adag: porban 0,5–1,5 pro dos. 2–3 \times napj. v. infus 8,0–10,0 : 100,0 2 ór. 1 evők.

321 Rp. Infus. rhizom. Calami
e 10,0.
l. a. p. ad colat. 150,0.
Tinct. Rhei Darelli 8,0
Syrup. cort. Aurant.
15,0.

MDS. 2 ór. 1 evők.
Amarum.

322 Rp. Rhizom. Calami 30,0.
Rad. Gentianae
Rad. Rhei chin.
Semin. Cardamomi
Flaved. cort. Aurant.
aa 10,0.
Consc. et. cont. m. f.
species.

DS. Keserű theakev. Házilag 1 liter felér borral maceratum készítendő. Ebből 3-szor napj. egy-egy tokaji pohárral.

II. Calcaria chlorata s. Calcium hypochlorosum [$Ca(OCl)_2$]. Fehér v. fehéres, gyakran összegomolyodó, nyirkos por; chlórsgazú; íze kesernyős, fanyar. Levegőn nedvességet vesz magához, vízben tökéletlenül oldódik. Desinficiens, desodorans, adstringens, szárító. Helyiségek fertőztelenítésére substantiában elhintve; erősebb Cl-fejlesztés céljából tányérban valamely savval (eczet) leöntve, v. konyhasóval és barnakővel keverve (aa) és híg kénsavval leöntve. Küls. sebmosó v. borogató folyadéknak 2%–4%-os szűrt oldatok, száj-, torokvíznek v. orrba fecskendésre 1%–5%-os oldatok. hügycsőbe fecskendésre 0,05–0,1 : 100,0. Bels. nem.

323 Rp. Calcar. chloratae 6,0.
Aquae dest. 300,0.
M. filtra.

DS. Külsőleg, borogatásra.
Gyermekeknek vulvitis
diphtherit. esetén.

324 Rp. Calcar. chloratae 0,1.
Aquae dest. 100,0.
MD. in vitro nigro

S. Befecskendésre gonorrhoeánál.

Hygiama alimentum est aptissimum omnibus morbo Brightii laborantibus.

325 Rp. Calcar. chlorat. 5,0.
 Ungu. paraff. 50,0.
 M. f. ungu.
DS. Kenőcs, fagydagana-
 tok ellen.

326 Rp Calcariae chloratae
 3,0—5,0.
 Aquae dest. 1000,0.
 Spirit camphor. 5,0.
MDS Borogatásokra.
 Egési sebek esetén.

H. Calcium carbonicum nativum s. Creta alba. Iszapolt kréta. Tiszta krétából előállított igen finom por. Küls. fogporba, mint mechanicusan ható anyag. Bőrgyógyászatban az ungu. sulfuratumban is mechanice hat. Bels. antacidum.

H. Calcium carbonicum praecipitatum ($CaCO_2$). Hófehér, igen finom por. Küls. fogporba. Bels. porban mint antacidum (pyrosis, némely diarrhoea, savmérgezések) kávéskanalanként, késhegyenként; rhachitisnél 0,1—0,3 pro dos. 2—3 × napj.

327 Rp. Calc. carb. praecip.
 2,0—4,0.
 Ferri lact. 1,0—2,0.
 Sacchar. albi 20,0.
 M. f. pulv. det. in scat.
S. 3 késhegygyel napj.
 1—3 éves gyermek. Rha-
 chitis.

328 Rp. Calc. carb. praecip.
 5,0.
 Pulv. rad. Rhei 2,0.
 Elaeosacch. Foenic.
 3,0.
 M. f. pulv. div. in
 dos. aequ. No. 10.
DS. 3—4-szer napj. 1 port.

329 Rp. Calc. carb. praecip.
 30,0
 Magnes. carb. 5,0.
 Natrii bicarb.
 Sapon. medic. ras.
 aa 3,0.
 Olei Menthae pip.
 gtt. 5.
 M. f. pulv. subtil.
DS. Fogpor.

330 Rp. Calc. carb. praecip.
 Gummi arab. pulv.
 aa 5,0.
 tere cum
 Aqua Cinnamomi
 150,0.
 adde
 Syrup. simpl. 10,0.
DS. 1—2 evők. 3—4-szer
 napj. Pyrosis.

H. Calcium chloratum crystallisatum. ($CaCl_2$). Színtelen, légen szétfolyó jegeczek; íze csipős és keserű. Vízben, bor-szeszben könnyen oldódik, aetherben nem. Substantiában causticum, híg oldatokban adstringens. Szemvíznek 1/2%—1% os oldat, sebmosó folyadéknak 4—5%-os oldat. Bels. újabban sok új javalat alapján haszn. Gyerm. göresös betegségei ellen (spas-mus glottidis, eclampsia, tetanus, haemophilia) 0,15—2,0 pro die oldatban. Felnőtteknek urticaria, pruritus, haemophilia, épp

Barella universal-gyomorpóra kitűnő hatású a különféle emésztési zavaroknál (L. hird.)

Pastilles de Bilin, (bilini emésztési czukorkák) a bilini forrás lepárlási maradékaiból előállított pasztillák kitűnő hatásúak gyomorégés ellen, gyomorhurtnál és általában emésztési zava-roknál. (L. hird.)

így a legkülönbözőbb görcsök ellen is (epilepsia) 1,0–4,0 pro die. Szívtonicumnak pneumonia esetén $\frac{1}{4}$ óránként 0,3–0,6 többször egymásután.

331 *Rp.* Calcii chlorati cryst. 5,0.

Aquae dest. 150,0.

Syr. Diacodii 10,0.

MDS. 2 ór. 1 evők. felnőttek. Gyerm. 2 ór. 1 kk—gyk.

332 *Rp.* Calcii chlorati cryst. 4,0–6,0.

Syr. Aurant. 40,0.

Rhum 30,0.

Tinct. Cinnam. 5,0.

Aquae dest. 50,0.

MDS. ór. 1 evők. Haemophilia. Morbus Werlhoffi. Scorbüt.

333 *Rp.* Calcii chlorati cryst. 2,0.

Aquae dest. 20,0.

Resorcini 1,0.

Sulfur. praecip. 2,0.

Lanolini anhydr. 10,0.

Vaselini 10,0.

M. f. ungu.

DS. Kenőcs. Acne dissem.

334 *Rp.* Calcii chlorati cryst. 2,0.

Aquae dest. 20,0.

Olei Cadini 5,0.

Pyrogalloli 1,0.

Lanolini anhydr. 5,0.

Vaselini 10,0.

M. f. ungu.

DS. Eccema prurigin. capitis.

Calcium hypermanganicum s. Acerdol. $Ca(MnO_4)_2 \cdot 5H_2O$
 — Ibolyaszínű, vízben old. kristályok. Állítólag erősebb bacteriumölő, mint a kalium hypermanganicum (?). Haszn. mint az utóbbié.

†H. Calcium hypophosphorosum s. Calc. hypophosphit.
 $Ca(H_2PO_2)_2$. Fehér, hatoldalú prismák v. fénylő jegeczlapocskák. Szagtalan, légálló, vízben elég jól old. Kisebb adagokban phthisis, chlorosis, scrophul., rhachitis, cachexia eseteiben. Láz ellenjavallatot képez. Nagy adagban undort kelt s kellemetlen felbőgőzéseket okoz. Nem szabad együtt adni savakkal és kali chloricummal. Savanyú ételek tiltassanak el. Adag bels. 0,2–0,5 gm. 3–4-szer napj. oldatban.

Calcium lacticum. $(Ca(C_3H_5O_3)_2 + 5H_2O)$. Fehér, laza, jegeczes anyag, vízben jól old. Rhachitis esetén 0,2–0,5 pro dos. napj. 2–3-szor porban.

H. Calcium oxydatum s. Calcaria caustica s. usta
 (CaO) . Fehér v. szürkés, szilárd darabok. Félannyi vízzel megnedvesítve, erősen megmelegszi és finom fehér porrá málik szét, melyből négyannyi vízzel egynemű sűrű pép támad. Causticum. Csak küls., mint *Pasta caustica viennensis*.

Fersan (vasat és foszforsavat tart. acidalbuminát) kitűnő hatású chlorosis, rhachitis, étvágytalanság, neurasthenia, tuberkulosis, gyöngeségi állapotok és reconvaescentia eseteiben. (L. hird. II.)

335 *Pasta caustica Viennensis.*

1. *Rp.* Kalii caust. pulv. 5,0. 2. *Rp.* Cale. oxyd. pulv. 5,0.
 Det. in lagen. Det. in lagen.
S. Suo nomine. *S.* Suo nomine.

3. *Rp.* Spiritus 10,0.

DS. Suo nomine.

Az 1. és 2. sz. a. anyagok összedörzsöltetnek s a borszesz lassú hozzáadása mellett pastává alakíttatnak, melyet lapocz v. kanál segélyével a megmarandó helyre kenünk fel. A környezetet, melyet a maró hatástól óvni akarunk, ragtapasz csíkokkal ragaszszuk be. A pastát 10 perczig kell a bőrön hagyni, azután bő vízzel lemosni.

H. *Calcium phosphoricum* [$Ca_2H_2(PO_4)_2 \cdot 4H_2O$]. Fehér, könnyű, kristályos por, vízben nem oldható. Bels. felnőttek csontbántalmak esetén, nemkülönben szoptatónőnek s graviditás esetén is a megfogyott szervezeti *Ca* pótlása céljából porban, pastillákban 0,5—1,5 pro dos. 3—5-ször napj.; gyermeknek rhachitis ellen 0,2—0,5 pro dos. 3—4-szer napj.

336 *Rp.* Calc. phosphor.
 Sacchar. alb. \overline{aa} 20,0.
 M. f. pulv. det. in scat.
S. 3-szor napj. 1 késhegygyel. Gyermeknek.
 Rhachitis.

337 *Rp.* Calc. phosphor. 3,0.
 Ferri reducti 0,5.
 Sacchar. alb. 2,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.
DS. 3-szor napj. 1 port.
 Felnőttek.

338 *Rp.* Calc. phosphor.
 Ferri lact. \overline{aa} 6,0.
 Sacchar. lactis 20,0.
 M. f. pulv. det. in scat.
S. 3-szor napj. 1 késhegygyel.
 Gyermeknek. Rhachitis.

339 *Rp.* Calcii phosphor.
 Calc. lactici
 Sacch. lactis \overline{aa} 10,0.
 Ferri lactici 5,0.
 M. f. pulv. det. in scat.
S. Reggel és este egy-egy késhegygyel. Rhachitis.

Calcium sulfuratum s. Calciumsulfid. Keveréke CaS , CaS^5 és CaS_2O_4 -nek. Szürkésfehér v. sárgásfehér, záptojás szagú por; légen bomlik, savakkal leöntve H_2S -t fejleszt; lúgos kémhatású vízben kevésbé, borszeszben nem oldódik. Fürdőhez (fakád) 50,0—100,0 vegyünk s a vízhez kevés HCl -at öntsünk (idült fémmérgezések, rheumatismus, némely idült bőrbaj).

Solutio Vlemingckx s. Calc. oxysulfurat. solut. *Calcium sulfuratum* oldata. Haszn. scabies, psoriasis, prurigo ellen.

Phosphor-csokoládé-bonbon „Finy“ kitünő hatású csontképzőszer angolkórnál. (L. hird.)

SCHNEIDER módosított rendelvénye köv.:

340 Rp. Calc. oxydat.	30,0.
Sulfur. subl.	60,0.
Aquae dest.	600,0.
M. et coque ad remanent.	360,0.
Filtra.	

DS. Külsőleg. Ecsetelésre. Scabies.

Arczon nem szabad ecsetelni.

A beteg fürdőben zöld szappannal ledörzsöltetik s $\frac{1}{2}$ óráig a fürdőben marad; ezután a beteg helyek az oldattal bedörzsölni s a beteg ismét fürdőbe száll $\frac{1}{2}$ órára.

H. **Calcium sulfuricum ustum s. Gypsum ustum** (CaSO_4). Fehér, alaktalan, íztelen és szagtalan por. 1 r. 400—500 r. vízben oldódik. Felényi vízzel péppé keverve, az 5 p. alatt megmerevedik. Contentivum. Kemény kötések készítésére haszn.

Calmette-serum. (Antivenin Serum antivemineux). Kobraméreggel fokozatosan immunizált ló vagy szamár vérséruma. Minden mérges kigyómarása ellen használatos, tehát a nálunk előforduló mérges viperák marása ellen is. Értéke szemben a kigyóméreggel 1:10,000-hez. Adag bőr alá gyermekeknek 10 köbctm., felnőtteknek kétszerannyi.

Calodal. Csaknem egészen fehérjéből álló húspor. Tápanyag. Adag: 3 szor napj. 1 kk. tejben, kávéban, levesben. Lehet bőr alá is fecskendezni physiol. konyhasó-oldatban feloldva (50 köbctm.-ben 5 gmot). Tápcsőrének 5—10 gm:100—200 vízre.

Calomelol. Colloidalis calomel, mely 75% calomelt és 25% fehérjét tartalmaz. Szürke, finom por, mely 50 r. vízzel fehér emulsiót ad. Antilneticum. Haszn. bedörzsölő kúrára 4,0—6,0 a 45%-os kenőcsből pro dosi; tablettá alakjában 0,01. Küls. hintőpor lueticus fekélyekre v. 2%-os nedves kötés. Az oldat befecskendezése fájdalmas, nem ajánlatos.

H. **Calumbae radix s. Colombo radix.** (Cocculus palmatus. Menispermaceae). Hatóanyagai: berberin, calumbin (keserű anyag), keményítő. Amarum, tonicum, antidiarrhoeicum. Bels. adag: decoct. 5,0—10,0:150,0 2 ór. 1 evők.

H. **Extractum Calumbae** Borszeszes kivonat. Vízben zavarosan oldódik. Bels. adag porban, pilulában, oldatban 0,3—1,0 pro dos. 1,5—3,0 pro die.

Berberinum hydrochloricum ($\text{C}_{20}\text{H}_{17}\text{NO}_4 \cdot \text{HCl} + 2\frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$). A calumba egyik hatóanyaga a berberin. Sárgás, finom tűkőből álló jegezes por. Keserű ízű. 80. r. hideg vízben oldódik, könnyebben forró vízben, borszeszben. Tonicum, amarum. Adják tumor lienis malaricus ellen, valamint méhvérvérek ellen is hydrastis canadensis helyett. Bels. adag porban vagy borszeszes oldatban 0,03—0,05 pro dos. 3-szor napj.

Berberinum phosphoricum ($C_{20}H_{17}NO_4$, 2 H_3PO_4). Sárgás, jegeczes, keserű por. Hideg vízben is jól oldódik. Haszn. mint a berber. hydrochlor.

341 Rp. Decoct. rad. Calumbae e 8,0.
l. a. p. ad colat. 150,0.
Tinct. Opii crocat. gtt. 10.
Syrup. simpl. 15,0.
MDS. 2 ór. 1 evők. Felnőttnek. Diarrhoea.

343 Rp. Extr. rad. Calumbae 3,0.
Pulv. Doveri. 1,0.
Sacchar. alb. 20.
M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10.
DS. 2 ór. 1 port. Felnőttnek. Diarrhoea.

Campechianum lignum. (Haematoxylon Campechianum. Caesalpinioideae). Csersavat tart. Adstringens. Decoct. 5,0—15,0 150,0 ór. 1 evők. felnőttnek. Gyerm. 2,0—5,0 : 100,0 decoct.

Extractum ligni Campechiani. Vízben zavarosan old. Csersavtartalmú. Porban, pilulában 0,5—2,0 napj. többször felnőttnek. Gyerm. 0,1—0,2 pro dos. napj. 4—5-ször.

345 Rp. Decoct. ligni. Campech. e 5,0
l. a. p. ad colat. 100,0.
Tinct. Opii simpl. gtt. 4.
Syrupi simpl. 10,0.
MDS. 2 ór. 1 gyk. Idült bélhurut ellen 5—7 éves gyermeknek.

342 Rp. Decoct. rad. Calumbae e 2,0.
l. a. p. ad colat. 80,0.
Extr. Ratanhiae dep. 0,2—0,4.
Tinct. Opii simpl. gtt. 2. — gtt. 3.
Syrup simpl. 10,0.
MDS. 2 ór. 1 kk. v. gyk. 1½—3 éves gyermeknek. Diarrhoea chron.

344 Rp. Extr. rad. Calumbae 5,0.
Aquae Cinnamomi simpl. 150,0.
M. f. solut.
DS. 2 ór. 1 evők. Felnőttnek. Tonicum, amarum.

346 Rp. Decocti ligni. Campech. e 20,0.
l. a. p. ad colat. 200,0.
Tinct. Opii simpl. gtt. 20.
Syrupi Diacodii 20,0.
MDS. 3 ór. 1 evők. Phthisicusok hasmenése ellen.

II. Camphora. $C_{10}H_{16}O$). Stearopten; fehér, jegeczes, áttetsző, fénylő, szívós tömeg. átható szagú, fűszeres ízű. illó: vízben nem oldódik, borszeszben, aetherben, zsíros és illó olajokban jól old. Borszeszszel nedvesítve porítható (camph. trita). Küls. gyenge antisepticum, izgató; sebekre substantiában, hintőpor alakjában, vagy kenőcs v. linimentum alakjában (1:5—10). Bels. excitans 0,05—0,2 pro dos. 4—5-ször napj. porban, emulsióban: bőr alá fecskendve leghatásosabb, de fájdalmas.

Myrticol „Csatádi“ igen kell. ízű guajacol áfonya-készítmény, tüdőbetegek gyomorzavarai és bélhántalmiai ellen specificum.

II. Linimentum saponato-camphoratum seu Opodeldoc.
Küls. derivans-bedörzsölésekre.

H. Oleum camphoratum. Küls. derivans bedörzsölésekre.

II. Spiritus camphoratus. Küls. mint az előbbiek.

347 *Rp.* Camphor. trit. 1,0.
Gummi arab. pulv. 10,0.
Aquae dest. 150,0.
Syrup. simpl. 10,0.
F. l. a. emuls.

DS. 2 ór. 1 evők. Excitans.

349 *Rp.* Camphor. trit. 0,5.
Sacchar. lactis. 3,0.
M.f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.

Det. in chart. cerat.
S. 2 ór. 1 port. 3–6 éves
gyermeknek. Excitans.

351 *Rp.* Camphor. tritae
Moschi aa 0,5;
Sacchar. lactis 4,0.
M.f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.

Det. in chart. cerat.
S. 2 ór. 1 port. Excitans.

353 *Rp.* Camphorae 1,0.
Aetheris acet. 15,0.
Tinct. Opii simpl. 3,0
MDS. 10–30 perzenként
10–15 csep. Choleránál
excitans.

348 *Rp.* Ol. camphor.
Chloroformii aa 15,0.
M. f. linim.

DS. Küls. bedörzsölésre.
Derivans.

350 *Rp.* Camphor. trit. 0,5.
Vitellum ovi minus
Aquae dest. 150,0.
F. l. a. emuls.

DS. Csőrének, Egyszerre
felét elhasználni.
Excitans.

352 *Rp.* Camphor. tritae, 0,2.
Chinin. hydrochlor. 0,5.

Pulv. Gummi arab.
Sacchar. alb. aa 1,5.

M. f. pulv. div. in
dos. aequ. No. 10.

D. in chart. cerat.
S. ór. 1 port. Gyermeknek
cholera asiat. és
cholera infant.
esetén erőhanyatlás
alkalmával.

354 *Rp.* Camphor. 2,5.
Ol. Amygdal. 10,0.
M. f. solut.

DS. Bőr alá fecskendésre,
1 fecskendővel egyszerre.
Excitans.

Camphora monobromata ($C_{15}H_{15}BrO$). Szintelen, prisma-
ticus tűk vagy jegeczlapok, légálló, gyenge camphorszagúak,
vízben oldhatlanok, borszeszben, aetherben, chloroformban, zsí-
ros olajokban jól oldódnak. Sedativum delirium tremens, hy-
steria, epilepsia eseteiben. Bels. adag 0,1–0,5 pro dos. napj.
3–4-szer, caps. amylac. v. gelatin.-ban vagy emulsióban.

Spiritus petrae camphoratus seu „Reparator-Kriegner“,
kitűnően bevált antirheumatikum, antineuralgikum. (L. a szem-
ben levő hird.)

Csúz, köszvény, neuralgikus

fájdalmak néhányszori bedörzsölés után szűnnek,
sőt egészen elmúlnak a KRIEGNER-féle

Ára 2 korona

REPARATOR

(SPIRITUS PETRAE CAMPHORATUS.)

ELVONÓ HATÁSÚ S FÁJDAL-
MAKAT ENYHÍTŐ SZER BEDÖR-
ZSÖLÉSRE

Kriegner György

(Spiritus petrae camphoratus) használatától.

40 év óta közhasználatban levő elvonó hatásu
s fájdalmakat enyhítő szer bedörzsölésre.

Hálairatok, köszönőlevelek ezrei
állanak rendelkezésünkre, amelyek
mind ezen szer kiválóságát
dicsérik.

Kis üveg — — — — — 1.— korona.

Nagy üveg — — — — — 2.— korona.

Egyedüli főraktár:

KORONA GYÓGYSZERTÁR

Budapest, VIII., Calvin-tér. Baross-u. sarok.

Postai szétküldés naponta utánvéttel
vagy a pénz előzetes beküldése után.

Bayer Antal



gyógyszertára a Vörös kereszthez
Budapest, VI., Andrássy-út 84.
ALBOPLAST Bayer

CONTRATUSSIN
BAYER

(Elexirium thymi »Bayer«)
szamárhurut, gégefő- és bronchial-
catarrhus eseteinél. Ára 1.40 kor. és 2 kor.
Pastilla alakban is kapható!!

VÖRÖS KERESZT

BABY - Crème, Puder
- és szappan

legtökéletesebb minőségben.

Minden gyógyszerárban kapható. Kivánatra próba-
küldemény kísérletezésre díjmentesen.

A világhírű londoni

Burrough Wellcome és Társa „TABLOID“
készítményei főraktára.

355 Rp. Camphor. monobromatae 2,0.
 Sacchar. alb. 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10.
 Det. in caps. amylac.
 S. 3-szor napj. 1 capsulát.

356 Rp. Camphor. monobrom. 2,0.
 Ol. Sesami 20,0.
 Gummi arab. 10,0.
 Aquae dest. 150,0.
 Syrup. simpl. 15,0.
 F. l. a. emulsio.

DS. 3 ór. 1 evők.

Camphosan. Camphorsav-methylester oldata santalolban (15:85). Az uropoeticus szervek lobos betegségei ellen (gonorrhoea?), ajánlották 3—5-ször napj. 0,3 gmot étkezés közben elfogyasztani. Kész capsulák is vannak forgalomban.

Candol. Malátakészítmény. Tápanyag, mely diastaset és fehérjét tartalmaz. Adag: 3—5-ször napj. 1 kk. tejbén.

†**H. Cannabis indicae herba.** (Moraceae.) Hatóanyagok: cannabin s. haschischin, tetanocannabin, cannabinon (lágy gyantás anyag), illó olaj. Sedativum, gyenge anodynum (opium pótszere), antispasmodicum; nagy adagban hypnoticum (?) Haszn. készítményei:

†**H. Extractum Cannabis indicae.** Küls. kenőcsben 0,2—0,5: 10,0—20,0. (irrationalis!) Bels. porban, pilulában. 0,03—0,05! pro dos. 3—4-szer napj. Dos. maxim. pro die. 0,5!

†**H. Tinctura Cannabis indicae.** Küls. nem. Bels. 5—20 csepp pro dos. 3—4-szer napj. Dos. maxim. sing. 1,0! Dos. maxim. pro die. 4,0!

Cannabinum tannicum. Keveréke cannabinnak és tanninnak. Összetétel igen változó. Tetanocannabinnt nem tartalmaz; ez előnye. Sárgásbarna, vízben oldhatatlan, kellemetlen szagú por, íze keserű, összehúzó. Enyhe hypnoticum. Megbízhatlan. Adag. 0,25—0,5 pro dos. este lefekvés előtt.

Cannabinonum. Lágyas, barna színű, gyantás anyag, vízben nem, borszeszben, aetherben jól oldódik. Sedativum, némelyek szerint hypnoticum. Főfájást, hányást, lelki nyugtalanságot, exaltatiót gyakran okoz. Nőknél kétszer oly erős hatású, mint férfiaknál. Szívbetegségeknél kerüljük alkalmazását. Adag bels. pastillákban coffea tosta-val v. pulv. cacaoval 0,02—0,03—0,05 pro dos.

Haschisch purum. Barnás, lágy, gyantás anyag, vízben nem, borszeszben sárga színűen oldódik. Keveréke cannabinonumnak és tetanocannabinnak, mely utóbbi alkatrészénél fogva excitans. Eddig melancholia eseteiben rendelték 0,02—0,06 gm.-nyi adagokban coffea tosta-val porban, pastillákban (pilula nem jó). Nem ajánlható; gyakran támadnak haschisch-részség, catalepsia, rángó görcsök a bevétel után.

Sedativum: Rp. Gelodurat „Pohl“

scat. orig. c. Bornylvaler. 0,25.

S. 3-szor naponta 1—2 dbot.

357 Rp. Cannabini tannici 1,0.
Sacchar. alb. 2,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.

DS. Este lefekvés előtt
1—2 port. Hypnoticum.

359 Rp. Cannabinoni 0,4.
Coffeae tostae pulv. aa 8,0.
Gummi Tragacanth. 0,10.

Aquae glycerin. qu. s.
ut f. massa plastica
e qua formentur pastilli No. 20.

DS. 0,02 grmos cannabinon pastillák. Este 1—2 szemet. Sedativum, hypnoticum. (?)

361 Rp. Tinct. Cannabis ind.
Tinct. Ipecac. aa 5,0.

MDS. 3—4-szer napj. 10—15 cseppet. Fel-nőttnek catarrh. bronch.

358 Rp. Extr. Cannabis ind. 0,3—0,5.
Extr. Hyosciami 0,1.
Sacchar. alb. 5,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.

DS. 3-szor napj. 1 port.
Izgatott köhögés ellen.

360 Rp. Extr. Cannabis ind.
Pulv. rad. Ipecac. aa 0,06.

Sacchar. lactis 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.

DS. 3-szor napj. 1 port.
3—6 éves gyermek.
Catarrh. bronch. acuta.

362 Rp. Cannabini tannici 3,0.
Extr. Liquir.

Pulv. Liquir. aa qu. s.
ut f. pilul. No. 30.
Obduc. fol. Argenti.

DS. Este lefekvés előtt
3—5 szemet.

†**H. Cantharides.** (*Lytta vesicatoria*. Coleoptera.) Hatóanyaga cantharidin. Haszn. készítményei:

Cantharidinum. ($C_{10}H_{12}O_4$). Színtelen, négyoldalú jegeczlapocskák, vízben nem, hideg alkoholban nehezen, aetherben, zsíros olajokban könnyen old. Haszn. a bogarak helyett tapasztokba, collodinmba. Bőr alá fecsk. és bels. psoriasis, lepra, gégetubercul., tüdőtübecul. eseteiben. Adag bőr alá és bels. 0,0002—0,0005 gm., tehát oly minimális adagok, hogy azok biztos lemérése nem könnyű. Nem megbízható. Fölösleges.

†**H. Tinctura Cantharidum.** Küls. mint bőrizgató; kenőcsben, linimentumban 1:20—50. Bels. diureticum (nem ajánlható mérgező hatása miatt). Dos. maxim. sing 0,5! dos. maxim. pro die 1,0!

Alimento Theinhardt a primo mense infantes nutrire licet.

Extr. Thymi Kern bevált thym.-készítm., 3 koncentrációban, kitiűző bronchitis, phthisis, pertussis, asthma ellen. (L. hird.)

†II. **Emplastrum Cantharidum** s. **Empl. vesicatorium consuetum.** Hólyaghúzó tapasz. Bőrön hólyagot húz 8—10 óra alatt; előbb, ha a bőrt kevésbé megszíroztuk. Cantharidin a tapasz alkalmazásakor felszívódik, ezért vigyázat!

Emplastrum Cantharidum perpetuum. Hólyagot csak igen sokára húz. Bőrvörösítő.

II. **Unguentum Cantharidum.** Pro usu veterinario.

363 *Rp.* Tinct. Canthar. 2,0.
Olei Sesami 50,0.
Olei Bergamottae gtt. 5
MDS. Külsőleg. Hajolaj.
Alopecia.

364 *Rp.* Empl. Canthar. ord.
qu. s.
extende crasse, super
corium (s. linteum)
magn. volae manus.
DS. Hólyaghúzó.

365 *Rp.* Tinct. Canthar.
Tinct. Capsici aa 20,0.
Spir. vini 50,0.
MDS. Külsőleg. Alopecia
areata esetén ke-
veset a beteg helyre
dörzsölni.

366 *Rp.* Cantharidini 0,1.
Collodii flexil. 50,0.
M. f. solut.
DS. Külsőleg. Az orvos
kezeléhez. Sub sigillo.
Hólyaghúzó collo-
dium. Vékonyan be-
ecsetelendő arra a
helyre, a hol hólya-
got akarunk húzni.
Orvos magánál
tartsa a gyógyszert.

Capilli Veneris frondes. (Filices.) Hatóanyaga illatos olaj.
Haszn. a hasonló nevű syrup készítéséhez.

H. **Capsici fructus.** Paprika. (Capsicum annum. Solanaceae.)
Hatóanyaga a capsicol. Haszn. a liv.

H. **Tinctura Capsici.** Erősen csípős, égető ízű. Bels. nem
Küls. mint bőrizgató, vörösítő.

Captol. (Tannin és chloral condensatiós származéka.) Sötét-
barna, vízszívó por, vízben nehezen, borszeszben jól old.
Haszn. oldva, mint *Spiritus captoli compositus* (l. alább). Se-
borrhea, defluvium capill. eseteiben czélszerű.

367 *Rp.* Captoli
Chlorali hydrati
Acid. tartar. aa 1,0.
Ol. Ricini 0,5.
Spir. vini. dil. 100,0.
MDS. Hajszesz. Spirit captoli
comp.

368 *Rp.* Captoli.
Acid. tartar. aa 1,0.
Acid. salicyl. 0,7.
Olei Ricini 0,5.
Aquae Coloniens.
100,0.

MDS. Külsőleg. Hajszesz.

Carragaheen s. **Fucus Carragaheen.** (Algae.) Ható-
anyagai növényi nyák, igen kevés brom, jódl. Belőle nyákos
főzet készíttetik (1 : 100), mely mint vehiculum szerepelhet csípős,
izgató anyagok adagolásánál.

Carbo ligni depuratus. Szárazon desodorans. Bels. antidotum alkaloid-mérgezések s keserű anyagokkal mérgezések eseteiben (?). Adag 0,5—2,0 porban, ostyában, 5—10 perczenként. Más indicatiók (typhus, pyrosis stb.) meg nem állhatnak. Fogpornak ártalmas.

Carbo animalis }
Carbo ossium } mint a carbo ligni.

Carboneol. Kátrányszerű, fekete sűrű folyadék. *Pix liquida* helyett jól használható.

Caropan. Táppor. Vízben oldh. Egyenlő részben malátakivonat és lisztféjék.

H. Cardamomi fructus. (Elettaria Cardamomum, Zingiberaceae) Hatóanyaga illó olaj. Carminativum, stomachicum. Önállóan nem haszn.; főleg illatos vagy keserű theakeverékekhez.

Carniferrin, l. Ferri praeparata.

Carpainum hydrochloricum. ($C_{14}H_{25}NO_2.HCl$). A carica pa. aya leveleinek alkaloidja. Szintelen, vízben oldh. keserű jegeczek. Hatása mint a sparteiné (l. e. cz. a.). Haszn. szívbetegségeknel 0,01—0,025 pro die pilulában, cseppekben. Subcután 0,005—0,01 (hatás gyorsan következik be).

H. Caryophylli flores. (Caryophyllus aromaticus. Myrtaceae) Hatóanyaga illó olaj. Haszn. mint a cardamomum.

Casanthrol. Ungu. caseini és extr. lithanthracis keveréke. Utóbbi nem más, mint a kőszénkátránuak aetherben és benzolban oldható részei. Sűrű, nyúlós emulsio, mely a bőrön megszáradva rugalmas bevonatot képez. Haszn. eczema, prurigo stb. esetén ecsetelésre.

H. Cascarae sagradae cortex. (Rhamnus Purshiana. Rhamneae). Hatóanyaga az oxymethylantrachinonok közé tartozik. Kitűnően használható enyhe hashajtó. Adaga porban (caps. amyl.) 0,25 pro dos. Főleg a köv. készítményei használtatnak:

H. Extractum cascarae sagradae fluidum. Adag 20—30 csepp pro dos. 1—4-szer napj.

Extractum cascarae sagr. siccum. Mint laxans 0,06—0,12, mint catharticum 0,2—0,5 pro dos.

Vinum cascarae sagradae. Nagyon elterjedt s kedvelt készítmény. Jól haszn. a Rozsnyay-féle bor, melynek alig van keserősége. Adag: 2 evők. v. egy tokaji pohárral egyszerre.

Cascarine Leprince. A kéreg hatékony anyagait tartalmazza. Narancsszínű jegecztűk. Adag porban, pilulában 0,1—0,3. Vannak készen 0,1 gmot tart. pilulák.

Pilulae aperientes Kleewein (Extr. Cascarae sagr., Extr. Rhei clin., Podophyllin, Extr. Bellad.) bevált laxans, káros mellékhatás nélkül. (Lásd hirdetést.)

Vinum cascarae sagradae sec. Liebe biztos és állandó hatású, igen jóízű, kellemetlen mellék- v. utóhatást nem okozó, id. obstip. külön. eredm. hatású hashajtó. (L. hird.)

369 Rp. Pulv. Cascarae sagradae. 2,5.
Div. in dos. aequ. No. 10.
Det in caps. amylac.
S. napj. 2—4 dbot.

371 Rp. Vini Cascarae sagrad. 500
DS. 2 evők. egyszerre.

372 Rp. Extr. Cascarae sagrad. fluidi
Syrup. cort. Aurant. aa 30,0.
Aquae dest. aa 30,0.
MDS. 3-szor napj. 1 kk.
Obstip. habit.

374 Rp. Extr. Cascarae sagr. sicci.

Extr. Rhei aqu. aa 5,0.

Extr. Aloes aqu. 10,0.

M. f. l. a. cum guttis nonnull. spiritus vini pilulae No. 100.

Obduc. fol. argenti.

DS. Hashajtó labdacsook.
1—2 szemet este.

370 Rp. Extr. Cascarae sagradae fluidi 50,0.
leni calore inspissa, dein adde
Pulv. Liquir. qu. s. ut. f. l. a. pilul. No. 100.

Consp. pulv. Liquir.
DS. 2—3 szemet egyszerre napj. 2—3-szor.

373 Rp. Extr. Cascarae sagrad. fluidi 30,0.
Glycerini 60,0.
Aquae dest. 30,0.
MDS. 3—4 ór. 1 kk.
Obstip.

Cascarillae cortex. (Croton Eluteria. Euphorbiaceae). Hatóanyagai: illó olaj, gyanta, cascarillin (keserű anyag). Amarum, tonicum, ezenkívül jó szer hasmenésekkel összekötött dyspepsiáknál. Adag porban 0,5—1,0 pro dos., infusumban 10,0: 150,0 2 ór. 2 evők.

Extractum Cascarillae. Borszeszes kivonat. Pilulában, oldatban (zavarosan oldódik) adag 0,2—0,5 pro dos. napj. 3—4-szer.

Tinctura Cascarillae. Adag 20—50 csepp pro dos. 3 × napj.

375 Rp. Tinct. Cascarillae gtt. 10.
Aquae dest. 80,0.
Syrup. simpl. 10,0.
MDS. 2 ór. 1 kk. v. gyk.
1—2 éves gyermekeknek dyspepsiás hasmenésnél.

376 Rp. Extr. Cascarillae Pulv. cort. Cascarillae aa 3,0.
M. f. pilul. No. 30.
Consp. Pulv. Cinna-momi.
DS. 3 × napj. 1—2 szemet.

Sagrada Barber kiváló purgans, komprimált, kakaóval bevont tabletták (tektolettes). (Lásd hird.)

Regulin (Agar-Agar + 20% Extr. casc. sagr. aquos.) kitűnő hatású obstipatio habit. eseteiben. (L. hird.)

H. Castoreum. Kiszáradva gyantaszzerű, kemény, sötétbarna, fénylő, sajátos erős szagú, aromás-kesernyős ízű, borszeszben oldható, porrá törhető állati váladék. Hatóanyagok: gyantás anyag és illatos olaj. Excitans, antispasmodicum. Bels. adag porban, pilulában, pastillában 0,1—1,0 pro dos. napj. többször.

Tinctura Castorei. Haszn. mint a castoreum. Bels. adag: 20—30 csepp pro dos. napj. többször.

377 Rp. Castorei 1,0.
Elaeosacch. Menthae 4,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
DS. ór. 1 port,
Excitans.

378 Rp. Tinct. Castorei 15,0.
• Aquae Cinnam. spir. 50,0.
Symp. cort. Aurant. 25,0.
MDS. 2 ór. 1—2 kk.
Excitans.

379 Rp. Castorei
Camphorae trit. aa 2,0.
Extr. et. pulv. rad. Li-
quirit. aa qu. s.
ut. f. pilul. No. 30.
Obduc. gelatina
DS. 3—4-szer napj. 3—4
szemet, Excitans.

380 Rp. Tinct. Castorei
Tinct. Valerian. spirit.
aa 10,0.
MDS. 3-szor napj. 20—30.
cseppet.
Hysteriás göresök ellen.

Catechu pallidum. Az Acacia Catechu fájából készült kivonat. Könnyű, barnásszürke, kagylós törésű darabok; íze összehúzó, fanyar. Legnagyobb része oldódik vízben, borszeszben. Hatóanyaga catechu-csersav. Adstringens. Haszn. mint az acid. tannicum. Adag bels. porban, pilulában 0,1—0,5 pro dos. napj. többször. Belőle *tincturát* is készítenek.

381 Rp. Catechu pallidi 4,0.
Pulv. Doveri 1,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
Det. in caps. anylac.
S. 2 ór. 1 port.
Diarrhoea ellen.

382 Rp. Catechu pallidi 10,0.
Sacchar. alb. 40,0.
Mucil. Gummi arab.
qu. s.
ut. f. trochisci No. 50.
DS. Napj. 4—8 szemet.
Diarrhoea.

383 Rp. Tinct. Catechu
Tinct. Opii aa 2,0.
Zinci sulf. 0,5.
Plumb. acet. bas.
sol. 1,0.
Aquae dest. 100,0.

MDS. Külsőleg. Ricord-féle
emul-io néven is-
mert folyadék.
Húgycsőbe fecs-
kentetessék idült
kankó ellen. Hasz-
nálat előtt felrázni.

Cava-Cava l. Piper Methysticum.

Cellotropin. Monobenzoylarbutin. Fehér, íztelen és szagtalan por. Vízben nehezen, alkoholban jól oldható. Szervezetben hasad benzoésavra, hydrochinonra és glycosé-ra. Arbutin helyett haszn. bels. por alakban 0,30—0,50 gm. 3-szor napjában.

H. Centaurii herba. (Gentianeae.) Hatóanyaga keserű anyag. Amarum. Adag infusumban 5,0—15,0 : 150,0 2 ór. 1 evők. Keserű theakeverékek egyik megszokott alkatrésze.

Extractum Centaurii. Sűrű, vizes kivonat. Amarum. Adag 0,5—2,0 pro dos. oldatban. Gyakran haszn. mint pilulaanyag.

II. Cera alba. Protectivum. Bels. emulzióban diarrhoeánál, dysenterianál. Vele készül számos kenőcs, emplastrum, a charta cerata s a cereoli medicati (bongies médicales).

384 Rp. Cerae albae 15,0.
leni calore liquefac
in mortario calefacto,
adde
Gummi arab. 10,0.
Aqua dest. 150,0.
f. l. a. emulsio
cui adde
Tinct. Opii croc. 1,0.
Syr. Menthae. 10,0.

MDS 2 ór. 1 evők. Diarrhoea.

385 Rp. Cerae albae 5,0.
Olei Amygdal. dulc. 35,0.
Cetacei 10,0.
leni calore liquefac-
tis refrigeratisque
adde
Aquae Rosar. 5,0.
Tinct. Benzoes 2,0.
M. f. l. a. ungu.

DS. Cold-cream.

H. Cera flava. Haszn. mint a cera alba.

Ceratum Cetacei. Részint mint protectivum, részint mint a bőrre alkalmazandó szerek vivőanyaga haszn.

Cerium oxalicum. Fehér, szemcsés, légálló por, szagtalan, sem vízben, sem borszeszben nem oldódik, sósavban igen. Cardialgia, csillapíthatlan hányás (terhesek) ellen bels. adag porban 0,06—0,2 pro dos. napj. 3—4-szer.

Cerolin. Az élesztő zsíros anyaga calcium-vegyületekkel, kevés cholesterinnel és aether. olajjal. Hashajtó. Furunculosis ellen dicserik. Adag pilula alakjában 0,10 pro dosi.

H. Cetaceum s. Sperma Ceti. Hófehér, fénylő, lemezesen jég-czes, áttetsző, zsíros tapintatú, szagtalan, íztelen állati zsíradék. Főleg palmitinsavas cetylaether. Kenőcsök, ceratumok készítésénél fontos anyag.

H. Chamomillae vulgaris flores. (Compositae.) Hatóanyaga illó olaj. Illatos theakeverékek gyakori alkatrésze. Infusuma (15,0—20,0 : 150,0) jó vivőanyag. Bőrbajoknál, ha tiszta vízzel lemosás ellenjavalt (pl. eczema), a vele készült langyos thea jól használható mosogatások alakjában.

H. Tinctura Chamomillae. Napj. 3—5-ször 30 csepp 1 kk.

H. Charta sinapisata l. Sinapis nigra.

Chelidonium phosphoricum

Chelidonium sulfuricum

Chelidonium tannicum

} Gyomor-, belfájalmak
esetén mint az opiá-
tok 0,1—0,2 pro dos.

Chinakéreg és készítményei.

- II. Chinae succirubrae cortex.** Egyedül hlv, chinakéreg. *Cinchona succirubra* (Rubiaceae) törzsének és nagyobb ágainak kérge. Főhatóanyagai chinin ($C_{20}H_{21}N_2O_2$), chinidin (isomer a chininnel), cinchonin ($C_{20}H_{21}N_2O$), cinchonidin (isomer a cinchoninnel). Az alkaloidokból gyk. szerint 6%-ot tartalmaz. Amarum, tonicum. Adag: decoctum 1 : 10 vízzel v. vörös borral.
- II. Extractum Chinae siccum.** Szeszkes kivonata a cort. chinae succirubr.-nek. Száraz, porítható. Csersavtartalma tetemes, alkaloidtartalma 12% legyen. Tonicum, adstringens. Adag porban, pilulában 0.5—2,0 többször napj.
- H. Extr. Chinae fluidum.** Folyékony kivonat, 4% alkaloid-tartalommal. Az extr. chinae fl. mint tonicum, amarum kávéskanalanként napj. 3—5-ször.
- Extr. Chinae Nanning.** Folyékony kivonat kb. 5% alkaloid-tartalommal. Úgy haszn., mint a magyar hlv. extr. fluid. készítm. melynél kissé erősebb.
- H. Tinctura Chinae.** Cort. chinae succirubr.-ből készül. Tonicum, stomachicum. Adag 20—50 csepp sőt kknyi is pro dos. napj. többször.
- H. Tincture Chinae comp. s. Tinctura roborans Whyti.** Cort. chinae succirubr. mellett rad. gentianae, flavedo cort. aurant. és cort. cassiae cinnamomi is használtatik készítéséhez. Tonicum, stomachicum. Adag 20—25 csepp—kknyi pro dos. napj. többször.
- H. Vinum Chinae.** Tokaji borral és tinct. aromaticával készül. Tonicum. Adag gyermekkanálnyi, tokaji pohárnyi 2—3× napj.
- 386 Rp.** Cort. Chinae succirubr. pulv. 15,0.
Elixir acid. Halleri 2,0.
Vini rubri 200,0.
f. l. a. decoctum.
cui adde
Syrup cort. Aurant. 20,0.
MDS. 2 ór. 1 evők. Tonicum. Felnőttnek
- 387 Rp.** Extr. Chinae fl. 0,2-0,4.
Aquae dest. 100,0.
Syrup. simpl. 15,0.
MDS. 2 ór. kk. v. gyk. 1—4. éves gyermekeknek. Tonicum.

Extr. Chinae Nanning a legjobb stomachicum, javalt: sápkórosok, görvélyesek és tuberk. étvágytalansága ellen, pangásos icterusnál, gyomoratonianál, ideges dyspepsiánál stb. (L. hird.)
Vinum ferro chinae sec. Kriegner a legjobb tokaji chinavasbor, valódi 5 puttonos tokaji borból készül. (L. a szemben levő hird.)

Stoll diet. Kola-készítményei: Kola-bor, Kaiser-Kola elixir, Kola elixir, Kola granulé stb. kitűnő gyomorzsongító és idegerősítő szerek. (L. hird.)



Vérszegénység,

étvágytalanság, idegesség gyógyítására és gyenge gyermekek, valamint felnőttek, sápkóros fiatal leányok erősítésére a legkitünőbb készítmény az orvosok és tanárok által is ajánlott

Kriegner-féle

Tokaji China vasbor

Az Országos Egészségügyi Tanács is méltatta ez itál kiváló sajátságait, így tehát nem téveszthető össze más hasonló szerekkel. — Valódi 5 puttonos tokaji borból készül, nagyon kellemes ízű. Hatása biztos, az egész idegrendszert megerősíti.

Kis üveg ára ... K 3.20

Nagy üveg ára ... K 6.—

Egyedüli főraktár :

Korona Gyógyszertár

Budapest, VIII. Kálvintér. (Baross-utca-sarok.)

Postai szétküldés naponta utánvétellel, vagy a pénz előleges beküldése után.

Extractum Chinae 'Nanning'

klváló tonlcum és roborans,

a legjobb stomachicum.

A kinakéregből előállított, elismerten leg-
tisztább készítmény.

Alkoholmentes — tisztán oldódik! Gyanta
és viasz nélkül — könnyen felszívódik.

Állandó alcaloida-tartalom 5^o/_o!

Ajánlják a következő tanárok: *Pertik*
Budapest, *Rokytansky* Graz, *Zuckerlandl*
Wien, *Sternberg* Wien, *Knapp* Prag, *Schulze*
ő exc. Jena, *Beuthner* Genf, *Risom* Kopen-
hagen, *Bonazzola* Miláno, és még sokan!

INDICÁLVA VAN: Sáp-kórosok étvágytalansága
ellen, görvélykórosok és gümőkórosok étvágytalansága
ellen, heveny és idült gyomorhurut ellen,
gyomor-atonlánál, lázasoknál és sebesülteknél,
lábbadozóknál, ideges dyspepsia ellen, alkoholisták-
nál, terhesek hányása ellen, pangási icterusnál,
higany- és jodkáli dyspepsia ellen, maláriánál.

Eredeti üvegje á 50 gr. vörös kartonban
névaláírással 2.— korona.

Minden gyógyszerárban kapható.

Adagolás: 20—25 csöpp felnőtteknek, 5—10 csöpp gyer-
mekeknek 3 szor naponta $\frac{1}{2}$ —1 órával étkezés előtt
vizben, cukros vízben; édes borban vagy tetszés
szerinti keverésben.

Mintát és irodalmat díjmentesen küld:

Dr. H. Nanning

den HAAG. Hollandia.

388 Rp. Cort. Chinae succir.
Carbonis ligni \overline{aa} depur.
 \overline{aa} 100,0.
M. f. pulv. subtiliss.
DS. Hintőpor putrid se-
bekre.

390 Rp. Tinct. Chinae comp.
Tinct. Rhei vinos.
 \overline{aa} 1,0.
Aquae dest. 100,0.
Syrup cort. Aurant.
20,0.
MDS. 2 ór. 1 kk. v. gyk.
1—3 éves gyermek-
nek. Stomachicum.

392 Rp. Tinct. Chinae comp.
Tinct. cort. Aurant.
 \overline{aa} 20,0.
Tinct. Nucis vomicae
10,0.
MDS. 3× napj. 20—30
cseppet.
Amarum. Tonicum.

393 Rp. Extr. Chinae fluidi
3,0—5,0.
Aqua dest. 80,0.
Syr. cort. Aur. 100,0.
MDS. Háromszor naponta
1 evőkanállal. Sto-
machicum.

389 Rp. Extr. Chinae. sicc.
Extr. Centaurii
 \overline{aa} 5,0.
Pulv. rad. Rhei chin.
qu. s.
ut. f. pilul. No. 50.
Consp. pulv. Cinnam.
DS. 3× napj. étkezés
előtt 2—3 szemet.
Stomachicum.

391 Rp. Decoct. Chinae suc-
cinbrae e 4,0.
l. a. p. ad. colat.
100,0.
Acid. sulf. dilut.
gtt. 10.
Syrup. cort. Aurant.
15,0.
MDS. 2 ór. 1 gyk. 5 éven
túli gyermekek-
nek morb. macul.
Werlhof-nél, scor-
butnál v. recon-
valescentia tar-
tama alatt.

394 Rp. Extr. Chinae fl. 2,5.
Medullae ossium
bovis 25,0.
Olei Lavand. gtt. 3.
M. f. ungu.
DS. Hajkenőcs.

Hivatalos chininsók.

II. Chininum seu Chininum hydratum. ($C_{20}H_{24}N_2O_2$,
 $3H_2O$). Fehér, selyemfényű, tűalakú jegeczekből álló por.
Keserű, lúgos kémhatású; vízben alig, borszeszben elég jól
oldódik. Gyógyezélokra sói használatnak.

Extr. Chinae Nanning a legjobb stomachicum, javalt: sáp-
kórosok, görvélyesek és tuberk. étvágytalansága ellen, pangásos
icterusnál, gyomoratonianál, ideges dyspepsiánál stb. (L. hird.)
Nural diet. digestivum és mesterségesen megemésztett tápláló-
és erősítőszér, kitünően bevált gyomorbetegségeknél, anaemia, chlo-
rosis, reconvalescentia, phthisis, cachexia, hyperemesis, gravid.
eseteiben. (L. hird.)

Pankreon kitünő stomachicum, ideges emészt. zavarok, étvágy-
hiány, alkohol- és nikotin-károk, diabetes eseteiben, hatásos
roborans reconvalescentiában (L. hird.)

H. Chininum bisulfuricum. ($C_{20}H_{24}N_2O_2, H_2SO_4, 7H_2O$). Színtelen, hasábos kristályok, levegőn elmállanak; 11 sr. vízben, 32 sr. borszeszben oldódik. Oldata savanyú kémhatású. Antitypicum (antimalaricum), antipyreticum (dos. totalis), tonicum, amarum (dosis refracta). Adag bels. dosis totalis 1,0–1,5, míg a dos. refracta 0,05–0,2 napj. 3–5× porban, pilulában, pastillában, oldatban. Subcután a hivatalos chininsók közül ezen készítmény használatát, mert vízben legjobban oldódik.

H. Chininum hydrochloricum. ($C_{20}H_{24}N_2O_2, HCl, 2H_2O$). Fehér, selyemfényű, többnyire összegomolyodó jegeczkék. Keserű ízű. 34 sr. vízben, 3 sr. borszeszben oldható. Oldata neutralis kémhatású. Antipyrin, phenocoll és urethan rendkívül fokozzák az oldhatóságot, így hogy antipyrin segítségével 50%-os oldat is készíthető, a mi, ha a chinint bőr alá kell fecsk., igen előnyös. Hatás, használat, adag mint a chinin. bisulf. Subcután ritkábban.

H. Chininum sulfuricum [$(C_{20}H_{24}O_2N_2)_2H_2SO_4, 7H_2O$]. Igen finom, hajlékony, tűalakú, gomolyokká összetapadó, selyemfényű, keserű ízű kristálykák; száraz levegőn elmállanak 800 sr. hideg, 25 sr. forró vízben, 60 sr. hideg, 6 sr. forró borszeszben oldódik. Ha vízben oldani akarjuk, néhány csepp acid. sulf. dilutum veendő. Hatást, használatot, adagot l. chinin. bisulfuricumnál.

H. Chininum tannicum insipidum Rozsnyai. 100 részben 30–32 sr. chinin. Sárgás színű, íztelen por, vízben alig, 40 sr. borszeszben oldódik. Hatás, használat, mint a chinin. bisulf. Adag $2\frac{1}{2}$ –3-szor annyi, mint a chinin. bisulf.-ból.

H. Chininum ferro-citricum. Fénylő, kissé áttetsző, vörösbarna lemezek, keserű ízűek, 3 r. vízben oldódnak. 9% chinint és 30–32% vasoxydot tartalmaz. Haszn. chlorosisnál, olygaemiánál, scrophulosisnál. Adag porban, pilulában v. oldatban 0,2–0,5 pro dos. 3–4-szer napj. Főleg a gyermekgyakorlatban haszn. Az ú. n. tokaji china-vasas borokat legtöbbször chin. ferr. citr.-al készítik.

Extr. Chinae Nanning a legjobb stomach., jav.: sápkór, görv. és tuberk. étvágyt., pang. icterus, gyomoratonía, ideg. dysp. ellen. (L. hird.)

Sztraka-féle chinin-bonbon 0,25 gr. chinin-tannát-tartalommal (megfelel 0,10 gr. chinin sulf.-nak). (L. hird.)

China-Ferr-Dragée Nagy orig. anaemia, chlorosis, neurasthenia, cachexia, marásimns eseteiben a legjobb haematikum, tonikum és roborans. (L. hird.)

Antipyreticum: Rp. Gelodurat „Poli“
scat. orig. c. Chinin. sulf. 0,25.
S. 2–3-szor naponta 1 drbot.

- 395** *Rp.* Chinini hydrochlor 2,0.
Natrii chlor. 0,15.
Aquae dest. 20,0.
M. f. sol.
DS. Intravenosus befecs-
kendezésre. Haszn.
előtt fel kell forral-
ni és szűrni.
- 397** *Rp.* Chinin. sulfur. 1,5.
Pulv. folior. Digi-
talis.
Opii pur. pulv. aa 0,3.
Succi Liquirit. qu. s.
ut. f. pilul. No. 30.
DS. 3-szor napj. 1—3 sze-
met.
Pilul. Heimi. Phthi-
sisnél.
- 399** *Rp.* Chinin. hydrochlor.
1,0.
Aquae dest. 100,0.
f. solut. admisce
Vitellum ovi unius
Tinct. Opii simpl.
gtt. 10.
DS. Két csőrének. Anti-
pyreticum.
- 401** *Rp.* Chinin. sulfur.
Ferri sulfur. aa 1,5.
Pulv. et extr. Li-
quirit. qu. s.
ut. f. pilul. No. 30.
Consp. pulv. Liqui-
ritiae.
DS. 3-szor napj. 3—3 sze-
met.
Anaemia, chlorosis.
- 396** *Rp.* Chinini bisulfur 2,0.
Ung. Glycerini 18,0.
M. f. ope aquae ungu.
DS. Prophylacticum ery-
thema solare ellen,
az ultraviolette su-
garak elnyelése czél-
jából. Külsőleg ke-
nőcs.
- 398** *Rp.* Chinin. sulfur.
1,0—1,5.
Div. in dos. aequ.
No. 2.
DS. Félórai időközben,
3—4 órával a ma-
láriás roham előtt
veendő be a két
por, vagy mint
antineuralgicum
a fájdalomroham
elején.
- 400** *Rp.* Chinin. hydrochlor.
2,0.
Div. in dos. aequ.
No. 4.
Det. in caps. amylac.
S. 3—4 órával a várt
roham előtt 2 port,
¼ órai időközök-
ben. Antimalari-
cum, antineural-
gicum.
- 402** *Rp.* Chinini hydrochlor 3,0.
Antipyrini 2,0.
Aquae dest. 6,0.
MDS. Bőr alá fecskendezés-
re. Nem fájdalmas.

Extr. Chinae Nanning a legjobb stomachicum, javalt: sáp-
kórosok, görvélyesek és tuberk. étvágytalansága ellen, pangásos
icterusnál, gyomoratonianál, ideges dyspepsiánál stb. (L. hird.)

China-Ferr-Dragee Nagy orig. anaemia, chlorosis. neu-
rasthenia, cachexia, marasmus eseteiben a legjobb haematikum,
tonikum és roborans. (L. hird.)

Nural, diet. digestivum és mesters. megemésztett tápláló- és
erősítőszer. kit. bevált gyomorbajoknál, anaemia, chlorosis,
reconvalescentia, phthisis, cachexia, hyperemesis gravid. esetei-
ben. (L. hird.)

403 *Rp.* Chinin. bisulfur. 1,0.
Aqua dest. 11,0.
M. filtra.
DS. Bőr alá fecskendesre.

405 *Rp.* Chinin. bisulfur. 2,0.
Aqua dest.
Syrup. Mororum.
 \overline{aa} 50,0.

MDS. Febris interm. malarica esetén felét egy óra alatt elfogyasztani 3—4 órával a várt lázroham előtt.

406 *Rp.* Chinini ferro-citrici
0,3—0,6.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10.
DS. 3—4 ór. 1 port.
4—8 éves gyermeknek.

408 *Rp.* Chinin tannici 3,0.
Pastae cacaotinae sacch. qu. s (20,0).
ut. f. trochisci No. 10.
DS. Rendelet szerint.
Chinin-chocolade.
1 trochiscus 0,1 chinint tartalmaz.
Gyermeknek váltólázásrohamelőtt 3 órával 1—3 drb.

404 *Rp.* Chinin. sulfur.
0,4—0,6.
Aqua dest.
Syrup. Rubi Idaei.
 \overline{aa} 40,0.
Acid. sulfur. dil. gttas qu. s. ad perfect. solut.

DS. 2—6 éves gyermeknek váltóláznál; lázmentes időben a szer felét, ór. 1 gyk.

407 *Rp.* Chinini ferro-citr. 2,0.
Pulv. rad. Gentianae 1,0.
Sacchar alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10.
DS. 2 ór. 1 port. Chlorosis, olygaemia.

409 *Rp.* Chinin. tannici.
Natrii bicarbon.
 \overline{aa} 0,5.
Lactucarii german. 0,2.
Sacchar. albi. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10.
DS. 4 port napj. 4—6 éves gyermeknek.
Phthisis.

Nem hivatalos chininsók.

Chinaphenin. Chininnek phenetidinnel való vegyülete. Íztelen vízben nem oldh. por. Antipyreticum, antineuralgicum. Felnőtteknek 1,5—2,0, gyermek. 0,15—0,3 pro dos. és pro die.

Chinaphтол. Sárgás, jegeczes, keserű, vízben nem oldh. por. Bélben hasad 3 naphtolsulfonsavra és chininre. Bélantisepticum. Adag. bels. 0,5 napj. többször porban.

Extr. Chinae Nanning a legjobb stomachicum, javalt: sápkórosok, görvélyesek és tuberk. étvágytalansága ellen, pangásos icterusnál, gyomoratonniánál, ideges dyspepsiánál stb. (L. hird.)

Neuralgia: *Rp.* Gelodurat „Pohl“

scat. orig. c. Chinin. sulf. 0,25.

S. 2—3-szor naponta 1 dbot.

Chininum aethylo-sulfuricum. [$C_{20}H_{21}N_2O_2.(C_2H_5)SO_4$.] Fehér, nehezen jegeczíthető, vízben jól oldható anyag. Bőr alá fecskendésre ajánlották. Subcután 0,2—0,5 gm. pro dos.

Chininum arsenicicum. Fehér, amorph, vízben neh. oldh. por. Egyenlő r. chinint s arsensavat tartalmaz. Nagy vigyázat! Adag 0,005—0,01 pro die. Jobb nem használni!

Chininum bimuriaticum carbamidatum. 70% chinint tartalmaz. Hosszú, fehér, prismaticus jegeczek = sr. vízben oldatnak. Kitiűő készítmény bőr alá fecskendés czéljaira. Hosszabb időn át nem tartható, bomlik. Antipyreticus adag 0,2—0,5 pro dos. 2—3-szor napj.

410 *Rp.* Chinin. bimuriatici
carbamid. 2,0.
Aquae dest. 8,0.
M. filtra.

DS. Bőr alá fecskendésre.
1 fecskendőben 0,2.
gm. van a készítményből.

Chininum glycerino-phosphoricum s. Kineurin. Színtelen jegeczttűcské. 68% chinint tart. Mint tonicum (neurastheniásoknál) 0,1—0,2 2—3× napj.; mint antineuralgicum 0,3—0,6 egyszer napj. porban, pilulában.

Chininum hydrobromicum. ($C_{20}H_{21}N_2O_2.HBr.2H_2O$.) Színtelen, fénylő, légálló, szagtalan, vízben elég jól oldódó jegecz. tűk. Malariás neuralgiák ellen ajánlották. Adag bels. 0,1—0,5 pro dos. pilul. v. oldatban. Bőr alá fecsk. 10%-os oldat, melyhez glycerin is tehető.

Chininum lygosinatum (Dr. Fabinyi). Salicylaldehyddel készül synthetice. Narancsvörös por, víz nem oldja, alcohol, benzin, chloroform igen. 70-80% chinin-tartalmú. A sebkezelésben antisepticus hintőpornak haszn. vagy mint gaze, glycerin-suspensió. Igen jó készítmény.

Chininum salicylicum. ($C_{20}H_{21}N_2O_2.C_7H_6O_3.H_2O$.) Fehér, laza jegeczek, hideg vízben nehezen, borszeszben könnyebben oldódnak. Egyesíti a chinin és salicylsav hatásait. Antipyreticum. Adag 0,1—0,5 pro dos. porban. 3—4-szer napj.

Extr. Chinae Nanning a legjobb stomachicum, javalt: sápkórosok, görvélyesek és tuberk. étvágytalansága ellen, pangásos icterusnál, gyomoratonianál, ideges dyspepsiánál stb. (L. hird.)

Stoll dietétikus Kola-készítményei: Kola-bor, Kaiser-kola-elixir, Kola-elixir, Kola-granulée stb. kitiűő gyomorzsongító és idegerősítő szerek. (L. hird.)

Febris intermitt.: *Rp.* Gelodurat „Pohl“
scat. orig. c. Chinin. sulf. 0,25.
S. 2—3-szor naponta 1 dbot.

Chinidinum sulfuricum seu Conchininum sulf. s. β
Chininum sulf. Isomer a chininum sulf.-al. Finom, tűlakú, színtelen, keserű ízű jegeczek. Vízben könnyebben oldódik, mint a kénsavas chinin. Hatás, használat, mint a chininsóknál. Hatása a chinin. sulf.-éhoz úgy viszonylik, mint 3:5 : 4.

Cinchonium sulfuricum. $[(C_{20}H_{24}ON_2)_2 H_2SO_4 \cdot 2 H_2O]$
 Nagyobb, épszögű hasábokból álló kemény jegeczek; kevésbé keserű, mint a chinin sulfur. 60 r. vízben oldódik, 7 r. tömény borszeszben. Hatása, használata, mint a chinin. sulfuricumé, adaga azonban félszer nagyobb legyen.

Chinoformin l. Chinotropin.

*

Chinolinum. Színtelen, olajszerű, erősen fénytörő, keserű mandolaolaj-szagú folyadék. Vízben nehezen, borszeszben könnyen oldódik. Antisepticum, s mint ilyen száj-, torokvíznek haszn. 1,0:500,0 (kevés borszesz segélyével feloldani); diphtheritisnél torokecsetelésre 5%-os vizes borszeszes oldat. Bels. ma már nem haszn.

Chinolinum tartaricum. Selyemfényű, színtelen, légálló, keserű mandolaolaj-szagú jegeczek; vízben elég jól oldódnak. Ize nem keserű. Bels. antipyreticum, antimalaricum (?). Adag porban, oldatban 0,5—1,5 pro dos. 3—4-szer napj. Obsolet.

Chinosol. Oxychinolintimsó Jegeczes, sárga por, összehúzó, aromás ízű. Oldh. vízben, nem oldh. alkoh. és aetherben. Oldh. tabletták vannak forgalomban. Antisepticum a kezek tisztítására sublimát helyett. Sebekre hintve nem mar. Hintőpornak 1:9 anylumra. Antisepticus oldatok 1:500—1000.

Chinotropin s. Urotropinum chinicum s. Chinoformin. Kétféle praeparatum van használatban: Chinotropin I. tartalmaz: 27% urotropint, 73% chinasavat. A chinotropin II. tart.: 20% urotropint, 80% chinasavat. Mindkettő fehér, vízben oldódó savanykás por. Húgysavas diathesis ellen: Dos. pro die 3,5—5,5 az I-ből és 5,0—7,5 a II-ből. Nagyobb adagoktól dysuriás tünetek jelentkezhetnek.

Chirol. Gyanták és olaj oldata alacsony forrponitú alkoholokban s aetherekben. Bőrre kenve, mint a collodium, azt egy hártával vonja be, mely borszeszszel lemosható. Sebészek chirol-al vonhatják be kezeiket gummikeztyűk használata helyett.

Chirosoter. Széntetrachlo idban oldott viasz és balzsamos anyagok. Spray alakjában használják a műtő kezeinek, valamint a műtői felületnek bevonására védelmiül fertőzések ellen. Szappannal és benzinnel lemosható. Égési sebekre is alkalmazható.

Chloralamid l. Chloralum formamidatum.


Chloralbacid. Chlorfelérje. 3% Cl. tart. Oldható, íztelen por. Gyomorrák, atoniás gyomorhurut, erjedés okozta gyomorégés, fel-

Piperazin Midy, a húgysav legjobb oldószere, kitűnő hatással van köszvény, csúsz, vesekőlika, húgyhomok, húgysavas diathesis eseteiben. (L. hird)

„LE FERMENT“ TÁRSASÁG

Metchnikoff tanár egyedüli szállítója

13, Rue Pavée, Paris.



LACTOBACILLINE

Az összes gyomor-bélbantalmakat kedvezően befolyásolja a **Lactobacilline** (Metchnikoff tanár módszere szerint előállított tej-erjesztő-anyag): mindenféle enteritisek, enterocolitis, dysenteriák, gümőkórosok és kis gyermekek hasmenése, bél-dugulás, májbajok, vesebetegségek, dyspepsia, arteriosclerosis, köszvény, húgyhomok, fehérje-vízelés, bőrbajok stb.

A **Lactobacilline** ezen javalatai nem csupán elméleti értékűek. Ezen tények teljesen megfelelnek a kísérleti és gyakorlati kórházi tapasztalásoknak.

A **Lactobacilline** hosszú ideig megtartja hatóképességét. Rendelhető czukros táplálékokkal együtt a következő főalakokban:

Lactobacilline-tabletták. 3—9 darab naponta étkezés után

Lactobacilline poralakban, ezzel mint a folyékony Lactobacillinel készíthetjük a savanyított tejet (1 tubus 1 literre).

Tessék külön leírást kérni!

Lactobacilline finom poralakban külön készűl sebészeti célokra. Utánzások elkerülése végett: Tessék minden dobozon megfigyelni a „**Lactobacilline**“-jegyet és hogy rajta legyen „**Metchnikoff tanár egyedüli szállító**“.

Nagyban való árusítás:

MM. Darrasse, Frères, 13, Rue Pavée Paris.

Kicsinyben kapható minden jobb gyógyszerárban.

P. F. W. Barella

universal gyomorpora

Kitüntetve: Paris 1889 és a lüttichi
világkiállításon 1905. év
aranyérem. Chicago 1893. Brüssel 1893.
Genf 1889. London 1893. Bécs 1891.
Magdeburg 1893. Mailand 1906. *caen*

Kitűnő gyógyszer minden gyógylt-
ható, még az idült gyomorbaajok ellen
is. Mindenütt elterjedt és ismeretes.
Dobozonként 3 korona 20 fill.



Valódi csak ezen védjeggyel.
!! Utánzásoktól óvakodjunk !!

P. F. W. BARELLA

több franciaországi orvosegylet tagja
BERLIN SW. Friedrichstrasse No. 220.

Főraktár Magyar-
ország részére:

Török József-nél
BUDAPEST, KIRÁLY-UTCA 12. SZÁM.

hűfögés eseteiben 0,5 grmos porokban vagy tablettákban (utóbbiak készen vannak).

†H. **Chloralum hydratum** [$CCl_3 CH(OH_2)$]. Szintelen, átlátszó kristályok; szaga gyengén szúrós, íze kesernyős, csípős; vízben borszeszben oldódik. Sedativum kis adagban, hypnoticum nagy adagban. Substantiában nem szabad adni! Ellenjavalt a gyomorlobos vagy fekélyes bántalmainál, szívbajoknál. Lázas bántalmak esetén csak kis adagban. Sedatív adag nyákos oldatban 0,1—0,5 pro dos. 2—3 ór. Hypnoticus adag oldatban, pilulában, vagy klystirben, suppositoriumban 1,5—2,5 egyszerre vagy két adagra osztva, lefekvés előtt. Bőr alá fecskendve tályogokat okozhat. Dos. maxim. sing. 3,0! dos. maxim. pro die 6,0! Gyer. 0,2—0,5; 80,0. 2 ór. 1 kk. v. gyk.

411 *Rp.* Chlorali hydrati 4,0.
Syrup. Menthae 60,0.

M. f. solutio.
DS. Lefekvés előtt felét
elfogyasztani.
Hypnoticum.

412 *Rp.* Chlorali hydrati 2,0.
Mucilag. Gummi
arab.

Aquae dest. aa 50,0.
MDS. Csőrének egyszerre
elfogyasztani.
Hypnoticum.

413 *Rp.* Chlorali hydrati 5,0.
Morphini hydrochlor.
0,05.
Aquae Menthae pip.
120,0.
Syrup. Menthae 30,0.

MDS. 2 ór. 1 evőkanállal.
Sedativum elme-
betegeknek.

414 *Rp.* Chlorali hydrati 10,0.
Olei Hyosiami fol
cocti 20,0.
Lanolini
Ungu. simpl. aa 50,0.
M. f. ungu.

DS. Kenőcs. Pruritusuál
a viszkető helyek
bekenésére.

415 *Rp.* Chlorati hydrati 3,0.
Butyri Cacao qu. s
ut. f. supposit. No. 3.
DS. 1 grmos chloralhydrat
suppositoriumok.
Este egyet elhasz-
nálni.

416 *Rp.* Chlorati hydr.
Camphorae.
Resorcini.
Ichthyoli aa 2,0.
Vasellini 5,0.
Gelanthi 45,0.
M. f. gelantham.

DS. Külsőleg. Bedörzsö-
lésre Pruritus ani.

Chloralum formamidatum s. Chloralamid. ($CCl_3.CHO.HCONH_2$) Fénylő, fehérés, nagyobb jeccek, kesernyős ízűek. Hideg vízben lassan oldódik, borszeszben jobban. 60° C.-on túl nem szabad hevíteni, sem alkáliakkal összehozni, mert akkor komponenseire, n. i. chloralra (hydrat) és hangyasavas ammon-ra hasad szét. Hypnoticum. A vérben chloral hasad le belőle, innen hatása. Hypnoticus adag 1,0—2,0—3,0 pro dos. oldatban. Feljebb menni veszélyes lehet (!). 3,0 chloralamid = 2,0 chloralhydrát. Szívbajosoknál vigyázat (!).

cseppekben *tiszta chloroform*-ot ne rendeljünk, hanem azt vagy vízben felrázva v. nyákos vehiculumban elkeverve adassuk be. Bels. tengeri betegség, hasmenések, bélférgek, cardialgia, erjedés a gyomorban, hyperemesis ellen (sőt typhus abd. esetén is) 5—20 csepp! Narcosist előidézendő, ügyeljünk a chl. tisztaságára (M. Gyk. kémlései). Előnyösnek tartják nemelyek az ú. n. *vegyes narcosisokat* is. Ez úton is chloroformot takaríthatunk meg, a mi a narcosis veszélyességét csökkenti. 1. Angliában divatos az *A-C-E keverék* ily célra: 1 vol. alkohol + 2 vol. chlorof. + 3 vol. aether. 2. A *Billroth keverék*: 100 r. chlorof. + 30 r. alkohol + 30 r. aether. 3. *Schleich keverék*: 15 r. chlorof. + 5 r. aether petrolei + 60 r. aether. 4. *Somnoform* l. e. cz. a. 5. *Brann-féle vegyes narcosis* chlorof. és aetherrel történik, melyek a Junker-féle készülék segélyével jönnek használatba; e készülék a két anyag mennyiségének egymáshoz való viszonyát szükség szerint regulálni engedi meg. 6. *Oxygen-chlorof. narcosis* (Wohlgenuth) igen előnyös. Ez a *Roth-Dräger-féle* liibeek-i készülékkel történik. Van oly készülék is n. a. céztől, mely az aether-chloroform-oxygen narcosist is megengedi.

†H. **Chloroformium ad usum externum.** Kevésbbé tiszta mint az előbbi készítmény. Narcosis céljaira nem használható. Linimentum alakjában a bőrre dörzsölve elvonó, fájdalomcsillapító neuralgiák, rheumatismus eseteiben. Cseppekben gyomorba vive, néha jól hat hyperemesis, colica, tengeri betegség, hemi-crania eseteiben is. Ajánlották taeniák ellen is.

H. **Aqua chloroformiata.** L. e. cz. a.

H. **Oleum chloroformiatum.** L. e. cz. a.

- | | |
|--|---|
| <p>419 Rp. Chloroformii
Ol. Hyosciami aa 20,0.
M. f. linim.
DS. Külsőleg, bőr bedörz-
sölésére.
Neuralgia, rheuma-
tismus.</p> | <p>420 Rp. Chloroformii 10,0.
Cerae alb. 5,0.
Adipis Snulli 85,0.
M. f. ungu.
DS. Kenőcs.
Pruritus.</p> |
| <p>421 Rp. Chloroformii 4,0.
Syr. simpl. 40,0.
MDS. 3 részre osztva 1
óra alatt vízben
bevenni. Taeniák.</p> | <p>422 Rp. Chloroformii 3,0.
Spiritus vini 12,0.
Tinct Absinth comp. 15,0.
MDS. 20—50 cseppet víz-
ben. (Colica, ten-
geri betegség, he-
micrania).</p> |
| <p>423 Rp. Chloroformii
Tinct. jodi aa 5,0.
MDS. Jól felrázva 5 csep-
pet egyszerre, Hy-
peremesis.</p> | <p>424 Rp. Chloroformii 8,0.
Camphorae 1,0.
MDS. Gyapotra felvéve
odvas fogba.</p> |

Ascher-féle javított mesterséges fogzománczot szállít
a General Dental Manufacturing Co. m. b. H., Berlin W/8,
Jägerstrasse 61. (L. hird.)

Chloryl, l. *Aethylum chloratum*.

Cholelysin. Állítólag cholagogum. Icterus catarrhalis és epekövek ellen haszn. Kétféle van; az egyik *ch. siccum*, szappanpor + 13% fehérje; a másik *ch. liquidum*, 20% szappan (olajsavas natr.) + 3% felh. Adagok: a siccumból 0.5–1.5 gm, a liquidumból 1–2 kk. pro die.

H. Chorda aseptica. Cat. gut. Juhbélből készült húrok, melyek sebészeten, mint varróanyag használtatnak. Jódos jódkalium + formaldehyd-oldatban tartandók el.

Chrisoformium. Dibromdijodohexamethylentetramin. Sárga, gyengén jódszagú, vízben, alkoholban oldhatlan por. A jodoform pótszere. Hintőpornak, kenőcsnek mint a jodoform.

Chrysarobinum, l. *Araroba*.

H. Cinae flores. (*Artemisia Cina Compositae*). Hatóanyagai santonin és illó olaj. Virágok ma már ritkán használtatnak, helyettük inkább a santonin.

†**H. Santoninum**. ($C_5H_8O_3$). Santonsav-anhydrid. Színtelen, hasábalakú vagy pikkelyes kristályok. Vízben alig, borszeszben is kevésé oldódik. Haszn. ascariis lumbricoides elűzésére. Adag porban, pastillában gyermekeknek 0,02–0,04 pro dos. napj. 3–4-szer, felnőttnek 0,05–0,1 !! pro dos 3–4-szer napj. Pastillák már készen is a gyógyszertárakban. Dos. maxim. pro die 0,3!

†**H. Pastilli Santonini**. Egy darabban 0.025 gm. santonin van.

425 Rp. Pastilli Santonini
No. 10.
. *DS.* 2–3 dbot napjában,
3–8 éves gyermek.

426 Rp. Santonini 0,2–0,4.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in
dos. aequ. No. 10.
DS. Délelőtt 3–4 port,
d. n. 1/2 pohár ke-
serűvíz. 3–8 éves
gyermek.

Pilules du dr. Séjournet, 0.025 gr. Santonint tartalmazó pilulák a diabetes kezelésére. adag: minden étkezéskor egy labdac. (L. hird.)

Sztraka-féle giliszta-csokoládé (0,06 gr. santonin 0,06 gr. phenolphthalein) kit. bevált az ascar. lumbric. elűzésére. (L. hird.)

Ascaris lumbric: *Rp.* Gelodurat „Pohl”
scat. orig. c. ol. chenop. gtt. XII.
c. Menthol.
S. 3-szor naponta 2 dbot.

Ascaris lumbric: *Rp.* Gelodurat „Pohl”
(gyermekek részére) scat. orig. c. ol. chenop. gtt. V.
c. Menthol.
S. 3-szor naponta 1–2 dbot.

427. *Rp.* Santonini 0,12—0,3.

Calomelanos

0,06—0,2.

Sacchar. alb. 3,0.

M. f. pulv. div. in.

dos. aequ. No. 6.

DS. Reggel, este 1 port.

3—8 éves gyermek.

Cinchoninum sulfuricum, l. nem biv. Chininsók cz. a.

II. Cinnamomi Cassiae cortex. (Laurineae). Hatóanyaga illó olaj, kevés csersav, gyanta. Porá pilulahintő por, íz- és szagjavító; a kéregdarabok keserű v. illatos theakeverékek s tincturák készítéséhez használatnak.

Aqua Cinnamomi simplex. Szagjavító vehiculum.

H. Aqua Cinnamomi spirituosa. Szagjavító vehiculum.

H. Syrupus Cinnamomi. Íz- és szagjavító.

H. Tinctura Cinnamomi. Keserű vagy illatos tincturák alkatrésze. Stomachicum. Adag 25—30 csepp pro dos. napj. többször. Szokásos menorrhagiák ellen is adagolni.

H. Oleum Cinnamomi Cassiae. Illatos olaj. Szagjavító. Elaeosaccharum készítéséhez haszn.

Citarin. Anhydromethylenczitromsavas natrium. Fehér, kissé sós ízű por. Vízben jól oldható. Uratoldó. Adag 2 gm 3—4 × napj. szénsavas vízben oldva.

H. Citri pericarpium. (Rutaceae). Hatóanyagai keserű anyag és illó olaj. Keserű vagy illatos theakeverékekhez, tincturákhoz haszn.

II. Oleum Citri. Illatos olaj. Elaeosaccharum készítéséhez haszn.

Citrophen. Citromsav és phenetidin összeköttetése. Fehér, kellemes ízű, vízben nehezen oldódó por. Antipyreticum, analgeticum, mint a phenacetin. Adag: bels. porban 0,5—1,0 pro dos. 3,0—5,0 pro die.

Clavin. Az anyarozsból előállított kristályos anyag. Vízben oldható. Haszn. mint az extr. secal. corn. Adag 0,02 gm per os tablettában v. subcutan physiol. *NaCl*-oldatban. Főlöszleges.

†**H. Cocainum hydrochloricum.** ($C_{17}H_{21}NO_4.HCl$). Fehér, jegeczes por, vagy szintelen kristályok. Íze kesernyész és a nyelvet mulékonyan érzésteleníti. Vízben, borszeszben, chloroformban könnyen oldódik. Vizes oldata semleges kémhatású. Helybeli anaestheticum, analgeticum. Adrenalin kis mennyiségeinek hozzátétele nagyban növeli az anaesthetizáló hatást.

Piperazin Midy, a húgysav legjobb oldószere, kitűnő hatással van köszvény, húgyhomok, csúsz, vesekölíka, húgysavas diathesis eseteiben. (Lásd hirdetést)

Szem érzéstelenítésére 5%-10%-os oldatból néhány csepp a kötőhártya-redőbe cseppentetik; szájfekélyek 5%-10%-os oldattal ecsetelendők; garathyperaesthesia-nál, anginánál 2%-5%-os oldattal ecsetelések; gége-orrtükrözés előtt a garat 10%-os oldattal érzéstelenítendő; endolaryngealis vagy endonasalis műtételnél gége, orr nyákhártyája 10%-os oldattal ecseteltessék; gégefekélyek 5-10%-os oldattal kezelve, szűnnek a köhögési inger s a nyelési nehézségek; dobhártya 5%-10%-os oldat néhány cseppjével érzésteleníthető; foghús a végzendő műtétek előtt 5%-os oldattal ecsetelendő; fogextractionnál előbb a megfelelő foghúsrészletet kell érzésteleníteni, azután a foghúsba 10%-15%-os oldatból $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ Pravaz-fecskendőnyit fecskendezni (vigyázat!); férfi, nő húgycsövét 2% oldat 2—3 centimeterje érzésteleníti; égési sebek, herpes Zoster, fissura ani, sebes esecsümbök stb. 2%-5% os oldattal ecseteltessenek. Belsőleg cardialgia, csillapíthatlan hányás (terhesek, tengeri betegség) esetén, azután mint stimulans testi kimerülés, collapsus, bódító mérgezések esetén 0,02—0,03! pro dos. napj. $\frac{3}{4}$ —1-szer porban, pilulában, cseppekben, bőr alá fecskendés alakjában. Dos. maxim. pro die 0,15! Heveny cocain-mérgezés esetén amyl-nitrit néhány cseppje (8—10) légzendő be. Schleich féle érzéstelenítésre is haszn. (Cocain ricépéket l. alább). A *cocainum purum*-ot újabban Unna haszn. pruritus, viszkető eczemák, lichen planus eseteiben collodiumos v. olajos oldatokban (l. ricépéket).

Schleich-féle helybeli érzéstelenítés. 0,2%-os konyhasó-oldat fájdalom nélkül fecskendezhető a bőrbe s az ily módon elárasztott terület rövid idő múlva *teljesen érzéstelené* lesz. Igen kis mennyiségű (már 0,01%) cocainos hozzáadására az oldat érzéstelenítő hatása *még biztosabb és még teljesebb*. Ezt tapasztalva, *Schleich* csekély mennyiségű cocainnak 0,2% konyhasós vízben való oldását hozta ajánlatba. A Schleich-féle oldatok háromféle erősségben rendeltetnek:

I.

Erős oldat.

428 Rp. Cocaini mur. 0,2.
Morphini mur. 0,025.
Natr. chlor. 0,2.
Aquae destill. 100,0.
Acid. carbol. 5%

gtt. 2.

MDS. I. erős Schleich-oldat,
befecskendésre.

II.

Normal oldat.

429 Rp. Cocaini mur. 0,1.
Morphini mur. 0,025.
Natr. chlor. 0,2.
Aquae dest. 100,0.
Acid. carbol 5%

gtt. 2.

MDS. II. normal Schleich-
oldat, befecskendésre.

Bengué-balzsam (menthol, metliylsalicyl. és lanolin) fájdalom-csillapító neuralgia, csúz, köszvény, fejfájás eseteiben. (L. hird.)
Robiol stabil Cocain-Suprarenin-Anaestheticum sebészeti és fogorvosi célokra befecskendezéshez, kaph.: Dr. G. Robisch, München. (L. hird.)

III.

*Gyenge oldat.*430 *Rp.* Cocaini mur. 0,01.

Morph. mur. 0,005.

Natr. chlor. 0,2.

Aqua dest. 100,0.

Acid. carbol 5%

gtt. 2.

MDS. III. gyenge Schleich-
oldat.

Ez oldatokkal (melyek mindig frissen készítendőek) első sorban a bőr cutis-rétege érzéstelenítendő, és pedig úgy, hogy egy jól záró, 5–10 cm-ű tartalmú fecskendő tűjét ferdén a bőr papillaris rétege alá szúrjuk s kellő nyomás segélyével annyit hajtunk az oldatból a cutis szövetközi hézagaiba, míg a beszűrás helye körül egy fillérnyi kerek, teljesen vértelen, kiemelkedő, urticariaszerű, úgynevezett „Quaddel“ (Schleich) „púp“ nem keletkezik. Most eme infiltrált és már érzéstelen terület szélén újra ferdén beszűrünk s az előbbi mellett, annak közvetlen szomszédságában egy újabb infiltrált területet hozunk létre. Így folytatandó ez az ejtendő metszés egész hosszában. Most a subcután kötőszövet következik, melybe a már érzéstelenített cutison bátran átszúrva, annyit kell az oldatból befecskendezni, hogy az tetemesen megduzzadva, *teljesen kocsonyaszerűvé* váljék. Ez állapotban a cutis és subcután szövet fájdalom nélkül szelhető keresztül. Következik a mélyebb rétegek, a subfascialis, intermuscularis terek, izmok, kifejtendő daganatok környékének stb. energiás infiltrálása mindaddig, míg azok megduzzadva vízenyősekké, kocsonyaszerűekké nem lesznek. Csontoknál a *csontthártya alá* kell vezetni a tűt, hogy az a csontról mintegy leemelődve, az oldat a Havers-csatornákon át a velőig préseltessék. Ily módon a csontok is tökéletesen érzésteleníthetők! Általában szabály az, hogy: *metszeni csak ott szabad, hol a szövetek teljesen vízenyősekké tétettek!* Amputációknál természetesen úgy a bőrt, mint az összes lágyrészeket a csontig köröskörül kell infiltrálni, mely alkalommal a kevésbbé érzékeny izom- és lágyrésztömegek kielégítő infiltrációjához az elhasznált oldatok nagy mennyisége folytán esetleg bekövetkezhető cocainmérgezés elkerülése végett a „gyenge oldat“ használandó.

A „normál“ (II) és a „gyenge“ (III) oldatokból 100–200 cm³-t is el lehet egy nagyobb műtéthez (mint amputációk, nagyobb daganatok kifejtése stb.) használni, mert a befecskendezett oldat legnagyobb része a befecskendéshez csatlakozó azonnali bemetszések révén a szövetek metszfelületéből úgysis kiszivárog. Érzékeny területeken, lobos góczok, tályogok szomszédsá-

Alimentum Theinhardt est remedium certum rha-
chitidis.

gában az „erős oldatot“ kell használni, mert e helyeken az amúgy is nagy szövetközi nyomás és a fokozott érzékenység folytán maga a befeeskenedés is fájdalmas szokott lenni, az érzéstelenség pedig nem mindig tökéletes.

A Schleich-féle oldat 0,2% konyhasótartalma helyett *Braun* 0,7—0,9% NaCl-t, a cocain helyett pedig Eucain B-t ajánl (l. e cz. a.).

431 *Rp.* Cocaini hydrochlor.
0,5.
Aquae dest. 10,0.
Hydrarg. bichlor.
corros. 0,001.
M. f. solutio. Filtra.

DS. Bőr alá feesken-
edésre 5%-os cocain
oldat. Az orvos kezé-
hez. Kisebb, a bőrön
végrehajtandó műté-
teknél anaesthetizá-
lás céljából $\frac{1}{2}$ —1
feeskenőnyi haszná-
landó el.

434 *Rp.* Cocaini hydrochlor.
0,1—0,2.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in
dos. aequ. No. 10.
DS. Szükség esetén egy
port. Cardialgia,
hyperemesis.

436 *Rp.* Cocaini hydrochlor.
0,15—0,25.
Butyri Cacao qu. s.
(10,0.)
ut. f. supposit. No. 5.
DS. Egy darabot elhasz-
nálni szükség ese-
tén. Tenesmus.

438 *Rp.* Cocaini hydrochlor.
0,5.
Ungu emoll. 25,0.
M. f. ungu.
DS. Kenőcs.
Tenesmusnál a vég-
bélnyílásba babnyi
bedörzsölendő.

432 *Rp.* Cocaini hydrochl.
0,5—1,0.
Aquae dest. 100,0.
MDS. Belehelésre Siegle-
féle permetezőből.
Vigyázat! Nem
szabad lenyelni!
Görsös köhö-
gés ellen.

433 *Rp.* Cocaini hydrochlor.
1,0.
Aquae dest. 8,0.
Spiritus 2,0.
MDS. Külsőleg 10%-os
cocain-oldat.

435 *Rp.* Cocaini puri 1,0.
Olei Amygdal. dulc.
49,0.
MDS. Küls., ecsetelésre.

437 *Rp.* Acid. arsenicosi
Cocaini hydrochlor.
aa 0,5.
Kreosoti qu. s.
ut fiat pasta mollis.
DS. Fogtömés előtt a
pulpa elroncsolá-
sára szolgáló pasta.
Az orvos kezéhez.

439 *Rp.* Cocaini hydrochlor.
0,25—0,5.
Aquae dest. 250,0.
Kalii chlorici 5,0.
Aqua Amygdal.
amar. 10,0.
MDS. Porlasztóval az
orrba viendő.
Coryza főfájással.

Dragées Bengué igen jó latással van elnyálkásodásnál, hang-
beli indisposíciónál, a torok és gége hurutjánál. (L. hird)

440 *Rp.* Cocaini puri 1,0—2,0.
Collodii 1,0.
Spiritus aetheris 50,0.

MDS. Külsőleg, ecsetelésre.

441 *Rp.* Cocaini hydrochlor.
0,5.
Aquae dest. 10,0.

MDS. Szemcseppek. 3—5
cseppet egyszerre.

442 *Rp.* Cocaini hydrochlor.
0,3—0,5.

Morphini hydro-
chlor. 0,2.

Tinct. Belladonnae
5,0—10,0.

Aquae Amygdal.
amar. 25,0.

MD. in vitr. nigr.

S. ór. 10—15 cseppet.

Hyperemesis, ga-
stralgia, hyper-
aesthesia hysterica,
hyster. convulsiók.

Cocainum nitricum. Fehér, vízben jól oldó. kristályok. Arg. nitr.-al nem ad csapadékot; ezért ha utóbbival hólyagot mosunk, v. a húgycsövet kifecskendezzük, mint fájdalomcsillapító jobb a cocainum hydrochloricumnál. Adagolás, használat l. Cocainhydrochlor.

Cocapyrin. Keverék (100 r. antipyrin + 1 r. cocain. hydrochlor.). Kész pastillák alakjában van forgalomban. 1 darabban 0,2 antipyrin és 0,002 cocain. hydrochl. Pharyngitiseknél haszn. mint fájdalomcsillapítót. Nem ajánlhatjuk.

†H. Codeinum, l. Opium.

†H. Coffeinum. Trimethylxanthin. ($C_8H_{10}(CH_3)_4N_4O_2$). Túlalkú fehér, selyemfényű, kesernyés ízű kristályok. 70 sr. hideg, 2 sr. forró vízben, 50 sr. borszeszben oldódik. Cardiacum (digitalis pótszere, nem cumulativ hatású), excitans, diureticum; hemicrania, neuralgia ellen is szokásos szer. Hivatalos sói használtatnak, melyek vízben jól oldódnak. Dos. maxim. sing. 0,3! dos maxim. pro die 1,0!

†H. Coffeinum citricum. Nem vegyület, hanem keverék; 66% coffeint tartalmaz; vízben jobban oldódik, mint a tiszta coffein. Adag porban 0,05—0,2! pro dos. 3—4-szer napj. Dos. maxim. pro dos. 0,6! pro die 2,0!

†H. Coffeinum natrio-benzoicum. 40—46% coffeint tartalmaz; 2 r. forró vízben oldódik s ha a víz kihűlt is, oldatban marad. Fehér, amorph por, benzoe-szagú, keserű ízű. Adag porban, oldatban, bőr alá fecskendezve 0,1—0,2 pro dos. napj. 3—4-szer. Dos. max. pro dos 0,6! pro die 2,0!

†H. Coffeinum natrio-salicylicum. 50% coffeint tartalmaz; 2 r. forró vízben oldódik. Fehér, amorph, szagtalan, keserű-édes ízű por. Adag, haszn. mint a coff. natr. benzoic. Dos. max. pro dos. 0,6! pro die 2,0!

Chiemsee-Szanatorium és gyógyintézet parti szálloda Prienben (Felső-Bajorország) különös súlyt helyez a szív-, ideg-, emésztési, anyagcsere- és női betegségek kezelésére, orvosoknak és hozzátartozóiknak jelentékeny engedmény, egész éven át nyitva. (L. hird. a hátsó belső borítókold. szemben.)

443 *Rp.* Coffeini natrio-benz.
1,0.
Aquae dest. 130,0.
Syrupi Mentha 20,0.
MDS. 2—3 ór. 1 evőkan.

445 *Rp.* Coffeini natrio-benz.
2,0.
Aquae dest. 10,0.
M. filtra.
DS. Bőr alá fecskendésre.
½—1 fecskendővel
egyszerre.

447 *Rp.* Coffeini natrio-salic.
1,0.
Elaeosacch. Citri.
3,0.
M. f. pulv. div. in
dos. aequ. No. 10.
DS. 2—3 ór. 1 port.

449 *Rp.* Coffeini natrio. salicyl.
seu benzoici 0,1.
Aquae dest. 80,0.
Syr. aurant. 20,0.
MDS. Gyermeknek. 2 ór.
1 kk.

444 *Rp.* Coffeini natrio-salic.
6,0.
Pastae Cacao. sac-
char. qu. s.
nt. f. trochisci No. 30.
DS. Napj. 3—4 dbot.

446 *Rp.* Coffeini citr.
Chinin. hydrochlor.
aa 0,6.
Sacchar. alb. 4,0.
M. f. pulv. div. in
dos. aequ. No. 10.
DS. Hemierania esetén
1—2 port napj.

448 *Rp.* Coffeini 5,0.
Syrupi Menthae 120,0.
MDS. 3—4-szer napj. 1 kk.
Hemierania.

Cognac. Sárgás, tiszta, kellemes borszesz-szagú és ízű folyadék. 46—50% alkoholt tartalmaz. Excitans, analepticum. Adag kávé-, evőkanalanként, esetleg tejjel vegyítve.

†H. Colchici semina. (Colchicum autumnale. Liliaceae.) Hatóanyaga a colchicinum. Készítményei haszn.

Colchicinum. ($C_{17}H_{19}NO_5$). Alkaloid. Sárgásfehér, néha jegezes por, levegőn megbaránil. Ize tartósan keserű, 2 r. vízben, borszeszben oldható. Kőszvényes, csúszos bántalmak ellen haszn. Adag pilulában, oldatban 0,0005—0,003 pro dos. 2—3-szor napj. Nagy vigyázat, hevesen ható mérge (!); inkább az alábbi készítmény használtassék.

Urocol sec. Dr. Schütz (Urol-Colchicin-tabletták), minden tablettátart. 0,5 urolt és 1 mgr. colchicint, heveny kőszvényrohamoknál rögtön csillapítják a fájdalmakat. (L. hird.)

Pankreon dietétikum és roborans, igen alkalmas étrendi hibák következményeinek megelőzésére és az emésztés szabályozására hemierania gastrica stb. eseteiben. (L. hird.)

Arthritis urica: *Rp.* Gelodurat „Pohl“
scat. orig. c. Colchicin 0,001.
S. 3-szor naponta 1—2 dbot.

†H. *Tinctura Colechici*. Adag 15—30 csepp 2—3-szor napj. vízben, syrupban. Dos. maxim. sing. 1,5; dos. maxim. pro die 5,0!

450 *Rp.* Colechicini 0,015.
Pulv. et extr. Liquir.
aa qu. s.
ut. f. pilul. No 30.
Obduc. Collodio.
DS. 3×napj. 1—2 szemet.
Egy pilulában 0,0005
colechicin.

451 *Rp.* Tinct. Colechici 10,0.
Tinct. Opii simpl. 1,0.
MDS. 3 × napj. 10—15
cseppet.

Collargolum l. *Argentum colloidal*e.

H. *Collemplastra*. Kautschuktapaszkok. Jól ragadnak.

H. *Collemplastrum adhaesivum*. A régi ragtapasz helyett lett hivatalos.

H. *Collemplastrum Zinci oxydati*. A régi diachylontapaszkok helyett most ezt használjuk.

H. *Collemplastrum saponato-salicylatum*. Hámot puhító. Tyúkszemek, bőrkeményedések eltávolítására alkalmas.

H. *Collodium*. Kissé sűrű, félig átlátszó, közömbös kémhatású folyadék. Protectivum.

H. *Collodium flexile*. (50. r. collodium + 1 r. ol. ricini.) Protectivum. Nem törékeny.

H. *Collyrium adstringens luteum*. Szemvíz. Adstringens. Főalkatrészei zinc. sulf. és ammon. chlorat. Tisztán v. egyenlő r. vízzel elegyítve kötőhártyaredőbe cseppenteni néhány cseppet catarrh. conjunct. esetén.

†H. *Colocynthis fructus*. (*Colocynthis Cucumis. Cucurbitaceae*.) Hatóanyaga a colocynthin ($C_{56}H_{42}O_{23}$), glycosida természetű keserű anyag. Drasticum, hydrogogum (?). Adag porban, pilulában 0,05—0,3! pro dos. Dos. maxim. pro die 1,0! Inkább az extractum használtatik.

†H. *Extractum Colocynthis*. Száraz kivonat. Drasticum. Adag porban, pilulában 0,02—0,5! pro dos. Dos. maxim. pro die 0,15!

452 *Rp.* Fruct. Colocynth. 1,0.
Pulv. rad. Rhei chin.
Sacchar. alb. aa 2,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aeqn. No. 10.
DS. 1—2 port szükség szerint.

453 *Rp.* Extr. Colocynth.
Sapon. medic. aa 1,0.
Spiritus qu. s.
ut. f. pilul. No. 20.
Consp. pulv. rhiz.
Iridis.
DS. 1—2 szemet egyszerre.

454 *Rp.* Olei Ricini 30,0.
Tinct. Colocynth. 1,0
MDS. Egyszerre 1 evők.

11. **Colophonium.** Világossárga, felette törékeny, ivergszerűen átlátszó, kézhez tapadó, hidegen szagtalan, terpentin-ízű gyanta. Hintőpor alakjában stypcium.

H. **Condurango cortex.** (Marsdenia Condurango. Asclepiadeae). Hatóanyagai keserű anyag, gyanta, cseresav. Stomachicum. Gyomorrák ellen ajánlották (?). Adag: decoctum v. maceratum alakjában 15,0—20,0 : 150,0 2 ór. 1 evők.

H. **Extractum Condurango fluidum.** Keserű ízű stomachicum. Adag 30 csepp — 1 kk. napj. 3-szor.

455 *Rp.* Cort. Condurango 15,0.
macera per hor. sex
cum
Aqua dest. 150,0.
filtra et adde
Syrup. Cinnamomi
20,0.

MDS. 2 ór. 1 evők.

456 *Rp.* Decoct. cort. Condurango e 15,0.
l. a. p. ad. colat. 150,0.
Tinct. Opiocrot. 1,0.
Syrup. cort. Anrant.
10,0.

MDS. 2 ór. 1 evők.

457 *Rp.* Extr. Quassiae 1,0.
Tinct. Absinth. comp.
10,0.
Extr. Condur. fluidi
50,0.

MDS. 1 kávéskanállal egyszerre.

Stomachicum. Tonicum.

Conii maculati herba. (Umbelliferae.) Hatóanyaga coniin Készítményei haszn. de ritkán:

Coniinum hydrobromicum. ($C_8H_{17}N.HBr$). Színtelen, tűalakú, prismaticus jegeczek; vízben könnyen oldódik. Francia orvosok ajánlották 0,001—0,005-öt pro dos. tussis convuls. asthna, neuralgiák, hányás ellen.

Extractum Conii. Borszeszes kivonat. Azelőtt mint antispasmodicum, antineuralgium használtatott. Küls. kenőcsben 1 : 5—10; bels. 0,03—0,1 napj. 3—4-szer pilulában.

459 *Rp.* Coniini hydrobrom.
0,02.
Aquae Melissae 100,0.
Syrup cort. Anrant.
50,0.

MDS. 3 × napj. 1 evőkan.
(0,002 gr. coniinsó).

460 *Rp.* Coniini hydrobrom.
0,02.

MDS. Aquae dest. 10,0.
Bőr alá fecsk. Sino
nomine. $\frac{1}{2}$ —1 fecsk.
egyszerre.

Elixir Condurango pept. Immermann.

Elixir Condurango pept. c. ferro „Walther“.

Pil. Condurango-Ferro-Conchitic. „Walther“ igen jól bevált Condurango-készítmények. (L. hird.)

Pepsorthin kiváló stomachicum, elősegíti az emésztést, javalt heveny és különösen idiült gyomorbajoknál elégtelen gyomorsav-elválasztással. (L. hird.)

Készítményeimet sokan utánozzák, tessék tehát mindig **eredeti Walther** készítményeket rendelni. Gazdag irodalom az orvos uraknak rendelkezésükre áll.

Walther-féle Elixir Condurango pept.

„Immermann“ Elismerten kitűnő eredményű mindenfajta gyomor bajoknál, indigestio, dyspepsia stb. eseteiben. Ajánlja számos *elsőrangú tekintély. Stöhr* titkos tan. Kissingenben ezeket írja: „...a legnagyobb értéke van a mindennapi gyakorlatban különösen régi keletű, idült bajoknál.“

Walther-féle Pilulae Condurango Ferro conchinic.

Eredeti üvegekben.

Elixir Condurango pept. c. Ferro

„Walther“ kitűnően bevált készítmények *gyomor zavarokkal járó vérszegénység, idegbajok, marasmus* stb. ellen. *szász*

Extract. Thymi Kern 3 koncentrációban:

1. koncentrált, fanyar; 2. jóízű, felnőttek részére 75%; 3. édes, a gyermekgyakorlat részére 45% alkoholmentesen is. Igen ajánlják *szamárhurut, asthma, hörghurut, phthisis* stb. ellen. Lásd *Fischer E. tanár: „Über neuere Thymianpraeparate“*. Deutsche mediz. Wochenschrift 1903. évfolyam. 450. oldal, stb. *szász*

Ahol nincsen raktáron, tessék a meghozatalát megsürgetni.

Egyedüli készítő:

F. WALTHER
chem.-pharm. Laboratorium
Strassburg i. Els. Neudorf.

Főlerakat Magyarországon

Török József
gyógyszertára
Budapest, VI. Király-u. 12.

Lycetol. granulát. efferv.

Dr. Egger

(5%-os)

Antirheumatikum, Diuretikum.

Specifikusan húgysavoldó és húgyhajtó hatása. A pezsgősó formája a Lycetol-nál (Dimethylpiperazintartrat) különösen ajánlatos, mert a szénsavas sók és a bőséges víztömeg hozzáadása hatását növeli.

Javallatok: Húgysavas diathesis, köszvény, idült ízületi csúz, arthritikus diabetes stb.

Adagolás: 3—4-szer napjában 1 tele kávéskanállal vízben oldva, 1 órával étkezés előtt.

Eredeti üveg Lycetol granul. efferv. Dr. Egger
5.— korona.

A bőrgyógyászati és urológiai gyakorlat részére:

CORROSOL

Intramuscularis, higanybefecskendezés a lues kezelésére.

Magas higanytartalom mellett (40 mg fémhigany minden injectióban) semmiféle fájdalomhatás, sem beszüremkedések. A legújabb kutatások az arsenobenzol kombinált alkalmazását ajánlják Corrosollal. Lásd: Gyógyászat, 1912, 7. sz.

Eredeti doboz Corrosol 10 két köbcentiméteres ampullával --- --- --- --- 3.50 korona.

Contratussin. (Elixirium thymi.) Thymus vulg. és serpill. kivonata ezukkorral, cognac-al és brómnatriummal vegyítve. Pertussis ellen kk. v. gyk. 2–3 ór.

Convallariae majalis herba. (Smilaceae). Hatóanyagai convallamarin és convallarin (glycosidák). Cardiacum, diureticum, mint a digitalis, csakhogy gyengébb. Nem cumulativ hatású. Az értékét illető ellentétes tapasztalatok a növény különböző gyűjtési helyére és frissességére vezethetők vissza. Adag infus. 5,0:150,0 2 ór. 1 evők. Ha diarrhoea jelentkeznék, mellőzendő a szer.

Tinctura Convallariae majalis. Adag 10 csepp 3–4× napj.

461 *Rp.* Infus. herb. Convallar.
maj. e 5,0.
l. a. p. ad. colat. 150,0.
Tinct. Opii gtt 15.
Syrup. Scillae 10,0.
MDS. 2 ór. 1 evők.

462 *Rp.* Tinct. Convallariae
Aquae Amygdalar.
amar. aa 10,0.
MDS. 2 ór. 15 cseppet.

H. Coriandri fructus. (Coriandrum sativum. Umbelliferae.) Hatóanyaga illó olaj. Stomachicum, carminativum. Keserű v. illatos theakeverékek gyakori alkatrésze.

Coryfin. (Mentholum aethylglycolicum.) Színtelen, alig szagos folyadék. Vízben nehezen old., jól szeszben. A hol helybelileg tartós mentholhatást akarunk elérni, jól haszn. Neuralgiás főfájás esetén néhány cseppet a megfelelő bőrrészleten el kell dörzsölni. Garathurut esetén néhány csepp pohár vízben toroköblítőnek. Bels. nem.

Coronillinum. A coronilla scorpioides hatóanyaga. Glycosida. Sárga, vízben oldh. por. Szívre úgy hat, mint a digitalis-glycosidák. Erős diureticum. Nem cumulativ hatású. Mérgező lehet! Ezért nagy vigyázat (!) Adag. pilulában v. cseppekben 0,1 pro dos. napj. 3–4 szer.

Corrosol dr. Egger. Hydrag. succinicum és kakodylicum combinatiója novocainnal. Phiolákban kapható (2 ketm.) melyek tartalma megfelel 0,0075 gm. Hg-nak, illetve 0,01 gm. sublimatnak. Bőr alá fecskendésre szolgáló antiheticum. Naponta v. minden két napban egy phiola használandó el.

Coryloform. Az *anestyle*-hez és *Kelen*-hez hasonló hideg-anaestheticum. Keveréke chloraethylnek, chlornethylnek és bromoethylnek. L. aethylum chloratum.

Coto cortex. Egy bolíviai lauraceának kérge. Hatóanyaga a cotoin (benzophloroglucin monomethylestere). Antidiarrhoeicum, amarum. Adag porban 0,2–0,5 pro dos. 3–4× napj. Helyette jobban használhatók készítményei:

Tinctura Coto. Adaga 10–30 csepp 2–3 ór. borban, nyákos folyadéokban.

- 463 *Rp.* Tinct. Coto. 40,0. 464 *Rp.* Cotoini 0,5.
DS. 10—15 cseppet — 1 kk. Sacch. alb. 4,0.
 3—4× napj. M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.
DS. 3 ór. 1 port.

Creolin. Pearson-féle. Feketésbarna, kellemetlen szagú, méz-sűrűségű anyag. Vízen tejfehéres színnel oldódik, de ha áll, barnás csapadék jelentkezik. Különös fajta angol kőszén száraz lepárlási terménye, mely 10—30%-nyi kresolokat, azután szén-hydrogeneket, pyridinbasisokat tartalmaz, melyek gyantaszappanokkal vannak keverve. Antisepticum, antiparasiticum ectoparasiták ellen; taenia, oxyuris ellen is megkísérlették, de nem ajánlatos (!). Sebészetben, szülészetben 1/2%-os és 2%-os oldatok használatnak; cystitisnél hólyagöblítésre, gonorrhoeánál húgyeső, hüvely kifecskendésére 1—5 pro mille oldatok. Irrigatiók per rectum igen veszélyesek; kerültessenek (!) Bels. Hiller erjedéssel járó gyomor-bélbajoknál 0,3—0,5 gmot ad 3× napj. capsula gelat.-ban. Bels. nem ajánlható, mérgező lehet! Különböző összetételűek lévén a kereskedésbeli készítmények, megbízhatatlan. Legjobb a Pearson-féle. Gyermekgyakorlatban mellőzendő; erős eczemák, fekélyek gyakran keletkeznek használata után.

Jól pótolja a

II. **Liquor Kresoli saponatus.** l. e. cz. a. a köv. oldalon.

- 465 *Rp.* Creolini (1,0)—2,0. 466 *Rp.* Creolini 5,0
 Aquae Menthae pip. Olei Lini 100,0.
 (100,0)—500,0. M. f. linim.
MDS. Száj-torokvív. *DS.* Külsőleg linim. sty-
 Hosszantartó angina racis helyett.
 tonsill. eseteiben. Scabies. phthiriasis.

467 *Rp.* Creolini 2,0.

Acid. boracici 100,0.

M. f. pulv. det. in scat.

S. Hintőpor fekélyekre.

†II. **Cresolum crudum.** Acid. carbol. flavum. Sárgás, tiszta, kozmás szagú, sűrű folyadék. Keveréke ortho-, meta-, és paracresolnak s más rokonvegyületeknek (carbol, naphthalin, pyridin). Vízen tökéletlenül old. Ezért inkább készítményei haszn., ezek a következők:

. *Cresolkészítmények.*

II. **Liquor cresoli saponatus.** Cresolum crud. + sapo kalinus aa. 50% cresol van benne. Barna, vízben oldh. olajszerű folyadék. Árnyékszékek, köpöcsészék, üredények stb. fertőtleníté-

Kleewein gyógyszerész új cresol-szappan-oldatai a legerősebb bactericid fertőtlenítőszerek.

sére 5%-os vizes oldatok haszn. Küls. $\frac{1}{4}$ —2%-os oldatokban a műteti tér, seb. eszközök, kezek fertőtlenítésére haszn. Hüvely-öblítésre $\frac{1}{2}$ —1%-os oldat. Csak destillált v. lágy calciummentes vízzel ad tiszta oldatot. Oldatok a kezeket sikamlóssá teszik.

Tricresolum. A három cresol elegye. Színtelen, tiszta, 2·5%-ban old. vízben. Haszn. sebészetben 1%-os vizes oldata, mint a carbolsav, melynél 3-szor erősebb antisepticum.

Cresolum purum liquidum. Orthocresolból áll csupán $(\text{C}_6\text{H}_2\text{CH}_3\text{OH} + \text{OH}_2)$. Színtelen, carbolszagú folyadék. Haszn. mint a tricresol.

Calcium cresolicum. Cresol + mésztej aa. Szörpsűrű, vízben jól old. folyadék, 5%-os oldatok haszn. ürülék, stb. fertőtlenítésére.

Saprol. Cresol keveréke szénhydrogénekkel. 40% cresolt tart. Barna, olajos folyadék. Vízben nehezen oszttható szét. Árnyékszék desinfectiójára haszn.

Solveol. Cresol neutralis oldata cresotinsavas natrium segélyével. 26% cresolt tart. Vízzel oldh. Antisepticum sebészetben. 37 ccm. 2000 vízre.

Solutol. Cresolnatriummal oldott cresol. 60% cresolt tart. Barna, lúgos folyadék. Árnyékszék desinfectiójára haszn. $\frac{1}{4}$ l. vétesék 50 l. vízre.

*

Cristallose. Saccharinhoz hasonló, de annál édesebb anyag. Diabetesnél úgy használható mint a saccharin.

H. Croci gallici stigmata. (Crocus sativus. Irideae.) Hatóanyag illó olaj. Stomachicum, emmenagogum. Adag porban, pilulában 0·2—1,0 pro dos. napj. 3—4-szer.

Crotonis semina. (Tigilium offic. Euphorbiaceae.) Drasticum. A magvak nem haszn. Használtatik a belőle készült:

†**H. Oleum Crotonis.** Sárga v. sárgásbarna, áttetsző, sűrű, sajátságos kellemetlen szagú, kezdetben enyhén olajos, később tartósan égető ízű zsíros olaj. Hatóanyaga: crotonolsav s annak glyceridje. A legerősebb drasticum. Adag: klystirnek 1—2 csepp emulsióban, per os $\frac{1}{4}$ —1 csepp pro dos. ricinusolajban, v. emulsióban, v. czukorral eldörzsölve. Dos. maxim. sing. 0,05! Dos. maxim. pro die 0,15! Nagy vigyázat!!

468 Rp. Olei Crotonis gtt. 1.
Elaeosacchar. Citri
2,0.

M f. pulv. div. in dos.
aëq. No 4.

Dent in chart. cerat.

S. 3 ór. 1 port, míg széket
letét jelentkezik.

469 Rp. Olei Crotonis gtt. 2.
Olei Ricini 30,0.
M. exact.

DS. Rendelet szerint 1 kk.

Crurin (Chinolin-bismuth-rhodanat). Veres-sárga, szúrós szagú, vízben oldh. durva por. Híntőpor ulcus cruris ellen. Bels. nem.

H. Cubebae fructus. (Cubeba offic. Piperaceae.) Hatóanyagok: illó olaj, cubebin és gyanta. Haszn. bels gonorrhoea, cystitis chron. ellen. Adag porban, pilulában 1,0—3,0 pro dos. 3—4 × napj.

H. Extractum Cubebae. Mézsűrűségű. Haszn. mint a fruct. Cubebae. Adag pilulában, capsula gelatinosában 0,5—2,0 pro dos.

470 Rp. Extr. Cubeb.
Bals. Copaivae
Pulv. Gummi arab.
aa 5,0.
f. l. a. emulsio cum
Aqua Menthae pip.
150,0.
Syrnp. simpl. 15,0.
DS. 3. ór. 1 evők.

471 Rp. Pulv. Cubebae. re-
cent. tns.
Extr. Cubeb. aether.
spirit. aa 5,0.
M. f. pilul. No. 50.
Consp. pulv. Lycopod.
DS. 3 × napj. 3 szemet.

Cucurbitae Peponis semina. (Cucurbitaceae.) Galandfereg-hajtó szer. Adag a dekortikált magvakból 50—100 gm. pro. dos. reggel élgymorra; utána 1 órával ol. ricini adas-ék. Jól használható taeniaellenes kúra előtt is diagnostikus célból, hogy t. i. proglottisokhoz juthassunk, melyekből a diagn. biztosan felállítható. Adag ekkor 20,0—50,0 a nem hámozott magvakból.

472 Rp. Seminum Cucurbitae
decort. 50,0.
Sacchar. alb. 4,0.
M. f. pasta
DS. Rendelet szerint el-
fogyasztani.
Taenia solium.

II. Cuprum aluminatum s. Lapis divinus s. Lapis ophthalmicus. Fehéres-kék, camphorszagú, vízben majdnem egészen oldódó darabok. Enyhe causticum, adstringens. Küls. substantiában fekélyes nyákhártyák edzésére; szemvíznek és hűgysőbe befeckendésre 0,2—0,5: 100,0 (filtra).

†**II. Cuprum sulfuricum crystallisatum.** ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$). Ferde, hasábalakú, kékszíni jeccek Levegőn kissé elhalálk; 3,5 sr. hideg, 1 sr. forró vízben oldódik. Küls. substantiában

Bardella, Bardeleben dr. bismut pólyája kitűnően bevált mindenfokú leforrázásoknál és égéseknél, ezenkívül ajánlják nedvező eczema, ulcus cruris, erosi k. fissurák ellen. (L. hird.)

Pivako hatásos internu antigonorrhoeum, a bals. copaivae és az extr. cubebae eltartható, aromát íző emulsiója, fokozza a vizelet aciditását és baktericid, összehúzó hatásává teszi, megakadályozza a gyulladás tovaterjedését, olesőbb, mint a legtöbb hasonló készítmény. (L. hird.)

mint nyákhártyákat, fekélyeket, hámfosztott bőrfelületeket edző szer; hígabb oldatokban (0,2%—0,5%) mint adstringens haszn. Bels. emeticumnak porban, oldatban, electuáriumban 0,1 0,15 Dos. maxim. pro dos. et pro die qua emeticum 1,0!

473 *Rp.* Cupri sulfur. 0,1.
Aquae Rosar. 30,0.
Tinet. Opii simpl. 0,5,
MDS. Szemeseppek. Adstringens.

475 *Rp.* Cupri sulf. 1,0.
Aquae dest. 60,0.
MDS. 5—10 perczenként 1 kk., míg hányás jelentkezik. Emeticum felnőtteknek.

477 *Rp.* Cupri sulfur. 0,03.
Aquae dest. 10,0.
MDS. Szemeseppek. Napj. 1—3-szor. Conj. catarrh. chron.

474 *Rp.* Cupri sulf. 50,0.
Aluminis 150,0.
M. f. pulv. det. in scat.
S. 2 kávéskanálnyi 1 liter langyos vízben feloldandó. A hüvely irrigatiójára.

476 *Rp.* Cupri sulfur. 0,4.
Aqua dest. 60,0.
Syrup. simpl. 20,0.
MDS. $\frac{1}{4}$ ór. 1 kk., míg hányás jelentkezik. Emeticum 2—6 éves gyermeknek.

478 *Rp.* Cupri sulf.
Zinci sulf. aa 6,0.
Aceti vini 80,0.
Liquor. plumbi subacet. 12,0.
MDS. Külsőleg. Villate-old. Nem rationalis!

Cutolum. Aluminium-boro-tannienm. Barnás, finom, összehúzó por. Antisepticus, összehúzó, szárító hatású. Nem izgat. Eczemák, erosiók, fissurák, fekélyek ellen kenőcsben (10—20%), pastában (20—30%), hintőpor alakjában (10—30% talcummal).

Cutolum solubile. Borkőssavval vízben oldhatóvá tett cutol. Ulcus cruris, égési sebek esetén 1%-os oldattal borogatások. Méh-hüvelyhurutnál 10%-os glicerindatával tamponnálás v. kikenés.

Cycloform. Helyi anaestheticum. Fehér, szagtalan és íztelen por; vízben alig, szeszben, aetherben jól oldh. Nem más mint isobutylestere a paraaminobenzoésavnak. Úgy haszn. mint az orthoform. Bels. nem. Küls. 5—10%-os kenőcs, substantiában hintőpor.

Cystopurin. Az urotropin natrium acetattal készült kettős sója. Haszn. mint az urotropiné (l. ezen czím alatt). Adag: 3—4-szer napj. 1 gm.

Daturae Atropinii semina et folia. (Solanaceae.) Hatóanyagai atropin és hyoscinin. Belladonna-készítmények egészen fölöslegessé teszik. Obsolet.

Hygiama continet phosphata et hydrocarbonata omnino paene solubilia.

- Tinctura Strammonii**, haszn. mint a tinct. Belladonnae.
- Dermatolum**. L. Bismuth. subgallicum.
- Dermosapol**. Túlzsirosított szappan. Kenőcsanyag, mely áll: olaj, zsír, lanolin, földviasz és kevés alkaliból. ●
- Dermogen**. Hintőporkeverék (speczialitás), mely 55% zinksuper-oxidot tart. L. utóbbi ezíne alatt. Dermogeuire szükség nincs.
- Desichthol**. Szagtalanított ichthyol. Szagtalanítás vízgőzökkel v. H_2O_2 -vel. Ichthyol helyett (?) haszn. Nem oly megbízható.
- H. Dextrinum**. $[(C_6H_{10}N_5)_n]$ Színtelen vagy kissé sárgás, átlátszó, nem jegeczes darabkák. Vízben könnyen oldódik s ragadás, semleges kémhatású folyadék képződik. Gyógyszerészeti technikában fontos szer. Kemény kötés készítésére vételessék 100 r. dextrin, 60 r. borszesz, 50 r. víz; a képződő péppel a pólyadarabok bekenendők.
- Dextroform**. Dextrin és formaldehyd összeköttetése. Fehér, szag- és íztelen, vízben oldh. por. Antisepticum. Hintőpornak. mint az amyloform. 10—20% oldattal gonorrhoea ellen befeesk.
- Diaethylketon**. $(C_2H_5.CO.C_2H_5)$. Propion. Színtelen folyadék. Vízben 24 r-ben oldh. Alkoholban jól. Hypnoticum, sedativum. Adag bels. aromás vizekben (aqu. menthae) 0,5—3,0. pro dos. és die.
- Diaphtherin**. Orthophenolsulfonsav (aseptol) és oxychinolin vegyülete. Sárga jegeczpor. Vízben jól old. Erős antisepticum. $\frac{1}{2}$ —2% vizes oldatban sebkezelésben. Nem izgat.
- Diaspirin**. A salicylsav borostyánkősavestere. Vízben nem old. fehéres kristálypor: íze savanykás. Hatása mint az acid. acetylo-salicyliumé. Talán kissé erősebb izzasztó. Különös előnye nincs Adag 0,5—1,0 pro dos. napj. 3—4-szer.
- Decilan**. Antisepticum. Összetétele pontosan nem ismert. Alighanem a lysoformhoz hasonló. Vízben, szeszben, glycerinben oldható. Haszn. mint a lysoformé.
- Dermasan**. Külsőleg bedőrzsölés alakjában használandó anti-rheumaticum. Túlzsirosított lágy szappan 10% acid. salicylicum-mal elegyítve. Egy alakja az **Ester-dermasan**, melyben még 10%-nyi phenyl és benzoysalicylsavesterek is vannak. Tubusokban szolgáltatják ki. Utóbbiból nőgyógy. czélokra 0,5 gmos vaginal-capsulák is kaphatók. Elég erős helybeli izgatók, melyek a bőrön eczemat is okoznak, ha túlságos mennyiségben vagy sokszor alkalmaztatnak.
-
- Bardella**, Bardeleben dr. bismut-pólyája kitűnően bevált minden-fokú égési sebeknél, rögtön csillapítja a fájdalmat, gyorsan beáll a gyógyulás, ezenkívül ajánlják fagyások, nyitott fagyási sebek, decubitns, mindenféle sebesedések ellen, azonnal alkalmazható antisepticus kötőzőszer. (L. hird.)

Rheumasan

és

ESTER-Dermasan

erősebb hatású „Rheumasan“

gyorshatású fájdalomcsillapító, könnyen felszívódó
antiseptikus szalicyl-kenőcsök és szappanok.

Rheumatosisok

Influenza

Herpes tonsurans

Arthritisek

Szívfájdalmak

Gonorrhoea

Neuralgiák

Tylosis

Parametritis

Tabeses

Psoriasis

Perimetritis

fájdalmak

Pityriasis

Oophoritis

Nehezen oldódó ecetsavas aluminium

Lenicet

-puder

-kenőcsök

-krémek stb.

Intertrigo, hyperhydrosis, eczema, dermatosisok,
ulc. crur. decubitus, fluor alb, pruritus, epidermo-
lysis, haemorrhoidák, ophthalmö-blenorrhoeat, con-
junctivitis, blepharitis, otitis, stomatitis, angina.

Lenirenin

befúvásra a
felső lég-
utak
hurutjánál.

Irodalmat és mintát díjtalanul küld:

Dr. R. REISS, Rheumasan- u. Lenicet-Fabrik
Berlin, Charlottenburg 4.

BOUCHARDAT

Tr. Pharm. p. 300

TROUSSEAU

Thérap. p. 314

GUBLER

CHARCOT

Com. du Codex p. 813 Cliniques de la Salpêtrière.

egyetemi tanárok véleménye szerint a

Valerianate de Pierlot

görcs-csillapító és felülmulhatatlan ideg-megnyugtató szer, javalt: neurosisok, neuralgiák, neurasthenia, ideges rángások, szívgyörcsök, epilepsiás és hysteriás rohamok, álmatlanság, hallucinációk, szorongási érzések eseteiben stb.

A valeriana-gyökérből készült **egyetlen természetes** productum, mely épen oly hatásos, mint ártalmatlan. Nem syntheticum.

1—2 kávéskanállal reggel és este cukros vízben, ha sehogysem tűrné így a beteg, akkor

Pierlot-féle Valerianat-capsulákat

kell rendelni, reggel és este üres gyomorra, 3—6 capsulát naponta.

Szív- és vesebajok ellen

Pandigitale Houdas.

30 csepp Pandigitale Houdas megfelel 20 centigramm friss Fol. Digit. porának és tartalmaz egy negyed milligr. kristályos digitalinet

Adag: 20—44 csöpp naponta 2—3 adagban.

Kapható minden nagyobb gyógyszerárban.

LANCELOT & CIE, PARIS, 26 & 28 Rue St-Claude.

Irodalmat és mintát küld a vezérképviselő:

RENÉ BLANPIN, Wien, IV. Wiedener Gürtel 26a.

Desalgin. 25% fehérjéhez kötött chloroform. Poralakú készítmény. Analgeticum. Bels. a gyomorbélhuzam fájdalmas betegségei, epekőkolika eseteiben 3-szor napj. 0.25—0.5 gm. capsulában v. theában, tejben szétosztva.

Desinfectol. Kresolok keveréke, melyek alkali segélyével oldhatókká tételtek Haszn. mint a liquor cresoli saponatusé.

Diastase absoluta. Malátából nyert fermentum. 1 rész 300 r. keményítőt tud oldani. 0.1 grmos tabletták (Merck) haszn. a nyálhiányos képzésénél a keményítőemésztés elősegítése céljából.

†**H. Digitalis folia.** (*Digitalis purpurea*. Scrophulariaceae.) Hatóanyagai 1. Digitoxin. 2. Digitalin. 3. Digitalein. 4. Digitonin (glycosidák). *Szívtonicum, midőn a szív munkaerélyét kell és lehet fokozni*; ugyanezen esetekben igen jó diureticum. Különben nem diureticus hatású. Cumulativ hatású, ezért nagy vigyázattal hosszabb adagolás alkalmával. Mivel hosszabb állás közben a hatóanyagok elbomlanak, egy évnél idősebb levelek ne használtassanak. Legjobbak a Caesar és Loretz-czég által forgalomba bocsátott durván porított levelek, melyek jól zárt üvegben tartatnak és békaszíven hatásra kipróbáltattak. Üvegek címkéjén a gyűjtési év és a virulentia (v) jelezve van. Bels. adag langyosan v. hidegen készült maceratum alakjában 0.5—1.5 : 150,0 1—2 cr. 1 evők. (Első nap ór., a második naptól 2 ór. egy-egy evők.); porban 0.1—0.2 pro dos. 4—5-ször napj. Jól teszszük, ha minden bevétel előtt egy késhegynyi natr. bicarbonicumot vétetünk a beteggel, mert a gyomorsav el tudja bontani a hatóanyagokat. Ha infusumot akarunk rendelni, utasítuk a gyógyszerészt, hogy csak 60° C vízzel öntse le a leveleket s hagyja magától kihűlni a massát s 1—2 óra múlva szűrje, néha-néha közben felkevervén. 100° C hő elpusztítja a hatóanyagokat. Dos. maxim. sing. 0.2! dos. maxim. pro die 1.0.

†**H. Tinctura Digitalis.** Használat, mint a leveleknél. Adag bels. 5—15 csepp 3—4-szer napj. Dos. maxim. sing. 1.5! dos. maxim. pro die 5.0!

Digipuratum. Physiologiailag beállított extractum, mely poralakú. Tabletták készen 0.1 gm. tartalommal. Bels. első és második nap 4 dbot, majd 2 napig 3—3 dbot, végre 2—2 dbot. Dicsérik.

Chiemsee-Szanatorium és gyógyintézet parti szálloda Priében (Felső-Bajorország) különös súlyt helyez a szív-, ideg-, emésztési, anyagcsere és női betegségek kezelésére, orvosoknak és hozzátart. jelent. engedm., egész éven át nyitva. (L. hird.)

Vitium cordis: Rp. Gelodurat „Pohl“
scat. orig. c. Fol. Digit. titr. 0.1.
S. 3—5-ször naponta 1 dbot.

Digitalinum. Vigyázat! Különféle készítmények vannak forgalomban, melyek tisztaságukhoz mértén különböző erősségiiek. Ezért az adagok különbözők.

a) *Digitalinum amorphum s. germanicum* (főleg digitalein, kevés digitonin). Adag pil. 0,001—0,002 pro dos. napj. 2—3-szor. Sabcután fele.

b) *Digitalinum gallicum amorphum* (Homolle et Quevenne). Főleg digitalinból áll. Erősebb, mint az a) alatti. Adag pil. 0,0005—0,001 pro dos. napj. 2—3-szor.

c) *Digitalinum crystall. Nativelle.* Főleg digitoxinból áll. Legmérgeesebb mindenik közt. Nagy vigyázat (!) Adag: 0,00025—0,0005 pro dos. 2—3 × napj pilulában.

d) *Digitalinum verum Kiliani.* Tiszta digitalin. Adag: 0,00025 pro dos. 2—3 ór. *0,0025—0,005 pro dos. 2—3 ór.*

Digitoxinum crystallisatum Merck. Adag. 0,00025 napj. 3—4-szer. Tabletták n. ilyen adaggal készen kaph.

Digalen. (Cloetta.) Digitoxinum solubile. Glycerines-vizes digitoxinoldat. 1 kctm. — 0,0003 amorph digitoxinnal. Adag: 1—2 kctm. per os v. subent. Apró, 15 kctmt tart. üvegekben kapható. Det. lagen. orig.

Digitalon. Tartós asepticus oldata az összes digitalis hatóanyagoknak. Haszn. mint a digalen $\frac{1}{2}$ —1 kctm. pro dos. (Parke-Davis-féle amerikai készítm.)

Digitalysatum. (Bürger.) Friss levelekből készült, meghatározott virulenciajú folyékony készítm. Bels. v. intraven. 0,5—1,0 pro dos. és 2,0—5,0 pro die. Intraven. célra sterilizáltan ampullákban kapható, melyek 2 köbctm. tart. aa physiol. konyhasóoldattal

Digitalis purpurea dialysata Golaz titrata. Friss levelekből dialyzálással készült folyadék, mely 1 gmban 1 milligrammot tart. a hatóanyagokból. Adag: 10—20 csepp 3—4-szer napj. Használhatóságát dicsérik.

Extractum digitalis liquidum Denzel. Jó készítmény. Elérthető, tiszta, alkoholszerű folyadék, melyből 5 gm = 1 gm. digitalislevél hatékonyságával

Digitalisat. „Bürger“ a friss Fol. Digit dialysált nedve, mint ilyen tart. a levelek összes alkatrészeit természetes, változatlan állapotban, 7 év óta ismeretes mint megbízható cardiacum fiziol. titre V=5 Focke dr. szerint. (L. szemben levő hird.)

Pandigitale Houdas a szív- és vesebajok kitünő specifikuma. a legmegbízhatóbb digitalis-készítmény. (L. hird.)

Diureticum: *Rp.* Gelodurat „Pohl“

scat. orig. c. Theobr. natr. salic. 0,25.

fol. digit. titr. 0,025.

S. 4-szer naponta 1—2 dbot.

- 479 *Rp.* Tinct. Digitalis 5,0.
Aquaе Amygdalar.
amar. 10,0.
MDS. 3-szor napj. 10—20.
cseppet.
Palpitatio cordis
nervosa.
- 481 *Rp.* Pulv. folior. Digital.
Chinin. sulf. aa 0,5.
Sacchar. alb. 4,0.
M. f. pulv. div. in
dos aequ. No. 10.
DS. 2—3 ór. 1 port.
- 483 *Rp.* Fol. Digitalis pulv. 1,0.
Aquaе dest. 150,0.
Macer. per hor. 3
saepius agitando,
dein cola et adde.
Kalii nitr. 5,0.
Syrupi Menthae 10,0.
MDS. 2 ór. 1 evők.
- 485 *Rp.* Fol. Digitalis pulv.
0,15—0,2.
Aquaе dest. 100,0.
Macer. per hor. 3
saepius agitando,
dein cola et adde
Kalii acet. sol. 2,0.
Syrupi Menthae 15,0.
MDS. 2 ór. 1 gyk. 3—6 éves
gyermeknek.
- 488 *Rp.* Digitalini germ.
amorphi. 0,03.
Pulv. rad. Liquir.
Succi Liquir. aa qu. s.
ut f. pill. No. 30.
Consp. pulv. Liquir.
DS. 3 × napj. egy szemet.
- 480 *Rp.* Tinct. Digitalis. 5,0.
Kalii acet. solut. 15,0.
MDS. 2 ór. 10—15 cseppet.
Diureticum incompen-
zált szívbajoknál.
- 482 *Rp.* Fol. Digitalis pulv. 0,6.
Aquaе dest. 150,0.
Macer. per hor. 3
saepius agitando,
dein cola et adde
Tinct. Opii, simpl.
gtt. 10.
Syrupi Scillae 10,0.
MDS. Ór. 1 evők.
- 484 *Rp.* Fol. Digitalis pulv. 0,6.
Aquaе dest. 140,0.
Macer. per hor. 3.
saepius agitando,
dein cola et adde.
Diuretini 5.
Syrupi Menthae 20,0.
MDS. 2 ór. 1 evők.
- 486 *Rp.* Folior. Digit. pulv.
Bulb. Scillae sicc.
pulv. aa 1,5.
Roob Juniperi qu. s.
ut f. pilul. No. 30.
Consp. pulv. Liquirit.
DS. 3—4-szer napj. 1 sze-
met. Diureticum.
- 487 *Rp.* Digitalini (Hom. et.
Quev) 0,1.
Sacchari lactis 4,0.
Gunmi arab.
Syrupi simpl. qu. s. aa
ut f. pil. No. 100.
Obduc. fol. Argenti
DS. Napj. 3 × 1 szemet.

Digitalisat. „Bürger“ előnye: tökéletes digit. hatás, egyen-
letesség, pontos adagolhatóság, jól tűrik, kumulatio nem lép
fő, majdnem határt. ideig eltarth., igen olcsó, fájd. nélkül al-
kalmazh. subcután (L. hird.)

Valeriana-Digitalisat. „Bürger“ egyesíti a digitalisatum és
valeriana hatását. Adag és hatás, mint a Digitalisat „Bürger“-nél.

489 *Rp.* Digitalysati (Bürger)
Validoli aa 10,0.
D.S. Felrázva 3 × 20 cs.
naponta.

490 *Rp.* Extr. Digital. liqu.
De. zel 5,0.
Aqua dest. 85,0.
Cognac 10,0.

491 Digitalysati (Bürger) 10,0.
Coffeini citr. 0,5.
M. f. sol.
D.S. 3 × napj. 15–20 cs.

M.D.S. 2 ór. 1 kk. v. gyak.

Dijodoformium. (C_2I_4). Aethylentetraiodid. Sárga jegeztűk v. por. Aromás szagú. 95,45% jódiart. Vízben nem, alkoh. rosszul old. Világosságon bomlik. Jodoform helyett haszn. hasonló módon.

Dimethylacetal. Színtelen folyadék. Ajánlották chloroform helyett narcosis céljaira. Mering 2 r. dimethylacetalt 1 r. chloroformmal kevertet.

Dionin, l. Opium és morphin.

Diplosal. A salicylsav salicylsavas estere. Fehér, vízben nehezen, szeszben, alkaliakban könnyen oldh. por. Belekben hasad mint az acid. acetil-salicylicum, melynek helyettesítője akar lenni. Hatása, haszn. adaga mint az acid. acetil-salicylicumé, melynél kissé erős-bb.

Diphtheria-antitoxin, l. Serum antidiphtheriticum.

Dispermin, l. Piperazin.

Diuretin, l. Theobrominum natrio salicylicum.

Dormiol (Dimethyl-aethyl-carbinol-chloral). Színtelen, olajszerű, kánforos szagú, kissé csípős ízű folyadék. Vízben alig oldódik.

Hypnoticum, a chloralhydrat helyett. Dosis. sing. et pro die 0,5–1,0–2,0.

492 *Rp.* Dormioli in caps. ge-
lat. 0,5 p. dos.
scatul. orig.

D.S. Este lefekvés előtt
1–3 szemet.

493 *Rp.* Solut. Dormioli 50%
20,0.

Aquae dest. 180,0.

M.D.S. 1–2 evőkanállal
lefekvéskor.

†H. Diuretinum, l. Theobrominum natrio-salicylicum.

†H. Doveri pulvis, l. Opium.

Duboisinum sulfuricum ($C_{17}H_{23}NO_3$). Sárgás, amorph. vízszívó anyag. Némelyek szerint azonos a hyosciaminnel. Mydriaticum; az atropin-nél állítólag gyorsabban hat. Adag szemcseppeknek 0,01–0,1:20. Az orvos kezéhez!

Dulcin. (p-phenetolcarbamid). Színtelen, igen édes jegeztűk. Vízben nehezen old. Haszn. diabetesnél, mint a saccharin.

Duotal, l. Guajacolum carb.

Dymal. Didymium salicylicum. Finom, szagtalan por. Hintőpor hyperhidrosis, intertrigo, excoriatio ellen, v. 10%-os lanolinkenőcs. Száritó, szagtalanító, antisepticus hatású.

Urobalkan, karlsbadi húgyhajtó tea, gyorsan hat a vesebajok nyomában föllépő hydropsnal. (L. hird.)

DIGITALYSAT.

„Bürger“

a **friss** folia Digitalis dialysált nedve, mint ilyen, tartalmazza a levelek **összes** alkatrészeit **természetes, változatlan** állapotban.

7 év óta ismeretes mint

megbízható cardiakum.

Fiziolog. titre V=5 Focke dr. szerint.

Előnyei: tökéletes digitalis hatás, egyenletesség, pontos adagolhatóság, jól tűrik, kumulatio nem lép föl, majdnem határtalan ideig eltartható, igen olcsó ár, **fajdalom nélkül** alkalmazható **subcutan**.

Belső és per rectum való használatra :
eredeti pénztári csomagolás 15 gr. = kor. **1.50**

Injectióhoz : 1 doboz = 6 ampulla = kor. **2.55**

Uj! Valeriana Digitalysat. Bürger


egyesíti magában a Digitalysat és a Valeriana-gyökér hatását. Eredeti üvegje à **15.0=2.00** kor. Adagja és hatóereje mint a Digitalysat. Bürgeré.

Irodalom és minta kapható :

EGGER LEO Dr. és EGGER J. BUDAPEST.

Chem. Laborat. Apotheker Joh. Bürger.

Wernigerode a./Harz.



REICHERT K.

OPTIKAI MŰVEK

cégtulajdonos

Reimann György

Budapest, VIII., Üllői-út 12.

Nagy raktárt tart: Mikroskópokból bakteriológiai vizsgálatokhoz, kézi és präparáló-mikroskópokból, nagyítókból, vérvizsgálatokhoz és ultramikroskópiához szükséges készülékekből és laboratoriumi berendezésekből, mikrotomokból, mikrophotográfáló és vetítőképes ülésekből, valamint polarizáló készülékekből.

Mikroskópokat kívánatra előnyös feltételek mellett részletfizetés ellenében is szállítok.

Angol bőrbutor és bőrszék-



különlegességek gyártása. Használt bőrbutorok festetnek. Kívánatra katalógust küld díjmentesen

SZÜCS A. BŐRBUTORGYÁR

Budapest, VII., Károly-körut 57. Telefon 148—07.

Dynamogen. Marhavérből állítatik elő, 100 részben 0,052 vas-oxyd van. Aromás, jól eltartható praeparatum. 1 evők. = 3 evők. friss marhavérrel. Dieteticum anaemiásoknál. Adag $3 \times$ napj. 1 evők. Gyer. 3×1 kk.

Ehrlich-Hatta 606, l. Salvarsan.

Eigonok. A jódnak és brómnak erős kötő s fehérjevegyületei. Bromkali, jódkali helyett haszn. *Bromeigon* 11% Br. tart. adag bels. porban, tablettákban 0,5—1,0 napj. többször. *Pepto-brômeigon* 15% Br. tart. Haszn. úgy mint az előbbi. *Jódeigon.* 20% J-tart. Bels. nem, küls. jodoform helyett 10 : 0% hintőpor, 5—10% kenőcsnek. *Jódeigon-natrium.* 15% J-tart. Bels. 0,1—0,5 pro dos. *Pepto-jód-eigon.* 15% J-tart. Bels. mint az előbbi.

Eka-Jodoformium. Jodoform és 0,65%-nyi paraformaldehyd keveréke. Steril anyag, ez az előnye a jodoform fölött. Hatás, haszn. l. jodoform.

Ektogan, l. Zincum superoxydatum.

H. Elaeosacchara. Olajcukrok, illatos czukrok. Dörzsölés által elegyítetük 2 gm. sacchar. alb. + 1 csepp. ol. aether. Iz- és szagjavítók. Leggyakrabban haszn. elaeosacchar. menthae piper-, anisi-, citri-, foeniculi.

Electrargol, l. Argentum coll. dale.

H. Electuarium lenitivum, l. Senna.

Emanosal. Radium készítmény. Fürdőkhöz használandó táblák, melyek vízben oldódnak. 1 db 50,000 Volt-nak megfelelő emanatiós értékű. A fürdővízben akkor kell feloldani, ha a beteg már 2—3 perczen át a fürdőben ül. Fürdő hőm. 34—35° Cels., tartama: $\frac{3}{4}$ —1 óra. Neuralgiák, rheumatismus, köszvény eseteiben dicsérik.

Emol. Zsirkó egy fajtája. Porban talcum helyett.

Emplastra.

Az emplastrumok helyett ma jobban szeretjük a kautschukot tartalmazó s ezért jobban tapadó collempastrumot. L. e cz. alatt. A régi emplastrumok közül a III. k. M. Gyk. csak az alábbi négyet tartotta meg:

†**H. Emplastrum Cantharidum.** l. cantharides.

H. Emplastrum diachylon simplex. Protectivum. Alapanyag más tapaszok készítéséhez. Szárító.

H. Emplastrum Hydrargyri. 20% kénesőt tart. Izgató, oszlató. Főleg syphilises fekélyekre rendeltetik.

H. Emplastrum saponatum. Gyengén izgató. Jó alapanyag más tapaszok számára.

*

Teufel klebro-pólya ruganyos, ragadós tekerespólya Heuss dr. szerint; kitűnő eredménnyel alkalm. rándulásoknál, csonttöréseknél, sebeknél, fekélyeknél és bőrbajoknál. (L. hird.)

Empyroform. Pix liquidának és formaldehydnek összekötése. Vízben nem oldh. barna por Haszn. 5—10%-os kenőcsök, paszták, szappanok és rázandó keverékek (ecsetelés) alakjában a bőrgyógyászatban mindenütt ott, a hol kátránykészítmények vannak javálva.

H. Emulsio amygdalina }
II. Emulsio oleosa } l. Amygdala dulcis.

Enophthalmia. A β encaimmal parallel vegyület. Fehér, jegeczes, vízben oldh. por. Gyengébb helyi anaestheticum. A szemészetben 2%-os oldatok haszn.

Enesol. Salicylarsinsavas kéneső. Fehér, alaktalan por, vízben 4% oldódik. Tartalmaz 38.5% Hg-ot és 14.5% As-t. Syphilis ellen intramnsularis befecskendések alakjában haszn. a már kész oldatot, mely ampullákba beforrasztva kapható. Egyben 2 köbcentimeter oldat, melyben 0,06 foglaltatik a vegyületheől. Napj. 1—2 köbctm. használandó.

Enterorose. Növényi fehérje husoldattal és diastaseval keverve. Tápanyag Felnőttnek 1 evők., gyerm. 1 kk. egyszerre.

Eosot, l. Kreosotum valerianicum.

Ephedrinum hydrochloricum. Az ephedra vulg. alkaloidájának sója. Színtelen, vízben oldh. jegecztűk. Mydriaticum, de az accomodatiót, intraocularis nyomást nem változtatja. 10%-os oldat 1—2 cseppjére hatás 40—60 p. múlva, mely órákig tart. Iritisnél nincs mydriat. hatása.

Epicarinum purum. A naphthol és kresotinsav condensatiós terméke. Fehér tűreskékből álló, gyengén eczetszagú, borszeszben, aetherben oldh. savtermészeti por. A sav helyett natronsója is használható. A bőr parasítás betegségei ellen küls. 10%-os kenőcsben.

494 Rp. Epicarini pur. 10,0.
 Vaselini 90,0.
 M. f. ungu.
 DS. Kenőcs. Scabies
 Prurigo.

495 Rp. Epicarini pur. 15,0.
 Sapon. kalini 200,0.
 Zinci oxyd. 10,0.
 M. f. ungu.
 DS. Külsőleg. Herpes
 tonsurans.

496 Rp. Epicarini pur. 10,0.
 Aether sulf. —
 Spir. vini rect. aa 80,0.
 Glycerini 5,0.
 M. f. linim.
 DS. Külsőleg ecsetelésre.
 Pruritus.

497 Rp. Epicarini 10,0.
 Naphtholi 5,0.
 Ungu. simpl. 100,0.
 M. f. ungu.
 DS. Kenőcs. Prurigo.

Enesol, steril. ampullákban, melyek 2 köbcm oldatban 0,06 Enesol tart., adag naponta egy amp. 10—20 injectiót felüledő sorozatokban, melyekre 8—10 napos szünet tartandó. (L. hird.)

Epinephrin. Mellékvese-kivonat. Haszn. mint az adrenalin.

Epirenan, l. adrenalin.

II. Equiseti arvensis herba. A species diureticae (karlsbadi tea) egyik alkotórésze. Önállóan nem haszn.

†**II. Ergotina,** l. *Secale cornutum*.

Ergotinol. s. Liquor ammonii ergotini. *Secale cornutum* savanyítva dialysált és ammoniával közömbösített vizes kivonata. 1 köbctm = 0,5 extr. secal. corn. Bőr alá igen fájdalmas. Adag. bels. 0,05:50,0 oldatból 20–30 csepp pro dos.

Ernutin. *Secale cornutum* készítmény. Bels. 2–3 köbctm. 3 óránként; subentan 0,3–0,6 köbctm.

Erythrolum. A bismuthum jodatum és cinchonidin. hydrojodicum kettős összeköttetése. Barnapiros, vízben, alkoh. nem oldh. por. Bels. gyomorfájdalmak, dyspepsiák esetén pro dos. 0,001–0,005 napj. 3-szor, porban.

Erythrolum tetranitricum. Nem az erythrolum származéka, hanem különböző zuzmókban előforduló erythrinből származó erythrit nitritje. Robban ütésre, hevítésre. Edényszetre, szívre úgy hat, mint a nitroglycerin, de hatása tovább tart, bár később támad. Bels. adag. tablettákban 0,03–0,06 pro dos., melyek készen kaphatók.

Erythrophloeinum hydrochloricum. Az N^o Cassa kéregben előforduló alkaloid sója. Sárgás, jegeczes, vízben jól oldható por. Lewin ajánlotta a cocain helyett, mint helybeli érzéstelenítőt. Fájdalmat okoz eleinte. Távolhatása mint a digitalisé, de görcs-
okozó is, mint a picrotoxin Haszn. nem ajánlható. Küls. 0,05% — 0,2%-os oldatok; bőr alá 0,1%–1%-os oldatból 1/2–1 fecsk.

Escalin. Aluminium pora 2 rész glycerinnel 1 résszel össze-
dörzsölve s pastillákká alakítva. Bism. subn. helyett ajánlja Klemperer ulcus ventriculi eseteiben mint protectivumot. Használata köv.: 4 pastilla fél pohár vízben oldatik; a tejszerű folyadékot éhgyomorra egyszerre meg kell inni. 2 óra hosszat ezután enni-inni nem szabad. Suppositoriumokat is készítenek, melyek végbélvérzések ellen (kül. haemorrhoidalis vérzések) használatnak.

H. Eserinum salicylicum, l. *Physostigminum salicyl.*

Ester-dermasan, l. *Dermasan*.

Eston. (Alum. acet. bas. pulver.) Igen finom, fehér por. Adstringens, d. sodorans, antisepticum. Hintóporban tisztán, kenőcsnek 5–10%-ban.

Teufel műtési pólyája kötések alkalmazására, alhasi műtétek után. (Lásd hirdertést.)

Ergotina Styptica Egger megbízható ergotin-készítmény fokozott ergotin hatással. (L. hird.)

Estoral (borsavasmentholester). Fehér, borsavra és mentholra könnyen hasadó, vízben, szeszben nem oldl. por. Az ornyálkahártya különböző lmrutos és más betegségeinél befúvás, szippantás alakjában haszn.

†**H. Eucainum hydrochloricum B.** (Trimethylbenzoyloxypiperidm.) Rokonvegyület a cocainnal. Két félesége van A) és B) encain. B) féleség a szemészetben és a Schleich-féle érzéstelenítésnél (l. cocain) a cocain helyettesítője; az A) féleség toxicensabb. Mindkettő szintelen, közömbös jegeczpor; az első 10 r., a második 28 r. hideg vízben old. Haszn. helybelileg mint a cocainé. B) encain-sóból a szemészetben 2%-os oldat, ugyanannyi cocainnal vegyest; cystoscopozásnál 0.2%-os, orr és gége érzéstelenítésre, gátvarráskor 5–10%-os, fogászatban 10%-os oldatok.

498 Rp. Eucaini B. 0,10.
Morph. mur. 0,025.
Natr. chlor. 0,8.
Aquae dest. steril. 100,0.

MDS. Schleich-féle be-
feeskendésre.

499 Rp. Encaini B. 0,2.
Andrenalini 0,001.
Saccl. lact. pulv. 10,0.

MDS. Küls. Szippantópor
nátha ellen.

Eucainum lacticum B. mint az eucainum hydrochlor. B.

Eucalypti folia. (Eucalyptus globulus. Myrtaceae). Hatóanyagai illatos olaj, kevés gyanta és cersav. Antisepticum, antipyreticum, antimalaricum (?), diaphoreticum. Küls. kötésekhez infus. 10,0 : 100,0. Bels. infus. 10,0 : 150,0 2 ór. 1 evőkl.

II. Oleum Eucalypti. Majdnem szintelen illó olaj, vízben alig, borszeszben könnyen oldódik; lavandulához hasonló szagú, hűsítő, kesernyés ízű. Küls. elvonó linimentumnak 1 : 5. (ol. sesami); desinficiens sebkötő folyadéknak 2 r. + 20 r. spiritus + 80 r. víz. Belégzésre 10–15 cseppet forró vízre csepegtetni, a párák belégzendők (bronchitis foetida, gangraena pulmon., bronchiectasia esetén). Bels. malariás láznál 5–15 csepp pro dos. caps. gelatinosában 4–5-ször napj. (Nem megbízható.)

Eucalyptolum. (C₁₀H₁₈O). Az eucalyptus-olaj egyik alkotórésze. Szintelen, camphor-szagú folyadék, vízben oldhatlan; borszeszben, aetherben, zsíros olajokban jól oldható. Haszn. küls. mint bőrizgató, rheumatismus, neuralgiák eseteiben, sebészetben fertőztelenítő kötésekhez, mint az ol. eucalypti. Bels. idült bronchitis-, bronchitis foetida, gangraena pulm. bronchiectasia eseteiben adag: 5–10 csepp napj. többször, gelatin-tokocskákban v. belégzés alakjában úgy, mint az ol. eucalypti.

Bronchiectasia : Rp. Gelodurat „Pohl“
scat. orig. c. ol. Terebinth. rect. 0.5.
S. naponta 3–6 dbot.

Tinctura Eucalypti. Bels. 2—4 kk. napj. febris intermittens malarica esetén a lázmentes időben; gyermekeknek tussis convulsiva ellen ajánlották. (3,0 : 100,0, 3 ór. 1 gyk.)

500 *Rp.* Tinct Eucalypti 3,0.
Glycerini 15,0.
Syrup. Menthae 30,0.
Aqua dest. 100,0.
MDS. 3 ór. 1. gyk.
Nagyobb gyermek-
nek tussis convul-
siva ellen.

501 *Rp.* Eucalyptoli gtt. 5.
Det. in caps. gelat.
Dent. tal. dos. No. 20.
S. 2 ór. 1—2 szemet.
Bronchitis foetid. Gangr.
pulm.

Eucasol. Nem más, mint eucalyptusanytol. 1. Anytol.

Eucerin. Kenőcsalapanyag; főleg paraffint és lanolint tartalmaz. Különös előnyei nincsenek.

Euchininum. (Chinin-carbonsavaethylester ($CO.O C_2 H_5.O C_{20} H_{23} N_2 O$). Fehér jegeczek. Old. alkoholban, aetherben, nehezen vízben. Chininsók jó helyettesítője, mert íztelen. Különösen gyermek. Adag pro die 2-szer annyi, mint a chininsókból.

502 *Rp.* Euchinini 0,4.
Dent. tal. dos. No. 10.
DS. Napj. 3—5 port $\frac{1}{2}$
óránként bevéve a
roham előtt 3—4
órával. Gyerme-
keknek antimala-
ricum.

Eucodin. Codeinbrommethylat [$C_{18} H_{21} NO_3.(BrCH_3)$]. Vízben jól oldható kristályos anyag. Köhögés csillapítására 0,2—0,3 gm. pro dosi oldatban v. tablettában napj. 3—4-szer.

Eucol. (Guajacolum aceticum.) Színtelen, alkoholban oldh. folyadék. Hatása, haszn. mint a többi guajacol-készítményé. Előnyei nincsenek. Adag: 0,25 gm. 4—6-szor napj. caps. gelatban Bőr alá 25%-os olajos oldatból napj. 1 ketm.

Eudermolum. Salicylsavas nicotin. Színtelen, vízben, alkoh. oldh. jegeczek. Scabies ellen 0,1:100 kenőcs; 4—6 napon át egy-egy bekenés. Nem veszélytelen nicotinhatósa miatt.

Eudoxin. L. Nosophen.

Eugadolum. [$C_6 H_2(OH)_2 O.C_2 H_3 O$]. Pyrogallolacetat. Sűrű, barna, átlátszó, vízben, alkoh. oldh. anyag. Hatása, haszn. mint a pyrogallolé. Acetonnal \overline{aa} ecsetelések alakjában a bőrgyógyászatban.

Capsules Cognet (eucalyptol jodoform és creosot) bevált bronch. chr., bronchorrh., bronchi-ekt, bronchopneumonia eseteiben.

- Eugallol.** A pyrogallol ecetsavas összeköttetése. Barnássárga, vízben, szeszben, acetonban oldh. sűrű folyadék. Bőrgyógyászatban mint a pyrogallol is, redukáló hatású, helybeli izgató és antimicrobicum. Rendszeren acetonoldatban v. ricinusolaj-oldatban haszn. 50—60%-os oldat ecsetelések alakjában. Ép bőrre ne ecseteljük!
- Eugenoforn.** Keletkezik, ha eugeninre hat formaldehyd. Szóles, szinte'len jegceztáblák. Vízben oldh. Béldeinficiens. Reggel, este 0.5—1.0.
- Eugufornium.** Guajacol és formaldehyd összeköttetése. Szürke por. Enyhén fájdalomcsillapító égési sebekre, fekélyekre hintve por alakban. Acetonban oldva s ecsetelve bőrbajokhoz társult viszketés ellen is ajánlják.
- Eulactol.** Tápanyag. Tejből s növényi fehérjéből készül. Gyermekek számára ajánlják.
- Eulaxans.** Phenolthalein-natrium. Hatása, haszn. mint a purgóé. Előnyei fölötte nincsenek.
- Eulyptol.** (SCHMELTZ.) Erélyes antifementativum. Keveréke 6 r. salicylsavnak, 1 r. carbolnak és 1 r. eucalyptus-olajnak. Küls. sebészetben mint antisepticum. Főlölesleges készítmény. Nem tévesztendő össze az eucalyptollal (!).
- Eumenol.** Chinában tenyésző Tang-kin növény gyökerének kivonata. Haszn. metrorrhagia, dysmenorrhoea ellen. Adagja hószám idején 3-szor napj. 1—1 evőkanállal, amíg 100—150 gm. elfogyott.
- Eumorphol.** Morphinnal idültén mérgezett házinyúl vérséruma. A morphinismus chron. kezelésére ajánlották (?) Hatása több mint kétes!
- Eumydrin.** Atropin-methylnitrat. Fehér, kristályos anyag, vízben jól oldódik. Haszn. mint az atropin; mydriaticum; izzadás ellen és gyomor- és bélgöresök ellen. Adag szemészetben 1—5%-os oldat becséppentésre; bels. 0,001 gm. porban, pilulában v. oldatban. Dreser szerint 50-szer kevésbbé mérges, mint az atropin.
- Eunatrol.** Olajsavas natron). Fehér por. 0,25 gm. tartalmú, csokoládéval bevont pilulákban kapható. Cholagogum; naponta kétszer 4—4 pilula veendő hosszabb ideig.
- 503 Rp.** Eunatrol 5,0.
Sacchar. alb. 2,0.
M. f. pulv. div. in
dos. aequ. No. 20.
DS. napj. 3-szor 1—2 port,
Cholelithiasis
-
- Tablettaa Eulaxans dr. Sztankay,** a hashajtó hatást a gyomorsav behat. alatt képz., molekul. változást nem szenvedett phenolphthalein idézi elő, a hatás azért sokkal jobb mint az elraktározott, molekul. változáson átment phenolphthalein. (L. hird.)
- Dysmenorrhoea:** Rp. Gelodurat „Pohl”
scat. orig. c. Extr. Hydrast. 1'0.
S. 3—4-szer naponta 1 dbot.

Euphthalminum hydrochloricum. ($C_{17}H_{25}ON_3.HCl$). A mandulasav egy származéka. Színtelen, jegezes, vízben oldh. por. Mydriaticum. Erősebb oldatokra accomodatio-hűdés is. Főleg szemtükri vizsgálatok alkalmával haszn. 2—5%-os old. becsépetés alakjában.

Euphorinum s. Phenylurethan. ($CO.O C_2H_5.NH C_6H_5$). Fehér, jegezes, aromás por. kissé csípős ízű; vízben nehezen, borszeszben könnyen oldódik. Antirheumaticum, analgeticum, antipyreticum, mint az antipyrin. Adag bels. kezdetben 0,1—0,2 gm.; ha jól tűrik 0,5 gm. pro dos. Pro die 1,0—2,0 gm (!).

Euphyllin. (A theophyllin-(theocin) aethylendiaminos vegyülete.) 75% theophyllint tart. Jegeczpor, nem jó ízű. Hatás, haszn. l. theocin.

†II. **Euphorbium.** (Euphorbia resinifera. Euphorbiaceae). Megszáradt tejnedv; sokoldalú, leginkább borsónagyságú, szennyes, halványsárga, homályos, csípős ízű darabok; vízben, borszeszben csak részben oldódik. Izgató tapaszok alkatrésze. Azelőtt bels. mint drasticum haszn., most már obsolet.

Euporphin. Apomorphinum-methylbromatum. Fehér, vízben jól oldódó por. Világosságon megbarnul. Az apomorphin pótszere. Expectorans, midőn alig okoz émelygést. Adagja pro dos. 0,005 napj. 3—4-szer oldatban v. tablettában. Sötét üvegben rendelő.

Eupyrin. (Vanillin aethyl-carbonat-p-phenetidín). Enyhén vanillaszagú, íztelen, kissé zölkes por. Enyhe antipyreticum. Adagja 1,0—1,5 gm., gyermekeknek 0,3—0,5 gm.

Euresol. A resorcinnak acetatja. Sűrű, sárga folyadék. Aceton-oldatban (10—50%) és kenőcs alakjában (5—10%) bőrgyógyászatban haszn. resorcin helyett.

504 Rp. Euresoli.	505 Rp. Euresoli	2,0.
Ol. Eucalypti aa 2,0.	Vasellini	20,0.
Collodii flexil. 20,0.	M. f. ungu.	
<i>MDS.</i> Küls. Fagydagana-	<i>DS.</i> Kenőcs. Kezek ecze-	mája ellen.
tok ecsetelések		
alakjában.		

Euretol. Resorcin-monoacetat. Kellemes szagú, sárga, sűrű anyag. Bőrgyógyászatban resorcin helyett acetonban 1:2—5 oldva, ecsetelés alakjában.

Eurobinum. Chrysarobintriacetat. Vízben nem, chloroformban acetonban oldh. anyag. Hatása, haszn. mint a chrysarobiné. Küls. 2—3% kenőcs, acetonban oldva 1,0—2,0:100 ecsetelések.

Alimentum Theinhardt est maxime idoneum pro infantibus.

Vichy Grande Grille-forrás kit. hatású májbajok, epekövek, allasi pangás eseteiben. (L. hird)

Antralapis jól bevált epe-, vese- és hólyagköveknel. (L. hird)

Europhenum. Isobutyl-orthocresol-jodid. 28,1% jódot tartalmaz. Finom, sárga, vízben oldhatlan por, borszeszben, aetherben, zsíros olajokban jól oldódik. Ha megnedvesedik, jód hasad le belőle. Antisepticum jodoform helyett. Használták ulcus cruris scrophuloticus fekélyek, fekélyes lupus, combustio, ulcus molle, ulcus syphil. eseteiben kenőcs, pasta, collodium alakjában (1 : 5—10). Subcután syphilis eseteiben 0,05—0,1 gm. pro dos. olajban oldva.

Eurythrolum. Marhalép vizes kivonata egyéb anyagokkal keverve. Barna, sűrű, forró vízben oldh. anyag. Chlorosis, anaemia eseteiben napj. 1—2 kk. ajánlják étellekkel (leves) keverve hogy használtassék.

Euscopol. Nem más, mint tiszta scopolaminum hydrobrom. L. e cz. a.

Eustenin. (Theobrominnatrium-jódnatrium.) 51% theobromint és 36% jódnatriumot tart. Vízben oldh. hygroskopos por. Arteriosklerosis ellen 0,5—1,0 pro dos. oldatban v. caps. anylaceában, napj. többször.

Euvaselin. Kenőcsanyag. Vaseline ceresinnel keverve.

Evonyminum. Barnás v. zöldes, gyantaszerű kivonat, melyet az evonymus atropurpureus gyökereinek v. ágainak kérgéből nyernek. Vízben oldhatlan, borszeszben jól oldódik. Chologogum, catharticum, nagy adagban drasticum. SENATOR a podophyllin) nel egyenrangúnak tartja. Adag bels. 0,1—0,2—0,4 (drasticum-pro dos. pilulában; czélszerű extr. belladonnae-val v. extr. hyosiami-val összekötni. Obstip. habitualis eseteiben 0,05—0,08 pro dos. pilula-alakban; ennyi hosszabb időn át is adható.

Exalginum s. Methylacetanilid ($C_8H_{11}NO$). Pompás, színtelen, hosszú jegeztűket v. fehér táblácskákat képez, melyek hideg vízben nehezen, híg v. tömény borszeszben könnyen oldódnak. Analgeticum; DUJARDIN-BEAUMETZ szerint mint ilyen fölötte áll az antipyrinnek. Főleg neuralgiák ellen ajánlatik. Adag bels. 0,2—0,5 pro dos. napj. többször gyenge alkoholos (rhmos, cognacos stb.) oldatban.

506 Rp Exalgin 2,5.
Spirit. Menthae pip. 5,0.
Aqua Melissae 120,0.
Syrup. cort. Aurant. 30,0.

MDS. Reggel és este egy evők. (0,25).

508 Rp. Exalgin 2,5.
Cognac 15,0.
Syrup. simpl. 30,0.
Aqua dest. 100,0.

MDS. Egyszerre 1—3 evők.
napj. 3—4-szer.

507 Rp. Exalgin 2,0—3,0.
Extr. Belladonnae
Codeini phosphor.

aa 0,1.
Sacchar. lact. 5,0.
M. f. pulv. div. in
dos. aequ. No. 10.

DS. Szükség esetén egy port.

Cardialgia. Ulcus
ventr. fájdalmi
rohamai ellen.

Exodin. Homolog rufigallussav-aetherek keveréke. Sárga, vízben oldhatatlan por. Enyhe hashajtó; hatása 8—12 óra múlva áll be. Adag 0,5—1,5 gm. 0,5 gmos tabletták alakjában. Nem tévesztendő össze az exodyne-el, mely acetanilidből, natr. bicarb.-ból és natr. salicyl.-ból álló keverék.

H. Extracta omnia. l. a megfelelő drogue-ok czímei alatt.

Extracta fluida. (Fluid extract.) Amerikai folyékony gyógyszeralak, a mi tincturáink helyett. Egy köbctm. fluid extractum rendszeren a készítéshez felhasznált drogue 1 gmjának felel meg. Igen czélszerű készítmények.

Extractum arenariae rubrae. l. Arenariae rubrae extr.

Extractum Aspidii spinulosi. l. Aspid. spin. extr.

Faex medicinalis. Élesztő, mely liquida és sicca alakban kapható. Utóbbit inkább haszn. Adag napj. 3-szor 1 kk. sörben v. kávéban furunculosis eseteiben.

H. Fasciae e tela paratae. Mullpólyák. 5—10 m. hosszú és 6—12 ctm. széles pólyák. Sterilizált állapotban szabályszerűen csomagolva kaphatók.

H. Fasciae e tela amylo imbuta paratae. Organtinpólyák. 5—10 m. hosszú, 6—12 ctm. széles pólyák.

Fel Tauri inspissatum. Besűrített marhaepe. Sötét, barnászöld, sűrű anyag. Aloe- vagy jalapával készült hashajtó pilulákhoz mint constituens, ha azok ictericus betegnek rendeltetnek.

Fermentum cerevisiae, l. Faex medicinalis.

Ferri praeparata.

A bels. használt vaskészítmények javalatai: chlorosis, oligoemia, rhachitis, scrophulosis esetei. Ellenjavalatok: haemoptoe és más vérzések, gümőkór, lázak, plethora, acut gyomorhurut, epilepsia. Bevétel legczélszerűbben étkezés közben. A hiv. és nem hiv. régibb és újabb készítm. a következők:

Ferratinum. 7% vasat tartalmazó, szerves vasösszeköttetés (vasalbuminsav); azonos a sertésmájából előállítható vasvegyülettel. Vörösbarna, vízben oldhatlan, szag- és íztelen por. Bels. adag: porban 0,5—1,5 pro die, többszörre felosztva. Gyermekeknek 0,1—0,2 pro die.

Ferratogen. Vasnuclein, melyet élesztőgombának vastart. táptalajon tenyésztésével nyernek. Sárgabarna, vízben oldh. por. Vastart. 1%. Adag bels. több gm, pro dos.

Perdynamin olcsó, jóízű haemoglobin-készítmény, kiváló tápláló és erősítőszer anaemia, chlorosis, rhachitis, reconvalescentia eseteiben. (L. hird.)

Ferratose. Ferratin oldata l. Ferratin.

Ferrichthol. Ichthyosulfosavas vas. Fekete, szag- és íztelen, vízben, alkoh. nem old. por. $3\frac{1}{2}\%$ *Fe*. tart. Haszn. mint a *Fe* általában. Adag: napj. többször. 0,1—0,2 porban pilulában, tablettákban. Utóbbiak 0,1 tartalommal készen.

Ferricodile Leprince. L. Kakodyl-készítmények.

Ferripyrinum. Vaschlörid és antipyrin vegyülete. Narancsszínű, vízben jól old. por. Adstringens, vérzéscsillapító; nem mar. Porban vagy 20%-os oldatban alkalmazható küls. vérzéscsillapítóképen orrvérzés, fogextractio, stb. eseteiben. Bels. chlorosis ellen $\frac{1}{2}\%$ oldatban 0,05 napj. 3—4-szer.

Ferrocodile Leprince. L. Kakodyl-készítmények.

Ferroglydine. *Fe* vegyülete növényi fehérjékkel. Vörhenyes barna por. Haszn. mint a ferratiné. Adag u. az.

Ferroplasma. 3% *Fe*-ot tartalmazó szerves vaskészítmény, melyet a *rumex crispus*-ból állítanak elő. 0,5—1,0 gmnyi adagokban.

Ferro-somatose. Vastartalmú somatose. Naponta 6,0—15,0 veendő belőle.

Ferrosol. Vasoxyl-chlornatrium kettős saccharatja. Barna, vízzel keverhető $0,77\%$ *Fe*-tart. folyadék. Adag: napj. $3-4 \times 1$ kk.

Ferrostyptin. Valószínűleg a hexamethylen-tetramin vasas vegyülete. Jegeszes, sötétsárga, karbolszagú, fanyar ízű, vízben oldh. por. Adstringens és stypticum; nem mar. Ferr. sesquichlor. helyett haszn. vérzéscsillapítónak kisebb vérzéseknél (orr, garat, foglús, kisebb sebek) hintőpor alakjában. v. gyapotr. gaze-ra felvéve s azzal tamponozva. Nőgyógyászatban 10—40%-os oldatok. Nem szabad felhevíteni az oldatot.

Fersan. Vastartalmú paranucleo-proteid vegyület. $0,37\%$ vasat, $0,12\%$ phosphorsavat és 81% fehérjét tart. Barna, sós ízű, meleg vízben oldh. por. Gyomorban nem változik meg. Duodenumban az összes mennyiség felszívódásra kerülhet. Adag: $3-6 \times$ napj. 1 kk. étkezés előtt v. közben, vízben, levesben, tejben. Gyerm. fele, harmada.

II Ferrum pulveratum. (*Fe*). Finom, sötétszürke, íztelen nehéz por, kevésbé fémtényű. Bels. adag: 0,05—0,2 pro dos 3—4-szer napj. porban, pastillában.

II. Ferrum hydrogenio reductum. (*Fe*). Szürke, fénytelen, igen finom por, íz- és szagtalan. Bels. adag: 0,05—0,2 pro dos. $3-4 \times$ napj. porban, pilulákban, pastillában.

Ferrum carbonicum saccharatum. (*FeCO₃*) 10% vasat tartalmaz. Zöldesszürke por, édeses fémízű; emésztést csak kevésbé zavarja. Bels. adag: 0,2—0,5 pro dos. $3-4 \times$ napj. porban.

Fersan (vas- és phosphortartalmú acidalbumin) a haemoglobin és a vörös vérszéltek jelentékeny szaporodását idézi elő, érvágyat gerjeszt, emeli a testsúlyt és erősíti az idegeket. (Lásd II. sz. hirdetést.)

H. Pilulae ferri carbonici Pilulae Blandi. Egy drb 0,05 ferum carbonatot tartalmaz. Napj. 3-szor 3—6 szemet.

Ferrum glycerino-phosphoricum. ($C_3H_7O_3PC_3Fe + H_2O$). Sárga, vízben oldh. lemezkek. Adag 0,2 napj. 3—4-szer oldatban v. pil.

Ferrum kakodylicum. Amorph, szürkés-zöldes, vízben oldh. 45% vasat és 32% arsént tart. por. Haszn. ha *Fe* és *As* hatását együtt kívánjuk. Bels. adag: 0,025—0,05 napj. 3-szor, étkezés közben, oldatban v. pilulában. Bőr alá 0,025—0,1 pro die és pro dos.

H. Ferrum lacticum. [$Fe(C_3H_5O_3)_2 \cdot 3H_2O$]. Zöldesfehér, apró, tűalakú kristályokból álló kéregdarabok vagy por. 40 r. hideg, 12 r. forró vízben oldódik, borszeszben alig; emésztést nem zavarja. Bels. adag: 0,1—0,2 pro dos. 3—4-szer napj. porban.

H. Pilulae ferratae. Egy szem tartalmaz 0,1 gm. ferum lacticumot, adag 1—2—3 szem 3—4-szer napj.

Ferrum natrio-pyrophosphoricum. [$Fe_4(P_2O_7)_3 \cdot 3(Na_4P_2O_7) \cdot 14(H_2O)$] Fehér, jegezes por, íze enyhén sós, de nem összehúzó, hideg vízben lassan és nehézkesen, langyosban könnyebben oldható; 13% vasat tartalmaz. Bels. adag: 0,2—0,5 pro dos. 3—4-szer napj. porban.

H. Liquor Ferri oxychlorati s. Oxychloridum Ferri solutum. Sötét barnavörös, átlátszó, szagtalan folyadék, gyengén összehúzó ízű, 3 1/2% vasat tartalmaz. Ferrum oxydatum dialysatum helyett vétetett fel a M. Gyk.-be. Adag bels. 10—20 csepp pro dos. 3—4-szer napj.

Ferrum oxydatum dialysatum solutum. Híg, sötétbarna, kissé összehúzó ízű folyadék; 5% vaséleget tartalmaz. Bels. adag: 5—15 csepp pro dos. 3—4-szer napj.

H. Extractum malatis Ferri s. Extractum Ferri pomati. Körülbelül 5% vasat tartalmaz almasavas só alakjában. Zöldes-fekete színű, vízben jól oldható anyag. Bels. adag 0,5—1,5 pro dos. 3—4-szer napj. oldatban, pilulában.

H. Tinctura malatis Ferri s. Tinctura Ferri pomati. 0,5% vasat tart. Bels. adag: 30 csepp — 1 kk. pro dos. 3—4-szer napj.

Tinctura Ferri acetici aetherea. Tiszta, barnásvörös, eczet-aether szagú, savanyús, összehúzó ízű, vízben jól oldódó folyadék. A vas hatása mellett kevésbé excitans is. Bels. adag 15—30—50 csepp pro dos. 2—4-szer napj. cukros vízben, tokajiban.

Elixir ferri glycero-phosphat „Gréb“ könnyen assimilálódó vaskészítm., tart. *Fe*, *Na*, *Ca*-glycer. phosph., jav.: anaemia, latens tuberk., neurasth., morb. Basedowi, gyöngye gyermekek erősítésére. (L. hird.)

II. Ferrum oxalicum oxydulatum crystallis. s. Ferrum protoxalatum. ($FeC_2O_4 \cdot 2H_2O$). Sárga por, vízben nem oldódik. Egyike a jobb vaskészítményeknek. Bels. adag: 0.20 pro dos. 2–3-szor naponta. Jók a dr. Deér-féle tabletták.

H. Ferrum sesquichloratum crystallisatum (Fe_2Cl_6). Kristályos, barnássárga, légen szétfolyó tömeg; vízben, borszeszben, aetherben jól oldódik. Csak oldatban haszn. L. a köv. készítményt.

H. Ferrum sesquichloratum solutum s. Oleum Martis. (Ferrum sesquichlor. crystall. + Aqua dest. aa.). Sötét, sárgásbarna folyadék. Küls. töményen causticum, hígítva stypticum. Bels. erős hígításban stypticum gyomor-, bélvérzések, vesevérzések, haemoptoë eseteiben. Küls.: injectiókra, belégzésekre 1%-os oldat; vérző sebek, diphtheriticus fekélyek esetelésére 1:2 vízhez v. 1:1 vízhez. Bels. adag: 1,0–3,0; 150,0 2 ór. 1 evőkl.

H. Spiritus aethereus ferratus s. Tinct. nervino-tonica Bestuscheffi. Aranysárga színű, összehúzó, vasízű folyadék. Csak bels. chloroticus, oligemicus, kimerül betegeknek. Adag: 10–30 csepp 3–4-szer napj. czukron v. tokaji borban.

H. Ferrum sulfuricum oxydulatum. Vasgálicz [$Fe_2(SO_4)_2 \cdot 4H_2O$]. Kékes-zöld színű, jegecsez por, vízben jól oldódik. Küls. hintőpor alakjában stypticum; $\frac{1}{2}$ %–1% os oldatokban adstringens. Bels. kali carbonicummal, mint Bland-féle labdacok chlorosis ellen. L. Pilulae ferri carbon. cz. a. 150. old.

H. Syrupus Ferri jodati. (100 részben 12,2 r. vasjodür). Színtelen v. kissé sárgás, vasízű. Scrophulosis, amyloid elváltozások, syphilis- és malaria-cachexia eseteiben bels. 15–30 cseppet 3–4-szer napj.

H. Pilulae Ferri jodati s. Pil. Blankardi. Haszn. mint a syrup. ferri jodat. Adag: 3–9 szemet napj.

Alboferrin. Vas-phosphor-fehérje vegvület. Világos barna, szag- és íztelen, vízben jól oldh. por. Tápanyagokhoz keverendő anaemia, chlorosis eseteiben. Pastillákban is kapható.

Carniferrin. Vasvegyülete a phosphorhússavnak. Íztelen, savakban és alkáliákban oldh. por. 30% *Fe*. tart. Jó vaskészítmény. Adag bels.: 0,5 pro dos. napj. többször. Gyer. 0,2–0,3 pro dos.

Triferrin. Paranneleinsavas vas, 22% *Fe*, 2,5% *P*. 9% *N*. Haszn. bels. napj. 3 \times 0,3. Tabletták készen 0,3 tartalommal. Jól haszn. készítmény.

Haematogen (Dr. Hommel), szerves vasat tartalmazó, vértképző készítmény, a legértékesebb dietétikus erősítőszer felnőttek és gyermekek részére, mindenféle eredetű gyöngeségi állapotoknál. (L. hirdetést.)

II. **Liquor Ferri albuminati.** 4‰ Fe. tart. Adag: 3-szor napj. étkezés közben egy-egy kk. v. gyk. Gyermekeknek fele.

H. **Liquor Ferri albuminati saccharatus s. Elixirium Ferr. alb Kb.** 3‰ Fe tart. Adag valamivel több, mint az előbbiből. Ez a két liquor Ferri alb. minden ilyenmű más gyógyszer-speczialitást fölöslegessé tesz s jobb is ezeknél, mert bár nem sok, de megbízható mennyiségű Fe-ot tartalmaz.

Globuli martiales. 40 grm súlyú golyók. Feketék, fénylők, 8 r. forró vízben csaknem egészen oldódnak. Kaliumferrotartaricumot tartalmaznak. Vasas fürdők készítéséhez 1—4 db. használandó. Fölsleges! Vasas fürdők pharmacologice nem igazolhatók!

Felnöttek számára.

509 *Rp.* Ferri pulv.
Pulv. rad. Rhei aa 1,0.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
DS. Napj. 3 port.

511 *Rp.* Ferri reducti 2,5.
Pastae cacaoinae
sacch. qu. s.
M. f. l. a. pastilli
No. 50.
DS. 3-szor napj. 1—2
szemet.

513 *Rp.* Ferri lactici
Extr. Chinae
Pulv. rad. Rhei aa 2,0.
Extr. Gentianae qu. s
ut. f. pilulae No. 30.
Consp. pulv. Cinnamomi.
DS. 3-szor napj. 1—3
szemet.

515 *Rp.* Extr. malat. Ferri 8,0.
Vini Tokayens. 150,0.
M. f. solut.
DS. 3-szor napj. 1 evők.

510 *Rp.* Ferri reducti.
Chinin. hydrochlor.
aa 2,0.
Elaeosacchar. Cinnamomi 6,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 20.
MDS. Napj. 3 port.

512 *Rp.* Ferri carbon. sacchar.
2,0.
Extr. Nucis vom. 0,1.
Sacchar. albi 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
DS. Napj. 3 port.

514 *Rp.* Ferri natrio-pyrophosph.
2,0.
Chinin. sulfur. 1,0.
Sacchar. alb. 2,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
DS. Napj. 3—4 port.

516 *Rp.* Tinct. malat. Ferri.
Tinct. Chinae comp.
aa 20,0.
Tinct. Nucis vom. 3,0.
MDS. 3-szor napj. egy kávéskanál.

Peptonate de Fer Robin könnyen fölszívódó folyékony vas-készítmény, 0,01 vas 20 cseppben, a gyomrot nem terheli, a fogakat nem feketíti, székrekedést nem okoz. (L. hird.)

Anaemin (vas-pepsin-saccharat) sec. Liebe eltarth., jóízű, étvágygerj. vaskészítm., jól bevált gyöngeségi állapotoknál, vérvesztéségnél, gyomorbajoknál stb., nem okoz gyomornyomást, sem békrekedést. (L. hird.)

517 *Rp.* Ferri protoxalat. 2,0.
Sacch. albi 1,0.
M. f. p. divide in dos.
aequ. No. 10.
DS. Étkezés közben egy
por veendő.

519 *Rp.* Ferri protoxal.
Natrii bicarb. \overline{aa} 7,5.
Extr. Nucis vom. 0,3.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 30.
DS. Napj. 2 port evés
közben. Chlorosis.

521 *Rp.* Tablettae ferri prot-
oxalati Deér sine vel
cum arsenico lag.
origin.
DS. Evésközben 1—2
szem veendő.

523 *Rp.* Ferri sulfur. oxydul.
Kalii carbon. \overline{aa} 15,0.
Tragacanthae pulv.
8,0.
Syrup. simpl. qu. s.
ut. f. l. a. pilul.
No. 100.
Consp. pulv. Cinna-
momi.
DS. 3-szor napj. 3 szemet,
majd 4—5 szemet.
Bland-féle pilulák
Niemeyer után.

527 *Rp.* Pilul. Ferri carb. sec.
Pharm. hung. No. 50.
DS. 3-szor 3—5 szemet
napjában.

518 *Rp.* Ferri sesquichlorati
cryst. 3,0.
Collodii flexil. 27,0.
MDS. Külsőleg.
Collodium stypticum.

520 *Rp.* Ferri protoxal. 10,0.
Extr. Cardui bened.
Pulv. Liquir. \overline{aa} qu. s.
F. pilul. No. 100.
DS. Napj. 5 szemet evés
után.

522 *Rp.* Ferri sesquichlorati
sol. 2,0.
Aquae dest. 150,0.
Syrup simpl. 20,0.
MDS. ór. v. 2. ór 1 evő-
kanállal.

524 *Rp.* Syrupi Ferri jodati
20,0.
Syrup simpl. 80,0.
MDS. 3-szor napj. 1 kávé-
kanállal.

525 *Rp.* Pilul. Ferri jodati.
Dentur No. 50.
S. 3-szor napj. 2—3 sze-
met.

526 *Rp.* Ferratini 20,0.
Div. in dos. aequ.
No. 20.
DS. 3 ór. egy port.

528 *Rp.* Ferri glycer. phosph.
2,0.
Glycerini pur. 10,0.
Vini Tokayensis 200,0.
Digere per horas quat-
tuor. dein filtra.
DS. Étkezés előtt egy
tokaji pohárral.

Tabl. Biodynii sec. Gréb (Tinct. ferri glycerophosph.) élet-
erő-tabl., erősítő tápszer tabl. formában csokoládé bevonattal.
pro dosi: Fe, Ca, Mg, Mn, Na és Chininylycer. sói 0:10, jav.:
chlorosis, anaemia, latens tuberk., neurasth., morb. Basedowi,
gyöngye gyermekek erősítése. (L. hird.)

529 *Rp.* Ferri kakodyl. 1,25.
Sacchari albi
Gummi arab.
Aqua glycerin. aa qu.
s. ut. f. pil. No. 50
Cosp. pulv. Cinnam.
DS. 3—1-szer napjában
étkezés közben egy
szemet.

530 *Rp.* Ferri kakodyl. 0,25.
Aqua dest. 10,0.
MDS. Bőr alá fecskendésre
1—3 fecskendővel
napj.

Gyermekek számára.

531 *Rp.* Liquor ferri oxychlorati 1,0.
Aqua dest. 80,0.
Aqua Menthae pip.
Syrup. cort. Aurant.
aa 10,0.
MDS. 2 ór. 1 gyk.

532 *Rp.* Liquor ferri oxychlorati 2,0.
Aqua dest. 100,0.
Syrup simpl. 10,0.
MDS. 2 ó. 1 kk. v. gyk.
3—4 éves gyermeknek.

533 *Rp.* Ferri reducti 0,5.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
DS. 4 port naponta.
Serdülőknék. Chlorosis.

534 *Rp.* Ferri carbon. sacchar. 1,0.
Chinin. sulf. 0,5.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
DS. 3-szor napj. 1 port.

535 *Rp.* Ferri lactici 0,5—1,0.
Calcariae carbon. praecip. 1,0—2,0.
Sacchar. alb. 10,0.
M. f. pulv. det. in scat.
S. Naponta 3 késhegygyel. 1—3 évesnek.
Rhachitis.

536 *Rp.* Ferri lactici 0,6—1,0.
Sacchar. alb. 6,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 20.
DS. 3—4 port naponta.
4—8 évesnek scrophulosis esetén, ha nagyobb fokú oligaemia is van jelen.

537 *Rp.* Tinct. malatis Ferri
Tinct. amar. aa 10,0.
Solut. arsen. Fowl. 2,0.
MDS. Reggel-este evés után
5 cseppet, emelkedőleg 15—20
cseppig.
Cachexia malarica.

538 *Rp.* Ferri sesquichlor. solut. gtt. 10—15.
Aqua dest. 100,0.
Syr. simpl. 10,0—15,0
MDS. 2 ór. 1 gyk. 2—8 éves
gyermeknek nephritis scarlatin. esetén.

Vas-Sorisin (Syr. ferri-sulfo-guajacol) — **Sorisin-Ferrarse-nat** (Syr. ferri-sulfo-guajacol-arsen). Javulat: a légzőszervek hurutos bántalmái, anaemia (különösen fertőzőbetegségek után), chlorosis, rhachitis, scrophulosis. (L. hird.)

Phosphor-esokoládé-bonbon „Finy“ kitűnő hatású csont-képzőszor angolkórnál. (L. hird.)

539 Rp. Ferri sesquichlor.sol.
gtt. 10—12.
Tinct. Opii simpl.
gtt. 1—3.
Aquae dest. 40,0.
Syrup simpl. 20,0.
MDS. 2. ór. 1 kk. v. gyk.
1—4 éves gyermek.
Enteritis follicul.
Dysenteria chron.

542 Rp. Syrup. Ferri jodati
30,0.
Det. in vitro coerul.
S. 4-szer napj. 3—4 csep-
pet. 2—4 éves gyer-
meknek.
Scrophulosis.

540 Rp. Spirit. aetherei ferrati
1,0.
Aquae dest. 70,0.
Syrup simpl. 10,0.
MDS. 2 ór. 1 kk. v. gyk.
2—8 évesnek. Oly-
gaenia.

541 Rp. Ferratini 2,0.
Sacchar. alb. 6,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 20.
DS. 4-szer napj. 1 port.

543 Rp. Syrup. Ferri jodati 2,0.
Syrup. simpl. 40,0.
MDS. 2—3 kk. napj. 2—4
éves gyermeknek.
Scrophulosis.

Fetron. Stearinsavanilid (3%) és vaselin (97%) keveréke. Kenőcs-
alapanyag tiszta vaselin helyett. Különös előnye nincs. Néha a
lanolinum anhydr.-al elegyítve rendelik kenőcsök készítésére.

Fibrolysin. Thiosinamin (l. e cím alatt) és natrium salicylicum
kelető sója. Vízben oldható. Bőr alá fec-kendezéskor nem fájdal-
mas. Haszn. mint a thiosinamin, tehát mint szöveteket feloldó szer
(lupus, idült mirigydagánatok, scleroderma, hegek). A forgalom-
ban levő phiolák tartalma megfelel 0,2 gm. thiosinaminnak.

H. Filicis maris rhizoma. (Aspidium Filix Mas. Polypodi-
aceae). Hatóanyagai filixsav és illó olaj. Anthelminthicum tae-
niák ellen. Használt készítménye az

H. Extractum Filicis maris. Felsőirű, zöldesbarna, vízben
oldhatlan. Adag felnőttek bels. caps. gelat. operculatában,
pilulában, electuariumban 6,0—8,0 egy elhajtáshoz (éhgymorra);
gyermeknek 2,0—4,0 electuariumban. Vigyázat! Kertöld az ol-
ricinit mint hashajtót. Hashajtónál legjobb a calomel. Mérge-
zés is fordult már elő; megvakulás is néhány esetben. Dos.
maxim. pro die 10,0!

544 Rp. Extr. Filicis maris.
6,0—8,0.
Pulv. Filic. maris 2,0.
M. det. in caps. gelat.
operculat. No. 12—16.
DS. 1 óra alatt bevenni.
Felnőtteknek.

545 Rp. Extr. Filicis maris
4,0.
Melis rosati 40,0.
M. f. electuar.
DS. 1 óra alatt 3-szorra
bevenni. 4—8 éves
gyermeknek.

Liquor Ferro-Mangani pept., Liquor Ferro-Mangani
sacchar., legjobb ízű, legkönny. emészth. vas-mangán készítm., —
Bluran alkoholmentes vaskészítm., arzénnel, brómmal, kinnel,
jóddal. (L. hird.)

Haematicum Glausch a vaskészítmények között az első, mert
a fogakat nem támadja, a gyomrot nem terheli, könnyen assi-
milálódik, kellemes ízű. (L. hird.)

Filmaron. Az extractum filicisből kivont sárgás, olajban oldható por. Jaquet szerint a filix hatóanyaga (acid. filicicum?). Anthelminticum taeniák ellen. Adag felhőttnek 0.7—1.0 gm. egy kúrára. Ricinusolajban oldva ajánlják, a mi veszedelmes lehet, ha a készítmény tényleg acid. filicicum.

Filmogen. (Acetoncollodium). Nitrirozott cellulose acetonoldata kevés zsíros olajjal. Bőrgyógyászatban esetelendő szernek vivőanyaga.

H. Filum sericeum hydrarg. bichlor. impraegn. s. antisepticum. Sublimatos varróselyem.

Fluoroform (*CHF₃*). Vele készítik az *Aqua fluoroformi*-t. Utóbbi szagtalan, íztelen. Tussis conv. ellen több-zör napjában 1 kk—1 gyk. bels. tüdőtubercul. ellen 4—5-ször nap. 1 kk—1 evők.

H. Foeniculi fructus. (Foeniculum offic. Umbelliferae) Hatóanyaga illó olaj. Stomachicum, carminativum, galactogogum. Bels. adag: porban 0.5—2.0 pro dos. napj. többször; infusumban 10.0—15.0 : 150.0 2 ór. 1 evők.

H. Aqua Foeniculi. l. *Aquae aromaticae*.

Fomitin. Két gombafajból; fomes cinnamomeus és fomes ignarius készült gombaszagú fluidextractum. Cystitis, dysmenorrhoea, menorrhagia, haemorrhoidalis vérzések esetén ajánlják napj. 1—2 evők.

H. Formaldehydum solutum. (Formol, formalin) (*H.CO.H*) 35%-os formaldehyd oldat. Tiszta, színtelen, szúrós szagú, közömbös v. kissé savanyú hatású, vízzel, szeszszel jól elegyíthető folyadék. Bacteriumellene; oldatokban épp úgy, mint gőzalakban. Desinficiens bútorok, helyiségek, árnyekszékek, kötőszerek, kezek, seb. eszközök számára; 2—3 evők. 1 lit. vízre. Ezt permene alakjában is lehet alkalmazni. Nőgyógyászatban hüvely és méh kifeccskendésére a készítményből 1 kk. 1 lit. vízre. Szemvíznek 25—30 csepp 1 liter vízre.

546 Rp. Formaldehydi sol.

Natr. borici aa 20.0.

Acid. carbol. puri 30.0.

Aquae dest. 1000.0.

MDS. Sebészeti eszközök fertőtlenítésére.

Formalin. l. *Formaldehydum sol.*

Forman. Chlormethyl-menthylaether. Meleg vízben componenseire bomlik: a belőle fejlődő formaldehyd és menthol elillannak és belehelhetők; a sósavat a víz visszatartja. Nátha ellen dicsérik formanvatta és pastillák alakjában.

Taenia: Rp Gelodurat „Pohl“

scat. orig. c. Extr. filicis 1.0.

Tub. Jalappae 0.05.

S. reggel éhgyomorra 15 perczen belül bevenni.

- Formanilidum.** ($C_6H_5.NH.CO.H$). Hosszú, színtelen jegeztűk, vízben elég könnyen, alkoholban jól old. Helybeli anaestheticum a cocain helyett, bels. antipyreticum, analgeticum, antirheumaticum az antipyrin helyett. Küls. gégébe, torokba befújni poralakban amyllummal aa, torokviznek, húgycsőbe, hólyagba fecsk. 1—3%-os old. Bels. 0,15—0,25 pro dos. napj. 3—4-szer, mint antipyreticum; 0,25—0,5 pro dos. es die, mint analgeticum porban.
- Formeston.** Oly készítmény mint az *eston*. (l. e. cz. a.) Haszn. is u. az.
- Fortossan.** Gyermekriápszer, mely tabletták alakjában jön forgalomba. Tartalmaz phytint (l. e. cz. a.) és tejeznokrot.
- Fortoin.** Methylendicotoin. [$CH_2.2C_{14}H_{11}O_4$]. Vízben oldhatlan, fahéjszagú, sárga kristályok. Hasmenesellenes szer. Adagja 0,2—0,5 pro dos. 3—4-szer napj.
- Frangol.** A cortex frangulaeből készült fluid extractum Hatás, haszn. mint az extr. fluid cascarae sagradae. (L. ott.)
- Fucol.** A fucus vesiculosus sesamolajos kivonata Olajzöld, kellemes, enyhe, kávéízű olaj. Az oleum jecoris pótszere. Jódnyomait tartalmazza. Adag. mint az ol. jecorisből.
- Furunculin.** Száraz élesztő készítmény. Haszn. bels. furunculosis, eczema esetén. Adag. 3-szor napj 1 kk.
- Gadol.** 50%-os csukamájolaj emulsió. Nincs rossz íze. Adagolás: 2—3 × annyi, mint a tiszta olajból.
- Galactogen.** Tejfehérje. Tápszer. Fehér, vízben oldh. por. Különböző cacaóval és liszttel készült készítm. vannak forgalomban.
- Galegol** A Galega offic. (Papilionaceae) kivonata. Galactogogum. Adag napj. 3-szor 1 kk. langyos tejben v. teában.
- Gallacetophenon.** [$CH_3.CO.C_6H_5.(OH)_3$]. Alizarinsárga. Sárgás, forró vízben oldh. por. Redukáló anyag, de gyengébb, mint a pyrogallol. Bőrgyógyászatban mint az utóbbi haszn. Küls. kenőcsben 1:10.
- H. Gallae.** Gubacs. Hatóanyaga csersav. Használtatik a tinct. gallarum készítésére.
- H. Tinctura Gallarum.** Adstringens. Csak küls. ecsetelésekre. Tisztán v. tinct. jodi-val aa.
- Gallal.** l. Alumin. subgall.
- Gallanolum.** [$C_6H_5.NH.CO.C_6H_5(OH)_3$]. Gallussavas anilid. Színtelen, keserű, hideg vízben nehezen, melegben jól oldódó jegeztűk. Antifermentatív, redukáló hatású. Bőrgyógyászatban pyrogallol és chrysarobin helyett. Hintőporok 1:2 talcumra, kenőcsnek 1:5—10. Ecsetelésre 1:5 borszeszben oldva.
-
- Egger-Emulsió** kit. csukamájolaj-készítmény c. 5% Thiocol, c. 5% Ovocitlin, c. Phosphoro oil ad 10000 emulsió.
- Jogadin** jóízű csukamájolaj!

Gallicin. Gallussavas-methylaether. [$C_6H_3OII_3.COOCH_3$]. Fehér, finom, meleg vízben old. por. Szemészetben conjunctivitis, phlyeténás gyulladások, keratitis superficialis ellen behintések alakjában haszn. Néha égő fájdalom használata után.

Gallobromol. Dibromgallussav ($C_6Br_2OH_3.COOH$). Finom, fehér, forró vízben oldh. jegecztük. Sedativum, antispasticum, hypnoticum a BrK. helyett. Sedativ adag 0,5, hypnoticus 2,0 porban, mixturában. Antisepticumnak is ajánlották 1—4% os oldatban blennorrhoea ellen befecsk. alakjában.

Gastrosan. Bismuthum bisalicylicum. Haszn. mint a bism. subsalicylicumé, l. ott.

Gaudanin. Sterilizált parakautschuk oldata formanbenzinben. Műtéteknél a bőr bevonására szolgál. Eltávolítása a bőrről aetherrel v. benzinnel történik.

H. Gaze carbolatum s. Tela acid. carbol. impraegn.
l. Acid. carbol.

H. Gaze Hydrargyro bichlorato corrosivo impraegnatum s. Tela hydrarg. bichlor. impraegn. l. Hydrargyri praeparata.

H. Gaze Jodoformio impraegnatum s. Tela jodof. impr.
l. Jodoformium.

Gelatina animalis albissima. Állati enyv. 1:50 forró vízzel kihűléskor kocsonyát ad. Aneurysmák, mindennemű vérzések, haemoptoe, gyomor-bél-vérzés, haemophylia, purpura rheum. vese-, hólyagvérzések ellen ajánlják sterilizált, de csakis! steril oldatok bőr alá fecskendését. Jók a Merck-, Gehe-, Grübler-féle készítmények tubusokban. A Merck-féle 10%-os és egy üvegsőben 40 köbctm. var; ez egy adag felnőttek, esetleg többször is. Gyerem 10 köbctm., csecsemőknek 5 köbctm. Befecskendés fájdalmas. Küls. 10% os oldatból méhvérzés ellen irrigatio. Csőrének 10,0—50,0 : 20 —300-ra decoctum napj. 2 ízben elhasználandó.

Gelanthum. Bőrfirmiss, melyet Uma ajánl. Vízben oldh. Bőrgyógyászatban vivőanyag. 10% zsírral, 20% glyceriumel még jól keverhető a nélkül, hogy száradó képességét elvesztené. Vízben oldhatlan anyagok, ha hozzá kevertetnek, vízzel előbb pulva, pastává alakítandók, zsírok pedig előbb gummival és vízzel emulgeálandók. Jól kenhető, gyorsan szárad.

Gelodurat-capsulák. Gelatin-capsulák, melyek formaldehyddel vannak megsemmisítve. Gyomorban nem oldódnak, tehát oly szerepük van mint a Keratin-capsuláknak.

Gelodurat-kapszulák, gelatin-tokocslák, csak a vékony-bélben oldódnak és oly szereket adagolására szolgálva, melyek rossz ízűek vagy a gyomrot terhelik. (L. hird.)

Haemoptoe: *Rp* Gelodurat „Pohl“

scat. orig. c. Extr. Hydrast. 10.

S. 3—4-szer naponta 1 dbol.

Gelonida. *Tabletta constituens* mely trioxymethylen-gelatinból áll. Gyorsan esik szét a gyomorbélluzamban, ez az előnye.
Gelsemii radix. *Gelsemium septemvirens.* Loganiaceae). Hatóanyaga gelsemin (alcaloid). Erős mérég; gerinczvelőt, szívet bénítja. Antinenralgicum. Helyette készítménye használatik:
Tinctura Gelsemii (1 : 15 spiritusra). Bels. adag 5—10 csepp 2—3-szor napj. (Vigyázat !).

547 *Rp.* Tinct. Gelsemii
 Tinct. Colchici aa 10,0.
MDS. 3-szor napj. 10 cseppet. Neurralgia.

II. Gentianae radix. (*Gentiana lutea.* Gentianeae). Hatóanyaga gentiopirin (keserű anyag). Amarum. Bels. porban, pilulában, decoctumban 0,1—0,5 pro dos. 2—4-szer napj. Egyik főszere keserű theakeverékekhez és tinctarákhoz.

II. Extractum Gentianae. Amarum. Bels. pilulában, oldatban adag : 0,2—1,0 pro dos. 3—4-szer napj. Constituens hashajtó pilulákhoz.

II. Tinctura Gentianae. Keserű anyag. Stomachicum. 20—30 csepp—1 kk. napj. többször.

548 *Rp.* Rad. Gentianae
 Rhiz. Calami aa 10,0.
 Flav. cort. Anrant.
 5,0.
 Conc. et cont. m. f.
 species.

DS. $\frac{1}{4}$ részét egy csésze theára, mely egy nap alatt fogyasztandó el. Amarum.

549 *Rp.* Pulv. rad. Gentianae
 1,0.
 Natrii sulfur. 10,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.

DS. 3 port napjában.
 Idült gyomorhurut, gyomoratonía esetiben.

Geosot l. *Guajacolum valerian.*

Glandulen l. *Organotherapia.*

Glandulae suprarenales. l. *Organotherapia és Adrenalin.*

G. idin. Növ. fehérje, buzából állítatik elő; kevés lecithint is tart. Szag- és íztelen por. Tápszer. Napj. 2—3 evők. felnőtteknek, 2—3 kk. gyermek. Arsenes, vasas, higanyos öszszeköttetései is vannak forgalomban mint gyógyszerküönlegességek.

Globon. Paranucleo-proteidekből alkaliák segítségével készült fehérjekészítm. Tápszer. Sárgás-fehér, szag- és íztelen por. 100% feh. tart. Vízben oldh., alkoholban is. Adag : felnőttek napj. 3—4 kk. gyermekeknek korukhoz mérten 1—2 kk. levesben tejben, borban.

Globuli martiales l. *Ferrum.*

Hygiama vario modo parari potest.

Guipsine tart. a viscum album hatóanyagát, vérnyomást csökk. szer, jav.: arteriosclerosis, haemoptoe, vesezsugor stb. (L. hird.)

Glutoid-capsulák. Formaldehyddel keményített gelatin-capsulák. Gyomornedv nem támadja meg, csak a duodenumban oldódnak. Haszn. mint a keratin-capsuláké. Háromféle keménységek kaphatók.

Glutoform. l. glutol.

Glutol Formaldehyd és gelatin összeköttetése. Durva, fehér, vízben oldhatlan por. Sebekre hintve antisepticum; formaldehyd hasad le belőle és szilárd pörk támad. Necroticus szövetre ha hintjük, a form. lehasadást pepsin-sósav vizes oldatával segítjük elő (pepsin 5,0, sósav 0,3, víz 100 gm.) úgy, hogy a behintés után ezen oldattal nedvesítjük meg a beteg helyet.

H. Glycerinum [$C_3H_5(OH)_3$]. Színtelen, szagtalan syrupállományú, átlátszó folyadék; íze édes, kémhatása semleges. Vízben, borszeszben minden viszony szerint, ellenben aetherben, chloroformban és zsíros olajokban nem oldható. Küls. puhító fedőszer. Bels. diabetes mellitusnál cukor helyett ételek édesítésére. Csőrében 1,5—2,0 kiürítő hatású. Oldószer némely vízben oldhatlan anyag számára, mely v. a bőrre, v. a nyákhártyára, v. a bőr alá viendő. Kenőcsökhöz, linimentumokhoz mint közömbös alapanyag.

H. Unguentum Glycerini. (Tragacantha l. r. + Spiritus 5 r. + Glycerin 49 r.) Fedőszer. Kenőcsalapanyag.

H. Suppositoria Glycerini. Végbélkúpok. Enyhe evacuans. Készen kaphatók.

Glycerolatum. Nem más, mint kissé consistensebb ungu. glycerini szagosítva. Jó kenőcsalapanyag, olyanféle értékű, mint az Unna-féle gelanthum. A legtöbb bőrre alkalmaztatni szokott anyagot 10%-ig fel tudja venni, akár oldhatók azok vízben, akár nem.

Glycerophosphatok. A *Na*, *K*, *Ca*, *Fe*. stb. glycerophosphatjai. Sűrű folyadékok; hígított állapotban könnyen bomlanak-idegrendszeri tonicum. Adagok: bőr alá fecsk. 0,2—0,3—0,5 bels. 1,0 pro dos. napj 2—3-szor. Készen kaph. köv. készítm.: Tabl. glycerophosphatae Deér (3—5 db. pro die). Liquor nerv. tonic. Deér (2—3 kk. pro die). Glycerophosphat Robin (granulált por 2—3 mérték-kan. pro die). Haemoneurol Cognet (haemoglobinos készítm. 2 kk. pro die). Jó hazai készítmény a Gréb-féle *Elixir. ferri glycerophosph.* nemkülönben a *Biodyn*-tabletták is, melyek *fe*, *ca*, *mg*, *na* és *chiniu* glycerophosphatokat tartalmaznak, darabjnkban 0,1 gmot. Adag utóbbiakból napj. 6—12 db, előbbiből napj. 3—4 evők.

Elixir ferri glycer. sec. Gréb, könnyen asszim. vaszkészítm., tart. *Fe*, *Na*, *Ca* glycer-sókat, javalt: chlorosis, anaemia, anorexia, latens tuberk., neurasth., morb. Basedowi, gyönggyermekok erősítésére. (L. hird.)

550 *Rp.* Calc. glycerino-
phosph. 2,0.
Aqua dest. 90,0.
Aqua Menthae pip.
Syrup. simplic. aa
30,0.

MDS. 3-szor napj. 1 evőkan.

552 *Rp.* Ferr. glycerino-
phosph. 1,5.
Rad. Rhei chin. pulv.
1,5.
Extr. chinae 4,5.

M. fiant pilul. No. 1

DS. Naponta 4 szemet.

554 *Rp.* Natr. glycerophosphatice 25,0.
Aqua dest.
Aqua Naphae aa 70,0.
Syrup. cort. Aurant. 20,0.

MDS. 3 kk. napj

Neurasthenia általános gyengeséggel.

Glycosal s. Aether glycerinosalicylicus. [$C_6H_4OII.COO.C_3H_5(OII)_2$] Fehér, kristályos por, hideg vízben nehezen (1%), míg melegben és alkoholban igen könnyen old., chloroformban és aetherben nehezen Natr. salicyl helyett bels. porban 0,5—1,0 gr. pro dos. 4—5 gr. pro die. Küls. alkoholos, ol. terebinthinás, chloroformos (10—20%-os) oldata v. elegye bedörzsölésre kenőcsben eczema ellen.

555 *Rp.* Glycosali 10,0.
Div. in dos. aequ.
No XX.

S. $\frac{1}{2}$ —1 óránként 1
port, míg az izzadá-
s be nem áll.

557 *Rp.* Glycosali 10,0.
Spir. vini 100,0.
Chloroformii
Ol. Terebinth. aa 10,0.

MDS. Küls. bedörzsölésre.

551 *Rp.* Ferr. glycerino-
phosph. 2,0.
Aq. Cinnamom. 40,0.
Syrup. Amant. cort.
160,0.

DS. 3-szor napj. 1 evőkan.

553 *Rp.* Natr. glycerino-
phosph. 50% 25,0
Aqua destill.
Aqua aurant. flor.
aa 50,0
Syrupi cort. aurant.
20,0.

MDS. Etkezés után 1 kk.

556 *Rp.* Glycosali 20,0.
Spir. vini 100,0.
Glycerini 20,0.
S. Külsőleg bedörzsölésre.

558 *Rp.* Glycosali 3,0.
Vasellini fl.
Lanolini aa 30,0.
M. f. nugn.
DS. Kenőcs.

Glycerophosphat granulé Robin (diabetikusok részére tablettákban). kit. hat. ideg- és counterösztöszer, jav: rachitis, neurasth., szellemi megerőltetésnél, terheesség és szoptatás idejében. (L. hird.)

Tabl. Biodyni sec. Gréb (Tabl. ferri glyceroph.), életerő tabl., erősítő tápszer tabl. alakban csokoládébevonattal, pro dosi: Fe, Ca, Mg, Mn, Na és Chin. glycer. sói 0,10, jav: chlorosis, anaemia, anorexia, lat. tnberk., neurasth., morb. Basedowi, gyöngye gyermekek erősítésére. (L. hird.)

Goa pulvis. l. Araroba.

Gomenol. Illatos olaj (*Melaleuca viridiflora*, Myrtaceae). 60% cineolt tart. Tüdőtuberculosis, légzőszervek hurutos betegségei, pertussis, rheumatismus, neuralgiák, cystitis ellen bels. 0,25 pro dos. napj. 1—10-szer caps. gelat.-ban.

Gonorol. Tisztított ol. santali. Szüntelen, gyenge szagú, alkoholban oldh., illatos olaj. Gonorrhoea ellen bels. 10—20 csepp 2—3-szor napj. ezukorra cseppentve v. caps. gelatinosában.

Gonosan. A *piper methysticum* gyantája ol. santaliban oldva (1:4). Zöldessárga, olajos folyadék. Antigonorrhoeicum. Capsulák (0,3 gm) készen. Adag 3—5-ször napj. két-két caps. Helybeli kezelést nem teszi fölöslegessé. Gyomorbélzavarok használata közben gyakoriak.

Gossypii herbacei cortex radiceis (Malvaceae). Amerikában *cottonroot bark* név alatt népszerű. Hatóanyagai egy részletebben még nem ismert gyantás anyag, kevés tannin. Emmenagogum, haemostaticum, mint a *secale cornutum*. Adag bels. decoct. 60,0:300,0 vízre, 1/2 ór. egy vörösbogor pohárral.

Extractum fluidum corticis Gossypii. Emmenagogum, haemostaticum. Adag bels. 3—5-ször napj. 1 kk. ezukros vízben.

II. Graminis rhizoma. (*Triticum repens*, Gramineae.) A spec. diureticae alkotórésze. Önállóan nem használjuk.

II. Granati Punicae cortex. (Punicaceae). Hatóanyaga: pelletierin ($C_{18}H_{30}N_2O_2$), folyékony alkaloid. Anthelminthicum taeniák ellen. Nem hashajtó. Adag: macerato-decoctum alakjában 30,0—60,0:600,0 vízre, 12 órai maceratio után felényire bepárlandó egy óra alatt elfogyasztandó éhgyomorral, utána hashajtó (calomel).

II. Extractum Punicae Granati. Félsűrű vizes kivonat. Adag 8,0—10,0 egy kurára, pilulában, caps. gelat.-ban. Utána hashajtó (calomel).

Pelletierinum sulfuricum.	} Adag oldatban, pilulában 0,3—0,8 egy kurára.
Pelletierinum tannicum.	
	Utána calomel hashajtóul.

Tüdőtuberculosis, a légzőszervek hurutos betegségei, pertussis után visszamaradt makacs hurutok ellen a legjobb gyógyszer: Liquor Thiorobini comp. Eibach!

Emsi források „Kränchen“ régóta kit hat asthma, hurotok, köhögés, rekedtség, elnyálkás, hyperacid, influenza, köszvény, csúsz stb. ellen. (L. hird.)

559 Rp. Cort. Punicae Granati 60,0.
 Aquae fontis 600,0.
 macera per 12 ho-
 ras, dein coque
 usque ad rema-
 nentiam 300,0.
 colaturae adde
 Extr. Filicis maris
 aeth. 3,0.
 Syrup. cort. Aurant.
 30,0.

DS. 3-szorra bevenni 1½
 óra alatt, reggel, éhgyo-
 morra. Emelygés ellen cit-
 romos viz, rotulae menthae
 pip. Felnőttnek.

560 Rp. Pelletierini tannici 0,5.
 Aquae dest. 80,0
 Syrup. simpl. 20,0
DS. Reggel, éhgyomorra
 bevenni 1 óra alatt.

Grindeliae herba. A Grind. robusta és squarrosa (Compo-
 sitae) levelei és virágai. Tartalmaz illó olajat, acid. robustien-
 mot s egy alkaloidot (grindelin). Úgy látszik, sedatív hatása
 van s e miatt haszn. bronchitiseknél a köhögés csillapítá-
 sára, továbbá tussis convulsiva, asthma nerv., angina pector.,
 Basedow-kór, ideges szívdobogás, hólyaggyulladás alkalmával. Adag.
 bels. infus. 10,0:200,0 vízre 2—3 ór. 1—2 evők.

Extractum fluidum Grindeliae. Haszn. mint a herba.
 Adag bels. 1,0—3,0 3—4 ór. Gyermeknek (2—4 éves) tussis
 convuls. esetén 2 ór. 10—15 cseppet.

563 Rp. Extr. fluidi Grinde-
 liae 15,0.
 Kalii jodat. 5,0.
 Aquae dest. 150,0.
 Syrup. cort. Aurant.
 30,0.
MDS. 3 ór. 1 evők.
 Asthma nervos. és
 cardiacum esetén.

561 Rp. Extr. Punic. Granat.
 8,0.
 Tannini 1,0.
 Pulv. r. Althaeae
 qu. s. ut f. l. a.
 pilul. No. 30.
 Consp. pulv. rad.
 Althaeae.
DS. 1½ óra alatt reggel,
 éhgyomorra beven-
 ni. Felnőttnek.

562 Rp. Cort. Punicae Granati
 15,0.
 Aquae fontis 200,0
 macera per 12 horas,
 dein coque usque
 ad remanent. 100,0.
 colat. adde
 Syrup. cort. Aurant.
 20,0.
DS. 3-szorra bevenni 1
 óra alatt, reggel,
 éhgyomorra.
 4—8 éves gyermek.

564 Rp. Infus. herb. Grindel.
 e. 10,0.
 l. a. p. ad colat. 180,0.
 Natrii hydrocarb. 4,0.
 Tinct. Opii croc.
 gtt. 10.
 Syrup. Ipecac. 20,0.
MDS. 2—3 ór. 1 evők.
 Catarrh. bronch. chron.

**Bronchitisnél a köhögés csillapítására, tussis convul-
 siva után visszamaradt hurut megszüntetésére leg-
 jobb a Liquor Thiorobini comp. Eibach!**

565 Rp. Extr. fluidi Grindel. 10,0.

Syrup. cort. Aurant. "

Aquae dest. \overline{aa} 40,0.

MDS. 5—10 éves gyermeknek napj.

3—4 kk. v. gyk.

Pertussis, asthma nerv.

Guacamphol. s. Guajacolum camphoratum. (Camphor-savas guajacolester). Fehér, szag- és íztelen, vízben nem oldh. jegeztük. Tüdővészések éjjeli izzadása és hasmenése ellen 0,2—1,0 pro dos. és pro die, porban, pilulában, caps amylaceában.

Guaethol. Kozmás katechin-monoethyl-aether. ($C_6H_4.OC_2H_5.OH$) Szintelen, olajos folyadék. Vízben alig oldh. Desinficiens, analgeticum ecsetelések, bedörzsölések alakjában. Lehet subcutan v. intramuscularis befecskendésekre is használni neuralgiák ellen (1:9 glycerin).

566 Rp. Guaetholi
Chloroformii \overline{aa} 10,0.

MDS. 2—3 \times napj. 3 ketm. ecsetelni.

567 Rp. Guaetholi 2,0.
Glycerini 20,0.

MDS. Felrázva napj. $\frac{1}{5}$ részét a hólyagba fecsk. Cystitis tubercul.

Guajacolsalol. l. Guajacolum salicylicum.

Guajacolum. [$C_6H_4.OH.OCH_3$] A kreosot egyik alkotórésze. Szintelen, vízben nem, borszeszben, aetherben, zsíros olajokban jól oldódó folyadék. Ize, szaga kellemesebb, mint a kreosoté. Oldatai a világosságon megzavarodnak, azért fekete üvegen rendeltessék. Tuberculum-bacillust 1:2000 oldata megöli, 1:4000 oldata gyengíti (GUTTMANN). Haszn. a kreosot helyett tuberculosis eseteiben. Adag bels.: 0,05 pro dos. és 0,2 pro die (GUTTMANN pro die 1,0 grmot ajánl caps. gelatin, pilula, borszeszes oldat alakjában v. ol. jecorisban). Dos. max. sing. 0,05. pro die: 0,2. Guajacolt tartalmaz a *Myrticol* nevű készítmény is. (L. e. cz. a.)

568 Rp. Guajacoli (1,0)—2,0.
Aquae dest. 180,0.
Spirit. vini dil. 20,0.
M. def. in vitro nigro.
S. 2—3-szor napj. 1 kk.
—1 evők. egy pohár
vízben, étkezés után.
Tuberculosis pulmon.

569 Rp. Guajacoli 2,0.
Pulv. et extr. Liquir.
 \overline{aa} qu. s. ut f. pilul.
No. 100.
Obdne. foliis Argenti.
DS. 3—5-ször napj. 3—5
szemet emelkedőleg.
Egy pilulában kö-
rülb. 0,04 guajacol.

Myrticol „Csatádi“ kell ízű guajacol-áfonya-készítm., tüdőbet. gyomorzavarai és bélbánt. ellen specificum. (L. hird.)

Guajacol-Perdynamin 5% kal. sulfognajac. tart. Perdynamin, jól bevált a légzőszervek mindenféle betegségeinél. (L. hird.)

Tuberculosis pulmonum ellen ideális guajacol-készítmény a **Liquor Thiorobini comp.** Eibach, melynek nagy előnye, hogy bactericid hatása mellett, cetrarin tartalma miatt, étvágyfokozó is!

570 Rp. Guajacoli 13,5.
 Tinct. Gentianae 30,0.
 Spir. vini dil. 250,0.
 Vini Xerensis qu. s.
 ad 1000,0.
MDS. 2—3-szor napj. 1 evő-
 kan. egy boros po-
 hárr vízben. Tuber-
 culosis pulmon.

571 Rp. Guajacoli 3,0.
 Olei Jecoris Aselli 150,0.
MDS. Étkezés előtt 1 kk.
 napj. 3-szor. Egy
 kk.-ban körülb. 0,2
 guajacol.

Guajacolum benzoicum Színtelen, szagtalan, íztelen, vízben nem oldh. por. 54% guajacoltartalmú. Haszn. bels. mint a guajacolé. Adag 0,25—1,0 por dos. napj. többször porban.

Guajacolum camphoratum l. Guacamphol.

†**H. Guajacolum carbonicum s. Duotal.** [$CO_2(C_6H_4O.CH_3)_2$] Fehér, szagtalan, íztelen, jegeczes por. Vízben nem old. Gyomorból fel nem szívódik, belekben hasad guajacolra és szénsavra. Haszn. guajacol helyett. Adag 0,2—0,5 napj. 2—3-szor porban. Adag-
 gal lehet emelkedni. Dos. max. pro dos 1,0! pro die 5,0!

572 Rp. Guajacoli carb. 10,0.
 Div. in dos. aequ.
 No 20.
 S. 3—5 port napj.
 emelkedőleg.

573 Rp. Extr. Nucis vom. 0,1.
 Guajacol. carbon. 10,0.
 M. f. p. div. in dos.
 aequ. Nr. 10.
DS. 3 port naponta.

Guajacolum cinnamylicum. Színtelen, vízben nem oldh. jegecztk. Haszn. mint a guajacolé. Adag bels. porban 1,0 napj. többször.

Guajacolum kakodylicum. Pirosas-fehér, rossz szagú, égető ízű, vízben, olajban old. por. Arséntartalmánál fogva vigyázat (!!). Tuberculosis ellen subcután olajoldatban 0,03—0,05 pro dos. és pro die.

Guajacolum phosphoricum. Fehér, vízben oldhatlan, szagtalan por. Haszn. mint a guajacolé. Adag bels. porban 0,25—0,5. pro dos. napj. többször.

Guajacolum phosphorosum. Fehér, vízben oldh. csípő ízű por. Haszn. adag, mint az előbbinél.

Guajacolum salicylicum. Guajacolsalol. Fehér, íz- és szagtalan, vízben nem oldh. por. Haszn. mint a guajacolé. Adag. bels. porban 0,5—1,0 napj. többször.

Sorisin (Syr. sulfo-guajacol.), jav.: a légzőszervek hurutos bánt., számarhurut, csücshurut, kezd. tuberculos. (L. hird.)

Maltocol a legtökélet guajacol-készítmény, tart.: fahéj-avas malátaszörpben 7% kal. sulfognajac., 2% natr. glycerophosph., 1% natr. camphor (L. hird.)

Myrticol „(satádi“ kell ízű guajacol-áfonya-készítm., kit. a légzőszervek bánt., kül. csücs- és hörghurut ellen. (L. hird.)

Guajacolum valerianicum. Geosot. A guajacol valeriana-savesterje. Olajszerű, sárgás, vízben neh. oldh. folyadék. Adag tuberculosis ellen 0,2 pro die gelatincapsulákban.

Guajacylum. Mészsója a guajacolsulfonsavnak. Szürke, vízben old. por. Helyi anaestheticumként subcután 5—10% oldatból 1—2 fecsk.

Guajakinol (48,8% chinin, 18,6% guajacol). Sárga kristályok; vízben jól oldódik. Haszn. a légzőutak betegségeiben. Adag: 1,0 pro die.

Guajamarum. A guajacolnak glycerinestere. Fehér, jegeczes, keserű, aromás por; vízben neh. old. Haszn. mint a guajacolé. Gyomorban bélben hasad guajacolra és glycerinre. Gyomor és bélantisepticum 0,2—1,0 pro dos. porban, oldatban. Küls. ízületi rheumatismus ellen kenőcs 1:4.

Guajasanol. Diaethylglycocol-guajacol sósavas sója. Fehér, guajacolszagú, keserű, vízben oldh. jegeczek. Antisepticum, mint a bórsav; helybeli anaestheticum is. Bélben guajacol hasad le. Bels. tuberculosis ellen 1,0—3,0 napj. 3—4-szer porban (ostyában) Küls. 1—2% oldatok. Hólyagmosáshoz 1‰ oldat.

†**H. Guarana** A Paullinia sorbilis (Sapindaceae) brasíliai fának szárított és porrá tört magvaiból gyúrt s megszáritott kemény tézta (pasta). Barnásfekete, belül vörhenyesen márványozott, kemény, törése majdnem egyenes, csekély fényű. Vízben részben oldható, sajátos szagú, fanyar, kesernyős ízű. Hatóanyagai coffein (1%), tannin és zsíros olaj. Hatása, mint a coffeiné, e mellett adstringens is. Diarrhoea, dysenteria, hemicrania ellen bels. adag 0,5—2,0 pro dos. napj. 3—4-szer.

574 Rp. Guaranae pulv. 5,0.
Sacchar alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No 10.
Det. in chart. cerat.
S. Hemierania esetén
½ ór. egy port a
roham kezdetén.
Összesen 3—4 port.

575 Rp. Guaranae pulv. 0,5.
Pulver. Doveri 0,1—
0,3.
Sacchar albi 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No 10.
Det. in chart. cerat.
S. 2 ór. 1 port.
1—5 éves gyerme-
keknek.
Idült béllarut.

H. Gummi arabicum. Megszáradt növényi nedv. (Acacia-fajok. Mimosae). Gömbölyded, fehér vagy sárgás, a fölületen át nem tetsző, íztelen, szagtalan darabok. Borszeszben nem oldódik, kétszeres mennyiségű vízzel ragadós, savanyú, nyúlós

Demeter-féle kal. sulfoguajacolt előszeretettel rendeli a gyak.-orvos, mert kit. összetét. mellett egyúttal a legolcsóbb készítmény is. (L. hird.)

Sanatorium Schömberg, Würtbg. Schwarzwald, 650 m. t. f. tüdőbetegek részére, téli és nyári kúrák, vezetőorvos Koch dr. (L. hird.)

oldat képződik. Küls. hintőporban, oldatban bevonó. Klystírhez 1:3, száj- és torokvízhez 1:5—10 Bels. nem, ha csak nem mint vivőszer. Gyógyszerészeti technikában fontos szer, különösen emulsiók készítésénél.

H. Mucilago Gummi arabici. (1:2 vízre). Segítőszer pilulák pastillák készítésénél; vivőszer.

H. Pulvis gummosus. (Amylum, rad. liquirit. pulv. gummi, arab. és sacchar. alb. keveréke). Vivőszer poralakú gyógyszerek számára sacchar. helyett.

H. Linctus gummosus. (Mucil. Gummi arab. + syrup. simpl. aa.). Keserű vagy csípős anyagok vivőszere.

H. Mixtura gummosa. (Mucil. Gummi arab. syrup. simpl. és aqua dest. keveréke). Vivőszer keserű v. csípős anyagok számára.

Gummi Kino l. Kino.

Gutti s. Gummigutti. Naraucssárga, kagylós törésű, viaszfényű, szagtalan, édeses, majd égető ízű mézgagyanta. Erős drasticum. Bels. adag pilulában 0,01—0,05—0,2! napj. 2—3-szor Dos. maxim. pro die 0,8! (M. Gyk. I. kiad.). Számos titkos szer, p. o. a Morrison-féle pilulák is tartalmazzák. (Nagy vigyázat!)

576 Rp. Gutti.

Pulv. tub. Jalapae
Aloes aa 2,0.
Pulv. rad. Rhei chin.
0,6.

Spirit. dil. qu. s.
ut. f. pilul. No. 30.
Obducant. balsamo
tolutnано.

S. 1—3 szemet egyszerre
Drasticum.

577 Rp. Gutti

Folior. Digit. pulv.
Bulbi Scillae
Stibii sulf. aurant.
aa 1,0.

Extr. Graminis qu. s.
ut. f. l. a. pilulae
No. 50.

Consperg. Lycopodio.

DS. 2—3 ór. 1 szemet;
az adag emelhető.
Pilulae hydrogogae
Heimi.

Gymnema silvestre. Folia. (Asclepiadeae.) Hatóanyaga gymnemasav. A nyelvre, ha helybelileg hat, megszünteti az édes és keserű (?) ízérzést. Diabeticusok kellemetlen édes paragenesiája ellen decoct. (5,0—10,0:200,0.) a száj kiöblítésére. Használható keserű gyógyszerek bevétele előtt is.

Gynoval. Az isoborneol isovaleriansavestere. Kellemes szagú, szintelen, vízben oldhatlan, szeszben oldható folyadék. Enyhe sedativum és fájdalomcsillapító. Adag 3-szor napj. 8—10—15 csepp. Vanak készen zárt capsulák is. Ezekből 1—2 db, egyszerre vehető be.

Alimentum Theinhardt tollit Atrophiam.

Vas helyett! Halmájolaj helyett!

Dr. Hommel-féle Haematogen

(tisztított, folyékony Haemoglobin fehérje és savó-fehérje vegyileg tiszta glycerinnel és aromát. anyagokkal.)


Erélyesen vérképző. Erősen étvágygerjesztő.

Nagy eredmények görvélykór, angolkór, általános gyöngeség, vérszegénység, szív- és ideggyöngeség eseteiben, a lábadózás időszakában (tüdőlob, influenza stb. után).

Kellemes íz. Gyermekek is igen szívesen veszik.

Mentes **bórsavtól, salicylsavtól és bármilyen** más antibakteriumos hozzátételtől, a teljesen tiszta Haemoglobinin kívül tartalmazza még a friss vér összes sóit **Főképen a fontos foszforsókat is** (natrium, kálium és lecithin), úgyszintén a nem kevésbé fontos fehérje-anyagait a szerumnak, koncentrált, tisztított és **szét nem esett** alakban. Mint **vérképző, szerves vasat tartalmazó, dietétikus erősítő** gyermekek és felnőttek részére mindenféle gyöngeségeknél a legnagyobb értékű.

Tuberkulozis-bacillusoktól készítményünk abszolúte mentes több ízben ismertetett és a megengedett legmagasabb hőmérséklet mellett eszközölt előállítási eljárásunk következtében.

 Hogy csempészések és utánzatok, melyek ujabban „Hommel“ névvel is jönnek forgalomba, elkerülhetők legyenek, szíveskedjék mindig csak **Dr. HOMMEL-féle Haematogen** rendelni.

Napi adagok: csecsemőknek 1–2 teáskanálnyi tejben (ivó temperatura!), **nagyobb gyermekeknek** 1–2 gyermekkanállal (tisztán) **felnőtteknek** 1–2 evőkanállal naponta evés **előtt**, sajátos erős étvágygerjesztő hatása miatt.

Kísérleti anyagot azon orvos uraknak, kik saját kísérleteik útján akarnak maguknak véleményt alkotni, szívesen bocsátunk **ingyen és bérmentve** rendelkezésre.

Raktár minden gyógyszerárban.

Árusítás eredeti üvegekben (250 gr.) **Ára 4 korona.**

Actiengesellschaft Hommel's Haematogen.
Zürich (Schweiz).

Haemalbumin-Lecithin

Dr. Dahmen

Haematin (vas) és Haemoglobulin (mint old. albuminat) 49·17%. Serumalbumin és Paraglobulin (mint old. albuminat) 46·23%, az összes vérsók 4·6%.

GENUIN VÉRVAS. A phosphatok, mint calcium- és magnesium-, di- és triphosphat, old. albuminathoz kötvé: **GENUIN LECITHIN.** A haemalbumin-lecithin spektruma azonos a mesterségesen (pepsin, sósav stb. által) megemésztett vér spektrumával. A haemalbumin-lecithint minden gyomor, még emésztőnedvek hiányában is, resorbeálja.

Leggyorsabb és legerősebb haemoglobin-gyapodás, ha a rendes haemoglobin-tartalom megcsökken.

Leggyorsabb és legerősebb vörös-vérsejt szaporodás, ha a rendesnél kevesebb a számuk.

Legnagyobb súlygyapodás rendesnél alacsonyabb súlyuaknál. (Klinikai észlelések szerint sokszor 8—12 font 2 hét alatt.)

Legtömörebb tápszer, legintenzivebb idegerősítő chlorosis, phthisis, rhachitis, idegbajok, fertőző betegségek, vérvesztések, gyermekágy, szabálytalan hőség (+ vagy —) lábadozás stb. eseteiben, kit. laktogogum.

Az étvágyat rögtön megjavítja. Adag 3—5 gr. pro die (1 gr. = 1 késhegynyi) vízben, sörben, borban, kávéban, teában stb. — $\frac{1}{4}$ üveg (kb. 60 gr.) mintegy 20 napra elegendő: 2 márka, $\frac{1}{2}$ üveg 1 márka 20 pf.

Főraktár Budapesten:

Török József, Dr. Egger Leó és
Egger I., Thallmeyer és Seitz.

Haemalbumin. Igen kevés Fe-t tartalmazó, vérből készült fehérjés készítmény. Vízben oldható barnás por. Mint Fe-készítmény nem nagy értékű. Adagul ajánlják gyermek 3-szor napj. 1 kk., felnőtteknek 1 evők. vízben, tejben, levesben.

Haematinalbumin. Vérből készült, vízben oldhatlan barnás por. U. az áll erről is, mint a haemalbuminról. Adag is n. az.

Haematogen. (Dr. Hommel.) Vérből készült vastartalmú készítmény. A vas javalatai alapján adag bels. felnőtteknek $2 \times$ napj. 1 evők., gyermek 2-szer napj. 1—2 kk.

Haematopan. Tápanyag. Keveréke haemoglobinnak és malátakivonatnak.

Haemolum. Kobert által előállított vaskészítmény. Létrejön, ha zinkpor hat vérfestékre. Feketebarna por. Adag chlorosis ellen 0,1—0,5 napj. 3-szor étkezés előtt, porban, pastillákban.

Haemogallolum. Kobert állította elő. Létrejön, ha pyrogallol hat vérfestékre. Barnafekete por. Haszn. mint a haemolumnál.

Haemoglobin. Barna, vízben oldh. por. Mint Fe-készítménynek nincs számottevő értéke. Adag 0,2—0,5 pro dos.

Haemoneurol (Cognet). 1. Glycerophosphatok ez. s.

Hamamelidis virginicae folia et cort. radic. (Hamamelideae) Hatóanyaga csersav; a levelekben ezenkívül illó olaj. Amerikában divatos adstringens, haemostaticum (minden fajta vérzések ellen). Használatnak készítményei:

Extractum Hamamelidis fluidum. Bels. adag 4,0—8,0 pro dos. 2—3 ór., vagy kávéskanalanként cukros vízben, syrupban. Főleg menorrhagiák, metrorrhagiák és haemorrhoidalis vérzések ellen.

Tinctura Hamamelidis. Bels. adag 5—30 csepp pro dos. napj. 3—4-szer.

Hamamelin s. Hamamelidin. Beszárított borszeszes kivonat. Suppositorinban 2,0 pro dos., pilulában 0,05—0,2 pro dos.

578 Rp. Extr. Hamamelidis
fluidi 40,0.

Aquae dest.

Syrup. cort. Anrant.
aa 50,0.

MDS. 2 ór. 1 gyk.—evők.

579 Rp. Tinct. Hamamelidis
Tinct. Chinae. comp.
aa 20,0.

MDS. Cukros vízben 10
csepp — 1 kk.
napj. többször.

Haematogen (Dr. Hommel), tiszt. conc. haemoglobin 80%, vegy. tiszta glycerin 20%, vériképző, étvágygerj készítm. alkohol és aether nélkül, kell. ízű, a tiszta haemoglobinnal kívül tart. a friss vér összes sóit, főképen a fontos foszforsókat. (L. hird.)

Menorrhagia: Rp. Gelodurát „Pohl“
scat. orig. c. Extr.-Hydra-t. 10.
S. 3—4-szer naponta 1 dbot.

580 Rp. Decoct. cort. Hamamelidis e 20,0.
l. a. p. ad colat. 400,0.
Syrup. simpl. 40,0.
MDS. 2—3 ór. egy vörös
boros pohárral.

Hectine. Bonyolult összetételű arzénvegyület, a salvarsan helyett francia részről ajánlották. 19% As van benne. Haszn. 0.1%-os oldatból 6 napon át 1 ktm. naponta bőr alá, azután naponként 1 ktm.-el több. Bels. 20—30 csepp a 0.1%-os oldatból.

Hedonal. (Methyl-propyl-carbinol-urethan.) Fehér, kissé kellemetlen szagú és ízű por, vízben csak kevésbé oldódik. Tablettákban vagy ostyában kell beadni. Igen jó hypnoticum. Dosis sing. 1.25—2.0 esténként.

582 Rp. Hedonali 1,5—2,0.
Dent. tal. dos. No VI.
S. Este egy port.
Hypnoticum.

581 Rp. Hamamelini 1,0.
Butyri Cacao qu. s.
ut. f. supposit. No. 5.
DS. 0,2 gmos. hamamelin
csapok. Napj. 2 db.
használandó el.

583 Rp. Hedonali 6,0.
Spir. dil.
Syrupi Cinnam.
aa 30,0.
Olei Carvi aeth. gtt. 2.
MDS. Este 1 evők. (1,5 gm.)
Hypnoticum.

Hegonon. 7% eziüstöt tartalmazó fehérjés ezüstvegyület. Vízben jól oldh. Haszn. mint az arg. proteinicumé. L. ott.

Helkomen. Dibrom-beta-oxynaphtoesavas bismuth. Sárgabarna por. Antisepticum. Használata hasonló a xeroform és dermatolhoz.

Helcosol. Bismuthum pyrogallicum [*Bi.O.H.(C₆H₃(OH)₂O)₂*]. Zöldes-sárga, szag és íztelen, vízben nem oldh. por. Gyomor és béldeinficiens Adag bels. porban 0,3—1.0 pro dos. napj. 2—3-szor.

Helenin (*C₆H₆O*). Az *Inula Helenium* gyökeréből előállított camphor. Antisepticus hatású; haszn. phthisis, pertussis, bronchitis capillaris eseteiben. Bels. 0,01—0,04 pro dos. 4—5-ször napj. borszeszes oldatban, pilulában.

584 Rp. Helenini 0,6.
Pulv. et extr. Liquir.
aa qu. s.
ut f. pilul. No. 30.
Consp. pulv. Liquir.
DS. 1—2 szemet 3—5-
ször napj.

585 Rp. Helenini 0,3.
Pulv. Amyli 2,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
Det. in caps. amylac.
S. 2—3 ór. 1 dbot.

586 Rp. Helenini 0,5.
Olei Jecoris Aselli 100,0.
M. f. solut.
DS. Napj. 1—3 kk.

587 Rp. Helenini 0,1.
Cognac 40,0.
M. f. solut.
DS. 3 ór. 1 kk.

Phthisis, bronchitis capill., pertussis után vissza-
maradt makacs hurut legmegbízhatóbb gyógyszere:
Liquor Thiorobini comp. Eibach!

Helgotan. A tannoform helyett használható methylen-tannin.

Vízben nem oldh. por. Haszn. l. tannoform cz. a.

Hellebori viridis radix. (Ranunculaceae). Hatóanyaga helleborein ($C_{26}H_{44}O_5$) és helleborin ($C_{38}H_{42}O_6$), glycosidák. Drasticum. Szívre különben úgy hat, mint a digitalis. Népgyógyászatban (Erdélyben) antihydropicum. Bels. adag porban, pilulában, decoctumban 0,02—0,1 pro dos. 2—3 ór. (Vigyázat! Erős méreg! Mint drasticum ne használtassék!)

Helleboreinum ($C_{26}H_{44}O_{15}$). Különböző helleborus-fajokból előállított glucosida. Szintelen v. fehérös tökből álló jegeczek, vízben könnyen oldódnak. Digitalis pótszerűül ajánlották. Cardiacum, diureticum. Könnyen okoz hasmenést. Cumulativ hatása nines. Adag bels. 0,01—0,02 grm. pro dos. 3—5-ször napj. pilulában.

Helmitol. (Methylen-czitromsavas hexamethylen-tetramin). Az urotropiumnak kellemes ízű, vízben jól oldható pótszere. A szervezetben formaldehyd képződik belőle. A húgyutak desinfiálására pyelitis, cystitis stb. esetén adagja 1,0 2—3-szor napjában.

588 *Rp.* Helmitoli 5,0.

Dis. in dos. aeqn.

No. 10.

DS. $\frac{1}{2}$ gmos helmitol-porok.

Hermophenyl. Vízben jól oldható, fehér por. Tart. kb. 40% Hg t. Antisepticum, antilueticum. Sebkezelésre 0,1—1,0% os oldat; antilueticus befeckskeudezésekre 0,01 pro die.

Heroin l. opium és morphin.

Hetol (Natrium cinnamylicum). Acid. cinnamylicum helyett (l. ott) 1—5%-os vizes v. physiol. konyhasóoldatok venás v. glutealis befeck. alakjában. haszn. Kezdetben 1 mg. 3-szor hetenként. Oldatok sterilizálandók.

Hetokresol (Cinnamylmetakresol). Vízben oldhatlan, fehér por. Gümőkóros fekélyekre, sebekre belintés alakjában porfuvóval v. aetheres oldatban permetezve (1:10—20). haszn.

Hetralin. Rosorcin hexamethyleutetramin. A vizeletet erősen savanyúvá teszi. Cystitis gonorrhoeicánál ajánlják, mint az urotropin helyettesítőjét 1—1,5 gmos adagokban

Hirudin. A pióczákból kivont azon anyag, mely a véralvadási akadályozni tudja. Barnás, száraz, lemezes anyag, mely vízben jól old. 0,001 elegendő, hogy 7-5 ketm. vért folyékony állapotban

Wildungeni Helenen. és Georg-forrás kit. hat. pyelitis, cystitis ellen. (L. hird.)

Vesicaesan-labdaesok tart. a Fol. urae ursi összes hatóanyagait, bevált hólyag-fertőtlenítőszer acnt gonorrhoeánál a hólyaghurmt és a húgycső hátsó része lobosodásának megakadályozására, idült gonorrhoeánál a vesék kiöblítésére, a gynomorra és a vesékre káros mellékhatásuk ninesen. (L. hird.)

tartson. Használatra 0,01 feloldandó 2 kctm. dest. vízben v. physiol. konyhasóoldatban.

H. Hirudo medicinalis és H. officinalis. Póca (Annullatae). Csak egyszer használható. Használat után elpusztítandó.

Histosan. A guajacolnak fehérjés vegyülete. Barna por, csak a belekben oldódik. Haszn. mint a guajacol-készítményeké általában. Adag porban 3—1-szer napj. 0,25—0,5 gm.

Holocainum hydrochloricum. Diaethoxyaethenyl-diamin sója. Színtelen jegeczek, 2½%-ban old. vízben. Helyi anaestheticum, mint a cocain. Szembe 1%-os oldatból 3—5 csepp már érzésteleníti a corneát. Accomodatiót, belszemi nyomást nem befolyásolja, pupilla ki-sé szűküli. Erős görcsokozó mérég (!). Vigyázat. Csak a szemészetben (0,1 : 10,0).

Homatropinum l. Belladonna.

Homorenolum hydrochloricum. Az adrenalinhoz hasonló, de azzal nem egészen azonos syntheticusan előállított aethyl-aminoacetkozmas katechin sósavas sója. 50-szer kevésbbé mérgező mint az adrenalin; szívre állítólag nem hat. Haszn. mint az adrenaliné, de 5%-os oldatban.

H. Honthin s. Tanninum albuminatum keratinatum. Keratinozott csersavas fehérje, melynek a tannalbin fölött az az előnye, hogy a gyomorban nem oldódik. — Sötét sárgásbarna, finom por, vízben oldhatlan, íz- és szagtalan; folyadékokban jól suspendálható, alkáliák oldják. Enteritis, diarrhoea ellen porban vagy nyákos főzetekben rendelik. Adagja felnőtteknek 0,7—1,0, gyermeknek 0,2—0,5.

Hopogan. l. Magn. peroxyd.

Hopein. A kókló alkaloidja. Fehér, igen keserű, vízben oldhatatlan. Sedativum, hypnoticum. Adagja 0,02. Salicylsavas sója oldódik és hasonló hatású. Angol készítmény, csak kondenzált sörben oldva és plüolába zárva kapható. Adag ebből 20—40 csepp.

Hormonal. A gyomor és duodenum nyálkahártyájából és főleg a lépéből előállított kivonat, mely bélmozgást idéz elő, ha a vérbe fecskendeztetik. 20 kctm. tartalmozás ideig elő, ha a intramuscularis (barna üveg) és intravenás (kék üveg) befecskendések céljaira. Adag 10—20 kctm. egyszerre.

Hydracetinum l. Pyroclinum.

Hydrargol. l. Hydrarg. imidosuccin.

Hydrargyri praeparata.

1. Hivatalos kénesőkészítmények.

II. Hydrargyrum purum s. Mercurius vivus (Hg). Ezüstfehér színű, élénk fémfényű, nehéz folyadék. Bels. ileusnál mint mechanically (súlyánál fogva) ható szer 100,0—200,0 mennyiségben (?). Különben csak kenőcs és tapasz előállítására haszn.

Hg-Glidine (higany-növényfehérje), új. intern antisymphiliticum, pót- és segítőszere az inunctio és injectio-kúrának, az emésztőszervek jól tűrik, adag 1 tabl. 1—3-szor pro die, minden tabl. tart. 0,01 gr. növényfehérjéhez kötött higanyt. (L. hird.)

II. Emplastrum Hydrargyri l. Emplastra.

II. Unguentum Hydrargyri s. Unguentum cinereum.
33,3% Hg. tart. Antiphlogisticus célból 2,0—3,0 gm. 1—2 × napj.
bedörzsölendő. Phthiriasis esetén a bőr beteg területére
2,0—3,0 dörzsölendő be egyszer. Syphilisnél a bedörzsölési
gyógymódhoz 1,0—3,0-os adagok charta ceratában rendelődk.

††H. Hydrargyrum bichloratum ammoniatum s. Mer-
cur. praecipit. albus [$Hg(NH_2)Cl$]. Igen fehér por, vízben
nem oldható, sem borszeszben. Causticum. Bels. nem. Küls.
kenőcsökben főleg lágy fekélyre és bujakóros fekélyekre mint
izgató, maró és specificus szer (1:10—30). Dos. max. pro dos.
0,02! pro die 0,06!

††II. Hydrargyrum bichloratum corrosivum s. Hyd-
rarg. sublimatum ($HgCl_2$). Apró, fényes, fehér jegeczekből
álló szagtalan tömeg; maró és mndorító fémizű; szétdörzsölve
fehér por; 16 sr. hideg, 3 sr. forró vízben, ugyanannyi bor-
szeszen és 1 sr. aetherben oldódik. Causticum, desiniciens,
antisiphiliticum. Küls. sebkezelésben mint antisepticum 1:1000—
2000; condylomák edzésére 1:10; permete alakban belég-
zésre vagy torok-, szájvíznek 0,2—0,5:1000; húgycsőbe fecs-
kendésre 0,05—0,1:100; cystitis tuberc. 1:4000 s ebből
20—30 csepp a hólyagba fecsk.; bujakóros száj-, torokfekélyek
ecsetelésére 0,5—1,0:100. Bels. pilulában, porban, bőr alá
fecskendés alakjában 0,005—0,01 pro dos. 1—2-szer napj. Dos.
maxim. sing. 0,02! Dos. maxim. pro die 0,06! Per os soha éh-
gyomorra! Por, pilula argillával készíttessék. Bőr alá fecs-
kendésre szolgáló oldatba 1 r. $HgCl_2$ -hoz 10 r. $ClNa$ -a vétessék.
Sublimatfürdőket l. Fürdők cz. a.

††Cylindri Hydrargyri bichlorati. Azelőtt pastilli hydrarg.
bichl. corr. név alatt szerepeltek; a cylinder elnevezés jobb.
Rózsaszínre festett 0,5 vagy 1,0 sublimatot és ugyanannyi natr.
chloridot tartalmazó készítmény. Haszn. sublimatoldatok gyors
készítésére. 1 liter vízre 1 db. Nagy vigyázat (!!). Zárt he-
lyen tartandó(!). Csak megbízható beteg kezére szabad bízni(!).
Figyelmeztetni súlyos mérgezést okozó voltára(!). Méregjeggyel
minden készítm. el kell látva lenni. Az elhasznált v. megmaradt
oldatok alkalmas helyen öntendőek el(!). Édelvényekre vigyázat(!).

H. Tela Hydrargyro bichlorato corrosivo impraegn-
ata. Antisepticus sebkötéshez.

II. Filum sericeum hydrarg. bichlor. impraegn. Asep-
ticus varróselyem.

Past. Hydrarg. bichlor. Dr. Egger hazai gyártmány.

Mercurocrème sec. dr. Rosenberg. legtiszt., legkényelm. be-
dörzs. kúra, bedörzs. 3—5 perc, nem piszkítja a felületet,
zsír- és szagtalan, mite 3 gr. 22 $\frac{1}{2}$ % Hg., normale 3 gr. 33 $\frac{1}{3}$ %
Hg., forte 3 gr. 50% Hg.-t tart. (L. hird.)

††H. *Hydrargyrum bijodatum rubrum* (HgJ_2). Skarlát-vörös por, vízben alig, hideg borszesz 130, forró borszesz 20 súlyrészében oldható. Kissé erősebb causticum, mint a hydrarg. bichlor. ammon. Küls. kenőcsben 0,1—0,5 : 10. Bels. ritkán, még leginkább görvélyes egyének bajakórjánál. Bels. adag porban, pilulában 0,005—0,01—0,02! pro dos. Dos. maxim pro die 0,06!

†H *Hydrargyrum chloratum mite sublimatione paratum, seu Calomel* (Hg_2Cl_2). Finom, sárgásfehér, nehéz por, mely kristálytörmeléből áll. Íz- és szagtalan. Vízben, borszeszben, aetherben oldhatlan. Küls. substantiában, mint a nyákhártyákat, fekélyeket enyhén edző hintőpor haszn. Bels. kis adagban antisiphiliticum (porban opiummal 0,02—0,05 pro dos. napj. 2—3-szor), nagy adagban laxans, diureticum (0,1—0,5 pro dos. napj. 2—3-szor, gyakran jalapával együtt). Cholera asiatica és nostras, valamint typhus abdom. nál nagy adagban, mint a beleket desinficiáló szert ajánlották. Dos. maxim. pro die. 1,0!

††H. *Hydrargyrum chloratum mite vapore paratum s. Calomel vapore paratum*. Bels. soha se rendeld; ha rendelnéd is, a gyógyszerésznek *nem szabad* expediálni, mert erősen mérgező. Csupán és egyedül a szemészetben haszn. a szembe hintésre. Egyidejűleg nem szabad bels. jódkészítményeket adagolni.

††H. *Hydrargyrum oxydatum flavum* (HgO). Sárga por, vízben nem oldható. Edző hatású. Küls. mint kenőcs lágy fekélyekre, syphiliticus fekélyekre 1 : 10—30, szemkenőcsnek 0,1 : 10—20. Dos. maxim pro dos. 0,02! pro die 0,06!

††H. *Hydrargyrum salicylicum*. Fehér, alaktalan, szag- és íztelen, közömbös kémhatású, finom por, mely vízben, borszeszben nem oldódik; jól oldódik konyhasó és natr. bicarbon. tartalmú folyadékokban. Igen állandó, ellentálló vegyület. Kénest tartalmaz 59,5%. Haszn. küls. behintés alakjában syphiliticus fekélyekre, befecskendés alakjában (1 : 1000) gonorrhoea urethrae eseteiben. Bels. syphilisnél adag porban, pilulában emelkedőleg 0,01—0,05 grmíg pro die. Bevétel után tejet igyék a beteg. Intramuscularis befecskendésekre 1%-os oldat kali carb. v. natr. chloratummal készítendő; egyszerre 1 fecsk. Paraffinum liquid-al készült suspensio is használtatik e célra. Dos. max. sing. 0,02! pro die 0,06!

H. *Hydrargyrum sulfuratum rubrum*. l. Cinnabaris factitia

Praecipitat. Mattan cuticular (Mattan + 1% és 5% Hydr. praec. alb.). — **Sárga higany-Mattan** (Mattan + 1% Hydr. oxyd. flav.), a bőrön nem látszó paszták a fedetlen testrészek nappali kezelésére. (L. hird.)

Syphilis: Rp. Gelodurat „Pohl“ 0,5.

(kal. jod. 0,5 + Hydr. bijod. 0,005 in Gelodurat)
S. 3-szor naponta 1—2 dbot.

589 *Rp.* Hydrarg. bichlor. ammon. 0,5.
Bismuthi subnitr. 2,0.
Ungu simpl. 20,0.

MDS. Kenőcs. Psoriasis faciei.

591 *Rp.* Hydrarg. bichlor. ammon.
Bismuth. subnitr. aa 0,5.

Amyli.
Glyceriini aa 10,0.
Mu. f. ungn.

DS. Kenőcs szeplős az epidermis más festenyzettségé ellen.

593 *Rp.* Hydrarg. corros. 0,1.
Collodii flexil. 10,0—15,0.

MDS. Corrosiv-collodium edzésre.

595 *Rp.* Hydrarg. bichlor. corr.
Natrii chlor. aa 2,0.
Aquae dest. 100,0.
M. f. sol. filtra.

DS. 2%-os subl. oldat. Az orvos kezéhez, sub. sigillo. 4—5 naponként 1 Pravaz-fecsk. a glutensok közé fecsk. Sürgős esetekben (pl. agosyphilis) 3-5 %-osra is emelhetjük e vényen a sublimatoldatot. 10—15 injectio egy cyclus.

590 *Rp.* Hydrarg. bichlor. corros. 0,2.
Glycerini 40,0.
MDS. Syphiliticus torokszájfekélyek ecsetelésére.

592 *Rp.* Hydrarg. bichlor. ammon. 0,1.
Lanolini
Vaselinæ aa 5,0.
M. f. ungn.

DS. Szembéjkenőcs. Borsónyi használandó el egyszerre.

594 *Rp.* Hydrarg. bichlor. ammon. 2,0.
Unguent. emoll. 30,0.
M. f. unguentum.

DS. Praecipitat-kenőcs. Lupus erythematodes, psoriasis ellen.

596 *Rp.* Hydrarg. bichlor. corros. 0,1.
Argillae alb. qu. s. ut. f. cum guttis nonnullis.
Aquae glycerinatae pilul. No. 30.
Consp. pulv. Argillae.
DS. 2—4 szemet naponta.

597 *Rp.* Hydrarg. bichlor. corros. 0,1.
Natrii chlorati 1,0.
Aquae destill. 10,0.
M. f. solutio; filtra.
DS. 1⁰/₂-os corrosiv-oldat Bőr alá fecskendésre. Sub sigillo. Az orvos kezéhez. 1¹/₂—1 fecskendővel naponta.

Gelokal, higanybioxid és jódkáli a vékonybélben oldódó geloduratkapszulákban, antilueticum belső adagolásra. (L. hird.)

Corrosol solutio (succinimid methylen-sav higany) a legalkalm. készítm. a luesnek intramusc. befecsk. útján való kezelésére. (L. hird.)

- 598 *Rp.* Hydrarg. bichlor.
corros. 0,5.
Aqua destill. 500,0.
Eosini qu. s.
M. f. solutio.
D.S. 1 pro mille corrosiv.
oldat. Külsőleg.
Sub signo veneni.
- 600 *Rp.* Hydrarg. bijodati
rubri 0,5.
Ungu. simpl. 20,0.
M. f. unguent.
D.S. Kenőcs.
- 602 *Rp.* Calomelanos vapore
par. 10,0.
Det. in vitro cum epist.
vitreo clauso.
D.S. Az orvos kezéhez.
Calomel. Hintőpor.
Szemészetben.
- 604 *Rp.* Calomelanos 0,05—
0,1.
Ferri lactici 0,2.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
D.S. Reggel, este 1 port.
Csecsemőknek syphi-
lis congenita ese-
tén, ha nagyfokú
vérszegénység is
van jelen, ami ha
nincs, úgy a ferrum
lact. elhagyandó
- 606 *Rp.* Calomelanos 1,0.
Tuberor. Jalapae
pulv.
Sacchar. alb. aa 2,5.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 5.
D.S. Naponta 1—2 port.
Drasticum.
- 599 *Rp.* Hydrarg. bijod. rubr.
0,05
Kalii jodati. 3,0.
Aqua dest. 150,0.
Glycerini 10,0.
M. f. solutio.
D.S. Reggel, este egy evő-
kanállal. Lehet
emelkedni 3—4
evőkanálíg na-
ponta.
Syphilis.
- 601 *Rp.* Calomelanos 0,5.
Opii pur. pulv. 0,05.
Sacch. alb. 4,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
D.S. 2—3-szor napj. 1 port
Felnőtteknek.
Syphilis.
- 603 *Rp.* Calomelanos 1,0.
Olei Olivar. 10,0.
M. f. suspensio
D.S. 1—2 hetenként $\frac{1}{2}$
Pravaz-fecsk. aglu-
tensok közé. 5—7
injectio egy cyclus.
- 605 *Rp.* Calomelanos 0,05.
Pulv. Doveri
0,05—0,08.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
D.S. Reggel, este egy port.
Csecsemőknek sy-
philis congen. ese-
tén, ha bélhurut is
van jelen. Ugyanez
rendelendő chole-
ra infantum ellen
is, midőn a calo-
mel összes adaga
0,08-ra emelhető
és 2 ór. adandó
1 por.

Gelokal intern antihueticum, higanybijodidot és jódkálit tart.
gelodurat kapsz., melyek csak a vékonybelekben oldódnak. (L. hird.)
Corrosol solutio (succinimid methylarsensavas higany) a leg-
alkalm. készítm. a lnc-nek intramusc. befecsk. útján való ke-
zelésére. (L. hird.)

- 607** *Rp.* Calomelanos 2,0.
Sacchar alb. 5,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aeq. No. 10.
DS. Naponta 3—4 port.
Diureticum.
- 610** *Rp.* Hydrarg. salicyl. 1,0.
Vaselinæ 30,0.
M. f. ungu.
DS. Kenőcs syphil. feké-
lyekre.
- 612** *Rp.* Hydrarg. salicyl. 0,1.
Aquae dest. 250,0.
Natrii bicarb. 1,0—1,5.
MDS. Gonorrhoeánál a
húgycsőbe fecsk.
3 × napj.
- 614** *Rp.* Hydrarg. salicyl. 1,0.
Opii pur. pulv. 0,2.
Extr. Gentian. qu. s.
nt. f. pilul. No 30.
Consp. pulv. Liquir.
DS. Napj. 2—3 szemet.
- 616** *Rp.* Hydrarg. salicyl 1,0.
Paraffin. liquid. 10,0.
MDS. Intramuscul. befecs-
kendésre
- 608** *Rp.* Hydrarg. oxyd. flav.
0,2.
Lanolini
Vaselinæ aa 5,0
M. f. unguent.
DS. Szemhéjkenőcs.
- 609** *Rp.* Hydrarg. salicyl.
Kalii carb. aa 1,0—3,0.
Aquae dest. 1000,0.
MDS. Sebkitőzéshez.
- 611** *Rp.* Hydrarg. salicyl. 1,0.
Magnes. carb. 20,0.
MDS. Hintőpor, syphil. fe-
kélyekre.
- 613** *Rp.* Hydrarg. salicyl. 0,5.
Opii pur. pulv. 0,1.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aeq. No. 10.
DS. Napj. 2 port.
- 615** *Rp.* Hydrarg. salicyl
Kalii carb. aa 0,1.
Aquae dest. 10,0.
MDS. Bőr alá fecskendésre.
Egy fecsk. pro die.

2. *Nem hivatalos kéneső készítmények.*

Pulvis cinereus s. Mercurin Egger és Mercuriol (Blenquist-Ahmann); 33—40% kéneső tartalommal a Welandor-féle zsákocskákban vétetnek használatba az ungu. ciner. helyett. A készítmények amalgamálás útján készülnek, poralakúak. Antisyphiliticus gyógymódnál 5 gm. napj. az első 5—10 napon át, majd másodnaponként 5 gm. Az elillanó kénesőgőzök hatnak. Némelyek épp oly jónak vélik, mint az inunctiós gyógy-
módot. A kúra 40 napig tart.

Gelokal 0·2, (kal. jod. 0·2 + Hydrarg. bijodat. 0·002) jól használható intern antilueticum (L. hird.)

Corrosol solutio (succinimid methylarsensavas higany) a legalkalm. készítm. a luesnek intramusc. befecsk. útján való kezelésére. (L. hird.)

Mercurocrème sec. dr. Rosenberg legtiszt., legkényelm. bedörzs. kúra, bedörzs. 3—5 percz, nem piszkítja a fehérneműt, zsír- és szagtalan, nite 3 gr. 22¹/₃₀ Hg., normale 3 gr. 33¹/₃₀ Hg., forte 3 gr. 50⁰/₀ Hg.-t tart. (L. hird.)

Hydrargyrol. ($C_6H_4.OH.SO_3Hg.$) Kéneseő paraphenylthionat. Barnavörös, szagos, vízben s glycerinben oldh. lemezkék. Sublimat helyett mint antisepticum. Nem mar, fémeszközöket nem rontja, fehérjét le nem csapja. 1—4 : 1000 old. haszn.

Unguentum cinereum cum resorbino paratum. Ugyanolyan kéneseőtartalmú mint a ltv. kenőcs. 15 grammos beosztott üvegtubusokban kapható.

Charta Hydrarg. bichlor. impraegnata. A sublimátacylinderek helyett Franciaországban gyakran haszn. készítmény. Nálunk is forgalomban van. Ugyanoly vigyázat, mint a cylinderekkel.

Hydrargyrum jodatum flavum (Hg_2I_2). Zöldessárga por. Haszn. mint a hydrarg. bijod. rubr.

Hydrargyrum aethylo-chloratum [$Hg(C_2H_5)Cl$]. Gyöngyházfényű, hideg vízben neh. old. jegeczek. Antisymphiliticum. Bőr alá 0,005—0,01 pro dos. és die. 1%-os oldat irandó fel. Helybelileg nem izgat.

Hydrargyrum kakodylicum [$(CH_3)_2AsO_2$]₂ Hg. Fehér, hydroszkópos kristályok; vízben, alcoholban könnyen old. Syphilis ellen intramuscularisan 0·03 naponként.

Hydrargyrum atoxylicum. As-tartalmú higanykészítmény. Ugy haszn. mint a hydrarg. kakodyl. Adag: 1 : 9 készült olajos emulsióból 4 naponként 0·5 gm. intramuscularisan. Előnyei nincsenek más Hg. készítm. fölött.

Hydrargyrum benzoicum oxydatum. [$(C_7H_5O_2)_2Hg + H_2O$] Fehér, szag- és íztelen jegeczpor; hideg vízben nehezen, forró vízben, borszeszben könnyen oldódik. Konyhasós vízben könnyen oldódik, midőn egy kettős só képződik. Antisymphiliticum. Bőr alá fecskendés alakjában adag 0,01 pro dos. és pro die. Oldat $ClNa$ segélyével készíttessék.

617 Rp. Hydrarg. benzoici 0,15.

Argillae alb. qu. s.

ut. f. cum gtt. nonnull.

Aquae dest.

pilul. No. 30.

Consp. pulv. Argillae.

DS. 1—2 szemet napj.

618 Rp. Hydrarg. benzoici Natrii chlorati aa 0,25.

Cocaini hydrochlor.

0,5.

Aquae dest. 30,0.

MDS. Bőr alá fecskendésre.

Gelokal 0·5, (kal. jodat. 0·5 + Hydrarg. bijodat. 0·005) jól bevált intern antilueticum (L. hird.)

Alcuentum Hydrargyri, vízben oldódó kenőcs 33 $\frac{1}{3}$ % higanynyal, eltartható, nem avasodik, gyorsabban resorb., mint a zsíros kenőcsök.

Mercurocrème sec. dr. Rosenberg legtiszt., legkényelm. bedörzs. kura, bedörzs. 3—5 percz, nem piszkítja a felületet, zsír- és szagtalan, mite 3 gr. 22 $\frac{1}{3}$ % Hg., normale 3 gr. 33 $\frac{1}{3}$ % Hg., forte 3 gr. 50% Hg.-t tart. (L. hird.)

619 *Rp.* Hydrarg. benzoici
 Vaselini \overline{aa} 1,0.
 Ol. Paraffini 8,0.

MDS. Intramuscul. befecs-
 kendésre. A Lewin-
 féle fecskendőből
 2 osztásnyi jobbra
 és balra a gluteus
 izmok közé.

Hydrargyrum bichloratum carbamidatum solutum.
 (1,0 hydrarg. bichlor, 100,0 forró, párolt vízben feloldatik, a
 lehűlt oldathoz 0,5. ureum tétetik) Hosszú időre nem rendel-
 hető, mert megbomlik. Bőr alá fecskendőre igen alkalmas
 syphilis esetén. Napj. 1 fecskendővel.

Hydrargyrum carbohcicum s Hydrarg. carbol. oxyd.
s. Hydrarg. diphenylicum (MERCUR.) ($OC_6H_5.Hg.OC_6H_5$).
 Színtelen jegecztük. Vízben, hideg borszeszben oldhatlan, 20 r.
 forró borszeszben oldódik. A kéneső erősen van a phenolhoz
 kötve ezen vegyületben, mely 51,8% kénesőt tartalmaz. Haszn.
 bels. mint antisiphiliticum. Adag pilulában 0,02—0,03 pro dos.
 3-szor napj. Intramuscul. befecsk. alakjában ugyanennyi pro die.

620 *Rp.* Hydrarg. carbol. 1,2.
 Extr. et pulv. Liquir.
 qu. s.
 ut. f. pilul. No. 60.
 Obduc. bals. tolut.
D. Napj. 2—4 szemet.

621 *Rp.* Hydrarg. carbol. 2,0.
 Mucil. Gummi arab.
 4,0.
 Aquae dest. 100,0.
MDS. Felrázva napj. egy.
 Lewin-féle fecsk.
 intramuscularisan.

Hydrargyrum colloidalé. Barna, szemeses anyag, vízben
 old. Az argent. colloidalé módjára készül. Syphilisnél 10%-os
 kenőcs (napj. 3,0 gm. használandó el); bőr alá 2%-os oldat.
 Bels pilulában, 0,01 pro dos. napj. 1—2-szer.

622 *Rp.* Hydrarg. colloid.
 10,0.
 Aquae dest. 10,0.
 Axung. Porci 60 0.
 Cerae alb. 15,0.
 Aetheris sulf. 1,5.
 Aether. benzoati 3,5.
 M. f. ungu.
D.S. Werler-féle mercur-
 colloid. kenőcs Küils.
 mint az ungu. ciner.
 Napj 3,0 gm. fogyasz-
 tandó el

623 *Rp.* Hydrarg. colloid.
 0,3—1,0.
 Argyllae alb.
 Glycerini \overline{aa} qu. s.
 ut. f. pilul. No 30.
 Consp. Talcó pulv.
D.S. 3-szor napj. 1—2 sze-
 met evés után.
 Syphilis.

Gelokal intern antilueticum, tartalmaz 0.2 és 0.5 kal. jod. +
 0.002 és 0.005 Hydr. bijo-dat. csak a vékonybélben oldódó gelo-
 duratkapsulákban. (L. hird.)

Corrosol solutio (succinimid methylarsensavas higany) a leg-
 alkalmi. készítm. a luesnek intramusc. befecsk. útján való ke-
 zelésére. (L. hird.)

Hydrargyrum formamidatum solutum. (LIEBREICH.) (1,0 frissen lecsapott kénesőxyd oldata formamidben: az oldat felhígíttatik vízzel 100 köbetnrig.) Bőr alá fecskendésre alkalmas syphilis ellen. Napj. 1 fecskendővel.

Hydrargyrum gallicum. Zöldes-feketés, vízben nem oldh. por. Antisyphiliticum. 31% kéneső tartalmú. Adag. pilulában 0,02—0,04 pro dos.

624 Rp. Hydrarg. gallici 1,5.
 Extr. Chinae 4,0.
 M. f. l. a. pil. No. 50.
 DS. Etkezés közben 3 ×
 napj. 1—2 szemet

Hydrargyrum glutino-peptonatum hydrochloricum. Fehér lemezekből álló hydroskópos por. Vízben jól old. Antisyphiliticum. Adag 4%-os oldatból subcután napj. 1 fecsk. = 0,01 sublimattal.

Hydrargyrum imidosuccinicum. ($Hg.N_2C_8H_8O_4$). Fehér, selyemfényű jegeczpor, mely 25 r. vízben és 300 r. borszeszben tisztán oldódik. Antisyphiliticum. Bőr alá fecskendés alakjában 0,01—0,015 gm. pro dos. és pro die.

Hydrargyrum jodicum oxydatum. [$Hg(JO_3)_2$] Fehér, amorph vízben oldhatlan por, oldh. NaCl v. IK-os vízben. Antisyphiliticum. Intraparenchym. befecskendések alakjában haszn.

625 Rp. Hydrarg. jodici oxyd.
 0,12.
 Kalii jodati 0,03.
 Aquae dest. 10,0.
 M. f. sol.
 DS. 1—1½ fecsk. 2—4
 naponként.

Hydrargyrum kalium hyposulfurosum. [$3Hg(S_2O_3)_{12}+5.K_2S_2O_3$]. Színtelen, vízben oldh. kis tők. Tart. 31,8% Hg-ot. Antisyphiliticum. Subcután 0,25: 10,0, ebből ½—1 fecsk. pro die. Fájdalmas.

Hydrargyrum oleicum s. elainicum. [$Hg(C_{18}H_{33}O_2)_2$]. Olajsavas kéneső. Olajszagú, sárgásfehér, sűrű, áttetsző anyag, vízben, borszeszben, aetherben alig oldh., benzinben könnyen. Szürke kenőcs helyett haszn. lanolinnal keverve 1:5 kenőcs alakjában.

Hydrargyrum oxycyanatum. [$HgO.Hg(NC)_2$]. Fehér, jegezes, vízben oldh. por. Mint antisepticum 5—6 × erősebb a sublimatnál, ezért 1:5000 oldatban jól haszn.; mint antisyphiliticum subcután 10%-os oldatból napj. egy fecsk.

Corrosol solutio (succinimid methylarsensavas higany) a legalkalm. készítm. a hiesnek intramusc. befecsk. útján való kezelésére. (L. hird.)

Hydrargyrum peptonatum. (BAMBERGER.) (1,0 húspepton 50 kctm. párolt vízben oldatlik, az oldathoz 20 kctm. 5%-os sublimatoldat tétetik; a megzavarosodott folyadékhoz 20%-os konyhasóoldatból annyi teendő, hogy az egészen feltisztuljon; ezután a keverék vízzel 100 kctm.-ig elligítandó.). Az oldat bőr alá fecskendésre igen alkalmas syphilis esetén. 1 kctm. megfelel 0,01 sublimátnak. Napj. egy fecskendővel.

Hydrargyrum-pyocetanin. Violaszínű, vízben neh. oldh. por. Merck készíti. Gonorrhoea ellen 1%-os oldat; égési sebekre amylinummal aa hintőpor; favus ellen 1%-os oldat spir. saponatus-szal.

Hydrargyrum soziodolicum. [$C_2H_2I_2.SO_3.OHg.$] Narancsszínű finom por, vízben, borszeszben oldhatlan, könnyen konyhasós vízben. Küls. parazitás és bujakóros bőrbajoknál 10%-os oldattal mosogatások; eczema, intertrigo, ulcus cruris esetében 1%-os kenőcs. Bőr alá v. intraglutealis befecsk. 8%-os oldat 2 r. KJ-al (syphilis).

626 Rp. Hydrarg. soziodol. 0,5—1,0.

Ol. Oliv. 5,0—10,0.

Lanolini 50,0—90,0.

M. f. ungu.

DS. Késhátvastagon vászoncsikokra felkenve alkalmazandó.

628 Rp. Hydrarg. soziodol. Natrii chlorati aa 0,2.

Aquae dest. 20,0.

MDS. Torok ecsetelésre. Syphilis.

627 Rp. Hydrarg. soziodol. 0,8-

commisce cum

Aqu. dest. 5,0.

adde

Kalii jodat. 1,6.

Aquae dest. 10,0.

M. filtra.

DS. Intraglutealis befecskendésre. Hetenként egy Pravaz-fecsk.

629 Rp. Hydrarg. soziodol. 0,3.

Talc. venet. 30,0.

MDS. Befúvásra. Ozaena syphil.

Hydrargyrum tannicum oxydulatum. (LUSTGARTEN.) Sötétzöld, íztelen por, oldhatlan. Bels. porban syphilis ellen. Adag. 0,1 pro dos. 3 × napj. 1/2—1 órával étkezés után.

630 Rp. Hydrarg. tannici oxydul. 1,0.

Sacchar. lact. 4,0.

M. f. pulv. div. in dos.

aequ. No. 10.

DS. 3 × napj. 1 port.

631 Rp. Hydrarg. tannici oxydul. 4,0.

Pulv. rad. Althaeae.

Extr. Liquir. aa qn. s.

ut. f. pilul. No. 60.

Consp. pulv. Liquir.

DS. Napj. 3—5 szemet.

Elizir Deret (jódos tanninsavas higany). (L. hird.)

Corrosol solutio (succinimid methylarsensavas higany) a legalkalm. készítm. a luesnek intramusc. befecsk. útján való kezelésére. (L. hird.)

Hydrargyrum thymico-aceticum. (MERCK.) Fehér, szagtalan, íztelen, lemezes jegerzkékben fordul elő; vízben oldhatlan, alkáliákban jól oldódik. Újabb antisymphiliticum. Úgy látszik, e tekintetben egyenrangú a hydrarg. salicylicum-mal. Per os nem igen haszn. Bőr alá v. intramuscul. fecsk. 5—10%-os suspensióban mucil. gummi arab. v. paraffin. liquid. ban; 1 kettm. egyszerre 3—5 napi időközökben.

632 Rp. Hydrarg. thymico.
acet. 1,5.

Mucil. Gummi arab. 0,5.

Aquae dest. 20,0.

M. f. suspensio.

DS. Bőr alá fecsk.

633 Rp. Hydrarg. thymico-
acet. 1,0.

Paraff. liquid. 10,0.

Cocaini hydrochlor. 0,1.

M. f. suspensio.

DS. Bőr alá fecsk.

634 Rp. Hydrarg. thymico-
acet. 1,0.

Paraff. liquid. 10,0.

M. f. suspensio.

DS. Bőr alá fecsk.

Hydrargyrum-Zincum cyanatum. Fehér, kristályos por. Vízben nem, vérsérumban oldható. Erős bactericid hatású. Kötőszereket impraegnálnak vele.

*

H. Hydrastis canadensis rhizoma. (Ranunculaceae.) Hatóanyagai berberin, hydrastin (alcaloidok). Méhvérzések, tüdővérzések, vesevérzések ellen haszn. de tonicum, stomachicum, cholagogum is. Hydrastis és készítményei újabb időben rendkívül (!) megdrágultak. Szegényebb sorsúaknak ezért *ne* rendeljük. Jól helyettesíthetjük a sokkal olcsóbb cotarnin v. *stypti-cinnel*. Készítmények:

II. Extractum Hydrastis fluidum. Adag 2 ór. 20—40 csepp syrupban.

Hydrastininum hydrochloricum, $C_{11}H_{11}NO_3.HCl$. Színtelen v. sárgás, vízben könnyen oldódó por; keserű. Hatása mint egyéb hydrastis készítményeké, csak hogy erősebb. Adag bőr alá fecsk. 10%-os oldatból $\frac{1}{4}$ —1 fecsk. Bels. pilulában 0,1 gm. pro dos. napj. 2—3-szor.

Hydrastis-Tektolettes, tömény hydrastis-készítmény, melyben az undorító ízt kakaoréteg elfedi: egy tektolette megfelel 30 csepp folyékony kivonatnak. (L. hird.)

Menorrhagia: Rp. Gelodurat „Pohl”

scat. orig. c. Extr. Hydrast. 1-0.

S. 3—4-szer naponta 1 dbot.

635 *Rp.* Hydrastini hydrochlor. 1,5.
Pulv. et extr. Liquir. aa qn. s.
ut f. pil. No. 30.
Consp. pulv. Liquir.
DS. Napj. 3 × egy szemet.
Metrorrhagia, menorrhagia

636 *Rp.* Hydrastini hydrochlor. 1,0.
Aquae dest. 10,0.
MDS. Szo nomine. Bőr alá
fecsk. $\frac{1}{2}$ —1 fecskendővel.

637 *Rp.* Extr. Hydrastis fluidi.
Syrupi simpl. aa 30,0.
MDS. 2—3 ór. 1 kk.

638 *Rp.* Extr. Hydrastis fluidi
Vini Malag. aa 30 0.
Syrup. Cinnam. 15,0.
MDS. 2—4 ór. 1—2 kk.

†**II. Hydrogenii hyperoxydati liquor.** (H_2O_2). Víztisztá folyadék, keserű, összehúzó ízű, könnyen bomlik. Kereskedésbeli készítmények 30%-os vízoldatok. Jól elzárt edényben tartandó. Helybeli izgató, desinficiens, élenyítő (fekélyek ecsetelésére), cosmeticum (a barna haj aranyszőke színt nyer általa). Bels. nem. Küls. 1—3% oldatokkal mosogatások, tamponozás, ecsetelések. Intrauterin befecsk. 4 köbctm. az 1—3%-os oldatból. Oldatok készítésénél a készítmény töménysége veendő figyelembe, pl. a 30%-os készítmény 1 része 29 r. vízzel ad 1% -os oldatot.

II. Hydromel infantum I. Senna.

Hydropyrin. Natrium acetylo-salicylicum. Az acid. acetylo-salicylicum natrium sója. Vízben jól oldódik. Fehér por. Antipyreticum, antirheumaticum, mint az acid. acetylo-salicylicum. Dos. sing. 0,5—1 0 pro die 3,0—5,0.

Hygiama. Tejből, malátából, árpalisztból, kakaóból és cukorból álló diéta tápanyag. Átlag 22% fehérjét, 60% oldható szénhidrátokat, 10% zsírt és 3,5%-sókat tartalmaz. Gyermeknek kk., felnőtteknek evőkanálnyi 1 pohár tejben többször napj. (Dr. Theinhardt-féle gyár készíti.)

†**H. Hyosciami folia.** (Hyosciamus niger. Solanaceae.) Hatóanyagai hyoscinin és scopolamin. Hatása, mint a belladonnának. Dos. maxim sing. 0,3! Dos maxim. pro die 1,0! Nem használtatik; helyette készítményei:

†**H. Extractum Hyosciami.** Dextrinnel készült borszeszes kivonat. Bels. porban pilulában 0,01—0,03! pro dos. napj. 3—4-szer. Dos. maxim. pro die 0,1!

Hygiama ab inope quoque modico pretio emitur.

Oxygar új hydrogenperoxid-készítm., melyben agarhoz hydrogenperoxid van kötve, az erjedési és rothadási folyamatot a belekben megakadályozza.

†H. Oleum Hyosciami. Küls. mint fájdalomcsillapító bedörzölések alakjában.

Hyosciaminum crystallisatum ($C_{17}H_{23}NO_3$). Nem mindig tiszta készítmény, legjobb a Merck-féle. Selyemfényű jegeczek vízben nehezen, savanyított vízben, borszeszben, aetherben könnyen oldódnak. A jó készítmény, mely hyoscint nem tartalmaz, hypnoticum, anodynum, antispasmodicum. Adag, mint hypnoticum subcután 0,001–0,005! (oldás glicerín segélyével) Per os pilulában mint anodynum 0,0005–0,001 pro dos. napj 2–3-szor. Nagy vigyázat, különösen, míg nem ismerjük a készítmény hatékonyságát és a beteg viselkedését a szer iránt. Jó lesz először a legalacsonyabb adaggal tenni kísérletet!

639 Rp. Olei Hyosciami
Chloroformii aa 20,0.
M. f. linim.
DS. Külsőleg bedörzsölésre.

640 Rp. Extr. Hyosciami 0,2.
Pulv. rad. Ipecac. 0,2.
Sacchar. alb. 5,0.
M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10.
DS. 2–3 ór. 1 port. Bronchitisnél, göresös köhögésknél.

641 Rp. Extr. Hyosciami 0,2.
[Pulv. Doveri 1,5.
Natr. hydrocarb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10.
DS. 2–3 ór. egy port. Bronchitis göresös köhögéssel.

642 Rp. Hyosciaminum crystall. Merck. 0,05.
Aquae dest.
Glycerini aa 5,0.
MDS. Hyosciamin bőr alá fecskendésre. Sub sigillo. Az orvos kezéhez. $\frac{1}{5}$ –1 fecskendővel egyszerre.

643 Rp. Extr. Hyosciami 0,02.
Sulfur. aurat. Antimonii 0,1.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10.
DS. 4 port naponta. 2–6 éves gyermeknek bronchitis sicca esetén.

Hypnolum s. Monochloral-Antipyrin. Chloralhydrat és antipyrin vegyülete. ($CCl_3 \cdot CH(OH)_2 + C_{11}H_{12}N_2O$). Fehér, jegeczes, szag és íztelen por. 15 r. vízben old. Hypnoticum és analgeticum. Bels. adag oldatban v. capsulában 1,0 gm. pro dos.

Neurolin-Balla (Syrup hypophosph.-polybromat) egyesíti a hypophosphit zsong. és a brom csillap. hatását, igen jó idegesség, neurasth, hysteria, hypoch, melanch. eseteiben, kit. erősítő szer lábadozók részére (L. hird.)

Emsi források „Kränchen“ régóta beváltak asthma, hurutok, köhögés, rekedtség, elnyálk., hyperacid., influenza, köszvény, csúz stb. ellen. (L. hird.)

Hypnonum l. Acetophenon.

Hyrgolum l. Hydrarg. colloïdale.

Hypophosphitek l. Syrupus hypophosphorus compositus.

Ibit. Bismutum oxy-jodo-tannicum. Az airollhoz közel álló zöldes szürke, szag- és íztelen, oldhatlan por. Jodoform helyett hintőpor.

Ichthalbin. (Ichthyol-albuminat). Finom, szürkés-barna, íztelen és szagtalan por. Hatása, mint az ichthyolé. Belsőleg 1,0—2,0. napj. 2—3-szor, étkezés előtt. Küls. hintőpornak.

Ichthargan. Ichthyosulfosavas ezüst. Barna, tömeges, szagos, csípős ízű por. Vízben, glycerinben és alkoholban oldh. Gonorrhoea ellen befecsk. 0,1—0,2%-os old. Janet-eljáráshoz 0,02—0,05%-os oldat elégséges.

Ichthoform. Formaldehyd és ichthyol összeköttetése. Szagtalan, oldhatlan por. Jodoform helyett.

H. Ichthyolum. Fossil halak maradványait tartalmazó tyroli bitumenes ásvány száraz lepárlási termékének a sulfo-ichthyol-savnak ammon sója. [$C_{28}H_{36}S_3O_6(NH_{4,2})$] Tiszta, barna, syrup-szerű, kellemetlen szagú folyadék. Vízben, aetherben, borszeszben tisztán oldódik. Használata küls. kenőcsök alakjában 1:5—10—20 idült eczema, psoriasis, prurigo, acne rosacea, favus, fagydagatok ellen, azonkívül idült rheumatismus és köszvény eseteiben is. Substantiában is beecsetelhető vele a bőr. Peri. parametritis, oophoritis eseteiben tamponok segítségével alkalmazandó s az abdomen is beecsetelhető. Bels. pilulában, 0,1—0,3 pro dos. 1,0 pro die idült bőrbántalmak, ízületi s izomrheuma, hemicrania, cystitis és pyelitis chron. eseteiben, sőt a légzőutak és emésztőszervek hurutjainál (?) is. Vannak az ichthyosulfosavnak Na, K, Li és Zn-összeköttetései is forgalomban; vannak 10—30% borszesz-aetheres oldatok, pilulák, tokocskák, tapaszok, gyapot és szappan is a kereskedelemben. A kész pilulákból (dragéés), melyek 0,1 gm-ichth.-tartalmúak, napj. 2-szer 2 szemet emelkedőleg.

344 Rp. Ichthyoli 10,0.
Vaselinæ 90,0.
M. f. unguent.
D.S. 10%-os ichthyolvase-
lin.

645 Rp. Ichthyoli 10,0.
Aquae dest. 20,0.
M.D.S. 2-szer napj. 15—30.
cseppet bels.

Ichthyol-gyógyszappan a kolozsvári (Heinrich József) gyógy-szappangyárból kit. hat. a bőr vörössége, az orr rezessége, acne rosacea, fagydag. ellen. (L. hird.)

Acne vulg. et rosacea: Rp. Gelodurat „Pohl“
scat. orig. c. Ichthyol.
Menthol aa 0.1.
S. 3-szor naponta 2 dbot.

646 *Rp.* Ichthyoli 10,0.
 Unguent. diachyli. 200,0.
 M. f. unguent.
DS. Kenőcs.
 Idült eczema.

648 *Rp.* Ichthyoli 10,0.
 Ungu. Adipis lanae 90,0.

DS. Külsőleg.

650 *Rp.* Ichthyoli 20,0—30,0.
 Aquae dest. 1000,0.
MDS. Külsőleg. Borogatásokra. Dermatitis exfol. neonat.

652 *Rp.* Ichthyoli 10,0.
 Ol. Ricini 20,0.
 Spirit. vini 100,0.
MDS. Külsőleg. Bedörzsölésre.

653 *Rp.* Ichthyoli 0,5.
 Lanolinae aa 5,0.
 Vaselinei aa 5,0.
MDS. Szemhéjkenőcs.

655 *Rp.* Ichthyoli
 Spirit. Aether aa 10,0.
 Collodii flexil. 200,0.
MDS. Ichthyol-collodium.
 Külsőleg.

647 *Rp.* Ichthyoli 3,0.
 Pulv. et extr. Liquirit. aa qu. s.
 ut f. pilul. No. 30
 Consp. pulv. Liquirit.
DS. Többször napjában szemet.

649 *Rp.* Ichthyoli 20,0.
 Aquae dest. 100,0.
MDS. Ecsetelésre. Külsőleg.
 Dysidrosis, hyperidrosis, crypselas.

651 *Rp.* Ichthyoli
 Spir. vini
 Aether. sulf. aa 15,0.
 Acid. salicyl. 0,5.
MDS. Külsőleg.
 Ecsetelésre. Növényi élődiés bőrbajok ellen.

654 *Rp.* Ichthyoli 20,0.
 Glycerini 100,0.
MDS. Hüvely tamponokhoz.

656 *Rp.* Ichthyoli 10,0.
 Gelatinae albae 10,0.
 Glycerini 60,0.
 Aquae dest. 25,0.
 ut f. globuli vaginales.
DS. Hüvelygolyók parametritisnél.

Ichthyolum desodoratum. Hydrogenium superoxyddal szagtalanított ichthyol. Hatásából mindenesetre veszt. Az ichthyollal nem lehet egyenértékűnek tekinteni.

Ichthyol-Mattan cuticular (Mattan + 2% Ichthyol) a bőrön nem látszó paszta a fedetlen testrészek nappali kezelésére. (L. hird.)

Chiemsee-Szanatorium és gyógyint. parti szálloda Prien-ben (Felső-Bajorország) kül. súlyt helyez a szív-, ideg-, emészt. anyagcsere- és női betegs. kezelésére, orvosoknak és hozzátart. 25—40% engedm., egész éven át nyitva, magyar orvosok ajánlják. (L. hird. a látsó belső borít. szemben.)

Urticaria: *Rp.* Gelodurát „Pohl“
 scat. orig. c. Ichthyol.
 Menthol aa 0,1.
S. 3-szor naponta 2 dbot.

Igazol. Keveréke trioxymethannak, chloralhydratnak, jodoformnak és terpinnek. *Cervello* ajánlja belégzését tüdőtubercul. ellen. Különös készüléket is szerkesztett elpároltatására. A poralakú készítményből kis szobában 2,0-tól lassan emelkedve 9,0 ig légzendő be pro die. Belégzés tartama 2—4 óra.

Indoform. Fehér, összehúzó ízű por. Hideg vízben rosszul, melegben jól oldh. A bélben acetylsalicylsavra (aspirin) és formaldehydre hasad. Haszn. neuralgiák, rheumatismus ellen. Adag 0,5—1,5 gm tabletta alakban, étkezések közben v. után. Mint bélantisepticum is szóba jöhet.

H. Infusum laxativum l. Senna.

H. Infusum Rhei l. Rhenm.

Ingluvin. Terhesek hányása és dyspepsiák ellen. Amerikábólajánlott titkos szer. Állítólag a csirke gyomrából állítatik elő. Nem áll másból, mint víz, konyhasó, keményítő, pepsin (27%) és izomrosttörmeléből. Adag pro dos. 0,5, utána 5—10 csepp híg sósav. Pepsinhatása van, amit az olcsóbb pepsinnel is el lehet érni.

†**H. Ipecacuanhae radix.** (Cephaëlis s. Uragoga Ipecacuanha. Rubiaceae.) Hatóanyaga az emetin ($C_{30}H_{40}N_2O_5$) és cephaelin. Gyökér pora farész nélkül 2% alkaloidtartalmú legyen. Bels. porban 0,01—0,05 pro dos. 2—3-szor, vagy infus 0,2—0,5 : 150,0, 2 ór. 1 evőkan., mint expectorans, antidiarrhoeicum, diaphoreticum; 0,3—1,0 pro dos. porban, infusumban, electuáriumban, mint emetium.

†**H. Pulvis Doveri s. Pulvis Ipecacuanhae cum Opio** l. Opium.

†**H. Syrupus Ipecacuanhae.** Adjuvans és ízjavító köptető folyadékokhoz.

†**H. Tinctura Ipecacuanhae.** 0,2% alkaloidtartalmú legyen. Expectorans adag 10—30 csepp napj. 3—4-szer; mint adjuvans köptető folyadékokhoz 3,0—5,0 : 150,0.

657 *Rp.* Infus. rad. Ipecacuanhae e 0,5.
l. a. p. ad colat. 140,0.
Tinct. Opii simpl. gtt. 10.
Natrii bicarbon. 3,0.
Syrup. Senegae 10,0.
MDS. 2 ór. 1 evőkanál. Expectorans felnőttek.

658 *Rp.* Rad. Ipecac. pulv. 0,3
Morphini hydrochlor 0,05.
Sacchar. alb. 5,0.
M. f pulv. div. in dos. aequ. No. 10.
DS 2—3-szor napj. 1 port
Diarrhoea. Catarrh. bronch. Felnőttek.

Catarrh. bronch : *Rp.* Gelodurat „Pohl” scat. orig. c. ol. Terebinth. rect. 0,5.
S. naponta 3—6 dbot.

659 *Rp.* Pulv. rad. Ipecacuan-
hae 2,0.
Tartar. stibiat. 0,08.
Amyli. 2,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 4.
DS. 10 percenként egy
port a hányás be-
következtéig.
Emeticum felnőttek.

661 *Rp.* Infus. rad. Ipecac.
e 0,1.
l. a. p. ad colat. 80,0.
Natrii bicarb. 0,4.
Syrupi simpl. 8,0.
MDS. 2 ór. 1 kk.
Csecsemőknek ex-
pectorans. Izgatott
köhögés esetén 1
—2 csepp tinct.
opii teendő hozzá.

H. Iridis florentinae rhizoma. (Irideae.) Hatóanyagai amyllum és illó olaj. Hintőpor, pilulaanyag, fogporok alkatrésze. Lapoczkákká faragva, mint *iris munda* gyermeknek fogzáskor rágni adatik.

Isarol. Ichthyol pótszere. Ahhoz hasonló sűrű folyadék. Haszn. mint az ichthyol.

Ischaemin. Nem más, mint az adrenalin 1‰-es oldata. L. adrenalin.

Isoform. Parajodanisol. Könnyű, fehér, ánizsszagú por. Desinficiens. Küls. sebkezelésre mint hintőpor isoform + calc. phosphoricum aa), mint pasta (aa glycerinnel) és gaze (1—3—10‰). Bels. mint gyomor-, bélantisepticum 0,5 gm. capsulákban, melyek készen kaphatók s vannak oly caps., melyek a gyomorban s olyanok, melyek csak a bélben oldódnak.

Isopral. (Trichlor-isopropylalkohol, $CCl_3CHOH.CH_3$.) Színtelen, camphorszagú, égető ízű, közönséges hőmérséken illó, kristályos anyag. Vízben rosszul, alkoholban, olajban jól oldódik. A chloralhydrat pótszere, melynél kétszer hatékonyabb hypnoticum. Adag 0,5—1,0 gm. caps.-ban este, lefekvés előtt 1 órával.

Isutan. l. Bismutan.

Itrol (Argentum citricum). Könnyű, szagtalan, majdnem íztelen vízben nehezen oldh. por. Antisepticum sebkezelésben; gonorrhoea eseteiben arg. nitr. helyett. Mint antisepticum 0,2—0,25%-os oldatokban; hevenyész gonorrhoeában 0,025 : 200 napj. 4 × befeesk. Utóbbi dosis emelhető. Kaphatók 0,1 gmos itroltabletták is, oldatok kényelmes készíthetése céljából.

660 *Rp.* Infus. rad. Ipecac.
e 0,1—0,2.
l. a. p. ad colat. 100,0.
Liquor. Ammonii ani-
sati gtt. 10—15.
Syrup. simpl. 10,0—
15,0.

MDS. 2 ór. 1 gyk.
2—5 éves gyermek-
nek expectorans.

662 *Rp.* Infus. rad. Ipecac.
e 1,0.
l. a. p. ad colat. 60,0.
Oxymel. Scillae 10,0.
MDS. ¼ ór. 1 kk. v. gyk. a
hányás bekövet-
keztéig. Emeticum
csecsemőknek (kk.-
s 1—4 éves gyer-
meknek (gyk.).

Jaborandi folia. (*Pilocarpus pematifolius*, Rutaceae.) Hatóanyaga a pilocarpin. Hatalmas diaphoreticum, sialagogum. Helyette használtatik a liv.:

††H. **Pilocarpinum hydrochloricum.** ($C_{23}H_{31}N_2O_4 \cdot 2HCl$). Szintelen, átlátszó, tű- v. lemezalakú kristályok; íze alig keserű, kevésbé összehúzó. Vízben, borszeszben könnyen oldódik. Diaphoreticum, sialagogum, myoticum, a belladonna (atropin) physiol. antidotuma. Adag subcután 0,01—0,02! pro dosi; per os 0,01—0,02! pro dos. vízben oldva v. borban. Dos. maxim. pro die 0,04! Szívbántalmak esetén vigyázatl! Gyermekeknek subcután 0,005—0,01 korukhoz képest.

663 Rp. Pilocarpini hydrochlor. 0,2.
Aquae dest. 10,0.
M. f. solut.
DS. 2%-os pilocarpin-oldat
bőr alá fecskendésre; az orvos kezéhez.

664 Rp. Pilocarp. hydrochlor. 0,03.
Pepsini german. 0,6.
Acid. hydrochlor. dilut. gtt. 2.
Aquae dest. 80,0.
MDS. 2 ór. 1 kk.
Gyermekeknek diphtheritis esetén.

665 Rp. Pilocarpini hydrochlor. 0,2.
Aquae dest. 10,0.
MDS. Szemcseppek. Glaucoma esetén 1—2 ór. 2—4 cseppet be-cseppenteni. Ugyanezen oldat bőr alá üvegtest izzadmány esetén.

666 Rp. Pilocarpini hydrochlor. 0,025.
Cognac 5,0.
Aquae dest. 70,0.
Syrup. cort. Aurant. 25,0.
MDS. 2 ór. 1 kk. v. gyk.
Gyermekeknek pertussis esetén.

†H. **Jalapae tubera.** (*Ipomea purga*, Convolvulaceae). Hatóanyaga jalapin seu convolvulin (gyanta). Gyantatartalma legalább 8% legyen. Kisebb adagban (0,2—0,5) erősebb purgans, nagyobb adagban (0,5—2,0) drasticum; porban, pilulában. Legtöbbször más catharticus szerekkel, mint aloe, rheum, calomel, együtt (l. calomel).

†H. **Resina Jalapae.** Sárgásbarna, fénylő törésű, könnyen szétmorzsolható. Vízben nem, borszeszben könnyen oldható. Porban, pilulában 0,05—0,15 pro dos. erősebb purgans; 0,3—0,5. pro dos. drasticum. Leggyakrabban más catharticus szerekkel együtt.

H. **Pilulae laxantes** jalapát tart., l. Aloe.

Joricin (jóízű ricinusolaj) a legjobb hashajtó!

Thaolaxine kitűnő kopragogum, javalt: obstipatio habit., ideges székrekedés, terhes és szoptató nők béldugulása, enteritis mucosa eseteiben, sem laxans, sem purgans. (L. hird.)

667 *Rp.* Pulv. tuber. Jalapae
2,0.

Kalii hydrotartar.

1,0.

M. f. pulv. div in dos.

No. 2.

DS. Egy port bevenni; ha
3 óra alatt nincs
hatása, a másik
port is.

Drasticum.

668 *Rp.* Resin. Jalapae.

Pulv. tuber. Jalapae.

Extr. Aloes aquos.

Sapon. medic. aa 2,0.

Extr. Taraxaci qu. s.

ut f. l. a. pilulae No. 40.

Consp. pulv. rad.

Liquirit.

DS. Reggel, este 1—2 sze-
mei.

Obstip. habit.

Jatrevin. Menthol és isobutylphenol összekötetése. Antisepticum belégzésre; tuberculosis, bronchitis foetida, tüdőgangraena esetén. 2—3%-os vizes oldatok használandók $\frac{1}{2}$ —1 órai belégzési tartammal.

Jequirity semina. (*Abrus precatoria*, Papilionaceae.) Főhatórésze az abrin, mérgező fehérjenemű anyag. A magvak forrátzata, ha a kötőhártyára ecseteltetik, gennyes, sőt croupos conjunctivitist idéz elő. Ezen tulajdonságát idült lobos kötőhártyabántalmak gyógyítására használták fel némelyek. SATT-
LER szerint az infusum következőképen készíttessék: A forró vízben héjuktól megfosztott magvakból 1,0 összezúzatik s 200,0 vízzel 24 órán át maceráltatván, a kivonat leszűretik. A folyadékkal 4—6-szor napjában ecseteltessék a kötőhártya. Nem ajánlható!

Jequiritol. Az *abrus precatoria* magvaiból előállított abrin-talmú készítmény. Használtatik chronicus szemgyulladásoknál 1 cseppen kezdve, naponként emelkedő adagban a szembe csepegtetve mindaddig, míg a jellemző heveny gyulladás be nem áll.

Jequiritol serum. MERCK által gyártott antitoxin-tartalmú gyógyszerum, mely az abrin távoli és helybeli hatását paralyzálni tudja.

Jodalbacid. 10% jodot tart. Keletkezik, ha jodfehérjét alkali-val kezelnek. Állítólag a jodothyrinhez hasonlóan viselked-nék (?). JK. helyett mint anti-syphiliticum 3—4 × napj. 1,0 por-ban v. tablettákban.

Jodglydin. A buzamagvakból izolált növényi fehérje (glydin) jód-dal van benne kombinálva. Mint jódkészítm. haszn. Sötétsárga, szag- és íztelen por, mely kb. 10% jodot tart. Javalatok mint a KJ és NaJ-nál. Pro dos. 0,5, pro die 2,0—5,0 porban.

Jodglidine (Jod-növényfehérje), tökéletes pótlóka a jódkáliák-nak, minden mellékhatás nélkül, javalatok: arteriosclerosis, tertiär lues, asthma, scrophulosis, apoplexia, tabes, struma, sele-
ritis, üvegtesthomályok, rheumat. és arthritis chr. (L. hird.)

Jódferlatin. A ferratin (1. ott) 6% jódot tartalmazó derivátuma. A jód is fehérvárához van kötve. Használható akkor, ha különben egyéb jódivas-készítmények (syrupus ferri jodati, pil. Blancardi) lennének javulva. 0,5 gr.-os tabletták készen, melyekből 3—4 × napj. 1 drb fogyasztandó el.

Jodipin. Jodnak sesamolajjal készült additív terméke. 10—20%-os J-tartalmú. Sárgás, olajösszeállású folyadék. Bels. JK. helyett lues ellen stb. napj. 1—3 kk. a 10%-os készítményből (olajízű; subcután u. abból 5—20 köbctm. 1 kk. = körülb. 0,5 gm. jodkalival

669 *Rp.* Jodipini (10%) 40,0.
Det. in caps. gelat.
No. 20.

670 *Rp.* Jodipini (10%) 100,0.
Olei Menthae pip.
gtt. 3—5.

S. Napj. 2—5 dbot el-
fogyasztani.

MDS. 1—3 szor napj. egy kk.

Jod-lecithin. 7—8% jódot tartalmazó lecithin. Vízben felduzzad, alkoholban, olajban oldódik. Haszn. lues, scrophulosis esetén 0,05—0,10 gm. többször napj., olajos oldatban, pastillában, capsulában.

Jodival. Monojodisovaleryl-ingyany. Parallel-vegyülete a bromnának. Fehér, valerianára emlékeztető szagú jegeczpor. Vízben alig old. Haszn. mint a jodkaliumé. Adag 0,3 pro dos. napjában többször.

Jodoformal [$C_6H_{12}N_4$, C_2H_5J , CHJ_3]. Szagtalan, sárga jegeczpor. Vízben neh., alkoholban jól old. Jodoformpótszer. Haszn. l. jodoform.

Jodocitin. 1 gr. 0,06 gr. jódot tartalmazó lecithin-készítmény. Arteriosclerosis esetén a készen levő tablettákból 3 × napj. 1—3 dbot.

Jodoformin [CH_2N_4 , CHJ_3]. Fehér, finom, szagtalan, oldhatlan por. Sebeken jodoform hasad le belőle. 75% jodoformot tart. Jodoformpótszer. Haszn. l. jodoform.

†**H. Jodoformium crystallisatum** (CHJ_3). Czitromsárga színű, zsíros tapiutású, hatszögű kristálylemezekből áll, melyek safrányra emlékeztető, de kellemetlen szagúak. Vízben nem, 50 sr. hideg és mintegy 10 sr. forró borszeszben oldódik, jól oldódik zsíros és illó olajokban, valamint vaselinában is. Küls. sebekre, fekélyekre, főleg ulcus venereumra (Dnerey). Anti-septicum hintőpor alakjában v. kenőcsben (1—5:20). Bels. subcután mint antisymphiliticum glycerinben feloldva 0,1—0,2 pro dos. Per os 0,05—0,21 pro dos. pilulában, capsulában.

Biocitin a mai kor legfőbb, lecithin-készítm. kit. hat. rhachit., osteomol., anaemia, chlorosis, neurasth., scrophul., ulc. ventr. stb. eseteiben. (L. hird.)

Dos. maxim. pro die 1,01 Szagtalanítására legjobb a porhoz egy átmetszett faba tonca-t tenni v. cumarint; kenőcsökhöz mint szagtalanító perubalzsam, ol. menthae pip., ol. eucalpyti v. carbolsav tehető.

H. Gaze jodoformio impraegnatum. Sebkezelésben használtatik. Van 10—20—30—50% jodoformot tartalmazó gaze.

671 *Rp.* Jodoformii pulv. 6,0. Glycerini qu. s. ut mensura sit 20,0.
DS. Bőr alá fecskendésre. 1 ketmben 0,8 jodoform. Syphilis.

672 *Rp.* Jodoformii pulv. 20,0. Cumarini 0,5. M. f. pulvis det. in vitro.
S. Jodoform.

673 *Rp.* Jodoformii pulv. 30,0. Glycerini 30,0. M. f. emuls.
DS. Külsőleg. Ulcus venereumnál phimosis esetében a fitymaürbe fecskendezni.

674 *Rp.* Jodoformii pulv. 2,0. Balsami peruvian. 4,0. Unguent. emollientis 20,0. M. f. unguentum.
DS. Kenőcs.

675 *Rp.* Jodoformii pulv. 2,0. Vaselini 20,0. Ol. Menthae pip. gtt. 2. M. f. unguent.
DS. Jodoformvaselin.

676 *Rp.* Jodoformii pulv. 2,0. Collodii flexil. 20,0.
MDS. Jodoform-collodium.

677 *Rp.* Jodoformii exact. pulv. 10,0.
DS. Suo nomine. Szembe lintésre. Szaruhártyafekély.

678 *Rp.* Jodoformii pulv. 1,5. Extr. et pulv. Liquirit. qu. s. ut. f. l. a. pilul. No. 30. Obduc. bals. tolutano. Dent. in vitro bene clauso.
S 2 × nap. 2—6 szemet, emelkedőleg Syphilis. Diabetes mellitus.

Jodoformogen. Fehérjés összeköttetése a jodoformnak. Vízben oldhatlan, sárgás, enyhén jodof. szagú por. Jodoformpótszer; 10% jodof. tart. Haszn. l. jodoform.

Jodolen. Jodolos fehérje. 36% J. tart., sárga, durva, szag- és íztelen por. Vízben nem old. JK. helyett ajánlják bels., de nem ajánlatos, mert jodismust igen gyakorta észleltek. Küls. jodoform v. jodol helyett.

Jodolum s. Tetrajodpyrrol. (C_4J_7NH). Sárgás-szürke, jegezes, szagtalan, íztelen por, vízben nehezen, borszeszben, aetherben, zsíros olajokban igen jól oldódik. Küls. porban, kenőcsökben, mint a jodoform; előnye szagtalausága és kevésbé mérgező hatása. Bels. syphilisnél, scrophulesisnél kalium jodatum, natr. jodatum helyett. Adag 0,05—0,1 pro dos. 0,2—0,5—1,0. pro die pilulában, capsulában.

Capsules Cognet (jodoform, eukalyptol és kreosot) kitűnő bronchitis chr., bronchorrhoea, bronchiektasia ellen. (L. hird.)

679 Rp. Jodoli
Aetheris sult. aa 5,0.
Collodii flexil. 50,0.
MDS. Jodol-collodium.

681 Rp. Jodol. 10,0.
Spiritus vini dil. 160,0.
Glycerinii. 340,0.
MDS. Tamponok beitatá-
sára, melyek szét-
eső méh-végbél-rák-
ra, tályogüregekbe
helyezendők.

683 Rp. Jodoli 1,0.
Spiritus vini dil. 16,0.
Glycerini 34,0.
MDS. Jodololdat ecsetelésre.

Jodomenin. Jodbismuth fehérje készítm. Szín- és szagtalan,
sárga, vízben oldhatlan por. Bélben hasad. Jódkalium helyett
ajánlották. Adag 3 × napj. 0,5 gm.

Jodophen I. Nosophenum. Nem tévesztendő össze a jodopheniinnel.

Jodophenin Jodphenacetin. Barna, vízben oldhatlan, jegeczes
por. 51% J. tart. Küls. hintőpornak jodoform helyett. Bels.
porban polyarthritiss ellen 0,5 pro dos: 3—4 × napj.

Jodopyrinum. ($C_{11}H_{11}JN_2O$) (Jod-antipyrin.) Színtelen, fénylő,
prismaticus jegeczek; hideg vízben, borszeszben nehezen, meleg
vízben, meleg borszeszben könnyen oldh. Szagtalan, íztelen.
Gyomorban bomlik. Enyhe antipyreticum és jódhatás. Adag
porban 0,5—1,5 bels.

Jodothyrim. I. Thyreoidea-készítmények.

†**H. Jodum.** (J_1). A rhombos rendszerbe tartozó, többnyire
lemezalakú, feketéssziürke, fémfényű, nem tapadó kristályokból
áll. Vízben alig, jódkaliumoldatban, borszeszben aetherben
barna színnel, chloroformban ibolyavörös színnel oldódik. Jód-
kaliumos oldatban mint *Lugol-féle* oldat használtatik külsőleg,
részt mint bőrvörösítő, részt mint causticum, részt bels.
scrophulosis, syphilis ellen. Kenőcsökbe vagy egyedül v. kalium
jodatummal együtt mint izgató, izzadmányokat osztató. Dos.
maxim. sing. 0,03! pro die 0,1!

Vinum gallojodatum dr. Egger, jódvegyület, melyben a
jód a gallus-sav molekulájába lépett, gyógyhatása kitűnően ér-
vényesül a jodismus tünetei nélkül.

Jodone Robin, jodo-pepton cseppek, szabad jódot nem tart.,
könnyen asszim. szerves jódkészítm., meglepő gyógyredmények
arterioscler., asthma, syphilis, rheumat. eseteiben. (L. hird.)

680 Rp. Jodoli 2,0.
Ungu. emoll. 18,0.
M. f. ungu.
DS. 10%-os jodolkenőcs.

682 Rp. Jodoli 0,5.
Sacchar. alb. 2,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
Dent. in caps. amyloc.
S. Napj. 2—3-szor 1 cap-
sulát.

684 Rp. Jodoli 3,0.
Pulv. et succi Liqueur.
aa qu. s.
ut f. pilul. No. 30.
DS. 2—4 × napj. 1 szemet.

†II. **Tinctura Jodi.** 10% os jodoldat. Küls. haszn. ecsetelések alakjában mint derivans v. tisztán v. glycerinnel, v. tinct. gallarummal; tisztán ecsetelések herpes tonsuransnál, pityriasis versicolornál; parenchymába befecskendésre strumánál (egy Pravaz-fecskendővel). Bels. ritkán, leginkább csillapíthatlan hányásnál 2—4 csepp pro dos. 2—3-szor napj. Dos. maxim. sing. 0,2! Dos. maxim. pro die 1,0!

H. **Unguentum kalii jodati cum jodo.** (*RJ* 5 r. + *J* $\frac{1}{2}$ r. + lanolin 40 + víz 5 r.) Küls mint izgató, oszlató. A benne levő jodum purum a hatékony. A régi ung. kalii jodati és ung. jodi helyett liv.

685 Rp. Tinct. Jodi 1,0.
Syrupi Diacodii 50,0.
DS. 2—3-szor napj. 1 kk.
Csillapíthatlan
hányás ellen.

687 Rp. Jodi 5,0.
Kalii jodati —
Aqua dest. aa 10,0.
MDS. Külsőleg edzésre.
Causticus Lugol
oldat.

689 Rp. Jodi 0,2.
Kalii jodati 2,0.
Aqua dest. 50,0.
MDS. Hydrocele esetén befecskendésre. Lugol-oldat.

691 Rp. Tinct. Jodi 10,0.
Benzini 750,0.
Paraffini liqu. 250,0.
M. f. solutio.

DS. Külsőleg. Kéz és bőr desiniciens a sebészethen. $\frac{1}{4}$ liter öntendő porcellántálba és a kéz 5 perczig kefével mosandó benne. Kéz tőle barna lesz s könnyen támad eccema is. Tűzveszélyre vigyázz, benzinnel.

686 Rp. Jodi 0,5.
Kalii jodati 5,0.
Aqua dest. 500,0.
M. f. solut.
DS. Toroköblítő v. fekélyek kötözésére is tertiaer lues esetén.

688 Rp. Jodi 10,0.
Kalii jodati 20,0.
Aqua dest. 150,0.
M. f. solutio.
DS. Külsőleg.
Bőrvörösítő Lugol-oldat.

690 Rp. Tinct. Jodi —
Tinct. Gallarum aa 30,0.
MDS. Külsőleg. Ecsetelésre.

Jodum trichloratum. (*IC*^a). Frissen előállítva narancsszínű tüköt képez vagy átlátszó rhombicus táblákat. Szaga szúrós, kellemetlen, 5 r. vízben oldódik. Sárga üvegben tartandó.

Jod-Fersan-Pastillák, vasat és foszfort tartalmazó acidalbumin jóddal, jodisums nem lép föl, könnyen emészthető, felnőttek részére, **Jod-Fersan-Csokoládé-Pastillák** gyermekek részére. (I. a II. sz. lird.)

Docteur M. LEPRINCE

62, Rue de la Tour

—○— PARIS.

GYÓGYSZER-JEGYZÉK.

CASCARINE LEPRINCE C ² H ¹⁰ O ⁵	Szokványosságokra kedés májbetegségek, az emésztőcső atoniája	PILULÁK és ELIXIR
RHOMNOL tisztá nucleinsav	A sejtek anyagcseréjét hatálmisan elősegíti, kitűnő szer neurasthenia ellen.	PILULÁK SACCHARAT, AMPULLÁK
EUMICTINE SANTALOL SALOL Hexamethylen-Tetramin	Gonorrhoea, urethritis, Cystitis, pyelo-nephritis stb.	GLUTEN- TOKOCSKÁK
Pilules du DR SEJOURNET SANTONIN	A diabetes kezelésére különös étrend nélkül.	PILULÁK 2—3 napjában
GUIPSINE a viscum album hatóanyagai	Szer a vérnyomás csökkentésére fokozott vérnyomás, arteriosclerosis, haemoptoe, köszv., migrén, szédülés stb. eseteiben.	PILULÁK 6—10 napjában étkezés közben AMPULLÁK
ARSYCODILE kakodylsavas natrium ampullák à 0.05	NEO-ARSYCODILE methyl arsensavas natrium pilulák és ampullák	
FERROCODILE kakodylsavas vasoxydul pilulák à 0.025	FERRICODILE kakodylsavas vasoxydul ampullák à 0.05	

Natr. kakodyl. Injectio

Dr. Egger

0.05 és 0.10

Bőraláfecskendésrevaló arsenkészítmény.

Tipikus erős arsen-hatása mellett nem mérgező, magas adagjai ártalmatlanok és tökéletesen steril. A legtisztább anyagból a legpontosabb adagolásban előállítva, ezek az injectiók semmi fájdalmat, semmi izgalmat nem okoznak és hosszabb időn át is, mint azt a gyógykezelés kívánja, minden ártalom nélkül alkalmazhatók.

Javalatok: Idült bőrbajok, tuberkulosis, syphilis, anaemia stb.

Használat: Sorozatokban mindennap egy-egy befecskendés, időközönként kezelési szünetekkel.

Eredeti doboz 12 injectióval à 0.05, illetve 0.1
natr kakodyl korona 3.—

Eredeti doboz 20 injectióval à 0.05, illetve 0.1
natr. kakodyl... .. korona 4.50

Concentráltan bomlatlanul eltartható, hígban hosszabb idő múlva bomlik. Antisepticum. Sebkezelésben 1,0 : 1000,0—1500,0 oldatban. Gonorrhoeánál húgycsőbe fecsk. 0,2 : 2000,0,

Johimbin. (Spiegel). I. Yohimbin.

Jothion. Sárga, olajszerű folyadék; olajban jól, vízben rosszul oldódik. Tartalmaz 80% jodot. Haszn. a jodalkaliák pótszerül, főleg mint antilneticum bedörzsölő kúra alakjában. Adag 0,5—2,0 gm. tisztán (ekkor csíp) vagy lanolinnal és cera alával.

692 Rp Jothioni 2,0.
Cerae albae
Lanolini anhydr. aa
0,5.

M. f. ung. D. tal.
dos. in caps. gelatin. No. XX. S. bedörzsölésre.

693 Rp. Jothioni 6,0.
Glycerini 200,0.

MDS. 2%-os jothionglycerin. Küls.

II. Juniperi fructus s. baccae s. galbulae. (Juniperus communis. Coniferae). Hatóanyagai illatos olaj, kevés gyanta. Diureticum. Bels. infus. 10,0—20,0 : 150,0 2 ór. 1 evőkan.; leggyakrabban más húgyhajtókkal együtt.

H. Roob Juniperi. Diureticum, 2—3 ór. 1 kk. v. gyk.

694 Rp. Infus. bacc. Juniperi 20,0.
e 20,0.
l. a. p. ad colat.
200,0.
Kalii acetici soluti
10,0.
Tinct. Digitalis 5,0.
Oxymel. Scillae 15,0

MDS. Ór. 1 evőkanállal.
Erős diureticum.

695 Rp. Roob Juniperi 50,0.
Kalii acet. soluti 15,0.
M. f. electuarium.
DS. 2 ór. 1 kk.
Diureticum.

Kakodyl készítmények. **Acid. kakodylicum** [$As(CH_3)_2O(OH)$]. Szagtalan jegeczek, oldh. vízben, borszeszben. **Natrium kakodylicum** ($As(CH_3)_2O.Na.$) Amorph, felér, vízben oldh. por. Mindkettő psoriasis, pseudoleukaemia eseteiben. Általában, a hol arsenkészítm. szükségesek. A savból 2,0—2,5 : 100 napj. 4—6 kk. a natriumsóból 10% os oldat $\frac{1}{2}$ —1 kctm. bőr alá napj. egyszer v. 3%-os oldatból 15—20 csepp. napj. 3-szor. Egger-féle natr. kakodyl. tabletták 0,01, a snpposit. 0,05 tartalmúak.

Arsycodile Ieprince nem más, mint natr. kakodylicum, mely 0,05 gmot tartalmazó ampullákban bőr alá fecskendés céljaira kapható (8 naponként egy fecskendővel); vannak 0,05 gmot tartalmazó snppositoriumok is, melyekből napj. egy használandó.

Natrium kakodylicum Clin sterilizált ampullákban. (L. hird.) Inj. Natr. kakodyl. dr. Egger ampullákban 0,05, 0,10 tartalommal 1 köbem. isotonicus oldatban.

Alimento Theinhardt nullum aliud facilius concoquitur.

Neo-arsycodile Leprince. Methylarsensavas natrium. Kereskedésben 0,01 gmot tart. pilulák és ampullák 0,05 gm. tartalommal.

Ferricodile Leprince. Kakodylsavas vasoxydnl. Egyesíti a vas és arsen hatásait. Adag étkezés közben 0,025—0,05. Van-
nak 0,025 gmos pilulák a kereskedésben.

Ferrocodile Leprince. Kakodylsavas vasoxyd. Ampullákban (0,05) bőr alá fecsk. czélljaira.

696 Rp. Natrii kakodyl. 3,0.
Cocaini hydrochlor. 0,10.
Natrii chlor. 0,20.
Morphini hydrochlor. 0,05.
Aquae carbol. (5%) gtt. 5.
Aquae dest. 100,0.

MDS. Bőr alá fecskendésre.
1—2 naponként 1
! | fecsk. Később emel-
hető a dosis.

697 Rp. Acid. kakodylici 2,5.
Rhum 20,0.
Syrup. cort Aurant. 20,0.
Aquae dest 60,0.
Olei Menthae pip. gtt. 2.

MDS. 4—6-szor napj. 1 kk.

698 Rp. Natrii kakodyl. 1,0.
Aquae dest. 10,0.

MDS. $\frac{1}{2}$ —1 Pravaz - fecsk.
bőr alá.

II. Kalium aceticum solutum. ($C_2H_3KO_2$). Semleges kém-
hatású, színtelen, átlátszó folyadék. 3 srészben 1 srész eczet-
savas kalium. Diureticum, diaphoreticum. Bels. adag 1,0—2,0
pro dos. 2—3 ór., legtöbbször más diureticus szerekekkel
együtt. L. digitalis, juniperus.

699 Rp. Kalii acet. sol. 10,0
Tinct. Digitalis 3,0.
Oxymel Scillae 40,0.
MDS. 2 ór. 1 kk. Diureticum.

700 Rp. Kalii acetici sol. 10,0.
Syrupi Scillae 40,0.
MDS. 2 ór. 1 kk. Diureticum.

701 Rp. Kalii acet. sol. 1,0—2,0.
Aquae dest. 80,0—100,0.
Syrup. simpl. 10,0.
MDS. 2 ór. 1 gyk.
2—5 éves gyermeknek.
Diureticum.

†H. **Kalium bichromicum.** ($K_2Cr_2O_7$). Mint gyógyszer nem
haszn.

†H. **Kalium bromatum.** (KBr). Köbalakú, színtelen és szag-
talan, csipős-sós ízű kristályok; 2 sr. vízben, 200 sr. borszesz-
ben oldódik. Antispasmodicum, sedativum, anodynum, hypno-
ticum. Bels. adag 0,5—2,0 pro dos. 2,0—5,0 pro die. Epilepsiánál
kétszer ily nagy napi adagok is javáltak. Adagolás porban
(charta cerata) nem czélszerű, mert megbomlik, belsőleg csak

Szlatvini Anna-gyógyforrás lithiumban legdúsabb ásvány-
víz, legkell. tisztító, legjobb húgyhajtó és húgysavoldó gyógyvíz,
nyálkahártya-, hólyag- és tüdőhurutnál kit. bevált. (L. hird.)

oldatban és syrup nélkül adandó, mert az édesség rontja a keverék ízét. Czélszerű préselt tablettákban, iüvegcsüvekben rendelni; a tabletták bevételkor vízben feloldandók.

†H. *Mixtura chloralo-bromata* l. *Mixtura*.

702 *Rp.* Kalii bromati 10,0.
Div. in dos. aequ.
No. 20.
Det. in chart. cerat.
S. Naponta 3—4 port
vízben feloldva.

703 *Rp.* Kalii bromati 4,0.
Aquae dest. 200,0.
MDS. 2 ór. 1 gyk.
5—10 éves gyermek.
Epilepsia.

704 *Rp.* Kalii bromati 0,5—
1,0.
Aquae dest. 100,0.
Tinct. Moschi gtt. 10.
MDS. 2 ór. 1 kk. v. gyk.
1—2 éves gyermek-
nek asthma laryn-
gis, eclampsia ese-
tén.

705 *Rp.* Kalii bromati 20,0.
Natrii bromati
Ammon bromati
aa 5,0.
Aquae destil. 300,0.
MDS. Naponta 2—3 evőka-
nállal.
(1 evőkanál 1,5 bróm-
só). Epilepsia.

706 *Rp.* Kalii bromati 20,0.
Natri bromati
Ammonii bromati
Natr. benzoici
aa 6,0.
Aq. destill. 500,0.
MDS. Naponta 4—6 evő-
kanállal (1 evőka-
nál 1,0 brómsó).
Epilepsia.

II. *Kalium carbonicum purum*. Fehér, száraz, szemecés por, egyenlő mennyiségű vízben tökéletesen oldódik; Csak küls. használtatik. Teli fürdőhöz 100,0—200,0, kéz-, lábfürdő-
hez 30,0, a bőr mosogatására 2—5%-os vízoldatok.

II. *Kalium carbonicum depuratum*. (K_2CO_3). 90% kalium-
carbonatot tart. Fehér, a levegőn megnedvesedő por; egyenlő
mennyiségű vízben tisztán oldódik, oldata lúgos. Léगतak hurut-
jánál és cronpnál belégzések permete alakjában 1/2%-os oldat-
tal. Bels. köszvény, hörghurut eseteiben adag 0,2—0,5 pro dos,
3—4-szer napj. híg oldatban. Saturatiók készítésére gyakran
haszn. A Bland-féle pilulák készítésénél haszn. (Lásd ferrum
sulfur.)

A légutak hurutjánál, hörghurutnál a leggyorsabban
és legbiztosabban hat a *Liquor Thiorobini comp.*
Eibach!

II. Kalium carbonicum solutum. (Kalii carbon. pur. 105,0 + Aqua dest. 200,0) Színtelen, átlátszó, lúgos folyadék. Kalium carb. depur. helyett haszn. 3 részben 1 r. K_2CO_3 .

H. Potio Riveri. (Kalium carbonicum 5,0 acid. citricum 5,1 grm.-jával víznek 170 grm.-jában telítve) Hányás ellen.

707 Rp. Kalii carbon. solut. 3,0.
Aquae dest. 200,0.
MDS. Permete alakjában belégzésre.

708 Rp. Decoct. rad. Althaeae e 10,0.
l. a. p. ad colat. 150,0.
Kalii carbon. solut. 6,0.
Syrupi Senegae 10,0.

709 Rp. Potionis Riveri 200,0.
DS Kétszerre elfogyasztani.

MDS. 2 ór. 1 evők.
Expectorans.

†**H. Kalium chloricum** ($KClO_2$). Lemez v. táblaalakú, az egyhajlású rendszerbe tartozó kristályokból áll. 16 sr. hideg és 2 sr. forró vízben oldódik. Száj- és torokvíznek (stomatitisek és anginák különböző alakjainál) 2—5% os oldatok; permete alakjában belégzésre 1% os oldat haszn. Bels. legjobb, ha egyáltalán nem rendeljük. Dos. maxim. sing. 0,5! pro die 2,0!

710 Rp. Kalii chlorici 10,0.
Aquae dest. 500,0.
MDS. Száj-, torokvíz.
Felnőtteknek.

711 Rp. Kalii chlorici 4,0.
Aquae dest. 300,0.
Syrup. simpl. 10,0.
MDS. Száj-, torokvíz.
Lehet összekötni tim-sóval is, melyből 6,0 teendő ez oldathoz.
Gyermekeknek.

†**H. Kalium hydroxydatum** (KOH). Rudakba öntött készítmény. Fehér színű, erősen lúgos kémhatású, felényi vízben oldható. Causticum. Használtatott régebben mint pasta caustica vienn. (l. calcium oxydatum). A bőr mosogatására 1—2% os oldat. Bels. nem.

H. Kalium hydrotartaricum s. Cremor Tartari s. Tartarus depuratus ($KC_4H_5O_6$). Fehér, kristályos, savanykás ízű por; 192 sr. hideg, 20 sr. forró vízben oldható. Gyenge antipyreticum, inkább hűsítő; diureticum; nagyobb adagban laxans. Bels. adag 0,5—2,0 pro dos. 3—4 × napjában. Mint laxans. 4,0—6,0 pro dos. leginkább porban, electuáriumban.

II. Electuarium lenitivum l. Senna.

Piperazin Midy, a húgysav legjobb oldószere, kitűnő hatással van köszvény, csúsz, vesekőlika, húgyhoniok, húgysavas diathesis eseteiben. (L. hird.)

Formamint fertőtlt. torokvizek helyett szájbet., torokgödv., angina diphtheria eseteiben.

712 *Rp.* Kalii hydrotartar.
 10,0.
 Sacchar. alb. 40,0.
 M. f. pulv. det. in
 scat.
S. 3—4-szer napj. egy
 késhegynyi.
 Hűsítő, enyhe diure-
 ticum.

713 *Rp.* Pulv. rad. Rhei 1,0.
 Kalii hydrotartar
 4,0.
 Sacchar. alb. 10,0.
 M. f. pulv. det. in scat.
S. 4-szer napj. 1 kés-
 hegygyel.
 Nagyobb gyermeknek icterus
 catarrh.-nál enyhe hashajtónl.

714 *Rp.* Decoct. pulp. Tama-
 rind. e 10,0.
 l. a. p. ad colat. 100,0.
 colat. ferv. adde
 Kalii hydrotartar. 2,0.
 Syrup. simpl. 10,0.
MDS. 2 ór. 1 gyk.
 4—8 éves gyermeknek
 icterus catarrh.-nál
 enyhe hashajtónl.

H. *Kalium hypermanganicum* (*KMnO₄*). Hasábalakú, lila-
 színű, fémfényű jegeczek. Íze összehúzó. 15 sr. vízben lila-
 színűen oldódik. Élenyítő, desodorans, összehúzó, töményen
 a nyákhártyákat, hámfosztott helyeket edző. Antisepticus ha-
 tású! Küls. desodoráló mosásokra (carcinoma uteri, ozoena,
 cystitis chron., foetor ex ore, stomatitis ulcerosa) 0,5—1,0%-os
 oldatok haszn.; belégzésekre (bronchitis putrida, bronchiec-
 tasia, gangraena pulmonum) 0,1—0,5%-os oldatok rendeltetnek.
 Bels. acut phosphor-(gyufa) és kéksav v. cyankalium-mérgezés-
 nél mielőbb $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{6}$ %-os oldatok öntendőek be a gyomorba
 gyomorsövön át $\frac{1}{2}$ —1 liternyi mennyiségben gyomormosás-
 képen. $\frac{1}{2}$ óra múlva ismét $\frac{1}{2}$ liter.

715 *Rp.* Kalii hypermangan.
 0,1—0,2.
 Aquae dest. 100,0.
MDS. Szájvíz.
 Gyermeknek sto-
 matitis ulcerosa
 esetén. A fekélyek
 edzése pokolkövel
 szükséges.

716 *Rp.* Kalii hypermang.
 0,25
 Aquae dest. 1000,0.
MDS. Külsőleg. Húgycső-
 kankónál a Janet-
 féle irrigatóhoz
 haszn.

717 *Rp.* Kalii hypermangan.
 0,5—2,0.
 Aquae dest. 200,0.
MDS. Suo nomine. Külsőleg.

718 *Rp.* Kalii hypermangan.
 0,10.
 Natrii chlorati 6,0.
 Aquae dest. 1000,0.
MDS. Szem irrigálásra blen-
 norrh. acuta ellen

Joricin (jőizű ricinusolaj) a legjobb hashajtó!

†H. **Kalium hypophosphorosum**. (KH_2PO_2). A syrupus hypophosphorosus comp. alkotórésze. Önállóan nem haszn.

†H. **Kalium jodatum** (JK). Koczkalakú, fehér kristályok. Ize csípős, sós, később kesernyés; $\frac{3}{4}$ sr. vízben és 12 sr. borszeszben oldódik. Küls. kenőcsben jodum purummal (!) mint oszlató 1 : 10. Bels. syphilis, scrophulosis, asthma nervosum, rheumatism. chron., a központi idegrendszer idült lobos bántalmai, idült fémmérgezések esetén, s idült lobos izzadási nyok elosztatására. Adag porban, pilulában, oldatban 0,1—0,5 pro dos., 1,5—3,0—4,0 pro die; oldatokhoz ízjavítónak csak glycerin.

H. **Unguentum Kalii jodati cum jodo** l. Jodum.

- | | |
|--|---|
| <p>719 Rp. Kalii jodati 4,0.
Sapon. medic. 6,0.
Solve in
Spirit. dilut. 50,0.
adde
Olei Citri 0,4.
MDS. Külsőleg; bedörzsölésre.</p> <p>721 Rp. Kalii jodati 6,0.
Aquae dest. 150,0.
Glycerini 10,0.
MDS. 3 × napj. 1 evők.</p> <p>722 Rp. Kalii jodati 0,5—1,0—2,0.
Aquae dest. 100,0.
Glycerini 5,0.
MDS. 2 ór. 1 gyk.
4—8 éves gyermeknek.</p> <p>724 Rp. Kalii jodati 5,0.
Aquae destill. 300,0.
Natrii carbonici 2,0.
MDS. Naponta 1—4 evőkanállal.
(Egy evőkanálban 0,25 jódosó)</p> | <p>720 Rp. Kalii jodati pulv. 5,0.
Div. in dos. aequal. No. 10.
DS. 0,5-os jodkali porok.
Asthma nervosum esetén, roham jelentkezésekor 1 por vízben feloldva elfogyasztandó.
Szükség esetén ismét egy por.</p> <p>723 Rp. Kalii jodati 5,0.
Aquae dest. 250,0.
Tinct. Opii simpl. 1,0.
MDS. Száj-, torokvíz.
Bujakóros száj- és torokbántalmak ellen.</p> <p>725 Rp. Kalii jodati 10,0.
Pulv. et extr. Liquir. aa qu. s.
ut. f. pilul. No. 60.
Consp pulv. Lycopod.
DS. 3 × napj. 3 szemet.
Syphilis. Idült fémmérgezések.</p> |
|--|---|

H. **Kalium natrio-tartaricum** s. **Sal Seignetti**, s. **Tartarus natronatus** ($KNaC_4H_4O_6 \cdot 4H_2O$). Hasábalakú, szín-

Jod-Fersan-Pastillák, vasat és foszfort tart. acidalbumin jóddal, felnőttek részére. **Jod-Fersan-Csokoládé-Pastillák** gyermekek részére. (L. a II. sz. hird.)

Syphilis: Rp. Gelodurat „Pohl“
scat. orig. c. kal. jod. 0,5.
S. 3-szor naponta 1—2 dbot,

telen, átlátszó kristályokból áll. Egy súlyrész 1,4 sr. vízben oldódik. Bels. kis adag (0,5—2,0) hűtő, enyhén húgyhajtó hatású, nagy adag (15,0—30,0) laxans. Porban. oldatban, electuariumban.

726 *Rp.* Kalii natrio-tart. 10,0.

Aquae laxativ. vienn.

40,0.

Syrup. mannati 10,0.

MDS. Két adagban egy óra alatt elfogyasztani.

Laxans.

727 *Rp.* Kalii natrio-tartar.

10,0.

Aquae dest. 100,0.

Syrupi mannati 20,0.

MDS. Ör. 1 gyk.

3—6 éves gyermek.

székszorulás esetén.

H. *Kalium nitricum* (KNO_3). Hasábalakú, átlátszó kristályok. 4 sr. hideg és 0,4 sr. forró vízben oldható. Enyhe antipyreticum, diureticum; némelyek szerint antiphlogisticus hatása is van; gyakran digitalissal együtt rendeltetik. Bels. adag 0,2—0,5—1,0 pro dos. 2—3 ór., leginkább oldatban. Ellenjavalt gyomor-bélbajok, vesebajok esetén.

728 *Rp.* Infus. fol. Digitalis

e 0,5.

l. a. p. ad. colat. 150,0.

Kalii nitrici 5,0.

Syrup. Althaeae 10,0.

MDS. 2 ór. 1 evők.

729 *Rp.* Kalii nitrici 5,0.

Aquae dest. 140,0.

Syrup. simpl. 10,0.

MDS. 2 ór. 1 evők.

730 *Rp.* Decoct. rad. Ono-

nidis spin. e 15,0.

l. a. p. ad. colat.

150,0.

Kalii nitrici 5,0.

Roob Juniperi 15,0.

MDS. 2 ór. 1 evők.

Gyenge diureticum.

†H. *Kalium stibio-tartaricum* s. *Tartarus emeticus* [$(KSbC_4H_4O_7)_2.HCl_2$]. Fehér, kezdetben édeses, később undorító fémízű, kristályos por. 15 sr. hideg. 2 sr. forró vízben oldható; borszeszben nem. Küls. kenőcsalakban 1:4—10 derivans, lobokozó. Bels. kis adagban 0,005—0,01 pro dos. napj. 3—4-szer expectorans, diaphoreticum; nagyobb adagban 0,03—0,05—0,15! pro dos. emeticum. porban, oldatban. Dos. maxim. pro die 0,50! Gyomor és bél lobos bántalmak, terhesség ellenjavallatok. Gyermekeknél nagy vigyázat!

Unguentum Autenriethi, (1 r. kalium stib. tartar. + 4 r. axung. porci.) Lobokozó, derivans. Borsónyi-, babnyi mennyiség dörzsölendő a bőrre. Már ma nem hiv.

Alcuentum kalii jodati, vízben old. kenőcs + 10% KJ., eltarth., nem avasodik, gyorsabban resorb., mint a zsíros kenőcsök.

Actinomyces: *Rp.* Gelodurat „Pohl“

scat. orig. c. kal. jod. 0,2.

S. 3-szor naponta 2 dbot.

†H. **Vinum stibiatum. Vinum Huxhami.** (0,4 : 100.) Expectorans 5—10 csepp pro dos. Mint emeticum nem. Dos. maxima. sing. 0,5! pro die 1,5!

731 *Rp* Kali stibiat. tart 0,1.
Pulv. rad. Ipecac. 1,0.
M. f. pulv. div. in
dos. aequ. No. 2.
DS. Egyszerre 1 port; ha
10 p. mulva hányás
nem áll be, a má-
sodik port is be-
venni.
Felnőttnek eme-
ticum.

733 *Rp.* Kali stibiat. tartar.
0,1
Aqua dest. 50,0.
M. f. solutio.
DS. Felét egyszerre elfo-
gyasztani; ha 10 p.
mulva hányás nem
jelentkezik, másik
felét is. Emeticum
felnőttnek.

732 *Rp.* Kali stibiat. tartar.
0,04.
Pulv. rad. Ipecac. 0,4.
Aqua dest.
Oxymel Scillae
20,0.
MDS. Felrázva $\frac{1}{4}$ ór. 1 kk
a hányás beálltáig.
Emeticum 1—3 éves
gyermek számára.

734 *Rp.* Kali stibiat. tartar.
0,05.
Ammon. chlorat 3,0.
Aqua dest. 150,0.
Syrup. Ipecac 10,0.
MDS. 2 ór. 1 evők.
Expectorans.

†H. **Kalium sulfoguaiaacolicum.** [$C_6H_5(OH)(OCH_3)SO_3K$.]
Fehér, kristályos por. Csaknem szagtalan; íze kesernyés-sós. Víz-
ben jól, szeszben alig old. Készítménye használtatik a

†H **Syrupus Kalii sulfoguaiaacolicum** (7 : 1 0). Hasonló ké-
szítmény, mint a Sirolin. Adag: felnőttnek 3—4 kk., gyermek-
nek 1—2 kk. naponta.

†H. **Kalium sulfuratum pro balneo s. Hepar Sulfuris.**
Barnás-sárga, májszínű, később zöldes-sárga színűvé váló,
záptojás szagú, a levegőben megnedvesedő tömeg. 2 sr. vízben
oldódik, csekély maradék hátrahagyásával. Csak fürdőkhöz
haszn. rheumatismus, köszvény, idiült fémmérgezéssek esetén
Fakád! Teli fürdőre 50,0—100,0. Ha H_2S -gázt akarunk a für-
dőben fejleszteni, 15,0—30,0 acid. sulf. dil.-ot öntünk a für-
dőhöz.

H. **Kalium sulfuricum** (K_2SO_4). Tömör, hasábos kristályok-
ból, vagy kristályos kérgékből áll. 10 sr. hideg, 4 sr. forró
vízben oldható; borszeszben nem. Bels. idiült gyomor-, bélhu-

Liquor thiorobin comp Eibach, tartalmaz kalium sulfo-
guaiaac. 6%, natr. benzoic. 1%, cetrarin 0,20%, syr. coffea 93%,
főelőnye a bactericid hatás mellett, hogy cetrarintartalma miatt
az étvágyat nagyban fokozza.

**Hygiama plurimis in phthisicorum sanatoriis prae-
cipue adhiberi solet.**

rutnál 0,5—1,0 pro dos. 2—3 × napj. Nagyobb adagokban laxans, de mint ilyen ritkán használtatik, ha igen, jalapával, rheummal együtt.

735 *Rp.* Kalii sulfurici 5,0.
Pulv. rad. Rhei 2,0.
M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10.
D.S. 3 × napj. 1 port.

Kalium tartaricum ($K_2C_4H_4O_6$). Tiszta, fehér, kristályos por; egyenlő sr. hideg, felényi meleg vízben oldható. Bels. diureticum, hűsítő 1,0—2,0 pro dos. Laxans. 5,0—10,0 pro dos.

Kalium telluricum. (K_2TeO_4). Jegeszes, vízben oldh. só. B.-ls. 0,02—0,04 pilulában pro. dos. este, phthisicusok éjjeli izzadása ellen Nagyobb adagoktól dyspepsia.

H. Kamala venale. (*Rottlera tinctoria*. Euphorbiaceae.) Gyantás, téglaszínű, íztelen, szagtalan por. Hatóanyaga: gyantás anyag (80%). Helyette használandó kizárólag a

H. Kamala depuratum. Anthelminthicum taeniák elhajtására. A taeniát megöli. Hashajtólag is hat. 8,0—12,0 porban, electuariusban 1 óra alatt elfogyasztandó élgymorra. Előkészítő étrend szükséges; kellemetlen mellékhatása az émelygés.

736 *Rp.* Kamala depur. 10,0.
Mel. rosati 40,0.
M. exact. f. elect.
D.S. 1 óra alatt elfogyasztani.
Felnőtteknek.

737 *Rp.* Kamala depur. 12,0.
Div. in dos. aequ.
No. 4.

D.S. $\frac{1}{4}$ ór. 1 port.
Felnőtteknek.

738 *Rp.* Kamala depur. 6,0
Extr. Filicis Maris
aether. 4,0.
Syrnp. cort. Aurant.
Pulv. gummos. aq. s.
nt. f. l. a. electuarius.
D.S. Reggel élgymorra be-
venni 1 óra alatt.
4—8 éves gyer-
meknek.

739 *Rp.* Kamala depur. 2,0—
4,0.

Aquae Menthae
pip. 80,0.

Syrnp. simpl. 15,0.

M.D.S. Felrázva 3-szorra be-
venni $\frac{1}{2}$ órai idő-
közökben
2—4 éves gyermek-
nek.

Karsan. 35% fehérjét tart. húsnedv. Tápszer. Napj. többször
1—2 evők. levesben, tejben.

Kava-Kava l. *Piper methysticum*.

Kelen l. *Aethylenum chloratum*.

Kephir. Erjedésben levő tehéntej. Az erjedést az ú. n. kephir.

Kawatol (*Resina Kawa-Kawa et ol. Santali ost. pur. in caps.*)
kiváló arigon., fájdalomcsillap., váladékot csökk., cystitisnél a
vizelet gyors föltiszt., megszünt. a dysuriát. (L. hird.)

magvak (gomba) eszközlik. Sűrű, fehér, savanykás, csipős folyadék. Pótolja a kumyst, s míg az utóbbi nálunk nem kapható, a kephir kapható, sőt házilag is készíthető, ha kephir-gomba vagy ha egy üveg kephir rendelkezésünkre áll. Tartalmaz alkoholt 0,7—1,3%, tejsavat 0,8—0,9%, hemialbumoset 0,2—0,4%, peptont, acidalbumint, szénsavat; ezenkívül még tejezükrot, caseint, zsírt, sókat. A kumysban több az alkohol és zsír, a kephirben több a fehérjeféle s így táplálóbb. Az erjedés foka szerint hatása különböző; az egynapos enyhén hasajtó, a kétnapos közömbös, a háromnapos ellenben szorulást okoz. Kitűnő táplálék; 1—2 pohárral kell kezdeni, később fel lehet menni 4—6 pohárig pro die.

Kineurin l. *Chininum glycerophosphoricum*.

Kino s. Gummi Kino. (*Pterocarpus Marsupium*. *Papilionaceae*) Beszáritott növényi nedv. Feketés-barna, törékeny, gránatküllemű darabok; porítva pirosas. Ize összehúzó. Vízben csekély maradékkal oldódik. Hatóanyaga kinocersav. Adstringens. Főleg a gyermekgyakorlatban haszn. mint antidiarrhoeicum. Bels. adag 0,3—0,5 pro dos. 3—4-szer napj. porban; gyermeknek 0,05—0,1 pro dos. porban. Legtöbbször opium-készítményekkel összekötve.

H. Kolae semina. (*Kola acuminata* diója.) 2—2½% coffeint tart. theobromin nyomai mellett. Coffeinhatas. Főleg mint excitans. Különböző specialitások alakjában is haszn. Ilyenek a köv.: *Kola granulée* Budai, *Kola granulée* Astier (mindenkiből adag 2—3 kk. napj.); *Kola elixir* Stoll; *Vin Mariani* (cocával együtt), *Vin Bravais* (2 pohárka mindkettőből). Glycerophosphatokkal együtt mint Biophorine, Pepto-Kola glycerophosphaté Catillon, Glycerophosphat Robin (granulálva, adag 2 mértékanál pro die); Glycokola (ugyanolyan adag); *Elixir Kola-Condurango* Aldor (3—4 evők. pro die); *Haemoneurol* Cognet (haemoglobinos készítm. adag, 2 kk. pro die).

†**H. Extractum fluidum Kolae.** 1%-os coffeintartalma van. Adag: napj. 2—3-szor 30 csepp, kávéskanálanként.

Kolanin. A koladióból készült glycosida, melyből a nyál és gyomornedv hatása alatt coffein hasad le. Folyékony és száraz kivonat alakjában jó kereskedésbe és különböző a kola cz. a. is említett készítmények előállítására haszn. 1 r. kivonat = 14 r. koladió hatásával. A *Krewel-féle Kolanin tableták* 0,2 glycosidát tartalm.

Stoll diet. Kola-készítményei: Kola-bor, Kaiser-Kola-elixir, Kola-elixir, Kola granulée stb. kitűnő gyomorzsongító és idegerősítő szerek. (L. hird.)

Glycerophosphate gran. Robin, a gyomrot nem terhelő, könnyen assim. phosphor. só, kit. hat.: rhachitis, csontgyöngeség eseteiben, a gyermekek növése idejében, a szoptatás és terhesség időszakában, neurasth. v. szellemi megerőltetésnél stb., diabet. részére tabl. (L. hird.)

Vin de Kola, Kaiser= Kola=Elixir, Elixir de Kola, Kola granulée és Kola=pasztillák Stoll.

Friss afrikai Kola-diókból előállítva, a legkiválóbb
orvosi tekintélyek véleménye szerint

**kitűnő idegerősítő és
kiváló gyomorzsongító szerek**

és igen jó eredménnyel alkalmaztatnak azok-
nál, akik **idegesek, vérszegények, lábado-
zók** vagy **emésztési zavarokban** szenvednek.

**Kimerültségi állapotoknál és
általános gyöngeségnél**
kiváló hatással vannak.

===== Gyár és fő-szétküldési hely: =====

K. Stoll, Prag – Kgl. Weinberge 752.

16 kiállításon kitüntetést nyert

Alapítási év 1883.

Kísérleti anyag és prospektusok díjtalanul állnak az orvos
urak rendelkezésére.

Kaphatók a legtöbb gyógyszerárban, drogeriában vagy
közvetlenül.

Főraktár Budapestén: Török József gyógyszerára Király-
utca 12. és Andrássy-ut 26. sz. **Thallmayer & Seltz,**
gyógyáru-nagykereskedése V., Zrínyi-utca 3. **Kochmeister**
Frigyes Utódal, V., Hold-utca 8. sz.

Laboratoire P. Famel,

20—22 Rue des Orteaux, Paris.

SIROP FAMEL

könnyen oldódó lacto-kreosot-készítmény.

Bevált szer köhögés, hörghurut, tüdőgümő-kór és a légutak és lélegzőszervek hurutos megbetegedései ellen.

Valódi bükkfa kreosotot tartalmaz egy új kombinációban, melyet még a legérzékenyebb betegek is jól tűnnek.

Tartalmaz egy evőkanálban :

Kreosotum lactic. solub. 0·20

Calcium phosphoricum 0·40

Codeinum 0·005

Tinct. alcoh. aconiti guttas 11.
stb. stb.

Használati utasítás.

Felnőtteknek: 2—3 evőkanállal naponta (reggel és este).

Gyermekeknek: kor szerint 2—3 kávé vagy csemegekanállal naponta tisztán vagy meleg teában vagy hasonló meleg folyadékban.

Ára 4 korona üvegenként.

Kapható minden gyógyszerárban.

Irodalom és ingyen minták:

JULIEN MEYER Wlen, XVIII., Gersthofstrasse 79.

Kreolin l. Creolin.

Kreosotal l. *Kreosotum carbonicum*.

†H. **Kreosotum**. Guajakol és kreosolnak keveréke. Olajszerű, sárgás, átlátszó folyadék; erős füstszagú; égető ízű. Borszeszszel, aetherrel átlátszó oldatokká elegyedik. Körülbelül 120 r. forró vízzel oldódik, kihűléskor az oldat zavarossá lesz. Küls. mint desiniciens használtatik, hasonlóan a carbolhoz, de igen ritkán; kitűnő elsőfokú égési sebekre, a fájdalmat és hólyagképződést szünteti. Fogászatban gyaputra felvéve s az odvas fogűrbe helyezve fertőztelenít, fájdalmat csillapít. Fagydagاناتokra kenőcs vagy collodium alakjában (1:10). Bels. gyomorban levő erjedési folyamatoknál, hányásnál, diar. rhoeáknál, phthisisnél adag 0,01 — 0,05! pro dos. pilulában, caps. gelatin.-ban, nyákos oldatban, legcélszerűbben ostyában szárított hússporral, somatoseval keverve. Dos. maximalison túl is lehet menni, vigyázattal. Dos. maxim, pro die 0,2!

740 *Rp.* Kreosoti gtt. 2—3.
Aquae dest. 90,0.
Tinct. Opii simpl.

gtt. 2—3.

Syr. cort. Aurant. 10,0.

MDS. 2 ór. 1 kk. gyk.

2—4 éves gyermeknek cholera infantum esetén.

742 *Rp.* Kreosoti 1,0—2,0.
Olei Jecoris Aselli 150,0.

MDS. Étkezés előtt 1 kk. napj. 2-szer.

Phthisis pulm.

741 *Rp.* Kreosoti 1,0.
Pulv. et. extr. Liquir.

aa qu. s.

ut. f. pilul. No. 50.

Obduc. foliis Argenti.

DS. reggel, este 2 szemet.

Egy szemben 0,02. kreosot.

743 *Rp.* Kreosoti 1,0.
Collodii flexil. 10,0.

MDS. Kreosot-collodium.

Kreosotum carbonicum. Sűrű, szagtalan, olajszerű folyadék, vízben oldhatatlan, íze alig van. Ajánlják gümőkórban szenvedő gyermeknek 1,0—3,0, felnőtteknek 4,0—15,0 pro die.

Kreosotum tannicum l. Tannosal.

II. **Kresolum** l. Cresolum.

†H. **Kresolum crudum** l. Cresolum crud. cz a.

Kryofin. Phenetidín és methylglycolsav condensatiós terméke. Iztelen, neh. oldh. por. Antipyreticum, antineuralgicum. 0,5—1,0 pro dos.

Phthisis pulmonumban szenvedők étvágya gyorsan javul a **Liquor Thiorobini comp.** Eibachtól!

Sírop Famel könnyen oldh. lacto-kreosot készítm., a legérzék. betegek is szívesen beveszik, a gyomor jól tűri, specifikum makacs köhögés, bronchitis stb. ellen. (L. szemben levő hird.)

Tuberkulosis: *Rp.* Gelodurat „Pohl“

scat. orig. c. kreosotal. comp.

S. 3-szor naponta 1—2 dbot.

Kryogenin. Metabenzamido-senikarbazid. Szín- és szagtalan; kesernyős, vízben nem oldh. kristályok. Antipyreticum mint a pyramdon. 0,2—0,5 pro dos. 0,5—1,0 pro die. Fölösleges. Mellékhatások mint a pyramidonnál. Előnye nincs.

Kumys. Erjedésben levő kanczatej. Hasonló a kephirhez. Használata is azonos. (L. Kephir.)

H. Kusso flores. (*Brayera anthelmintica*. Rosaceae.) Hatóanyaga kussein (gyanta). Anthelminticum taeniák ellen. Adag porban, electuariumban, rázandó keverékben 15,0—20,0, mely 1 óra alatt 2-szerre, éhgyomorra fogyasztandó el. Előkészítő étrend szükséges. Bevétel után $\frac{1}{2}$ órával ol. ricini nem fölösleges. Emelygés ellen citromvíz, rotna menthae.

Kusseinum crystallisatum. Kénsárga, szagtalan, íztelen, rhombos, tűlaku jegeczek; hideg vagy meleg vízben alig, aetherben jól, borszeszben csekély mérvben oldódnak. Haszn. mint a flores kusso. Adag: 1,0—2,0 porban, éhgyomorra 1 óra alatt elfogyasztandó. Előkészítő étrend. Bevétel után $\frac{1}{2}$ órával ol. ricini.

744 *Rp.* Flor. Kusso pulv. 20,0.
Melis rosati 40,0.
M. f. electuarium.

D.S. 1 óra alatt éhgyomor-
morra elfogyasz-
tandó. Felnőttnek.

745 *Rp.* Flor. Kusso pulv. 20,0.
Vini rubri 200,0.

M.D.S. 1 ó. alatt éhgyomor-
morra elfogyasztandó.
Használat előtt
felrázandó.

746 *Rp.* Flor. Kusso 6,0.
Mel. depur. 40,0.
M. f. electuar.

D.S. Reggel éhgyomor-
ra 1 óra alatt elfo-
gyasztandó.
4—8 éves gyermek-
nek.

747 *Rp.* Kusseini crystall. 2,0.
Div. in dos. aeqn.
No. 4.

Det. in caps. amylac.
S. $\frac{1}{4}$ ór. 1 capsulát
reggel éhgyomor-
ra Felnőttnek.

Lactagol. Gyapottüvény magvainak porából készült kivonat. Finom, sárgás, vízben nem oldh. por, de emulsioszerű keverékké alakítható vízzel. Galactogogum napj. 10—12 gm.

Lactopheninum. A phenacetinhez analog képzett vegyület. Az acetylesoportot benne tejsav helyettesíti. Fehér, vízben nehezen oldh. por. Haszn., hatása mint a phenacetiné. Adag: bels. porban 0,5—1,0 napj. többször.

Capsules Cognet (kreosot, eucalyptol és jodoform) bronchi. chr., bronchorrh., bronchiékt., bronchopneumonia ellen. (L. hird.)

Kleewein gyógyysz. új kresol-szappan-oldatai a leg-
erősebb bactericid fertőtlenítőszerek.

Pneumonia cat.: *Rp.* Goldurat „Pohl“
scat. orig. c. kreosotal. comp.
S. 3-szor naponta 1—2 dbot.

748 *Rp.* Lactophenini 5,0.
 Coffeini citr. 0,5.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.
D.S. 3 -4-szer napj. 1 port.
 Hemicrania, ischias,
 lumbago.

†11 **Lactucarium germanicum.** (*Lactuca virosa*. Compositae.)
 Beszáradt tejnedv. Opium pótszere. Főleg a köhögési inger
 csillapítására használtatik. Hatása bizonytalan. Bels. adag
 0,1—0,3 pro dos. porban, pilulában, esetleg emulsióban. Dos.
 maxim pro die 1,0!

Lactylphenetidin l. Lactophenin.

Laevulose s. **Diabetin.** [$C_6H_{12}O_6$]. Fehér, jegeczes por,
 vízben, híg szeszb. old. Répa és nádeznok helyett diabetes
 mellitusban szenvedőknek rendelik ételek édesítésére. Phthisi-
 kusok hizlalásánál is igéybe vehető.

Laminaria. (*Laminaria Claustroni*. Algae). A nyélczének 1—2
 decimeternyi hosszú s körülbelül $\frac{1}{2}$ —1 cmnyi átmérőjű darab-
 jai. Vízben duzzad. Nőgyógyászatban a spongia pressa helyett
 a canalis cervicalis uteri tágitására haszn.

H. Lana Gossypii depurata s. **Lana Gossypii Brunsi.**
 Bruns-watta. Sebészetben kötszerül használtatik. Bár a M. Gyk.
 szerint sterilizáltan árusítható csak el, mégis a sebészetben
 csak újra sterilizáltan jöhet alkalmazásba. Fertőtlenítő szerekkel
 impraegnált gyapotfélék már nem hivatalosak.

H. Lanolinum anhydricum Víztelen gyapjúzsír. Kenőcsök-
 höz veendő cholesterinzsír.

H. Lanolinum s. **Adeps lanae hydrosus.** A víztelen adeps
 lanae 375 része 125 r. dest. vízzel elegyítve adja ezen készí-
 tményt. Gyapjúból nyert és tisztított zsiradék. Cholesterinzsír.
 Fehéres, kenőcsszerű anyag, közömbös vegyhatású, nem ava-
 sodik. Vízet még többet is tud felvenni, ha azzal összegyúra-
 tik. Nyákhártyákra tapad. Használtatik mint kenőcs-anyag; ki-
 tűnő kenőcsöt ad, ha 10 részre 1—2 rész axungia porci vették.

H. Unguentum lanolini s. **Ung. adipis lanae.** (100 r.
 vízmentes lanolin + 25 r. víz + 25 r. sesamolaj.) Igen jó ke-
 nőcsanyag.

Bardella, Bardelenben dr. bismitos égési pólyája igen jól bevált
 leforrázásoknál, mindenfokú égési sebeknél. (L. hird.)

Bengué-balzsam (menthol, methylsalicyl. és lanolin) fájdalom-
 csillapító neuralgia, csúz, köszvény, fejfájás eseteiben. (L. hird.)

Algoeratin, megbízh. antipyret., analg. és antineuralg., káros
 hatás nélkül a szívre és gyomorra, specif. dysmenorrhoea ellen,
 fájdalmesillap. neuralg., migrén, ischias stb. eseteiben. (L. hird.)

- 749 Rp.** Lanolini 50,0.
 Olei Amygdal. dulc. 5,0.
 Olei Rosar. gtt. 1.
 M. f. l. ungu.
DS. Lanolin toilette-crème.
 Cosmeticum.
- 750 Rp.** Kalii jodat. 3,0.
 Jodi pur. 0,1.
 Aqua dest. 3,0.
 Axung. Porci 5,0.
 Lanolini 25,0.
 M. f. ungu.
DS. Jodkali kenőcs.
- 751 Rp.** Lanolini
 Olei Amygdal. dulc.
 Sulfur. praecip. aa 5,0.
 Zinci oxyd. 2,5.
 Olei Bergam. 0,5.
 M. f. l. a. ungu.
DS. Lanolinos crème cosmétique. Cosmeticum.
- 752 Rp.** Empl. diachyl. simpl.
 recent. parati 100,0.
 Empl. adhuc liquido
 admisce
 Olei Sesami
 Lanolini aa 50,0.
 Olei Lavand. gtt. 5.
DS. Lanolinos diachylon-
 kenőcs.
- 753 Rp.** Cocaini hydrochlor.
 0,1—0,2.
 Lanolini 30,0.
 Olei Sesami 20,0.
 M. f. ungu.
DS. Cocainos-kenőcs.
- 754 Rp.** Zinci oxyd. 3,0.
 Lanolini anhyd. 27,0.
 M. f. ungu.
DS. Zink-kenőcs.
- 755 Rp.** Acid. borici sublt. pulv.
 Cerae alb. aa 20,0.
 Lanolini 30,0.
 Olei Amygdalar. dulc. 50,0.
 M. f. ungu.
DS. Bórkenőcs.
- 756 Rp.** Chrysarobini 1,0—2,0.
 Lanolini 20,0.
 Axung. Porci 2,0.
 M. f. ungu.
DS. Chrysarobin-kenőcs.
- 757 Rp.** Jodoformii 3,0.
 Lanolini 27,0.
 M. f. ungu.
DS. Jodoform-kenőcs.

Largin. Ezüstprotalbin. Keletkezik, ha a paranucleoproteidek hasadási terményeit, melyek borszeszben oldattak, AgNO_3 ammoniumos oldatával kezelik. 11.1%-nyi Ag. tart. Fehéres-szürke, vízben 10%-nyi oldh. Fehérjékkal nem ad csapadékot. Haszn. küls. mint a többi új Ag. készítményeké (protargol). Húgycsőbe feesk. 1/4%-os oldattól felfelé fokozatosan 2%-ig, szembe cseppentésre 1—5%-os old. Nőgyógyászatban is haszn. 1/2—1% os oldatok öblítésre, 5%-os bougiek és tamponok (glycerinnel).

Noffke oldódó bougie-jai a gonorrhoea (urethritis ant. et post., prostat. chr.) kezelésére c. Largin 1—5%. (L. hird.)

Dr. Klopfer-Lecithin-fehérje szénhydr. nem tart., igen alk. sütemények készítésére diabet. részére, Glidin-Luftbrot. (L. hird.)

Lecithin-Clin granulée, pilulákban és injectiókban. (L. hird.)

Egger-Emulsio kit. csukamájolaj-készítm. c. 5% Ovolecithin, c. 5% Thiocol. c. Phosphoro 0,01, ad 100,00 emulsio.

Lecithin. Tojássárgájából (ovo-lecithin) előállított distearyl-glycerinphosphorsavas cholin. Roborans szer általános gyengeségnél, bármily alapon fejlődött legyen az. Állítólag még a hecticus lesoványodást is meggátolja. Adag pro dos. 0·05—0·10 gr., pro die 0·3—0·4 gr. pilulában vagy glycerines injectióban. Jó a hazai dr. Richter G.-féle lecithin-készítmények: 1) *Tablettae lecithini Richter*. Kétféle van, 0,05 és 0,025 tartalmúak. 2) *Lactolecithin Richter*. Lecithines tejcukorpor; 1 kk.-ban 0,05 lecithin van. 3) *Lecithin granulée Richter*. A mellékelt mérczében 0,05 lecithin. 4) *Oleum jecoris aselli cum lecithino sec. Richter*. 1 kk.-ban 0,05 lecithin. 5) *Lecithinol Richter*. Steril olajos lecithin-oldat bőr alá fecskendezésre, üvegfolyókban.

Lecithinum bromatum. Kb. 3% bromot tart. lecithinhez kötve. A bélben a lecithin ily alakban nem hasíttatik s így lecithin változatlanul szívódhat fel. Nervinum. Adag 0·2 gm. pro dos. napj. 2—3-szor pilulákban. Pilulák darabja 0,05—0,1 brom-lecithint tartalmazhat.

Lenicetum. Basicus eczetsavas aluminium. $[Al_2(OH)_2(C_2H_3O_2)_4]$. Fehér, finom, tömeges, vízben neh. oldh. por. Adstringens, szárító, némileg desodorans. Hintőpornak haszn. hyperhidrosis, intertrigo nedvező eczemák esetén és rosszul granuláló sebekre ulcus crurisra tisztán v. talcummal aa esetleg kenőcsben vaselinnel, glycerinnel (20%-os kenőcsök, ill. pasták).

Lenigallol (Pyrogallol-triacetat). A pyrogallol pótszere, melynél kevésbbé izgató. Fehér, vízben oldhatlan por. Acut és chron. eczema, psoriasis esetén. Küls. kenőcs 1:10—20

Lenirobin. Chrysarobintriacetat. Sárga, vízben oldhatlan por. Haszn. mint a chrysarobiné és pyrogallolé a bőrgyógyászatban, csakhogy kevésbbé izgató. Küls. kenőcs 1:10—20.

Lentin. Metaphenyleudiamin. Vízben oldható kristályos anyag. Antidiarrhoeicum, bélantisepticum. Adag vizes oldatban csecsemőknek 0,01, felnőtteknek 0,1 többször napj.

H. Leonuri lanati herba. (Leonurus lanatus s. Ballota lanata. Labiatae.) A species diureticae egyik jelentéktelen alkotórésze.

Leucofermantin. Trypsinnel immunizált lovak serumja. A leucocyta tripticus fermentje által okozott szövetszétmálást genyes gyulladások alkalmával meggátolja. Tebát abscedáló folyamatok ellen használható, midőn a tályogba vagy beléöntjük, vagy abba beléfecskendjük. 20—25 köbctm.-nyit tart. üvegekben kapható. (Merck.)

Haemalbumin-Lecithin Dr. Dahmen, genuin vérvas lecithinnel idegerősítő tápanyag: chlorosis, phthisis, rhachitis, gyermekágy, lactagogum, hószámvazar stb. (L. hird.)

Lecithin-Perdynamin, nagy haemoglobin és lecithin-tart. miatt kit. hat neurasthenia, hysteria, rhachitis ellen. (L. hird.)

Biocitin a mai kor legtökél. lecithin-készítm., kit. hat. rhachit., osteomal., anaemia, chloro, neurasth., scrophul., ulc. ventr. stb. (L. hird.)

Liantralum. A kőszénkátrány benzolos kivonata. Sötétbarna, sűrű, vízben oldhatlan, zsíros és illó olajokban, szeszenben, aetherben oldh. folyadék. Haszn. a bőrgyógyászatban kátrányok helyett mint bőrizgató és antiparasiticum. Számos kereskedelmi készítménye van, (Baiersdorf et Co.) pl. Oleum és Tinctura Liantrali, L. hintőpor, Pasta zinci cum L., Ungu. Caseini cum L., Ungu. Zinci cum L., Sapo Kalin. cum L., Filmogen cum L., Tinct. L. aetherea.

Libanol. A libanoni cedrusfa fájából destillált illó olaj. A santal-olaj helyett haszn. mint antigonorrhoeicumot. Napj. 3-0 gm. fogyasztandó el capsulákban.

H. Lichen Islandicus. (Cetraria islandica. Parmeliaceae.) Hatóanyagai cetrarsav (keserű anyag) és nyálka. Amarum, stomachicum. Adag: decoct. 10,0—15,0:250,0 étkezés előtt 2—3 evőkanáluyit egyszerre.

Cetrarinum s. Acid. cetraricum. Kitűnő amarum, főleg chlorosisnál, reconvalescentiánál. Székletétet is rendezi. Adag pilulában, porban bels. 0,1 délben és este 1 órával az étkezés előtt.

758 Rp. Decoct. Lichen. island. 2,0—4,0.

l. a. p. ad. colat. 100,0.

Natrii bicarb. 5,0

Tinct. Opii simpl. gtt. 3—4.

Syrup. simpl. 10,0.

MDS. 2 ór. 1 gyk

3—6 éves időlt hörghurutban
szenvedő sorvadt gyermekeknek.

Lien siccatus. l. Organotherapie.

Lignosulfit. A cellulose gyártásnál mellékproductumként nyert barna, szagos folyadék. Tartalmazza a fenyőfa gyantáit, aether. olajat, kénssavat, s még más közelebből nem ismert illó aromás anyagokat. Desinficiens, desodorans. Tüdőtuberculosis és időlt bronchialis hurutok ellen belégzésre haszn. 10%-os vízes keverékét párolják el szobában, hol a beteg 1—2 órát tartózkodik naponta. Vannak külön e célra szolgáló belégző-készülékek is (Gehe-féle), sőt zsebben hordozhatók is

H. Linctus gummosus l. gummii arabicum.

H Linimentum ammoniatum l. Ammonium-készítmények.

Linimentum saponato camphoratum l. Camphora. "

Időlt hörghurutban szenvedő sorvadt gyermekek legjobb gyógyító és erősítő szere a cetrarint tart. Liquor Thiorobini comp. Eibach!

Nural diet. digestivum és mest. megemészt. tápláló- és erősítő-szer, kit. bevált gyomorbajok, anaemia, chlorosis, reconv., phthisis, cachexia, hyperemesis eseteiben. (L. hűrd.)

II. **Linimentum Styracis** l. *Styrax liquidus*.

II **Lini semina**. (Linum usitatissimum. Lineae.) Hatóanyagai zsíros olaj, növényi nyák Bevonó, Infusum, decoctum alakjában (1 : 10) haszn.

Farina seminum Lini s. **Placenta sem Lini**. Leunmagliszt. A zsíros olaj kipréselése utáni maradék. Meleg vízzel péppé alakítva kataplasmának használtatik.

II. **Oleum Lini**. Zsíros olaj. Küls. fedő, pulvó szer. Égési sebekre aqua calcis-sal aa Kiürítő csőrének 2—3 evőkanállal. Bels. 1—3 evőkanállal laxans.

Liparin. MERING szerint az ol. jecoris aselli kitűnő pótszere Nem más, mint igen finom ol. olivarium, melyhez 6%-nyi olaj-sav kevertetett. Betegek szívesebben fogyasztják, mint a halmájolajat; igen könnyen emésztetik, mert könnyen képez fejetet. Adaga mint az ol. jecoris-nek.

II. **Liquiritiae radix**. Glycyrrhiza glandulifera hámozott gyökere. Porítva pilulaconstituens, pilulahlintőpor, porvivőanyag, izjavító. Készítményei :

II. **Succus Liquiritiae venalis**. Fekete, hengerded rúdcskák.

H. **Succus Liquiritiae depuratus**. Híg kivonatanyag. Izjavító a syrupok helyett; pilula-constituens.

II. **Pulvis gummosus** l. Gummi arabicum.

*

†II. **Liquor acidus Halleri** l. Acid sulf.

Liquor aluminii acetici l. Alumin. acet. liquor.

†II. **Liquor Ammoniae** l. Ammonii caust. liq.

†II. **Liquor Ammonii anisati** l. Ammon. anis liq.

II. **Liquor Ammonii acetici** l. Ammon. acet. sol.

Liquor Ammonii ergotini l. Ergotinol

Liquor Ammonii succinici l. Ammon. succin. liq.

II. **Liquor Anodynus Hoffmanni** l. Spir. aether.

II. **Liquor Burowi** l. Alum. acet. sol.

II **Liquor cresoli saponatus** l. Cresolum cz. a.

II. **Liquor Ferri albuminati** l. Ferri praeparata.

H. **Liquor Ferri albuminati saccharatus** l. Ferri praeparata cz. a.

H. **Liquor Ferri oxydati** l. Ferri praeparata.

Fersan kit. hat. chlorosis, rachitis, étvágytalanság, neurasth., tuberk., gyöngeség, reconval. eseteiben. (L. II. sz. hird.)

Jogadin kitűnő ízű csukamájolaj!

Liquor Hollandicus l. **Aethylenum chlor.**

†H **Liquor Hydrogenii hyperoxydati** l. **Hydrogenium hyperoxydatum** cz. a.

H. **Liquor Kalii acetici** l. **Kalium acet. sol.**

†H. **Liquor Kalii arsenicosi** l. **Acid arsenicosum.**

H. **Liquor Kalii carbonici** l. **Kalium carb. sol.**

H. **Liquor natrii silicici** l. **Natr. silic. liqu.**

†H **Liquor plumbi subacetici** l. **Plumb. acet. bas. sol.**

Lithium benzoicum [$C_7H_5O_2Li$]. Fehér, vízben oldh. por. Haszn. mint a többi Li. készítmény. Adag porban 0,05—0,3 pro dos. napj. 3—4-szer.

H. **Lithium carbonicum** (Li_2CO_3). Fehér, kristályos por, 150 sr. vízben oldható; oldata lúgos kémhatású. Bels. köszvény, húgyhomok, húgykövek eseteiben, valamint diureticus czélból is haszn. Adag 0,05—0,25 pro dos. 3—4× napj. porban.

Lithium citricum ($Li_3C_6H_5O_7$).

Lithium jodatum (LiJ).

} Bels. mint a lith. carbon. Köszvény, idült izületi rheumatismus, húgyhomok eseteiben.

Lithium citricum effervescens. Granulált keverék (5r. lith. citr. 21r. acid. citr. 31r. acid. tartar. 58r. natr. bicarb.) Haszn. mint a lith citr. Adag vízben 4,0—8,0 pro dos. és pro die. Pezsegés közben fogyasztandó el.

Lithium glycerino-phosphoricum. [$LiPO_4C_3H_5(OH)_2$]. Fehér, vízben oldh. por, vagy 50% os kereskedésbeli oldat. Haszn. köszvény, húgysavas diathesis ellen, ha tonizálni is kell. Adag: 0,5—1,0 pro dos. porban vagy ezen adagnak megfelelő mennyiség az 50%-os oldatból; mindkét esetben szénsavas vízben (szodavíz, Kristályvíz).

Lithio-piperazinum. Keveréke piperazinnak lithiumsókkal Szemesés, vízben oldh. fel. por. Diureticum és húgysavoldó. Adag. bels. porban 1,0—3,0 pro die.

Lithium salicylicum. ($LiC_7H_5O_3$) Fehér, szagtalan, selymes tömegekké egyesült tñk. Íze csípős, édeses utóízzel. Vízben, borszeszben könnyen oldódik. Haszn. natr. salicylicum helyett,

Piperazin Midy a leghatásosabb szer csíz, köszvény, vesekölíka, húgyhomok, húgysavas diathesis eseteiben. (L. hird.)

Szlatvini Anna gyógyforrás lithiumban legdúsabb ásványvíz, legkell. üdítő, legjobb húgyhajtó és húgysavoldó gyógyvíz, nyálkahártya-, hólyag és tüdőhurtnál kit. bevált. (L. hird.)

Wildungeni Helenen-forrás kit. hat. köszvény, húgyhomok, húgykő, húgys. diath. ellen. (L. hird.)

Urol (clinas. lugyary) Noorden tanár által bevezetett, kit. bevált, gyorsan ható szer köszvény és húgys. diath. ellen. (L. hird.)

de kisebb adagokban, köszvényes ízületlobok, polyarthrits rheumatica és progressiv félheveny ízületi rheumatismus, sőt idiült rheumat. eseteiben is (VULPIAN). Adag: 0,5 pro dos., 3,0—4,0 pro die. Szívbjajoknál, szívgyengeségnél nagy vigyázat (!).

759 Rp. Lithii salicyl. 5,0.	760 Rp. Lithii salicyl. 6,0.
Div. in dos. aequ.	Aquae Menthae pip.
No. 10.	100,0.
Det in caps. amylac.	Syrup. cort. Aurant.
S. Suo nomine. Rendelet szerint.	20,0.
	<i>MDS.</i> Felét egy napra. Egy evőkan.-ban 1/2 grm. lith. salicyl.

Lithium sulfoichthyolicum. Ichthyosulfonsavas lithium. Barna, kátrányos összeállású és szagú anyag. Oldh. vízben. Haszn. mint az ichtlyol bels. 0,25 pro dos. napj. többször; legjobb capsula gelatinosában.

Lithium vanadinicum ($LiVO_3 + 2H_2O$). Fehéres, jegeczes, vízben old. por. Köszvény, húgysavas diathesis ellen 0,04 : 160,0 s ebből délben és este étkezés előtt egy-egy kk. 2—3 naponként.

†**H. Lobeliae herba.** (*Lobelia inflata*. Lobeliaceae.) Hatóanyaga lobelin (alcaloid). Antiasthmaticum. Adag: infus. 1,0—3,0 : 150,0 2 ór. 1 evők. Dos. maxim. sing. 0,1! Dos. maxim. pro die 0,3! Ritkán használtatik, még leginkább készítménye a

†**H. Tinctura Lobeliae.** Adag 5—15 csepp pro dos. 2—3× napj. Vigyázat (!) Dos. max. pro dos. 1,0! pro die 3,0!

761 Rp. Tinct. Lobeliae

Tinct. Ipecac. aa 5,0.

Aquae Amygdal. amar. 10,0.

MDS. 15—20 cseppet 2—3×napj.

Loretinum. ($C_6H_5N.J. OH. SO_3H$.) Halavány-sárga, szagtalan, nehezen oldh. por. Jodoform pótszere. Sebészeten hintőpor. Nem tekinthető veszélytelenebbnek, mint a jodoform. Kenőcshöz collodiumhoz 5—10%-nyi veendő.

Losophanum. ($C_6H_5OH. CH_3$.) Fehér, jegeczes, vízben nehezen oldható, alkoholban nehezen, aetherben, chloroformban, zsíros olajokban jól oldh. por. Herpes tonsurans, pityriasis, pediculosis, scabies, prurigo, idiült eczemák, sycosis, acnē vulg. et rosacea eseteiben (acut bőrbajoknál kerülendő) 1—2%-os vizes oldatok vagy kenőcsök.

Lupuli glandulae. (*Humulus Lupulus mirigyei*. Cannabinaeae.) Nevezik lupulinnak is. Hatóanyagai keserű anyag, illatos olaj, némelyek szerint egy bódító alcaloid is. Kis adagban (0,1—0,2)

Piperasin Midy a leghatásosabb szer csúz, köszvény, vesekőlika, húgyhomok, húgys. diathesis eseteiben. (L. hird.)

Emsi forrás „Kränchen“ régóta bevált asthma, hurut, köhögés, rekedtség, elnyálk., hyperacid., köszvény stb. ellen. (L. hird.)

Vichy Célestine-forrás igen jól hat köszvény, húgyhomok, húgys. diat. ellen. (L. hird.)

amarum, nagyobb adagban (0,5–1,0 pro dos.) porban, pilulában, electnariumban, sedativum, antiaphrodisiacum; különösen az utóbbi értelemben haszn., de gyakran eredmény nélkül.

Lycetolum. Borkősavas dimethylpiperazin. Vízben könnyen old. fehér por. Hatása és haszn. mint a piperaziné. Adag pro die 1,0–2,0 vízben.

H. Lycopodii sporae. (*Lycopodium clavatum* csírszemesei. *Lycopodiaceae*.) Hintőpor intertrigo, nedvező kiütések, herpes zoster eseteiben. Pilulahintőpor.

Lygosin—chinin l. *Chininum lygosinatum*.

Lygosin—natrium l. *Natrium lygosinatum*.

Lysidinum. Aethylen-aethylenyl-diamin. Fehér, vízszívó, vízben könnyen oldh. por. Hatás, haszn. mint a piperazin. Gyógyszárakban 50%-os vízoldatban tartatik, ebből adag 2–10 grm. pro die $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ liter szódavízben.

Lysargin. Celloid ezüst egy fajtája. 80–83% argentumot tart. Szürkés-kék, fénylő lemezkék, meleg vízben jól oldh. Haszn. l. arg. colloid.

Lysochlor. Chlormetaeresol és szappan elegye. Haszn. mint a liquor cresoli saponatus. (L. ott.)

Lysidinum bitartaricum. Fehér, légálló jegeczpor, vízben jól oldh. Lysidin helyett. Adag bels. egyharnaddal több mint a lysidinből.

Lysoform. Formaldehyd oldata borszeszeskaliszappan-oldatban. Sárgás, tiszta folyadék. Vízben, alkoholban oldh. Párolt vízzel átlátszó, közönséges vízzel opalizáló oldatot ad. Oldatban szagtalan. Oldatok frissen készítendők. Antisepticum, desodorans. Fémesszközöket nem támadja meg. Desinficiens. Kézmosásra, eszköz desinfectióra 3–5%-os, hüvelyöblítésre $\frac{1}{2}$ –2%-os, húgycső és hólyagmosásra $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ % oldatok haszn. Bels. nem. Van *nyers lysoform* is, mely igen olcsó. Ebből 3–5%-os old. haszn. betegszoba fala, padlója, butorok, éjjeli edény, köpőcsésze, árnyékszék desinfectiójára.

Lysolum. Magasabb phenolok alkali-vegyületeinek keveréke gyanta- és zsírszappanokkal. Barna, olajos, sima, kreo-otszagú folyadék; víz, borszesz, glycerin oldja. Antisepticum, desinticiens. Olyforma szerepe van, mint a creolinak. Éjjeli edények, köpőcsészek, fal, padló, butordarabok fertőtlenítésére 5%-os, kezek mosására 1–3%-os, sebek mosására 0,3%-os oldatok haszn. Helyette használd a liquor cresoli saponatust.

Lycetolum granulat. efferv. dr. Egger 5% lycetolt tart. kell. ízű készítmény.

Urol és Urocol (Urol + Colchicin) kit. beváltak köszvénynél, mert a fájdalomat rögtön csillapítják. (L. hird.)

Lysoform alkalm. módjai: colpitis, fluor albus, endometr., cyst., gonorrh., bűzös orr- és fülfolyás, panarit., phlegmone, furunc., pityriasis, herpes tons., scabies, psoriasis, lupus, hyperhydr., műszerek fertőt., kéz- és felhám desinfect.

LYSOFORM

A **Lysoform** tökéletes anti-septicum, **nem mérges**, kellemes szagu, nem maró hatásu és nem támadja meg a fém-műszereket. Kitűnő desodorans. Kapható minden gyógyszer-tárban és drogériában.

Üvegekben :

á	100	250	500	1000	gr.
á	— .80	1.60	2.80	4.60	kor.

Kórházak és orvosok részére van olcsóbb bádogcsomagolás á $2\frac{1}{2}$ és 5 kilogramm.

Dr. Keleti és Murányi
vegyészeti gyára, Ujpest.

LYSOFORM

Menthocapsol „Skala“

fájdalomcsillapító bedörzsölőszer



analgetikus, rubefaciens
resorptiv fájdalomcsilla-
pító, izgató és fölszívó
hatású.

Kitünően bevált különösen azokban az esetekben, ahol a Salicylatoknak főképen resorptiv hatásuk jön tekintetbe:

Rheumatismus articulorum

„ **acutus**

„ **chronicus**

Pleurodynia, Lumbago

Ischias, Coccygodynia eseteiben.

Irodalom és minta az orvos
uraknak rendelkezésükre áll.

Schutzengel-Apotheke
Gross-Seelowitz (Mähren)

Lysulfol. A lysolnak kénes készítménye. Sűrű, fekete folyadék. Haszn. bőrbajok ellen tisztán v. glycerinnel aa bekenésre. Este alkalmazandó, reggel lemosás.

H. Magnesium carbonicum hydrooxydatum s. Magnesia carbonica. $[(MgCO_3)_2, Mg(OH)_2, 3H_2O]$. Elporló, hófehér, laza tömeg, v. igen könnyű por, vízben jóformán oldhatlan. Küls. fogporhoz v. mint pilulahintőpor. Bels. antacidum, nagy adagban enyhe laxans. Saturatiókhoz gyakran haszn. mint szén-savat adó alkatrész. Adag bels. késhegyenként, kávéskanalanként.

762 Rp. Magnes. carbon. hydrooxyd. 20,0.
Rad. Rhei chin. pulv. 5,0.
Sacchar. alb. 10,0.
M. f. pulv. det in scat.
S. Késhegyenként v. kk.-ként.
Felnőttek, nagyobb
gyermeknek. Laxans

763 Rp. Magnes. carbon. hydrooxyd. 2,0.
Rad. Rhei chin. pulv. 1,0.
Elaeosacch. Ponic. 10,0
M. f. pulv. det. in scat.
S. 2—3 késhegynyi naponta.
Csecsemőknek megrögzött székrekedése ellen.

II. Magnesium hydrooxydatum in aqua s. Magnesia usta in aqua $[Mg(OH)_2 + Aq. (Mg(OH)_2)]$. Tejszerű folyadék. M. Gyk. I. kiadásában mint antidotum arsenici szerepelt. Antacidum. Savmérgezéseknél, főleg arsenessav-mérgezésnél mint antidotum chemicum. Adag evőkanalanként. Savmérgezéseknél 5—10 perczenként 1 evőkan.

764 Rp. Magnes. hydrooxyd. 150,0.
S. Rendelet szerint.
Statim!! Arsenessav-mérgezés.

II. Magnesium oxydatum s. Magnesia usta (MgO) . Hófehér, könnyű, igen finom por, vízben nem oldható. Haszn. mint a magn. hydrooxyd. s a magn. carb. hydrooxyd. Adagolás mint az utóbbinál.

Magnesium perhydrol (Merek) l. Magn. peroxydatum.

Magnesium peroxydatum mixtum l. magn. peroxyd.

Magnesium peroxydatum. Fehér, vízben nem old. por. 15—25% magn. peroxydból (MgO_2) és 75—85% magn. oxydból (MgO) áll. Igen könnyen fejleszt hydrogenhyperoxydot (H_2O_2) s ettől van oxydáló és desinficiáló hatása (l. hydrog. hyperoxyda-

Joricin (jóízű ricinusolaj) a legjobb hashajtó!

Barella univers. gyomorpora kit. hat. a különféle gyomorbántalmaknál. (L. hird.)

Mikroboform sec. Kleewein, szagtalan és igen hatásos fertőtlenítőszer.

tum cz. a. is). Főleg a gyomor és belek desinfectiójára haszn. Adag 0,25—0,5 pro dos. napi. 3—4-szer. Ha a belekre akarunk hatni caps. keratin.-ban rendeljük. A *Hopogan*, *Biogen*, *Magn. peroxid. mixtum* név alatti készítmények MgO_2 és MgO keverékéből állanak.

Magnesium salicylicum [$(C_7H_6O_3)_2Mg + 4H_2O$]. Színtelen, légálló jegeczek, melyek 10 r. vízben oldódnak. Íze édeses-keserű. Antipyreticum; úgy hat, mint a natr. salicyl. Huchard főleg typhus abd. eseteiben ajánlja. Jó polyarthrit. rheumaticánál is. Nagy adagban (6—8 gm.) hashajtó. Adag bels. porban, oldatban 0,5 gm. pro dos. 3,0—6,0 gm. pro die.

765 Rp. Magnes. salicyl. 10,0.
Aquae dest. 180,0.
Syrup. cort. Aurant. 20,0.

MDS. 4. X napi. 1 evők.
Typhus abdom. Polyarthrit.

766 Rp. Magnes. salicyl. pulv. 5,0.
Div. in dos. aqu. No. 10.

DS. 2 ór. 1 port.
Typhus abdom. Polyarthrit.

H. Magnesium sulfuricum ($MgSO_4 \cdot 7H_2O$). Keserűső. Színtelen vagy fehér, a levegőn kissé elmálló hasábos jegeczekből áll. Íze keserű, sós, 0,8 sr. hideg, 0,15. sr. forró vízben oldható. Laxans. Adag 15,0—30,0 pro dos. porban vagy vízben (szódavízben) oldva.

Magolan. Vízben oldh. fehér por. Oxydiaminphosphorsav calciumsója, mely a *Lapinus arab. leguminosae* magvaiból készül. Antidiabeticum (?). Cukorkiürítést állítólag lecsökkenti. Adag porban v. pilulában 3X napi. 0,4 gm. több héten át.

Malonal, l. Veronal melylyel azonos, de olcsóbb.

Maltocol. Fehéjsavas malátaoldat, mely 7% kaliumsulfoguaia-colicumot, 1% natr. camphoricumot és 2% natr. és calc. glycerophosphatot tartalmaz és így ezeknek hatásait egyesíti. Használható mint a guajacol. jóízű pótszere. Különösen a gyermekgyakorlatban vált be. Adagja felnőtteknek 3—4 kk. pro die, gyermekeknek feleannyi.

H. Malvae folia. { (Malva silvestris. Malvaceae.) Ható-
anyaga növényi nyák. Decoct. 10,0—
H. Malvae flores. { 15,0 : 150,0 nyákos folyadék. száj-, to-
rokviznek, vagy csipős, keserű anya-
gok számára vívőfolyadeknek.

Mammae siccatae l. Organotherapia.

Polyarthrit. rheumatica eseteiben kit. hat. Trencséntep-
licz természetes izzapfűrdői és 36—42 hőfokú radiumos kénes
forrásai. (L. hird.)

Arthritis urica: *Rp.* Gelodurat „Pohl“
scat. orig. c. acid. salicyl. 0,25.
S. 3—4-szer naponta 2 dbot.

Mammin-Poehl l. *Organotherapia*.

H Manganum chloratum crystallisatum. ($MnCl_2, 4H_2O$). Önállóan nem haszn. Alkotórésze a Syrupus hypophosphi comp.-nak.

Manganum hyperoxydatum (MnO_2). Barnakő. Hamvasfekete, kristályos törésű darabok. Chlorfejllesztésre használtatik.

II. Manna. (Fraxinus Ornus kiizzadó édes nedve.) Hatóanyaga manninum. Enyhe laxans. Adag: felnőttek substantiában 30,0—60,0, gyermekek 5,0—10,0.

H. Mannitum ($C_6H_{14}O_6$). Hasáb- vagy tűalakú, tiszta fehér és fénylő kristályokból áll; 6,5 sr. hideg vízben és 80 sr. híg borszeszben oldható. Ízjavító cukor helyett. Laxans terhes nők, gyermekek számára; adag porban, oldatban felnőttek 20,0—40,0, gyermeknek 3,0—5,0.

H. Syrupus mannatus l. *Senna*.

767 Rp. Manniti 5,0.

Aquae dest. ferv. 50,0.

MDS. 2 óránként 2 gyk.

Csecsemőknek székszorulás esetén.

Matico folia. (Piper angustifolia. Piperaceae.) Hatóanyagai illóolaj, csersav, gyanta. Adstringens, elválasztást csökkenti. (Közel áll a piper cubeba hatásához.) Küls. infus. (5,0—10,0 : 100,0—150,0). alakjában gonorrhoea ellen húgycsőbe fecskendeztetik. Belső gonorrhoea, cystitis, diarrhoea, vérzések ellen 0,5—2,0 pro dos. 3×5 napjában porban, pilulában vagy infus. 10,0 : 150,0 ; 2 ór. 1 ev k.

Medinal solubile l. *Veronalnatrium*.

H. Mel. Syrupok helyett ízjav. Electuariaumok alapanyaga.

H. Mel depuratum. Az előbbinél hígabb. Haszn. mint a mel.

H. Mel rosatum. Rózsaiolajjal szagosított méz. Íz- és szagjavító.

II. Melissae folia. (Melissa officinalis. Labiatae.) Hatóanyagai: illatos olaj, kevés csersav, gyanta. Haszn. infus alakjában (1 : 10) mint diaphoreticum, carminativum, stimulans. Illatos theakeverékek alkotórésze.

Mellin-tápszerszer. Malátával, búzaliszttel, korpával és kali carbonatál készül, főleg maltose-ből áll (63%), tartalmaz dextrint (18%) fehérjét (8%) is. Adag élelkezés mód a mellékelt haszn. utasításban.

Mellin-Biscuits 50% Mellin-tápszert tart. és a csecsemőknek az összeállók táplálékhoz való átmenetkor adhatók. (L. hird.)

Brázay-féle menthol-sósorszesz a legjobb. (L. hird.)

Joricin (jóízű ricinusolaj) a legjobb hashajtó !

Meningococcus-serum. Meningitis cerebrospinalis epidemica ellen készítették. Immunizált lovak seruma. Kifejlett betegség esetén a gerincvelőcsatornába 10—25 ccm-t kell fecskendezni naponta. Prophylaktikus célból 10 ccm. bőr alá. A Höchsti gyár por alakban is készíti, melyet az orrba és garatba kell befújni.

Mensan. Zsírtalanított mogoró szeszes kivonata. Haemostaticum (?) menorrhagiák ellen. Adag $2\times$ napj. 1 evők.

H. Menthae folia. (Mentha piperita. Labiatae.) Hatóanyaga illó olaj. Infusum (1:10) alakjában diaphoreticum, carminativum, stimulan. Illatos theakeverékek alkotórésze.

H. Aqua Menthae piperitae. l. Aquae aromaticae.

H. Syrupus Menthae piperitae. Kellemez, hűtőízű íz- és szagjavító.

768 Rp. Fol. Menthae pip.

Fol. Melissae.

Rad. Valerianae aa 25,0.

Fruct. Anisi

Fruct. Coriandri aa 10,0.

Conc. cont m. f. species.

DS. 1 csésze theára 1—2 evők.

Diaphoreticus, antispasmodicus theaelegy.

H. Mentholum [$C_{10}H_{19}(OH)$]. Azelőtt Po-ho néven árulták. Az ol. menthae pip. stearoptenje. Színtelen jegeczek, vízben nehezen borszeszben, aetherben, glycerinben. zsíros olajokban könnyen oldódnak. Szaga, mint a menthaolajé. Helybelileg érzéstelenít; bels. véve a reflextevékenységet csökkenti s érzéstelenít. Antisepticus hatása is tetemes. Küls. hemicrania, neuralgiák ellen rudacsókák (Migraine-Stift), kenőcsök (1:10) alakjában használatik. Anginánál ecsetelések. Bels. tuberculosisnál, influenzánál belégzések (melegítetik, midőn elillan) alakjában haszn.; továbbá porban, pilulában (0,1—0,5—1,0 pro dos.) phthisis, cardialgia hyperemesis, reflexneurosisok eseteiben.

769 Rp. Mentholi 5,0.

Solve in

Ol. Sesami 45,0.

adde

Aquae Calcis 50,0.

M. f. linim.

DS. Külsőleg égési sebekre.

770 Rp. Mentholi 0,25—0,5.

Spir. vini 100,0.

MDS. Külsőleg. Pruritushál ecsetelésekre.

Dragées-Bengué menthollal (menthol 0,02, bors. natr. 0,10) igen jó a torok és gége hurutjánál. (L. hird.)

Emsi források „Kränchen“ régóta kit. hat. asthma, humtok, köhögés, rekedtség, elnyálkás., hyperacid., influenza, köszvény, csúsz stb. ellen. (L. hird.)

Sztraka-féle Menthol-fogszappan eredeti, új összetételű fogápolószer. (L. hird.)

T. ORVOS URAK FIGYELMÉBE!

SZTRAKA TANNIN-CSOKOLÁDÉJA
kis gyermekek és felnőttek hasmenése ellen kitűnő. Minden darab 0.40 acid. tannic.-t tartalmaz vegyileg kötött állapotban, salemppel készítve. Ára 40 fillér. Kis gyermekek negyedrészt, felnőttek felét veszik be egyszerre. Kellemes ízű, drasticumot nem tartalmaz és hasmenés ellen a legolcsóbb szer.

SZTRAKA GILISZTA-CSOKOLÁDÉ
0.06 gr. santonin és 0.06 gr. phenol-phtalein tartalommal. Egy darab 20 fillér.

SZTRAKA CHININ-BONBON 0.25 gr. chinin-tannát tartalommal (megfelel 0.10 gr. chinin sulf.-nak). Egy darab ára 12 fillér.

Ezen készítményeket a belügy-miniszterium tudomásul vette.

SZTRAKA MENTHOL-FOGSZAPPAN.
Eredeti új összeállítású fogtisztító szer, mely nagy menthol-tartalma és a többi gondosan megválasztott alkatrészei folytán a mikroorganizmusokra megsemmisítőleg hat, azért hygienikus szempontból nemcsak kiállja a versenyt, de sőt felülmúlja a hasonló célú szolgáló külföldi készítményeket. Ára 1 kor.

Az itt felsorolt készítmények minden gyógyszerárban és drogua üzletben kaphatók.

Legtisztább, legkényelmesebb bedörzsölési kúra.

MERCURO CRÈME

sec. Dr. Rosenberg.

Bedörzsölés 3-5 percig. Nem piszkítja a fehéreneműt. Zsirtalan és szagtalan.

Új csomagolás:

Mercurocrème **mite**

1 csomag à 10 doboz à 3 gr. $22\frac{1}{2}\%$ Hg. = 2 gr. $33\frac{1}{3}\%$ Hg.

Mercurocrème **normale**

1 csomag à 10 doboz à 3 gr. $33\frac{1}{3}\%$ Hg.

Mercurocrème **forte**

1 csomag à 10 dob. à 3-33 gr. 50% Hg. = 5 gr. $33\frac{1}{3}\%$ Hg.

Régi csomagolás:

1 graduált tubus à 30 gr. $33\frac{1}{3}\%$ Hg. Minden csomag ára 2 K.

CSILLAG - GYÓGYSZERTÁR, BUDAPEST,
VIII., Rákóczi-ut 39. szám. (József-körut sarok.)

Foszfor-csokoládé-pasztillák

Gärtner tanár szerint. (Tabul. cacaotin.
phosphorat. sec. Prof. Gärtner.) Készülnek

BRADY KÁROLY gyógyszerertárában
„Zum König v. Ungarn“, Wien I. Fleischmarkt 1.

Minden pasztilla tartalmaz 0.00025 foszfort. — A pasztillák bevétele kellemes, gyermekck és felnőttek igen jól tűrik, ép ezért igen jó pótszerei a foszforcsukamájolajnak angol-kór, nehéz fogzás és csontlágylulás eseteiben. — *Ezek a pasztillák Prof. dr. C. Heubner berlíni titkos egészségügyi tanácsos „Lehrbuch der Kinderheilkunde“ című könyvének II. kladásában is ajánltatnak használatra.* — Szokásos adag: 2 db pro die, idősebb gyermekeknél 4 db pro die. Egy kartonnak, mely 2 zselatintubust 20 pastillával tartalmaz, ára 2 korona 40 fillér. A gyógyszerertárakban csak orvosi rendelésre kapható. — Minták az orvos urak részére kívánatra díjtalanul és bérmentesen állnak rendelkezésre.

771 *Rp.* Mentholi 1,0.
 Spirit. Vini 20,0.
 Aquae dest. 150,0.
 M. f. solut.

DS. ór. 1 evők.
 (Hyperemesis, tabeti-
 cusok hányása.)

773 *Rp.* Mentholi 10,0.
 Solve in Toluolo ad
 centimenb. 36,0.
 Spirit vini. conc. 60,0.
 Liquor. Ferri sesqui-
 chlor. 4,0.

MD. in vitro nigro.
S Diplitheritisnél ecse-
 telésre.

776 *Rp.* Mentholi 1,0.
 Ol. Sesami 0,5.
 Lanolini 8,5.
 M. f. ungu.

DS. Migrain-kenőcs.

772 *Rp.* Empl. diachyl. simpl. 75,0.
 Ceræ flavæ 10,0.
 Resin. Pini 5,0.
 lenicalore liquef. adde
 Mentholi 10,0.
 fiat. l. a. emplastrum

DS. Tapasz.

Neuralgia, rheumatismus.

774 *Rp.* Mentholi 5,0.
 Tinct. Aurant.
 Tinct. Valerianæ
 aa 15,0.

MDS. 15—20 cseppenként.
 Hysteriás állapotok

775 *Rp.* Mentholi 5,0.
 Spiritus vini 120,0.

MDS. Külsőleg. Paraesthe-
 siák ellen bedörzsölésre.

777 *Rp.* Mentholi 4,0.
 Ol. Sesami 20,0.
 M. f. linim.

DS. Gégébe, orrba csep-
 pentésre.

Mercolint. Gyapotszövet, mely kénes³kenőccsel van impreg-
 nálva. Inunctiók kúrák helyett a mellen viselendő köténykék
 alakjában haszn. l. Hydrargyri praeparata ez. a. is (Pulv-ciner.
 Mercurin, Mercuriol).

Mercurin l. Hydrargyrum

Mercuriol l. Hydrargyrum.

Mercurocrème. Az ungu. cinereum pótszere: glycerinben oldott
 közömbös stearinsavas kalium 33¹/₃% Hg-tartalommal Anti-
 luctiens bedörzsölésekre 3 gr.-os adagokban. Nem szennyez,
 vízzel lemosható.

Mesotan. (Salicylsavas methyloxymethylester). Sárgás, olaj-
 szerű, gyengén aromás szagú folyadék. Vízben alig, alkohol-
 ban, aetherben, zsíros olajban jól oldható. Izom- és ízületi
 rheumatismus esetén a bőrre dörzsölendő, ol. sesamival aa.
 naponta 2—3-szor egy-egy kk.-nyi mennyiségben.

Bengué-balzsam (menthol, methylsalicylat, lanolin) fájdalom-
 csillapító neuralgia, csúsz, köszvény, migrén esetében. (L. hird.)

Mercurocrème sec. dr. Rosenberg, mite 3 gr. 22¹/₃%, normale
 3 gr. 33¹/₃%, forte 3 gr. 50% Hg.-t tart. (L. hird.)

Izom- és ízületi csúsz eseteiben kit. hat. Trencsénteplicz
 term. iszapfürdői és 36—42 hőfokú radiumos kénes források.
 (L. hird.)

778 <i>Rp.</i> Mesotani	10,0.	779 <i>Rp.</i> Mesotani	5,0.
Olei Sesami	10,0.	Vasellini	15,0.
M. f. linim.		M. f. ungu.	
<i>DS.</i> Külsőleg.		<i>DS.</i> Külsőleg.	

Metasol. Metakresolanytol l. Anytin s. Anytol cz. a.

Metaethyl l. Aethylum chloratum.

Methacetin seu Acetanisidin. Színtelen vagy kissé pirosas, szagtalan, keserű por. Vízben nehezen, borszeszben könnyen oldódik. Hatása, haszn. mint a phenacetiné, de az utóbbinál csekélyebb jelentőségű. Adag porban, pilulában 0,2—0,4 pro dos, 2—3X napj.

Methylalum [$CH_2(OCH_3)_2$] Színtelen, könnyen mozgó, igen illó, 42° C.-nál forró folyadék; chloroform és eczetaetherre emlékeztető szagú, csipős, aromaticus ízű; vízben, borszeszben, zsíros olajokban oldódik. Sedativum, hypnoticum. Agyvérzés esetén bizonytalan hatású. Adaga subcután 0,1 pro dos. többször napj.; per os vagy klysmában 0,5—1,0 pro dos. 2—3-szor.

780 <i>Rp.</i> Methylali	1,0.	781 <i>Rp.</i> Methylali	5,0—8,0.
Aquae dest.	9,0.	Aquae dest.	
M. f. solut.		Syrup. cort. Aurant.	
<i>DS.</i> Bőr alá fecskendésre.		aa 50,0.	
Egy fecskendő 0,1		<i>MDS.</i> Felét este lefekvés	
methylalt tartalmaz.		előtt elfogyasztani	

782 <i>Rp.</i> Methylali	1,0—2,0.	783 <i>Rp.</i> Methylali	10,0.
Mucil. Gummi arab.		Ol. sesami	50,0.
Aquae dest. aa 50,0.		M. f. linimentum.	
<i>MDS.</i> Klysmá.		<i>DS.</i> Külsőleg. Anodynum.	

Methylatropinum bromatum, l. Atropinum methylobromatum.

Methylenum chloratum (CH_2Cl). Methylchlorür vagy chlor-methyl. Színtelen, aetheres erős szagú folyadék, mely gázalakkból erős compressióval v. —6—25 fokra lehűtéssel tétetett cseppfolyóvá. Helyi érzéstelenítő, mint az aethylenum chloratum (l. ott.); fém v. üvegtubusokban jó kereskedésbe. Hideg helyen tartsd. Könnyen gyúlad.

Methylenum bichloratum (CH_2Cl_2). Színtelen, tiszta, kellemes szagú folyadék. Forrpontja 40° C. Chloroform helyett a sebészetben mint altató, érzéstelenítő használtatik. Különös előnyei nincsenek. Gyakran találni tisztátlan készítményeket, ezért vigyázat (!)

Methylenum coeruleum (Methylenkék). Sötét-barnás por, feloldva élénk kék színű. Antimalaricum. Dosis a roham előtt 0,3

Alimentum Theinhardt omnes materias ad nutriendos infantes necessarias continet optima ratione mixtas.

—0,5 ugyanamnyi pulv. nucis moschatae-val, mely utóbbi a különben fellépő húgyhólyagizgalmat van hivatva megszüntetni.

Methylum salicylicum. [$C_6H_4.OH.COCH_3$] Színtelen, kellemes szagú folyadék, vízben nehezen, alkoholban könnyen old. A Gaultheria olaj főalkatrésze, de syntheticusan is előállítják. Haszn. mint az Ol. Gaulth. l. ott.

Methylsulfonyl l. Trional.

Microcidin. Natrium β -naphtholicum. Fehér, vízben oldh. por. Erősebb antisepticum. Küls. 3—5% oldatban sebek, hüvely kimosására.

Migraenin l. Antipyrinum coffeino citricum.

Miscella pro solutione Calcii oxysulfurati. (Calc. oxyd. 30,0 + aqua commun. 20,0 + sulfur. subl. lotum 60,0.)

Solutio Calcii oxysulfurati s. Solutio Vlemineckx l. haszn. calc. sulfurat cz. a.

Mitin. A lanolinhoz hasonló, kenőcsszerű, túlszírosított anyag, mely tejfél-hérjéket is tartalmaz. Kenőcsalapanyag lanolin helyett. Készítenek vele *mitincrême*-t (m. cosmeticum), *mitinpástát* (pasta m.) és 33 1/3% Hg-ot tartalmazó *mitinum mercuriale*-t; utóbbit az ung. ciner. helyett haszn. Különös előnyei nincsenek.

†**H. Mixtura chloralo-bromata.** A bromidia helyettesítésére szerkesztett, elkészített gyógyszer. Tartalmaz 150 gm.-ban 5 gm. extr. hyosciami c. dextrint, 50—50 gm. kalium bromatumot és chloralhydratot és 10 csepp chloroformot. Adagja 1—2 kk vízben elkeverve. Epilepsia ellen.

H. Mixtura gummosa l. Gummi arabicum.

H. Mixtura oleoso-balsamica l. Balsamum vitae Hoffmanni.

Mollinum. Túlszírosított kálishappan, mely a bőrgyógyászatban részint tisztán haszn. más szappanok helyett, részint kenőcs alapanyagul szolgál. Fehér, enyhén szappaszagú, ceratum összeállású. Hatása mint a kálishappané, de enyhébb. Főösleges készítmény.

Monochlorphenol. ($C_6H_4Cl.OH$). Paravegyület az isomeriák közül. Jegeczek vízben alig, szeszben jól old. Fogászatban haszn. antisepticum. Ujabban 5%-os glycerines vizes oldatban follicul. mandulagyulladás esetén ecsetelések alakjában is használják.

Monotal. A guajacol methylglycolsavestere, melyben 60% guajacol van. Olajos, szeszben jól oldh. folyadék. Helybeli érzéstelenítő hatása miatt mint analgeticum ecsetelések alakjában napj. 2—3×2—3 gm. használható el tisztán v. egyenlő r. olajban oldva.

Neurolin-Balla (Syrup hypoph. polybr.) egyesíti a hypophosj hit zsongító és a brom csillapító hatását; igen jó idegesség, neurasth. hysteria, hypoch., melanch. eseteiben, kit. erősítő szer lábadozók részére. (L. hird.)

††H. Morphinum

††H. Morphinum hydrochloricum } l. Opium.

Morphosan, l. Morphinum methylbromatum az opium ezikk keretében.

Morrhual. Az ol. jecoris aselli-ből 90%-os borszeszszel lepárlás útján előállított, kissé szagos, csípős, keserű, már közönséges hőnél jegecedő anyag, mely phosphort, jódot és brómot tartalmaz. A különféle halmájolajokból 2—4% nyerhető. Állítólag hatóanyaga az ol. jecoris-nak (?), s így helyette adatik (l. ol. jecoris). Adag: 8—10 éves gyermeknek 0,4 grm, 12—15 éves gyermeknek 0,6—0,8 grm, felnőttnek 1,0—1,50 grm pro die étkezés közben. Capsula gelatin-ban rendelendő. Kereskedésben már készen vannak morrhual-capsulák, melyek 0,2 grmot tartalmaznak. Az ol. jecoris-t nem pótolhatja. Romlott halmájolajból készült morrhual mérges ptomainokat is tartalmazhat.

H. Moschus. A moschus moschiferus praeputium-mirigyének váladéka. Excitans, antispasmodicum. Adag porban 0,1—0,3—0,5 pro dos. napj. 3—4-szer, gyakran camphorral összekötve. Igen drága.

Tinctura Moschi. 10—30 csepp 2—3 ór.

784 Rp. Moschi

Camphor trit. aa 1,0.

Sacchar. lact. 4,0.

M. f. pulv. div. in dos.

aequ. No. 10.

D. in chart. cerat.

S. 2—3. ór. 1 port.

Excitans.

786 Rp. Moschi 0,1.

Sacchar. alb. 3,0.

M. f. pulv. div. in dos.

aequ. No. 10.

D.S. 3 ór. 1 port.

Csecsemőknek asthma

laryngeum vagy

ecclampsia esetén.

785 Rp. Tinct. Moschi

Tinct. Valerian. spir.

aa 15,0

MDS. 2—3 × napj. 20—30.

cseppet.

Antihystericum, anti-

spasmodicum.

787 Rp. Moschi

Camphorae aa 1,0.

Vitellum ovi unius

Aquae dest. 200,0

M. f. l. a. emuls.

D.S. Csörének.

H. Mucilago Gummi arabici l. Gummi arabicum.

H. Mucilago Salep l. Salep cz. a.

Muiracithin. A braziliai lignum Muira Puama lecithinnal kevert kivonata. Aphrodisiacumnak ajánlották impotentia virilis eseteiben (?). Kész pilulák alakjában van forgalomban. Napj. 3 × 2 db.

Mutase. 60% növényi fehérjét tartalmazó mest. tápszer. Adag levesben, tejben napj. 3—4 × 1 kk. v. evők.

Egger-Emulsio kit. csukamájolaj-készítm. c. 5% Thiocol, c. 5% Ovitelcithin, c. Phosphoro 100 ad 100:00 Emulsio.

Jogadin jóízű csukamájolaj!

Minden gyógyszerárban kapható.

MALTOCOL

LEGOLCSÓBB LEGTÖKÉLETESEBB

GUAJACOL-PRAEPARATUM.

TARTALMAZ: FANÉJSZAVAS (HETOL) MALÁTASZÖRBPEN
7% KAL.SULFID-GUAJAC. 2% CALC. és NATR. GLYCEROPHOSFOR.

1% NATR. CAMPHOR. STB. AROMÁS ANYAGOT

MARBERGER GYULA VÖRÖSKERESZT GYÓGYTÁR
UJPEST. VÁCI-ÚT 25.

irodalom és minta ingyen.



ÁRA:
1K.80f.

KÉSZITI —



ÁRA:
4 KOR.

KÉSZITI:

GLYKOMALTIN

DIAETÁS GYÓGYÉS TÁP-SZER

TARTALMAZ:

10. FER. GLYCEROPHOSFOR. KOLA ÉS
LECITHINT, MALÁTA-KAKAOBAN

MARBERGER GYULA VÖRÖSKERESZT GYÓGYTÁR
UJPEST. VÁCI-ÚT 25.

Myrticol

„Csatádi“

Igen kellemes ízű
Guajacol-Áfonya-
készítmény.

Javalva: a légzőszervek hurutos bántalmainál, **különösen csúcshurutok és hörghurut** eseteiben. **Tüdőbetegek gyomorzavarai és bélbántalmai ellen specificum.**

Adagolása 3-szor napjában 1 evőkanállal.

Egy üveg ára 2 korona 50 fillér.

Kapható a gyógyszertárakban.

Készítője :

Csatádi Artur gyógyszerész
Tátrafüred.

Mycodermin. Hideg légkörben szárított sörélesztő. Haszn. furunculosis, eczémák, urticaria eseteiben napj. 3—4-szer 1 kk.

Mydrinum. (Keverék: 1r. homotropin. hydrochl. + 10r. ephedrin. hydrochl). Mydriaticum. Gyorsan hat s a hatás gyorsan múlik. Küls. becseppentésre 0,2 : 10,0.

Mydrol. Jodmethyl-phenylpyrazolon. Fehér, vízben oldh. por Mydriaticum. Adag 0,5—1,0 : 10,0 szemecsképeknek.

Myrrha. Gummiresina. (Balsamodendron Myrrha. Burseraceae.). Kellemes szagú, áttetsző barnás gyantás anyag. Vízben alig, borszeszben nagy részben old. Haszn. készítménye a

Tinctura Myrrhae. Küls. szájvízbe 1 : 30—50. Foglus ecsetelésre tisztán is.

Myrticol. Áfonyaborral készült kalium sulfognajacol-oldat. Haszn. mint a syrupus kalii sulfognajacol. Adag felnőtteknek 3—4 evők. gyermek. 3—4 kk. napj. Készíti Csátádi Artur Tatrafüreden.

Myrtilli fructus s. baccae. Kék áfonya. (Vaccinium myrtillus.) Tartalmaz: Csersavat, alma és citromsavat, cukrot. Enyhe adstringens. Szárítva evőkán. napj. többször. Jó készítménye a *Vinum myrtillorum medic. Cornides*. Idült hasmenésnél kávésevőkánalankint napj. többször.

Myrtolum. A *Myrtus communis* illó olajának 150—170° C-nál forró része; nagyrészt eucalyptolból áll. Víziszta, kellemes, frissítő szagú folyadék. Has n. bronchitis putrida, gangraena pulm. eseteiben jó eredménnyel (Eichnorst). Tuberculum bacillusokra hatástalan. Adag bels. 2—3 ór. 0,15 gmot (= 15 csepp) tartalmazó gelatin-tokocsákból 2—3 db. Étvágytalanság nagyobb adagokra gyakori. A Linarix-féle tokocsák 0,15 myrtolt tart. s jól adagolhatók.

788 Rp. Myrtoli gtl. 5.

Det. in. caps. gelat.

Dent. tal. dos. No. 20.

DS. 2—3 ór. 2—3 szemet. 5 csepp
= 0,15

Bronchitis putrida. Gangraena
pulmonum.

Vinum myrtill. med. Cornides, fekete áfonya-gyógybor idült bélhurut, ideges hasmenés eseteiben kitűnő. (L. hird.)

Mycodermin, tartós, száraz élesztő, jav.: furunc., acne, eczémák, urticaria, anthrax, obstipatio, diabetes, leukorrh. (L. hird.)

Furunculosisnál a legjobb eredm. érhető el a Lysoformnak kenőcs alakjában való alkalmazásával, 5—10—15% Lysoform vaselionel v. vasogennel.

Lactobacilline erjesztő anyag kit. bat. furunc., eczema, urticaria, syccosis stb. eseteiben. (L. hird.)

Nafalan = Naftalan, melynek *concurrans* utánzata.

Naftalan. Igen tiszta naftaolaj. (Fs. 0,960, közömbös kémhat.) Szappan hozzáadásával van szilárdítva. Sötét barnás-zöldek, vízben, alkoholban és glicerinben nem oldható, aetherben, chloroformban jól; zsírokkal jól keveredik. Kenőcsökhöz használtatik. Fajdalomcsillapító, antiparasítás, lobellenes. Vásonra kenve tétesék a megfelelő helyre (égési sebek, fagyás, eczema, bőrlobok),

789 *Rp.* Naftalani 2,0.
Zinci oxyd.
Amyl. pur. pulv. aa 10,0.
Vasellini 20,0.

M. f. pasta
D.S. Kenőcs.
Vörös, korpádzó,
viszkető eczema
ellen.

790 *Rp.* Naftalani 25,0.
Ungu. simpl. 50,0.
M. f. ungu.
D.S. Kenőcs.
Eczema ellen.

791 *Rp.* Naftalani 10,0.
Magnes. oxyd. 20,0.
Talcí 35,0.
Amyli 30,0.
Natr. borac. 3,0.
Zinci oxyd. 5,0.
M.D.S. Hintőpor.

792 *Rp.* Naftalani 50,0.
Zinci oxyd. 15,0.
Colemplastri adhaes. 35,0.
M. leni calore. nt f.
empl.

D.S. Naftalan ragtapsz.

793 *Rp.* Naftalani 50,0.
Cerae alb. 45,0.
Butyri Cacao 5,0.
M. f. suppositoria
No. 25 vagy 50.
D.S. Végbélkupok. Haemorrhoidalis állapotok ellen.

Naphthalinum purissimum ($C_{10}H_8$) Színtelen, fénylő, kátrányszagú lemezecskék. Illó. Vízben nem, hideg borszeszben nehezen, forróban könnyebben, aetherben, zsíros olajokban könnyen oldódik. Antisepticus, desinfectiens hatású. ROSSBACH ajánlotta idült vékony- és vastagbélhurutok, cholera infantum, typhus abdomin., tuberculosok hasmenése ellen. Oxyuris ellen is jónak mondják. Hólyagbajoknál czélszerűtlen, sőt ártalmas is lehet. Bőrgyógyászatban pityriasis, scabies ellen kenőcsalakban 1:2. Belső porban 0,1—0,5 pro dos. 3—6 × napj. felnőttek; gyermeknek 0,05—0,1 pro dos. 3—4 × 1 apj. Nem tévesztendő össze a Naph-tollal (!!)

Myrticol „Csatádi“ igen kell. ízű guajacol-áfonya-készítm., tüdőbet. gyomorzavarai és bélbánt. ellen specifikum. (L. hird.)

Leurose, javít. Leube-Rosenthal hússoldat a dr. Mirus (R. Stütz) jenai ndv. gyógysz. kit. gyomorbajok, typhus, dysent., tuberk. bélbajok, peritonitis, gyomor- és bélvérzések eseteiben. (L. hird.)

Lactobacilline erjesztőanyag kit. hat. gyomorbéllhurut, vastagbélhurut, vérhas, székrek., béltuberk., typhus, cholera infant. stb. eseteiben. (L. hird.)

- 794 *Rp* Naphthalini puriss. 1,0.
 Sacch. albi 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos. aeqn. No. 10.
DS. 2 ór. 1 port. 2—4 éves gyermek.
 oxyuris verm. ellen.

Naphtalol l. Betolum.

†H. Naphtolum ($C_{10}H_7OII$). Színtelen, selyemfényű kristály-lemezekből áll, v. fehér kristályos por. Gyenge, phenolra emlékeztető szaga, erős égető íze van. 1000 sr. hideg, 75 sr. forró vízben oldódik, borszeszben, aetherben, chloroformban, zsíros olajokban könnyen. Bőrgyógyászatban küls. kátránykészítmények helyett idiült eczema, psoriasis, pityriasis versicolor, scabies, favus, herpes tonsurans, prurigo ellen. Hosszas v. kiterjedt bőrfelületen alkalmazása haemoglobinuriát hozhat létre, ezért vigyázat (!). Kenőcshez 1 : 10—30, borszeszes oldathoz 2—10 : 100.

- | | |
|---|--|
| 795 <i>Rp.</i> Naphtoli pulv. 0,5.
Amyli 50,0.
M. f. pulv. det. in scat.
<i>DS.</i> Hintőpor.
Hyperhydrosis. | 796 <i>Rp</i> Naphtoli 1,0.
Ol. Sesam 100,0.
M. f. linim.
<i>DS.</i> Ecsetelésre. |
| 797 <i>Rp.</i> Naphtoli
Resorcini
Acid. salicyl. aa 1,0—5,0.
Sulf. praecip.
Sapon. kalini
Amyli pulv.
Vaselini aa 25,0.
M. f. ungu.
<i>DS.</i> Kenőcs. Hámítás előmozdítására | 798 <i>Rp.</i> Naphtoli 15,0.
Axung. Porci. 100,0.
Sapon. kalini 50,0.
Cretae alb. 10,0.
M. f. ungu.
<i>DS.</i> 1—2-szer bedörzsölni.
Scabies. |
| 799 <i>Rp.</i> Naphtoli 5,0.
Axung. Porci 15,0.
Lanolini. 80,0.
M. f. ungu.
<i>DS.</i> Kenőcs. | 800 <i>Rp.</i> Naphtoli 5,0.
Aetheris sulf. 100,0.
<i>MDS.</i> Külsőleg.
Pediculus pubis. |
| | 801 <i>Rp.</i> Naphtoli 0,5.
Spirit. vini 100,0.
<i>MOS</i> Külsőleg. Hónaljzizsada-
sánál a hónalj 2×
napj. bedörzsölendő. |

Narceinum l. Opium készítm.

Narcoform l. somnoform.

Narcotinum l. Opium készítm.

Herpes tonsurans, psoriasis, pityriasis, scabies ellen igen hatásos a Lysoform 5—10—15%-os kenőcse vaselinnel vagy vasogennel.

Hyperhydrosis ellen 1—2%-os Lysoformoldat.

Oxyuris verm.: *Rp.* Gelodurat „Pohl“

(gyerm. részére) scat. orig. c. ol. Chenop. gtt. V. c. Menthol
S. 3-szor naponta 1—2 dbot.

Narceyl. Sósavas aethylnarcein. Vízben jól oldható kristályos anyag. Köhögési inger csillapítására gyermeknek 0,01—0,03 gr., felnőtteknek 0,06—0,10 pro dosi többször napj. syrupban vagy pillulában.

Nargol. Nucleineziüst. 10% argentumot tart. Fehér por. Vízben old. Haszn. mint az Arg. proteinicumé.

Natrium aceticum crystallisatum ($NaC_2H_3O_2, 3H_2O$). Színtelen, átlátszó jegeczekből áll, íze keserű és sós. 14 sr. hideg vízben, 30 sr. hideg és 2 sr. forró borszeszben oldható. Gyenge diureticum. Bels. adag 1,0—3,0 pro dos. napj. 3—4 szer. oldatban Gyakran mint más diureticus szerek adjuvansa kali acetic. solut. helyett.

Natrium acetylarsanilicum, l. Arsacetin.

Natrium arsanilicum, l. Atoxyl.

H. Natrium benzoicum ($C_7H_5NaO_2$). Fehér, alakatlan por; 1,5 sr. vízben oldódik. Antipyreticum. Ma ritkán rendelik, még leginkább polyarthritís rheum. ellen (jobb a natr. salicyl.). Adag bels. porban 10,0—20,0 pro die.

H. Natrium bicarbonicum l. Natrium hydrocarbonicum.

II Natrium boricum s. Borax. ($Na_2B_4O_7, 10H_2O$). Hasáb-alakú, színtelen, kemény kristályok, levegőn elmállnak. 17 sr. hideg, $\frac{1}{2}$ sr. forró vízben oldódik, glycerinben könnyen, borszeszben nem. Antisepticum; gyenge diureticum; húgsavas sókat oldja. Küls. minden alakú stomatitisnél, angina catarrh-nál száj-, torokvizek (1—2% oldatok) és ecsetelések (1 : 5—10) alakjában; acné disseminata, pityriasis versicolor, pruritus vulvae eseteiben kenőcsök alakjában (1 : 5—10). Bels. mint diureticum és köszvény-ellenes szer 0,5—2,0 pro dos. porban, oldatban napj. 3—4-szer.

802 Rp. Natrīi boracici
1,0—2,0.
Aquae dest. 100,0.
MD S. Csecsemőknek sooresetén szájmosó víz.


803 Rp. Natrīi boracici 3,0.
Glycerini 15,0.
M. f. solut.
DS. Stomatitis aphthosa esetén ecsetelésre.

Syrgol a gonorrhoea specifikuma, bevált eziüstpraep., gyors hatásával fejelemulja a többi készítményt. (L. hird.)

Borax-gyógyszappan a kolozsvári (Heinrich József) gyógyszerzappangyárból kit. lat. akne, eczema, a gyermekek ótvára ellen. (L. hird.)

Akne vulg. et ros.: *Rp.* Gelodurat „Pohl”
scat. orig. c. Ichthyol.
Menthol aa 0,1.
S. 3-szor naponta 2 dbot.

Mely vaskészítmények alkalmasak hosszabb használatra?



**Csak azok,
melyek a fogakat
meg nem támad-
ják, a gyomrot
meg nem terhelik,
könnyen asszimilálódnak, jól elbír-
hatók és bevételre
kellemesek.**



Mindezekkel a tulajdonságokkal bír a **Haematinum Glausch.**

Azért ez a szer az összes vaskészítmények között az első helyet foglalja el és az orvosok világszerte évek óta, mint a legcélszerűbb és legolcsóbb vaskészítményt rendelik étvágytalanság, anaemia, chlorosis, neurasthenia eseteiben, mindennemű testi gyöngeségnél és súlyos betegségek utánireconvalescentiánál.

250 gramm tartalmú fél üveg ára . . 1 korona 50 fillér.

500 gramm tartalmú egész üveg ára. 2 korona 60 fillér.

A Haematolum Glausch minden gyógyszerárban kapható.

Beszerezhető: az ausztriai és magyarországi főraktár útján is:
„Adler-Aphoteke” des S. E. Kleeweln in Krems bei Wien.

Sal polybromat efferv. Dr. Egger

**Pezsgő brómsó szemcsék vagy tabletták
alakjában.**

A bróm-medikáció legkellemesebb és egyuttal leghatásosabb, mellékhatásoktól mentes formája, felfrissítő, savanykás ízű pezsgőital alakjában. A sedativ-hatás enyhe és mégis megbízható, brómakne pedig még huzamosabb használatnál sem lép föl.

Adagolás: Egy (minden üveghez mellékelt) mérőüvegnyi pezsgősó vagy 1 tableta megfelel pontosan 1 gr brómsónak; ez az adag szükség szerint napjában 2–3 ízben veendő.

Használat: Vizben föloldva veendő; a tablettákat oldás előtt ajánlatos fölapritani.

Eredeti üveg

Sal. polybrom. efferv. Dr. Egger K 2.20

Eredeti üveghenger

Tabl. polybrom efferv. Dr. Egger (25 tabl.) K 2.50

804 *Rp.* Natrii boracici 0,15.
 Aquae dest. 10,0
MDS. Szemecseppek.
 Conj. catarrh. chron

†H. **Natrium bromatum** (*NaBr*). Fehér, kristályos por 1,2 sr. hideg vízben oldható. Hatása, használata, adagolása, mint a kalium bromatumé; különbség, hogy a szívre még nagy adagban sem hat károsan. *Natr. bromatumot* mint főhatóanyagot tartalmaz a Glück-féle *Liquor hypnobromid. comp.* Egyéb alkotórészek benne a paraldehyd, a stront. brom., kevés diuin és codein. Oly formán haszn., mint a mixtura chloralo-bromata.

II. **Natrium carbonicum crystallisatum** ($Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$). Színtelen, az egyhajlású rendszerbe tartozó, a levegőn elmálló jegecekből áll. 1,8 sr. hideg és 0,3 sr. forró vízben oldódik; oldata erősen lúgos hatású, maró ízű; borszeszben nem oldódik. Bels. nem haszn.; még leginkább saturációkhoz kali carbon. helyett. Helyette a *natr. hydrocarb.* (dilaps).

II. **Natrium carbonicum dilapsum** ($Na_2CO_3 \cdot 2H_2O$). Finom fehér por, vízben melegedés közben oldódik. Vízszívó. Bels. Úgy haszn., mint az előbbi.

Natrium citricum neutrale. ($2Na_2C_6H_5O_7 + 11H_2O$). Fehér, vízben oldh. jegeczek. Diureticum, gyenge antipyreticum. Diabetes ellen is. Adag oldatban 0,5—1,0 pro dos. napjában 3—5-ször.

Natrium glycerino-phosphoricum. [$C_3H_7O_3 \cdot PO_3Na_2 + H_2O$]. 50%-os sárgás, tiszta, lúgos kémh. oldatban kapható. L. glycerophosphátok cz. a.

II. **Natrium hydrocarbonicum s. bicarbonicum** ($NaHCO_3$). Fehér, nem átlátszó, a levegőn el nem málló jegeczek. 13,8 sr vízben oldható, íze gyengén lúgos. Küls. száj-torokvíznek 2—5%-os oldatok, belégzésre $1/2$ —1%-os oldatok. Bels. adag porban, oldatban 0,3—1,0 pro dos. 3—5×napj. Főleg *natr. hydrocarb.*-ot tart. a „*Digestol*“ nevű porkeverék. Egyéb alkotórészek benne:

Neurolin-Balla (Syrup hypoph. p lybr.) egyes. a hypophosphit zsong. és a brom csillap. hatását; igen jó idege-ség, neurasth., hysteria, hypoch., melanch. eseteiben, kit. erősítő szer lábbadozók részére. (L. hird.)

Barella universal-gyomorpóra kitűnő hatású a különféle emésztési zavaroknál. (L. hird.)

Radeini gyógyforrás, legdúsabb natrium-lithium-savanyúvíz, kit. hat. hólyag- és vesebajoknál, köszvény, húgyhomok, hurutos betegségek ellen. (L. hird.)

natr. sulf., magnes. carb., phenolphthalein és cetrarin. Hashajtó hatása is van.

805 *Rp.* Natrii hydrocarb. 3,0.
Pulv. rad. Rhei 2,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ No. 10.

DS. 2—3 ór. 1 port.
Gyomorhurut. Icterus.

807 *Rp.* Natrii hydrocarb. 0,4.
Aquaes Foeniculi
Aquaes dest. aa 40,0.
Syrup. simpl. 8,0.

MDS. 2 ór. 1 kk.
Csecsemőnek dyspepsia acida esetén.
Kolika esetén 1—2 csepp tinct. nucis vom. is teendő hozzá.

806 *Rp.* Natrii hydrocarb. 0,4.
Tinct. Opii simpl. gtt. 1.
Aquaes dest. 80,0.
Syrup. simpl. 8,0

MDS. 2 ór. 1 kk.
Csecsemőnek heveny hörghurut esetén.

808 *Rp.* Natrii hydrocarb. 0,5.
Aqua dest. 100,0.
Aquaes Amygdal. amar.
gtt. 10.

MDS. 2 ór. 1 gyk.
3—4 éves gyermek. hörghurut esetén.

†H. **Natrium hydroxydatum** (NaOH). Fehér rudaeszkák. Causticum mint a kalium hydroxydatum.

Natrium hydroxydatum solutum s. Natrium causticum solutum. Színtelen, átlátszó folyadék; 200 srészben 32 sr. natr. hydroxyd. Erősen lúgos hatású. Maró (!). Bels. nem. Küls. bőrgyógyászatban $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{10}$ -os oldatok mosogatásokra, ecsetelésre.

†H. **Natrium hypophosphorosum** (NaH_2PO_2 , H_2O). Önállóan nem haszn. Alkotórésze a syrupus hypophosph. comp.-nak.

†H. **Natrium jodatum** (NaJ). Fehér, jegeczes por, levegőn hosszabb idő múlva megnedvesedik és vöröses színű lesz. 0,6 sr. vízben és 3 sr. borszeszben oldható. Hatása, használata, adaga, mint a kalium jodatumé. Előnye az utóbbi fölött, hogy a szívre nem hat károsan.

Gyermekek hörghurutjának leghatásosabb gyógyszer a **Liquor Thiorobini comp. Eibach!**

Vichy Hopital-forrás kitűnő hatású mindenfajta dyspepsiáknál. (L. hird.)

Emsi források „Kränchen“ régóta kit. hat. asthma, hurutok, köhögés, rekedtség, elnyálkás., hyperacid., influenza, köszvény, csúz stb. ellen. (L. hird.)

Asthma bronch.: *Rp.* Gelodurat „Pohl“
scat. orig. c. kal. jod. 0,2.
S. 3-szor naponta 2 dbot.

Natrium jodicum ($NaIO_3$). Fehér, vízben oldh. por. Jodoform helyett hintőpor substantiában fekélyek, ulcus molle és syphiliticum esetén. Sebkezelésben 1:5—10 bórsavval. Bels. 0,1—0,15 napj. 3-szor pilulában serophulosis, asthma bronch. ellen.

Natrium kakodylicum l. Kakodyl-készítmények.

Natrium metavanadinicum, l. Natr. vanadinicum.

Natrium nitricum ($NaNO_3$). A rhomboedriens rendszerbe tartozó, csaknem kockaalakú, színtelen jegeczeket alkot. 1,0 sr. vízben és 50 sr. borszeszben oldható. Használata tévesen olyan, mint a kalium nitricumé; szívre, diuresisre, hőre alig hat. Adag bels. oldatban 0,5—2,0 pro dos. 3—4 × napj.

Natrium nitrosum ($NaNO_2$). Fehér, jegeczes, gyengén lúgos kémhatású, vízben könnyen, borszeszben nem oldódó, hűtő, sós ízű por. Úgy hat és úgy használtatik, mint az amylium nitrosum. Adag bels. oldatban 0,5—2,0:150,0 3—4-szer napj. 1 evők, vagy szükség szerint (angina pectoris és asthma-rohamok alkalmával) 1—2 evőkanállal. Vigyázat. (!)

Natrium nucleinicum. Élesztőből készülő nucleinsav sója. Leucocytozist tud előidézni. Paralysis progressiva eseteiben használják bőr alá fecsk. alakjában (2%-os steriloldatokból 100 gm. kétszerre használandó el).

Natrium perboricum. ($NaBO_3 \cdot 4H_2O$). Fehér kristályos por, vízben nehezen oldódik. Savak vagy $MnSO_4$ hozzáadására oxigént fejleszt. Oxigén-fürdőhöz lehet használni.

H. Natrium phosphoricum ($Na_2HPO_4 \cdot 12H_2O$). Színtelen, áttetsző, hasábos jegeczekből áll; levegőn igen könnyen el-mállik. Íze enyhén sós, kémhatása lúgos. 5,8 sr. hideg vízben, 2 sr. forróban oldódik. Enyhe laxans 20,0—30,0-gmos adagban; adják rhachitis, osteomalacia, közhvény, lithiasis eseteiben is 0,5—2,0—3,0-gmos adagokban, de kevés haszonnal.

809 Rp. Natrii phosphor. 30,0.
Aqua dest. 160,0.
Syrup. mannati 10,0.
MDS. Reggel 2—3-szorra
elfogyasztani. Eny-
he laxans.

810 Rp. Natrii phosphor. 10,0.
Acid. benzoici 1,0.
Aqua dest. 100,0.
Syrup. simpl. 30,0.
MDS. 2 ór. 1 evők.
Közhvény, húgyho-
mok eseteiben

Caps. Amyli nitrosi Egger angina pectoris és asthma-rohamok eseteiben kit. szolgálatot tesznek.

Nucléatol Robin granulé belsőleg: neurasthenia, phosphaturia, neuralgia stb., befecsk.: lázas betegségeknel, praeventive műtétek előtt. (L. hird.)

Biocitin a mai kor legtökél. lecithin-készítménye, kit. hat. rhachitis, osteomalacia, anaemia, chlorosis, neurasth., serophul., ulcus ventric. stb. eseteiben. (L. hird.)

- 811 *Rp.* Natrii phosphor. 1,0—2,0.
 Aquae dest. 100,0.
 Syrup. simpl. 10,0.
MDS. 2 ór. 1 gyk.

Gyermekeknek lithiasis esetében, ha a vizelet savas vegyhatású. Fájdalmas vizeletésnél 2—4 csepp tinct. opii simpl. tehető hozzá.

- 812 *Rp.* Natrii phosphorici 30,0.
 Natrii bicarb. 3,0.
 Acidi citrici 7,5.
 Aquae dest. 500,0.
 M. f. saturatio.

DS. Poharanként. Enyhe la-haj ó.

Natrium pyrophosphoricum ferratum l. Ferri praeparata.

II. Natrium salicylicum ($2NaC_7H_5O_3, H_2O$). Sós és édeses ízű, fehér, jegeczes pikkelyekből álló por. Egyenlő sr. vízben, 6 sr. borszeszben oldható. Antipyreticum. antirheumaticum. Adag porban, oldatban 0,5—1,0 pro dos, 3,0—10,0 pro die. Antipyreticus célból az egyes adagok óránként, polyarthrititis rheum. eseteiben $\frac{1}{2}$ óránként adandók. Hemicrania eseteiben roham kezdetén 1,0—1,5 pro dos. Vastagbélhurut, dysenteria chron. eseteiben bélmosások 1—2%-os oldattal.

- 813 *Rp.* Natrii salicyl. 10,0.
 Aquae dest. 170,0.
 Tinct. Opii simpl. 1,0.
 Syr. cort. Aurant. 20,0.

MDS. 2—3 óra alatt felét elfogyasztani evőkanalanként polyarthrititis rheum. acuta esetén. Két napra való.

- 814 *Rp.* Natrii salicyl. 1,0—2,0.
 Aquae dest. 80,0.
 Syrup. simpl. 10,0.

MDS ór. 1 gyk.
 2—4 éves gyermekeknek heveny lázas fertőző betegségek esetén antipyreticum.

- 815 *Rp.* Natrii salicyl. 10,0.
 Div. in dos aequ. No. 10.

DS. 1-gmos. natr. salicyl. porok.

- 816 *Rp.* Natrii salicyl. 10,0.
 Butyri Cacao qu. s. (15,0).

nt. f. suppos. No. 10.
DS. Napj. 5—6 dbot elhaszn.

Menthocapsol „Skala“, fájdalomcsillapító, különösen bevált ott, hol a salicylatok resorptiv hatása jön tekintetbe. (L. hird.)
Wildungeni Helenen-forrás kit. hat. köszvény, lithiasis, húgyhomok eseteiben. (L. hird.)

Rheumat articul.: *Rp.* Gelodurat „Pohl“
 scat. orig. c. acid. salicyl. 0,25.
 S. 3—4-szer naponta 2 dbot.

H. Natrium silicicum liquidum. Víziveg. Színtelen vagy kissé sárgás színű, lúgos hatású folyadék. Sebészetben contentiv kötések készítéséhez használtatik.

H. Natrium sulfuricum crystallisatum. Glaubersó. ($\text{Na}_2\text{SO}_4, 10\text{H}_2\text{O}$). Színtelen, hasábalakú, csíkos jegecekből áll. Légen könnyen elmállik; íze kesernyés-sós, 3 sr. hideg és 0,4 sr. forró vízben oldható. Bels. 15,0—30,0 pro dos. laxans; 1,0—2,0 pro dos. 3—4-szer napj. idült gyomor-, bélhurut, gyomor-bélatonia, icterus catarrhalis, ulcus ventriculi eseteiben.

H. Natrium sulfuricum dilapsum. Haszn. mint az előbbi.
Sal thermarum Carolinarum. Karlsbadi só. Jegeces és poralakú van. A poralakú a karlsbadi Sprudel-forrás összes alkotórészeit tartalmazza s vízben oldva sok esetben a természetes karlsbadi vizet helyettesítheti. A jegeces só főleg kristályos natr. sulf.-ból áll.

H. Sal Carolinum artefactum. Olcsóbb mint az előbbi s n. azt a szolgálatot teljesíti. Haszn. mint a karlsbadi sóé. Tartalmaz: 220 r. natr. sulf. dilaps., 10 r. kalium sulf., 90 r. natr. chlor., 180 r. natr. hydrocarb.-ot.

817 Rp. Natrii sulfur. dilapsi 10,0.

Pulv. rad. Gentinae 1,0.

M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10.

DS. 3-szor napj. 1 port.

Idült gyomor-, bélhurut, gyomor- és bélatonia eseteiben.

818 Rp. Fol. Sennae 15,0.

Rhiz. Zingib. 2,0.

infunde Aquae ferv. qu. s.

ut. colat. sit 150,0.

in qua solve

Natrii sulfur.

Syr. simpl.

aa 20,0.

MDS. 1—2 ór. 1 evők. Laxans.

Natrium tartaricum ($\text{Na}_2\text{O}_4\text{H}_4\text{O}_6, \text{H}_2\text{O}$). Színtelen, vízben könnyen oldható jegecek. Laxans, mint a kalium tartaricum. Bels. adag 10,0—30,0 vízben oldva.

Natrium telluricum (Na_2TeO_4). Vízben könnyen oldh. fehér por. Hatásos antihydroticum. Este lefekvés előtt 0,05 pro dos. porban.

Natrium thiophenicum. ($\text{C}_4\text{H}_3\text{S}.\text{SO}_4\text{Na}$). Fehér, vízben rosszul oldh. por. Küls. kenőcsben (3,0 : 30,0) prurigo ellen.

Natrium vanadinicum. (NaVO_3). Sárgás, forró vízben oldh. por. Chlorosis, idült rheumatismus, diabetes ellen ajánlják 0,001—0,0025 pro dos. (Vigyázat!) oldatban napj. 2-szer (0,05 : 200,0 napj. 2-szer egy kk.)

Haemalbumin-Lecithin Dr. Dahmen, genuin vérvas lecithinnel idegerősítő tápanyag: chlorosis, plithisis, rhachitis, vérvesztéség, hőszámzavar, lábadózás stb. (I. hird.)

- Neoform.** Oxytrijodphenolbismuth Sárga, enyhe szagú por. Hiutópornak mint a bismutlun subgallicum.
- Neopyrin.** (Valerylamidoantipyrin), fehér, keserű, vízben nem oldh. por. Antipyreticum; haszn. mint az antipyrin, melynél állítólag kevésbé mérges.
- Neraltein.** A phenacetinnel rokon antipyreticum, analgeticum. Haszn. adag mint a phenacetinnél.
- Nesain.** 10% arsen tartalmazó arsenprotein-készítmény. Az atoxyl helyett haszn. bőr alá fecsk. alakjában. Nem ajánlható.
- Nestlé-liszt.** „*Farine lactée Henri Nestlé.*“ König szerint 9·9% nitrogen tartalmú anyagokat, 4·4% zsírt és 42·3% oldható és 35% nem oldható szénhidrátokat tartalmaz. A gyermektáplálisztek egyik legkedveltebbike. Szénhidrátgazdag tápanyag. Haszn. szoptatás alatt, ha az anyatej kevés; de csak a 7-dik hónaptól kezdve ajánlatos, továbbá elválasztáskor az átmeneti időben és később a vegyes táplálkozás támogatására, ha erősebben kell táplálni a gyermeket, végre enteritis acuta és chron. esetén néhány napon át. Felnőtteknek is, ha lábbadozók, aggodnak és hyperemesis gravidarum, ideges dyspepsia eseteiben. Adag pép alakjában gyerm. 1 kk—2 evők. kor szerint. Felnőtteknek több.
- Neurodinum.** (Acetyloxyphenylurethan). Vízben nehezen oldh. fehér, szagtalan jegeczek. Analgeticum, neuralgiák, hemicrania, tabes eseteiben. Adag 1,0—2,0 porban bels.
- Neurogen.** 80% konyhasót, 12% natr. sulfatot, 3% calc. sulfatot, 0·5% vassulfatot tartalmazó fürdősó. Mest. sósfürdők készítésére haszn. Belőle kb. 2%-os sósfürdő készíthető. Teli fürdőre tehát 5 kiló veendő.
- Neurolin.** Syrupus hypophosph. polybrom. Kalium, natrium és ammoniumbromidet tartalmazó hypophosphit szörp. Sedativum. Adag felnőttek napj. 3-szor 1 evők. Gyerm. kk. napj. 2—3-szor
- Neuronal.** Diaethylbromacetamid. Fehér, kristályos, camphor-szagú por; vízben nehezen, alkoholban, olajban jól oldódik. Hypnoticum, sedativum. Adag 0,5—1,0; dühöngő elmebetegnek 2,0—4,0 porban.
- Neutralon.** Aluminiumsilikát vegyület, mely a gyomorban acid. siliciumra és aluminiumchloridra bomlik s így a gyomor só-savát megköti. Ezért és mert a gyomor falához tapad (protectiv hatás) hyperchlorhydria eseteiben jól használható. 3× napj 1 kk. vízzel elkeverve használandó étkezés előtt. Vele parallel mérsékes adagokban extr. belladonnae v. eumydrin is rendelendő.
-
- Nestlé-féle liszt** indicatióit lásd a gyermekek táplálásáról szóló fejezetnél.
- Chiemsee-Szanatorium** és gyógyintézet parti szálloda Prieben (Felső-Bajorország) különös súlyt helyez a szív-, ideg-, emésztési, anyagcsere és női betegségek kezelésére, orvosoknak és hozzátartozóiknak 25—40% engedmény, egész éven át nyitva, magyar előkelő orvosok ajánlják. (L. hird. a látsó belső boríték-old. szemben.)

„Neurolin Balla”

Tonico-sedativum.

Klinikailag kipróbálva, állandó alkalmazásban a legtöbb kórházban, betegsegélyező egyletekben és a kir. magyar tudományegyetem ideg- és belgyógyászati osztályain.

Biztos hatású csillapító és idegzsongító.

Tartalmazza az összes hatékony hypophosphatokat, polybromokkal keverten. Kellemes ízű, miért a legérzékenyebb betegek is szívesen veszik. Bromismust nem okoz, dus hypophosphat-tartalma révén hatása bámulatosan intenzív és gyors. Napi adagja 3 evőkanál.

Ára 3.— korona.

Duplaüveg 5.— korona.

Kórházi csomagolásban kizárólag egyleteknek és kórházaknak 2.— korona.

Változatosság céljából, vagy olyanoknál, kik **syrupot nem tudnak bevenni,** vagy végül **diabetikusoknál** helyette ugyanily therapeutikus hatással adagolható a

Tabulae ferri peptonati bromali Balla,

melynek minden egyes tablettája a legkönyebben oldódó és felszívódó vasat (ferr. peptonat.) tartalmazza tablettánként 0.25 bromsóval keverten. Napi adagja 6—9 tablettá. Ára 3.— korona.

Érdeklődő orvos uraknak kísérleti anyagot bérmentve küld:

BALLA SÁNDOR laboratoriuma
Budapest, VII., Damjanich-utca 58. szám.

Gelodurat „Pohl“

kizárólag csak a bélben oldódó készítmények.

Csak eredeti dobozban, gyári töltésben, meghatározott árakkal, valódi.

Minden oly gyógyszer adagolásánál, melyek a gyomorra vagy a nyákhártyákra bármilyen kellemetlen vagy káros mellékhatást gyakorolnak, nélkülözhetetlenek; mert kizárólag csak a bélben oldódván, tulajdonképeni felszívódási helyén válik a gyógyszer szabaddá, s ott spontán felszívódik.

Fontosabb töltések a gyakorlat szempontjából:

Kal. jodat. 0·2, 0·3, 0·5

Gelocal 0·2 (Kal. jodat. 0·2, Hydr. bijod rubr. 0·002.)

Gelocal 0·5 („ „ 0·5, „ „ „ 0·005.)

Ol. santali 0·3, 0·5.

Ferr. carb. Blaudii.

Scat original.

Klinikák, kórházak állandóan rendelik.

Minden gyógyszertárban kapható.

Magnospirin Balla

(Tabulae magnesii acetylosalicylici Balla).

**Klinikailag kipróbált biztos hatásu
analgeticum, antipyreticum es antirheumaticum**

főleg oly esetekben alkalmazható kiváló eredménnyel, ahol elkerülni óhajtjuk a más ilyenmü gyógyszerek okozta kellemetlen mellékhatásokat. **Acid. acetosalicilic** (Aspirin) helyett alkalmazva hatás tekintetében pontosabb; a gyomor és bélműködést nem zavarja meg, hanem azokat, — ha fennállanak — jótékonyan befolyásolja.

Valamennyi influenza esetben, főleg neuralgiás és reumatikus jellegűeknél, feltétlen sikerrel alkalmazható.

Csak tabletta alakban valódi. Egy doboz ára 1·20 K.

Kísérleti anyagot és irodalmat készséggel küld:

BALLA SÁNDOR laboratoriuma

Budapest, VII., Damjanich-utca 58.

Niauli oleum l. Gomenol.

Nicotinum salicylicum l. Eudermol.

Niccolum bromatum. (NiBr_2). Zöld lemezek, vízben, borszeszben oldh. Hypnoticum, sedativum, Antiepilepticum. Adag bels. syrupban 0,1—0,6 pro dos. és pro die.

Niccolum sulfuricum. ($\text{NiSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$). Zöld, vízben oldh. jegeczek. Hemierania ellen 0,03—0,06 napj. 3-szor.

Nirvanin. Diaethyl-glycocol p-amido-o-oxybenzoésav methylester sósavas sója. Szintelen, vízben oldh. prismák. 2—5%-os oldat helyi anaestheticum, de a cocainnál gyengébb. Haszn. a kis sebészetben s a fogászatban. A sértetlen bőrt csak subcutan alkalmazva érzésteleníti. (2%-os oldat). Schleich-eljáráshoz 0,1—0,5%-os oldat. Szemészek nem haszn. izgatja a kötőhártyát.

††H. Nitroglycerinum in spiritu solutum. [$\text{C}_3\text{H}_5(\text{NO}_3)_3$] + Alk. [$\text{C}_3\text{H}_5\text{NO}_3$]. A glycerinitrát 1%-os borszeszes oldata. Hatása, használata, mint az amylium nitrosumé és a natr. nitrosumé. Adaga 3 cseptől pro dos. emelkedőleg 10 cseppig pro dos. Dos. max. pro dos. 0,0005! pro die 0,003! a tiszta nitroglycerinre vonatkoztatva.

††H. Pastilli Nitroglycerini. Egy-egy db 0,0005 nitroglycerint tartalmaz. Adag napj. 3—5 db. Fölöslegessé teszi az összes efféle specialitásokat.

819 Rp. Solut. alcoh. nitroglycer. 1% gtt. 15.
Aqua. destill. 150,0.
MDS. Naponta 4—8 evők.

820 Rp. Pastilli Nitroglycerini sec. Pharm. hung. No. 30.
DS. Suo nomine. Napjában 3—5-ször egy dbot.

Nosophenum. (Tetrajodphenolphthalein) Antisepticum sebekelésben. Hintőpor talcummal v. tisztán eczema, intertrigo, balanoposthitis, herpes proenitalis, ulcus molle esetén. Kenőcs vaselinnel v. lanolinnal égési sebekre stb. Befűvások orr- és garatbántalmak ellen. Vele állítják elő az *antinosint* (natrium-tetrajodphenolphthalein) és az *eudoxint* (bismuth-tetrajodphenolphthalein). *Antinosinból* hintőpornak mint az *nosophenből*; oldatnak 1 : 500—1000 hólýagmosásra, 0,5—2,0 : 100 orr, lúgyeső kifecskendésére. Bels. 1,0—2,0 : 150,0 ór. evők. *Eudoxinból* adag bels. 0,3—0,5 pro dos. porban.

Novargan. Fehérjés ezüstösszeköttetés. Olyan, mint az arg. proteicum. Utóbbi fölöslegessé teszi.

Novaspirin. (Methyleitrom av disalicylestere.) Fehér, szagtalan, savanykás, vízben alig old. por. Tart. 64% salicylsavat. Haszn. adagolása, mint az aspiriné.

Hygiama saporis suavis causa diu facile sumitur et libenter.

Algocratin megbízh. antipyret., analg., antineuralg., specif. dysmenorrhoea, neuralgia, migrén, ischias stb. ellen. (L. hird.)

Novocain. Aránylag olcsó helyi anaestheticum. Cocainpótszer. Szöveteket nem károsítja; szívre, légzésre alig hat, mydriasiát nem okoz. Színtelen, hideg vízben 1:1 oldható tűcskák. Bomlás nélkül sterilizálhatók oldatai. 6-szor kevésbbé mérg., mint a cocain. Suprareninnel együtt haszn. (Kocher) szöveti, infiltrációs, medullaris, szemészeti, rhino-laryngeális és fogorvosi anaesthesia céljaira. A leghísebb gyár novocain-suprarenin tablettákat hozott forgalomba, melyek előírt mennyiségű steril physiol. konyhasó-oldatban v. steril vízben oldandók fel. Kész steril oldatok ampullákban is kaphatók különböző célokra. Adag: 0,1:5—10—50 physiol. konyhasó-oldatra + suprarenin oldat (1:1000) 5—10 csepp.

Novojodin. (Keverék = r. Hexamethylentetramindijodid + talcum.) Jodoformpótszer. Néha már is, ezért vigyázat a mennyiséggel (!)

Novorenal. Ampullákban készen kapható keveréke novocainnak és adrenalinnak. Helybeli anaestheticum. Főleg fogászok használják.

Nuclein l. *Phagocytin Richter*. Nucleinsavas natriumot tart. (0,15 egy darabban) tablettákat készít Dr. Richter tablettae nucleinae Richter néven.

Nutrose. Tehéntejből készül. A casein könnyen oldható natrium összeköttetése. Ételekhez teendő hozzá mint tápszer (tejhez, chocolatehoz, leveshez, rizshez, darához stb.). 1 klg. megfelel 4 klg. hús tápértékének. Elgyengült betegek, reconvalescensek táplálását javítani van hivatva. A leghísebb gyár állítja elő. Adag: felnőtteknek 3—4-szer napj. 1 kk. gyermeknek 1—2 gm.

H. Nux moschata. Szerecsendió. (*Myristica fragrans*. Myristicaceae). Hatóanyaga illatos olaj. Carminativum, szagjavító. Hevenyész hólyaghurutban csökkent a vizeelési ingert. Adagja naponta 3—4 késhegygyel porából.

†**H. Nux vomica** (*Strychnos nux vomica* magvai.) Hatóanyagai: strychnin, brucin. Dos. max. pro dos. 0,1! pro die 0,2! Készítményei haszn.:

††**H. Strychninum nitricum** ($C_{21}H_{22}N_2O_2 \cdot HNO_3$). Finom, fehér, selyemfényű kristályokból áll, 90 sr. hideg és 3 sr. forró vízben, 70 sr. hideg és 5 sr. forró borszeszben, 26 sr. glicerinben oldható. Oldata igen keserű. Körzeti és központi

Sanatogen (glycerin-foszfors. casein) erősítő szer hysteria és neurasthenia eseteiben. (L. hird.)

Novo-Robiol (Novocain-Paraneplrin) kiváló steril injectiós anaestheticum, gyorsan hat, megrend.: Chem.-techn. Labor. Dr. G. Robisch, München. (L. hird.)

Nucleatol Robin granulé belsőleg: neurasthenia, phosphaturia, neuralgia stb., befeesk.: lázas betegségeknel, preventive műtétek előtt. (L. hird.)

motor. hűdések (különösen zárizomhűdések) esetén, azután a szemészetben bőr alá fecskendés alakjában adag 0,001—0,01! Dos. maxim. pro die 0,02!

†II. **Extractum Nucis vomicae.** Borszeszes kivonat. 16% alkaloidát tart. Kis adagban bels. mint amarum, tonicum; nagyobb adagokban hűdések esetén. Adag pilulában, porban 0,01—0,05! Dos. maxim. pro die 0,1!

†II. **Tinctura Nucis vomicae.** Haszn. mint az extr. nucis. Alkaloidtartalma 0,25%. Adag bels. 2—5—10! csepp pro dos. 2—3-szor napj Dos. maxim. sing. 1,0! Dos. maxim. pro die 2,0!

821 Rp. Strychnini nitr. 0,05.
Aquae dest. 10,0.
M. f. solut. filtra.

DS. Bőr alá fecskendésre.
ub. sigillo. Sub signo
veneni. Az orvos
kezéhez. Egy fecs-
kendőben 0,005.
strychn nitr.

823 Rp. Tinct. Nucis vom. 5,0.
Tinct. Chinae comp.
Tinct. Rhei Darelli
aa 75,0.

MDS. Naponta 2 kávésk.
Stomachicum.

825 Rp. Extr. Nucis vom.
0,03—0,05.
Aquae dest. 100,0.
Syrup. simpl. 15,0.

MDS. 2 ór. 1 kk. v. gyk.
1 5 éves gyermek-
nek prolapsus ani
esetén.

822 Rp. Extr. Nuc. vom. 0,1.
Natrii hydrocarb. 2,0.
Pulv. rad. Rhei 1,0.
Sacch. albi 2,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No 10.

DS. 3 ór. 1 port.
Gyomorhurut.

824 Rp. Tinct. Nucis vom.
Tinct. Opii crocat.
aa 3,0.
Tinct. Chinae comp.
10,0.

MDS. 3—4-szer napj. 15—
20 cseppet. Diar-
rhoea.

826 Rp. Extr. Nucis vom. 0,2.
Ferri lactici 2,0.
Sacchar alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.

DS. 2—3-szor napj. 1 port.
Hűdések, impotentia.

Stoll dietétikus Kola-készítményei: Kola-bor, Kaiser-kola-elixir, Kola-elixir, Kola-granulée stb. kitűnő gyomorzsongító és idegerősítő szerek. (L. hird.)

**Nural diet. digestivum és mesters. megemésztett tápláló és erő-
sítő szer,** kit. hatású gyomorbajoknál, anaemia, chlorosis, recon-
valesc. phthisis, cachexia, hyperemesis eseteiben. (L. hird.)

Biocitin a mai kor legtökél. lecithin-készítm., kit. hat. rhachit.,
osteomal., anaemia, chloros., neurasth., serophul., ulc. ventric.
stb. eseteiben. (L. hird.)

827 *Rp.* Tinct. Nucis vom. 2,0.
 Tinct. amarae
 Tinct. Chinae comp.
 Tinct. Cort. Aurant. aa 20,0.
MDS. Ebéd előtt 1 kk. Stomachicum. Úgyn. Csodacseppek.

Odda. Gyermektápszer. Sárgásbarna por. Édes, jóízű. Tartalmaz: zsírtalanított tejport, tojássárgát, cacaovajat, lisztet, czukrot. Vízben felfőzve és tejhez keverve haszn. Utasítás a dobozon.

Olea aetherea.

H. Oleum Anisi.	}	Szagjavítók.
H. Oleum Aurantiorum flor.		Elaeosaccharum
H. Oleum Caryophyllorum.		készítéséhez használtatnak.

Oleum Chenopodii anthelminthici aeth. Nematoda-ellenes szer (ascarisok). Adag czukros vízben 8—15 csepp gyermekeknek napj. 3-szor. Utána hashajtó. Lehet emulsióban is adni.

828 <i>Rp.</i> Olei Chenap. anthelm.	829 <i>Rp.</i> Olei Chenopod.
aeth.	anthelm. aeth. 10,0.
Pulv. Gummi arab.	Vitellum ovi unius.
aa 5,0.	Aquae dest. 150,0.
Aquae Melissae.	Syr. Amygdal. 10,0.
Syrupi Aurant. aa 45,0.	M. f. emulsio.
M. f. emulsio.	<i>DS.</i> Napj. 3×1 evők.

DS. Napj. 3×1 evők.

H. Oleum Cinnamomi Cassiae. Szagjavító. Elaeosaccharum készítéséhez haszn.

H. Oleum Citri. Szagjavító. Elaeosaccharum készítéséhez haszn.

H. Oleum Eucalypti l. Eucalypti folia.

H. Oleum Foeniculi. Szagjavító. Elaeosaccharum készítéséhez haszn.

Oleum Gaultheriae. Gaultheria procumbens (Ericaceae) illó olaja. Színtelen, légen megpirosodó, kellemes illatú, édeses ízű folyadék. Hatóanyaga methylsalicylsav (90%). Salicyl. helyett polyarthrititis rheum. ellen. Adag 10—20 csepp 2—3 ór. caps. gelat.-ban, borban, tejben. Natr. salicyl. fölött előnyei nincsenek, melléktünetek mint az utóbbinál. Küls. fertőztelenítő száj- és torokvizekbe

Anchylost. duod.: *Rp.* Gelodurat „Pohl“
 scat. orig. c. Ol. Chenopod. XII.
 c. Menthol.
 S. 3-szor naponta 2 dbot.

Menthocapsol „Skala“, fájdalomcsillapító bedörzsölés, reumat. articulorum acut. et chron. eseteiben. (L. hird.)

830 Rp. Olei Gaultheriae gtt. 15.
 Det. in caps. gelat.
 Dent. tal. dos. No. 10.
 S. 2—3 ór. 1 tokot be-
 venni. Polyarthri-
 tis rheumatica.

831 Rp. Spirit. vini dil. 100,0.
 Acid. benzoici 3,0.
 Tinct. Eucalypti 15,0.
 Olei Gaulther. gtt. 25.
MDS. 2 kk. egy pohár vízre.
 Száj- és torokvíz.
 Diphtheritis faucium.

832 Rp. Olei Gaultheriae
 in caps. gelat. Hazs-
 linszky
 lagen originalem.
DS. Napj. 2-szer 2 szemet.

H. Oleum Juniperi. Küls. bőrizgató. Bels. diureticum. Adag
 bels. 2—4 csepp czukorra cseppentve, v. cognacban, v. más
 szeszes oldatban.

833 Rp. Olei Juniperi 3,0.
 Ungn simpl. 30,0.
 M. f. ungu.
DS. Bőrizgató kenőcs.

834 Rp. Olei Juniperi 2,0.
 Tinct. Digitalis 5,0.
 Spirit. Aetheris 13,0.
MDS. 3 ór. 20—30 cseppet.
 Diureticum.

H. Oleum Lavandulae.

Oleum Macidis.

Oleum Majoranae.

H. Oleum Menthae pip.

} Szagjavítók. Elaeosaccha-
 rum készítéséhez haszn.

H. Oleum Pini silvestris pro inhalatione. Az Ol.
 terebinthinae helyett 10—25 csepp forró vízre cseppentve
 belégzendő idült légcső-, hörghurut esetén, ha sok a vá-
 ladék.

H. Oleum Rosae. Szagjavító. Elaeosacchar. és Mel. rosatum
 készítéséhez haszn.

H. Oleum Rosmarini. Szagjavító.

Idült légcső- és hörghurut esetén a legjobb hatást
 fejt ki a **Liquor Thiorobini comp. Eibach!**

Ozofluin remek illatú, fenyőlevél-fürdő készítéséhez gyönyörű
 fluoreszcenciával, a közöns. fenyőlevél-fürdők helyett. (L. hird.)

Anchylost. duod.: Rp. Gelodurat „Pohl“

(gyermekek részére) scat. orig. c. Ol. Chenopod. V.
 c. Menthol.

S. 3-szor naponta 1—2 dbot.

Pivako hatásos int. antigen., bals. copaivae és extr. cubebae
 emulsiója, fok. a vizelet aciditását, oldó. (L. hird.)

Vesicaesan-labdacsok tart. a Fol. uvae ursi összes ható-
 anyagait, bevált hólyag-fertőt. acut és idült gonorrhoeánál,
 gyomorra és vesékre káros mellék. nincsen. (L. hird.)

Oleum Santali ligni. Santalum album fa illatos olaja. Hurutellenes szer. Különösen bronchitisek s acut gonorrhoea esetében 10—20 csepp gelatin-capsulában 3—4-szer napj. jó sikerrel adható.

†II. **Oleum Sinapis aethereum** l. Sinapis semina.

Oleum Succini rectificatum. Bals. vitae Hoffmanni készítéséhez haszn.

II. **Oleum Terebinthinae rectificatum.** Színtelen, híg, közömbös kémhatású, fenyőszagú, csipős, égető ízű illó olaj. Küls. tisztán v. kenőcsben (1:3) a bőrre dörzsölve bőrvörösítő, tisztán beecsetelve haemostaticum. Belégezve (15—30 cseppet forró vízre cseppentve) légső-, hörghurutnál az elválasztást csökkenti. Bels. hurutellenes, haemostaticum, anodynum, excitans, diureticum. Adag 5—10—15 csepp pro dos. 2—3 ór. capsula gelatinosában, electuáriumban, v. egyszerűen czukorra cseppentve. Heveny phosphormérgezésnél *nem retificált ú. n. francia terpentin adandó* mint vegyi ellenszer 15—20—30 cseppnyi adagokban (??).

835 *Rp.* Olei Terebinth. 20,0.
Olei camphor. 40,0.
M. f. linim.

D.S. Külsőleg.
Bőrvörösítő.

836 *Rp.* Olei Terebinth.
gtt. 10.
Det. in caps. gelat.
Dent. tal. dos.
No. 20.

S. 3—4-szer napj. 1 db.
capsulát.

837 *Rp.* Olei Terebinth. 5,0.
Cerae alb. 15,0.
Sacchar. alb. qu. s.
ut f. l. a. pillul.

No. 100.

Consp. pulv. Cinnam

D.S. 3—4-szer napj. 5—10
szemet.

Cystitis chron. Go-
norrhoea chron.
eseteiben.

838 *Rp.* Olei terebinth.
Olei Amygdalar. dulc.
aa 5,0.
Mucil. Gummi arab.
Syrup. simpl. aa 20,0.
Aquae dest. 200,0.
M. f. l. a. emulsio.

D.S. 1/2 ór 1 evőlk.
Haemoptoë.

Oleum Valerianae. Zöldessárga v. barna, kissé sűrű, savanyú kémhatású, átható szagú illó olaj. 100 sr. vízben oldódik, bor-

Eumictine kapsz. (Santalol 0,20, Salol 0,05, Hexamethyilentetramin 0,05) antigon., diuret., antisept., 8—10 kapsz. pro die. (L. hird.)

Légső- és hörghurutnál az elválasztás csökkentésére a legjobb szer a **Liquor Thiorobini comp. Eibach!**

Szlatvini Anna-gyógyforrás litiumban legdúsabb ásványvíz, legkell. üdítő, legh. húgyhajtó és húgysavoldó gyógyvíz, nyálkahiártya-, hólyag- és tüdőhurutnál kit. bevált. (L. hird.)

Bronchitis: *Rp.* Gelodurat „Pohl”

scat. orig. c. Ol. Terebinth. rect. 0,5.

S. naponta 3—6 dbot.

szeszben minden arányban. Antispasmodicum. antihystericum. Bels. adag 1—3 csepp pilulában, capsula gelatinosában.

Zsíros és egyéb nem illó olajok.

H. Oleum Amygdalarum l. Amygdalae dulces.

Oleum Anda-assu. Johannesia princeps (Vell.) magvaiból préselt zsíros olaj. Szintelen, átlátszó, szag- és íztelen olaj. Ricinusolaj pótszere. Hashajtó adag 50 csepp.

H. Oleum Cacao s. Butyrum Cacao. Végbélesapok alapanyagául szolgál.

H. Oleum Cadinum s. Ol Juniperi empyreumaticum. Sötétbarna, sűrű, kátrányos, füstös szagú folyadék. Bőrgyógyászatban a pix liquida helyett mint bőrizgató és antiparasiticum használtatik psoriasis, prurigo, idiült eczemák, herpes tonsurans, favus, scabies ellen. Bels. nem.

839 Rp. Olei Cadini
Olei Sesami \overline{aa} 50,0.
MDS. Külsőleg.

841 Rp. Empl. diachylon
simpl.
Ungu. emoll. \overline{aa} 25,0.
Olei Cadini 5,0.
M. f. ung.
DS. Kenőcs.
Gyermekeknek prurigo
esetén.

842 Rp. Sulfur. sublim. loti
Olei Cadini \overline{aa} 50,0.
Sapon. kalini venalis
Axung porci \overline{aa} 100,0.
Pulv. Cretae alb. 10,0.
M. f. ung.
DS. Módosított Wilkin-
son-kenőcs.

840 Rp. Olei Cadini 2,0.
Sapon. kalini
Ungu. simpl. \overline{aa} 50,0.
M. f. ung.

DS. Kenőcs. Sörteecsettel
vékonyan ecsete-
lendő a beteg bőr-
felületre.
Gyermekeknek herp.
tons., favus esetén.

843 Rp. Olei Cadini
Sapon kalini \overline{aa} 20,0.
Spiritus 40,0.
MDS. 2-szer napjában szőr-
ecsettel beecse-
telni.
Idült eczema.

Joricin (jóízű ricinusolaj) a legjobb hashajtó!

Valerianate de Pierlot görcs-esillapító és idegmegnyugtató-
szer neurosisok, neuralg., neurasth., ideges rángások, szívgör-
csők, epileps. és hyst. rohamok ellen. (L. hird.)

Eucadolum, szagtalanít. Ol. cadinum; nem izgatja a bőrt,
mert a könnyebben illó empyreumat. alkatr. el vannak távolítva.

Ester-Dermasan, kátrány-dermasan, elchrysarobin-dermasan be-
vált szerek eczema, prurigo, psoriasis, pytiriasis ellen. (L. hird.)

844 Rp.	Olei Cadini	10,0.
	Hydrargyri oxyd.	
	flavi	1,0.
	Vasellini	30,0.

MDS. Kenőcs.
Pityriasis

H. Oleum camphoratum l. Camphora.

Oleum Chaulmoograe. A Gynocardia odorata magvaiból nyert zsíros olaj. Hatóanyaga a gynocardiasav. Lepra és scrophulosis ellen linimentum és injectiók alakjában. Linimentum 1:10—20 olajra. Injectio 0,1—0,2 tiznaponként. Bels. 4 csepptől 20 cseppig emelkedőleg pro die (tejben v. fejetben).

H. Oleum chloroformiatum. Ol. sesami + Chloroformium aa.
Küls. bedörzsölésre.

+H. Oleum Crotonis l. Crotonis semina

H. Oleum Fagi empyreumaticum s. Pix Fagi liquida
s. Bitumen Fagi l. Pix liquida.

Oleum Gomenoli l. Gomenol.

Oleum Gynocardiae l. Ol. Chaulmoograe.

H. Oleum Hyosciami foliorum coctum l. Hyosciami folia.

H. Oleum Jecoris Aselli. Csukamájolaj. Minden zsíros olaj közt legkönnyebben emészthető. Tápanyag rhachiticus, görvélyes (erethicus alak) gyermekeknek, gümőkórosoknak. Ellenjavalt láznál és gyomor-bélbajok eseteiben. Adag gyermekeknek napj. 2-szer 1 kk., felnőtteknek 2-szer 1 gyk. v. 1 evők., mindig étkezés közben, soha éhgyomorra. Készítenek *Ol. jec. aselli cum lecithino*-t is. Újabban az Ol. jecorist *emulsiók* alakjában, vagy különböző aromás anyagokkal *szagosítva* is forgalomba hozzák. Mindezen készítmények elég jól használhatók, de nélkülözhetők.

Jogadin jóízű csukamájolaj!

Eucadolum, szagt. Ol. Juniperi empyreum., s. Ol. Cadinum, nem izgatja a bőrt, mert a könnyebben illó empyreum. alkatr. el vannak távolítva.

Egger Emulsio kit. csukamájolaj-készítm., c. 5% Thiocol, c. 5% Ovocleithin, c. Phosphoro 0.01 ad 100.00 emulsio.

Phosphatine Faliéres kit. tápláló. és csontképzőszer rhachitikus, scrophulotikus gyermekek részére. (L. hird.)

Nem avasodik!


Nem okoz émelygést, sem felbőfögést!



JOGADIN

meglepően kellemes ízű

CSUKAMÁJOLAJ.

99% elsőrendű csukamájolaj tartalommal  Kiváló hatása közismert!

Gyenge fejlődésüeknél, vérszegényeknél az étvágyat fokozza, a testsúlyt gyarapítja, az egész szervezetet élénkíti és erősíti.

1 üveg 200 gramm ára K 1.90

Készítik: Basch Ernő és Szamocsy Gyula
gyógyszerészek Budapest, VIII. Rákóczi-ut 25.

Morphin-Dionin-SCOPolamin-Injectiók.

MODISCOP

Dr. Schlesinger Hermann egyet. tanár előírása szerint.

Javaltatok: Általában az összes fájdalmas affekcióknál, különösen organikus ideg megbetegedéseknél, neuralgiák, neoplasmák stb. eseteiben

morphin befecskendezések helyett
továbbá

morphin-elvonó-kurákhoz.

Előnyei: nem áll be megszokás, exact adagolás és eltarthatóság
Irodalmat és mintákat
szívesen bocsát az orvos urak rendelkezésére
az egyedüli készítő:

**Brady Károly gyógyszerész, Wien I. Rotenturmstrasse 18.
Fleischmarkt sarok.**

PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

TH. DEFRESNE, PARIS

**Pancréatine
Defresne**
poralakban

**Pilules
Defresne à la
Pancréatine**
keratinisées

Jav.: dyspepsiák
(hypo- és hyper-
aciditással), into-
lerantia tej és
zsíros ételek
iránt, a hasnyál-
mirigy elégtelen
működése esetei-
ben czukorbajo-
soknak igen aján-
latos.

**2-szer, 3-szor
naponta az
üveghez
mellékel
kanálkával**

**2-4 labdacs
a két fő-
étkezés után**

Kapható minden nagyobb gyógyszerertárban.
Irodalmat és mintákat küld a vezérképviselő:

René Blanpin, Wien, IV, Wiedener Gürtel 26a.

845 Rp. Olei Jecoris Aselli 250,0.
 Sacchar. alb. pulv. 20,0.
 Natrii chlorat. pulv. 10,0.
 Rhum. 60,0.
MDS. Haszn. előtt össze-
 rázandó.
 Felnőttnek 3 × napj.
 1—2 gyk. v. evők.

846 Rp. Olei Jecoris Aselli
 Olei Cadini aa 30,0.
MDS. Külsőleg. Lichen
 scrophulosorum-
 nál napj. egyszer
 a beteg bőrre dör-
 zölni.

H. Oleum Juniperi empyreumaticum l. Ol. Cadinum.

II. Oleum Lauri pressum. Friss babérmagvakból sajtolt
 zöld, lágy, kenőcshez hasonló, szemcsés, babérszagú olaj.
 Kenőcsökhöz kül. hajkenőcsökhöz mint alapanyag haszn.

II. Oleum Lini l. Lini semina.

Oleum Melaleuca }
 Oleum Niauli } l. Gomenol.

††**H. Oleum phosphoratum l. Phosphorus cz. a.**

H. Oleum Ricini. A ricinus communis magvaiból sajtolt, át-
 látszó, kissé sűrű, majdnem színtelen v. sárgás, sajátos
 szagú és ízű zsíros olaj. Laxans. Adag 20,0—30,0 pro dos.
 (1—2 evők.) Kellemetlén ízét javítjuk, ha a kanálban levő
 olajra néhány csepp rumot v. citromnedvet öntünk. Rendel-
 hető tisztán v. emulsióban, sörben v. kapszulában (az utóbbiakat
 különböző adagokban készletben is tartják nagyobb forgalmú
 gyógytárak).

847 Rp. Olei Ricini 30,0.
 Pulv. Gummi arab. qn. s.
 Aquae dest. 180,0.
 Syrup emuls. 20,0.
 M. f. l. a. emulsió.
DS. 1 óra alatt 3-szorra
 bevenni.

848 Rp. Olei Ricini
 Syrupi mannatī aa 10,0.
MDS. 2 ór. (felrázva) 1 kk.
 v gyk. a hatás be-
 következtéig.
 Csecsemőknek v. 1—3
 éves gyermeknek.

Oleum Rusci rectif. s. Pix liquida betulina. Nyirkát-
 rány. Illegan folyó, átható bagaria szagú, sötétbarna anyag.
 Haszn. a bőrgyógyászatban kül. mint bőrizgató és anti-

Joricin (jóízű ricinusolaj) a legjobb hashajtó!

Psoriasis, herpes tons., scabies ellen kit. hat. a Lysoform-
 kenőcs, 5—10—15% Lysoformvaselinnel vagy vasogennel.

Rüger-féle erő-kakao és csokoládé a legjobb pótléka a
 csukamájolajnak, kit. erősítő tápl. scroph. gyermekek v. (L.
 i .)

parasiticum psoriasis, prurigo; idült eczemák, herpes tonsurans, favus, scabies ellen pix liquida v. ol. cadin. helyett.
Bels. nem.

849 *Rp.* Olei Rusci rectific. 25,0.
Spirit. aether. 10,0.
Olei Lavand. gtt. 2,0
M. f. linim.

DS. Bőr beecsetelésére.

850 *Rp.* Olei Rusci rectific. 30,0.
Spirit. vini conc. aa 4,0.
Olei Lavand.
Olei Rutae
Olei Rosmar. aa gtt. 20

MDS. 2-szer napj. sörteccsettel bőrre dörzsölendő psoriasis ellen.

H. *Oleum Sesami.* Olcsó zsíros olaj.

Olibanum. Tömjén. A *Boswellia papyrifera* megszáradt mézgyantája. Borsónyi, fehéres-sárga, enyhe szagú, áttetsző darabok. Emplastrumok alkotórésze.

H. *Ononidis spinosae radix.* (Papilionaceae). Hatóanyagát pontosan nem ismerjük. Diureticumnak mondatik (?) Adag decoct. 15,0—20,0 : 150,0 2 ór. 1 evők. Gyakran más diureticus szerekkel kötjük össze.

Oophorin l. Ovariumkészítmények.

†H. *Opium.* *Papaver somniferum* gyümölcsének tejnedve. Főbb hatóanyagai: morphinum (pontosan 10% legyen), codeinum (0,3—0,5%), thebainum (0,2—1,0%), narceinum, narcotinum, papaverinum. Anodynum, anaestheticum, hypnoticum, antispasmodicum, antidiarrhoeicum. Colica saturnina eseteiben nagy adag a fájdalmakkal együtt a székszorulást is megszünteti, diabetes mellitushnál nagy adagok erősen csökkentik a cukorkiürülést. Adag bels. porban, pilulában igen különböző; fájdalmak, köhögési inger, hasmenés csillapítására 0,01—0,02 pro dos 3—5× napj.; hypnoticus, antispasmodicus czélból, v. colica saturn és diabetes mellitushnál 0,03—0,10 pro dos. Dos. maxim. sing. 0,15! pro die. 0,5! Gyermekeknél nagy vigyázat. L. táblázat (!!)

Pantopon, l. e. czím alatt.

Myrticol „Csatádi“ igen kell. ízű guajacol-áfonya-készítm., tüdőbetegség gyomorzavarai és bélbántalmai ellen specificum. (L. hird.)

Chiemsee-Szanatorium és gyógyintézet parti szálloda Prienben (Felső-Bajorország) különös súlyt helyez a szív-, ideg-, emésztési, anyagcsere- és női betegségek kezelésére, orvosoknak és hozzátartozóiknak 25—40% engedmény, egész éven át nyitva, magyar előkelő orvosok ajánlják. (L. hird. a hátsó belső borítékold. szemben.)

†H. **Extractum Opii.** Beszárított vizes kivonat. Morphin-tartalma pontosan 20% legyen. Hatás, használat, mint az opiumnál. Még egyszer oly hatékony, mint az opium. Adag bels. porban, pilulában *felénni*, mint az opiumból. Dos. maxim. sing. 0,1! pro die 0,3! Gyermekeknek nem!

†H. **Tinctura Opii simplex.**

†H. **Tinctura Opii crocata.**

Mindkettő egyenlő mennyiségű opiumot tartalmaz és pedig pontosan 1%-ot. Hatás, használat, mint az opiumnál. Bels. kis adag 5—10 csepp pro dos. 3—5 × napj., nagy adag 10—20! csepp pro dos. 3—5 × napj. Dos. maxim. sing. 1,5! pro die 5,0! Gyermeknek az adagokat a táblázat mutatja (l. ott).

†H. **Pulvis Doveri.** (Opium 5 r. + pulv. rad. ipecac. 5 r. + sachar. 40 r.) Morphin-tartalma pontosan 1%. Expectorans, köhögést csillapító, antidiarrhoeicum. Adag porban, pilulában 0,1—0,3 pro dos. ór. v. 2 ór. Dos. maxim. sing. 1,0! pro die 5,0! (Gyerm. l. a táblázatot).

††H. **Morphinum hydrochloricum** ($C_{17}H_{19}NO_3 \cdot HCl \cdot 3H_2O$). Vékony, tűalakú, gyakran kéve módjára egyesült, selyemfényű jegecekéből, v. kockaalakú, kristályos tömegekből áll. Íze igen keserű. kémhatása semleges. 20 sr. hideg, majdnem egyenlő sr. forró vízben és 50 sr. borszeszben oldható. Hatása, mint az opiumé. Küls. fájdalomcsillapító kenőcsnek szokásos ugyan, de nem használ. Bels. porban, pilulában, suppositoriumban, oldatban, bőr alá fecskendés alakjában kis adag 0,005—0,01 pro dos. 3—5-ször napj., nagy adag 0,02—0,03! pro dos. 3—4-szer napj. Dos. maxim. pro die 0,10! Gyermekeknek nem!

Morphinum methylobromatum. Fehér, vízben jól oldh. jegecek. A morphin. hydrochlor. fölött előnyei nincsenek. Hatása u. az., de nagyobb adagokat kell adni. Némelyek szerint 10-szer nagyobb adagokat is jól tűrik a betegek. Adag felnőtteknek: 0,05—0,2 gm. porban vagy 5% oldat cseppeknek s ebből 20 csepp veendő egyszerre. Bőr alá 5%-os oldatból 2—5 köbctm. használható el.

††H. **Codeinum hydrochloricum.** ($C_{17}H_{19}(CH_3)NO_3 \cdot HCl \cdot 2H_2O$). Fehér, finom, keserű ízű, vízben könnyen oldódó hasábos alakú kristályok. Hatás, haszn. mint a codeinnél. Adag bels. 0,03—0,05 pro dos. pilulában, porban, oldatban. Bőr alá 0,02—0,03 pro dos. Dos. max. sing. 0,5! pro die 0,3!

Narceinum ($C_{23}H_{29}NO_3 \cdot 2H_2O$). Fehér, prismaticus tűkből álló jegecek; hideg vízben, hideg borszeszben nehezen, forró víz- és borszeszben könnyen oldódik. Hatása mint a morphiné; csak kissé gyengébb, de kellemetlen mellékhatása is kevesebb. Bels. mint hypnoticum 0,05—0,1 pro dos.; mint sedativum,

Modiscop, morphin-dionin-scopolamin-injectiók Schlesinger tr. sz., morphin-befecsk. helyett, előnyei: *nincs megszokás, exact adagolás és eltarthatóság, gyors hatás, igen alk. morphiumpiegvonó kúrákhoz.* (L. hird.)

anodynum, antispasmodicum 0,02 pro dos. 3—5-ször napj. porban, pilulában v. eczetsav segélyével készített oldatban. 3—4 éves gyermeknek tussis convulsiva esetén 0,01—0,015 lefekvés előtt. (LABORDE.)

Narcotinum. [$C_{21}H_{23}NO_7$] Az opium egyik alcaloidja. Színtelen, hosszú tűk, hideg vízben nem oldh. A *N. hydrochlor.* és *N. sulfuricum* vízben oldh. Nem narcoticus hatású, tehát morphin helyett nem haszn. Ujabban *antimalariás* hatását dicsérik. Adag porban 0,1—0,2 napj. többször. Pro die 1,0. Ha rendeljük, sóit válasszuk.

Dioninum hydrochloricum l. Aethylmorphinum hydrochloricum.

Heroinum hydrochloricum. Morphindieczetsavester. Fehér, jegeezes, vízben jól old. por. Morphin és codein pótszere. Főleg mint köhögéscsillapító és antiasthmaticum. Anodyn és hypnoticus hatás kétes. Adag 0,003—0,005 pro dos. napj. 2—3-szor porban. Magasabb adagok néha kellemetlen tüneteket okoznak.

Peronin. Sósavas benzoylmorphin. Fehér, tömeges, vízben jól oldh. keserű por. Morphin és codein pótszere, főleg köhögéscsillapító. Adag: 0,02—0,04 napj. 2—3-szor oldatban, porban.

Pantopon l. e. cz. a.

Apomorphinum hydrochloricum l. Apomorphin.

851 *Rp.* Opii pulv. 0,1.
Sacchar alb. 5,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.

DS. Napj. 3—4-szer egy port.

852 *Rp.* Extr. Opii 0,05.
Alumin pulv. 2,0.
Elaeosacch. Menthae 3,0.

M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10.

DS. 2 ór. 1 port.

Diarrhoea.

853 a) *Rp.* Opii pulv. 0,6.
Pulv. et extr. Liquir. aa qu. s.
ut f. l. a. pilul. No. 30.
Consp. pulv. Lycopod.

DS. Diabetes mellitus esetén napj. 3 × 1 pilulát, majd emelkedőleg egészen 3 × 3 szemig napj. Egy pilulában 0,02 opium.

854 *Rp.* Extr. Opii 0,05.
Butyri Cacao qu s ut f. l. a. supposit. No. 5.

DS. Naponta 2 × 1 csap alkalmazandó.

Végbél- és hólyag-tenesmus, prostatitis, acut gonorrhoea eseteiben.

855 *Rp.* Tinct. Opii simpl. Chloroformii aa 5,0.
MDS. Fogeseppek.

Wildungeni Georg Viktor-forrás kit. hat. prostatitis, gonorrhoea ellen. (L. hird.)

Ascher-féle javított mesterséges fogzománczot szállít a General Dental Manufacturing Co. m. b. H., Berlin W/S., Jägerstrasse 61. (L. hird.)

- 856** *Rp.* Extr. Opii 0,05.
Sulfur. aurat. Antimon. 0,5.
Natrii hydrocarb. 3,0.
Sacchar. alb. 2,0.
M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10.
DS. 2 ór. 1 port. Köhögés-
csillapító, köptető.
- 857** *Rp.* Tinct. Opii croc. 50,0.
Aquae dest. aa 50,0.
MDS. Küls. Szemgőzöléshez
szaruhártya - homá-
lyok ellen. Siegl-féle
gőzölőbe 1 kk.
- 858** *Rp.* Pulv. Doveri 1,0—2,0.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10.
DS. 2 ór. 1 port.
Felnőttek.
- 859** *Rp.* Mixtur. Gummosae 100,0.
Tinct. Opii simpl. gtt. 3.
MDS. 2 ór. 1 gyk.
3—5 éves gyermek, izga-
tott köhögés esetén.
- 860** *Rp.* Pulv. Doveri 0,1—0,3.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10.
DS. 2 ór. 1 port.
1—5 éves gyermeknek.
- 861** *Rp.* Tinct. Opii croc. 1,0.
Tinct. Castorei 2,0.
Tinct. Valerian. spir. 5,0.
MDS. 1/2—1 ór. 10—15 csep-
pet szükség esetén.
Hysteriás görcsök.
- 862** *Rp.* Morphini hydrochl. 0,06.
Butyri Cacao qu. s. ut. f. suppos. No. 4.
DS. 0,015 gmos morphin-
suppos.
- 863** *Rp.* Narceini 0,12.
solve ope
Acid acet. dil. gtt. 10.
in
Infus. sem. Coffeae.
Syrup. simpl. aa 125,0.
MDS. Napj többször 1 gyk.
v. kk. Tussis convuls.
- 864** *Rp.* Morphini hydrochl. 0,05.
Sacchar. alb. 5,0.
M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10.
DS. 2 ór. 1 port.
- 865** *Rp.* Morphini hydrochlor. 0,2.
Aquae dest. 10,0.
M. f. sol. filtra.
DS. 2%-os morphinoldat bőr
alá fecskendésre. Fél
fecskendővel egyszerre.
- sztraka-féle tannin-csokoládé** kis gyermekek és felnőttek
hasmenése ellen kit. hat. és kell. ízű. (L. hird.)
tussis conv., kanyaró, influenza után visszamaradt
makaes hurutoknál a legjobb hatással van a Liquor
Thiorobini comp. Eibach!

- 866 Rp.** Tinct. Opii crocatae 5,0.
Tinct. Ipecac. 3,0.
Tinct. Valerian. aeth. 10,0.
Olei Menthae pip. gtt. 10.
MDS. 2—3 ór. 15—20 cseppet. Colica, diarrhoea eseteiben. Hasonló összeállítású cseppek cholera cseppek neve alatt is ismeretesek.
- 869 Rp.** Decoct. rad. Althaeae e 15,0.
l. a. p ad colat. 100,0.
Tinct. Opii simp. gtt. 5—10.
MDS. Langyosan klysmának. Tenesmus.
- 871 Rp.** Morphin. hydrochlor. 0,05.
Emuls. oleosae 100,0.
Aquaе Amygdalar. amar. 5,0.
MDS. Ór. v. 2. ór. 1 kk. lassan lenyelni. Fájdalmas nyelésnél, anginák, epiglottis fekélyek eseteiben.
- 873 Rp.** Codeini hydrochlor. 0,1—0,2.
Pulv. rad. Ipecac. 0,3.
Sacchar. alb. 4,0.
M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10.
DS. 2—3 ór. 1 port. Köhögéscsill., köptető.
- 876 Rp.** Heroini hydrochlor. 0,1.
Sacchar. alb. 4,0.
M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10.
D. 2—4 port napj. Köhögéscsillapító.
- 867 Rp.** Morphin hydrochl. 0,2.
Atropin. sulf. 0,01.
Aquaе. dest. 10,0.
MDS. 2%-os morphinoldat atropinnal. Bőr alá fecskendésre.
- 868 Rp.** Morphini hydrochlor. 0,15.
Pulv. rad. Althaeae
Mucil. Gummi arab. aa qu. s.
ut f. pillul. No. 30.
Consp. pulv. Lycopod.
DS. 0,005 grmos morphin-pillulák
2—4—6 szem este bevéve hypnoticum.
- 870 Rp.** Morphini hydrochlor. 0,05.
Aquaе Amygdalar. amar. 15,0.
MDS. 2—3 ór. 10—15 cseppet.
- 872 Rp.** Codeini hydrochlor. 0,5.
Aquaе dest. 10,0.
MDS. Bőr alá fecsk. Suo nomine. $\frac{1}{2}$ —1 fecsk. egyszerre.
- 874 Rp.** Codeini hydrochlor. 0,10—0,20.
Syrup. simpl. 30,0.
MDS. Napj. 3 kávéskan. Gyerm. diabetes insipid.
- 875 Rp.** Morphini hydrochl. 0,5.
Gummi arab pulv. 10,0.
M. exact. f. pulv. det. in scat.
S. Gégébe befúvásra por.
- 877 Rp.** Heroini hydrochlor. 0,1.
Aquaе Amygdal. amar. 10,0.
MDS. Egyszerre 10—15 csepp. Köhögéscsillapító.

Modiscop, morphin-dionin-scopolamin-injectiók Schlesinger tr. sz., morphin-befecsk. helyett, előnyei: *nincs megszokás*, exact adag. és eltarth., gyors hatás, igen alk. morphin-megvonó kúrákhoz. (L. hird.)
A leghatásosabb köhögés-csillapítószer a Liquor Thiorobini comp. Eibach!

H. Opodeldok l. Camphora.

Opothierapia l. **Organotherapia**. Merck készítményei vannak az „Opo“ előnévvel jelezve. Pl. *Opothyreoidin*, *Oposuprarenalin*, *Opoprostatin*, *Opoovarín*, *Opoorchidin*. stb.

Organotherapia. A következő szervekből vannak kivonatok forgalomban:

Biovar Poehl. l. e. cz. alatt.

Thymin Poehl. tabl. à 0·3 gm. Napj. 3—5 db.

Lienin Poehl. tabl. à 0·5 gm. Napj. 3—6 db. Ampullákban is subcután injectio számára.

Hepatin Poehl. tabl. à 0·5 gm. Napj. 3—6 db. Ampullákban is subcut.

Pancreatin Poehl. tabl. à 0·5 gm. Napj. 2—6 db.

Renin Poehl. tabl. à 0·3 gm. Napj. 3—6 db.

Suprarenalin Poehl. tabl. à 0·3 gm. Napj. 2—4 db.

Prostatin Poehl. tabl. à 0·5 gm. Napj. 3—6 db. Suppositoriumok is és ampullák is subcut. használatra.

Sperminum Poehl. l. e. cz. a.

Hypophysin Poehl. tabl. à 0·3 és 0·5 gm. Napj. 2—6 db. Ampullákban is.

Cerebrin Poehl. tabl. à 0·3—0·5 gm. Napj. 2—6 db.

Mammin Poehl. tabl. à 0·5 gm. Napj. 2—6 db.

Thyreoidin Poehl. l. e. cz. alatt.

Orphol. (Bi-muthum β naphtholicum). $[Bi_2O_2(OH)(C_{10}H_7O_3)]$. Szürke, szagtalan, kissé aromás, nem kellemes ízű por. Vízben, szeszben nem oldh. Tartalmaz 261/2% β naphthol és 231/2% bism. subnitr.-ot. Bélantisepticum. Adag feln. 0,5 pro dos. napj. 5—10-szer porban; gyermek. 0,2—0,3 pro dos. napj. 5—10-szer

878 Rp. Orpholi 10,0.

Div. in dos. aequ. No. 20.

D.S. Napj. 2—4 × 1 port.

Orthoform (p-amido-m-oxybenzoësav-methylester). Fehér, íztelen és szagtalan por, vízben oldhatatlan. Helybeli anaestheticum nyálkahártyákon és fekélyeken (ép bőrön nem). Hatása megbízható és tartós (18—36 óráig is); nem mérgező. Haszn. különleg nyálkahártyákra, fekélyekre, főleg a gégegyógyászatban; belsőleg gyomorfekély esetén. Külső használatra porban (mágában vagy amylummal, sacch. lactissal) vagy kenőcsben (5—20%); belsőleg porban adagja 0,5—1,0. Két félesége van: a „Neu“

Alimentum Theinhardt inopes quoque parvo emunt.

jelzővel ellátott a finomabb por s ilesőbb. Hatása mindkettőnek u. az.

Orthomonobromphenol l. Bromphenolum.

Ossin. (Stroschein). Csukamájolaj ezukorral emulsionálva. Vízrel jól elegyíthető, édes. Adag: kk—evők. tejben vagy kávéban.

Ostauxin. Calcium paranucleinicum. Fehér por, vízben oldható. Tartalmaz 17% Ca. 9% N. 2·5% P. Rachitis és scrophulosisnál. Adagja gyermeknek 1—2-szer naponta 1 kk. felnőttnek 2—3-szor 1 evők. a porból.

Ovadin. }
Ovaraden } l. Ovarium-készítm.

Ovarium-készítmények. A természetes és mesterséges klimax alkalmával előforduló ideges tünetek ellen rendelik ezeket. 1. *Tablettae ovarii Richter*; minden db. 2 gm. friss petefészeknek felel meg. 2. *Ovaria siccata Merck*. Tabletták. Tehén petefészekből készülnek. 5 ovarium 7·5 gm. ovaria siccata ad. Egy tablettában 0·1 ovar. sicc. van. Adag 2 × napj. 10—15 dbot bevenni. 3. *Ovaraden*. (Knoll u. Co. Ludwigshafen.) Sertés-ovariumból készül. Porból 1 gm. = 2 gm. friss ovariummal, 1 db. tabletta = 0·5 gm friss ovariummal. Adag porból 1·0—1·5 gm. pro dos. napj. 3—4 szer, tablettákból 2—3 db. pro dos. napj. 3—4-szer. 4. *Biovar-Poehl*. Tabl. 0·3—0·5 gm. tartalommal; 3-szor napj. 1—2 dbot. Sterilizált 2%-os oldat ampullákban à 2 kctm.; napj. 1—2 ampulla bőr alá fecskend 5. *Oophorin*. (Freund). Tabletták Napj. 2—5 dbot.

Oxygen (O₂). Színtelen gáz. Haszn. dyspnoe ellen belélegzésre; kapható tömlőkben lélegző tubussal, v. vastartályokban; továbbá mint oxigén-víz (oxigén-gázzal telített víz); stimulans (?).

Oxaphor l. Oxycamphor.

Oxycamphor. Hydroxylozott camphor. Fehér, kristályos, szagtalan por; hideg vízben nehezen, forróban könnyen old. Kissé keserű. Könnyen bomlik világosság és nedvesség behatása alatt, ezért 50%-os szeszes oldatát is tartják „**Oxaphor**“ néven kész-

Haemalbumin-Lecithin Dr. Dahmen, genuin vörvas lecithinnel, legkömörebb tápanyag, legintensivabb idegerősítő: rhachitis, scrophulosis, phthisis, chlorosis stb. (L. hird.)

Phosphatine-Faliéres kit. tápláló és csontfejlesztő szer rhachit és scroph. gyermekek részére. (L. hird.)

Jogadin jóízű csukamájolaj!

Biocitin a jelenkor legtök. lecithin-készítm., kit. hat. rhachitis, osteomalacia, anaemia, chlorosis, neurasth., scrophul., ulc. ventric. stb. eseteiben. (L. hird. a címlappal szemben.)

letben. Haszn. mint antidyspnoeicum szív-, tüdő- és vesebetegségek eseteiben és angina pectoris ellen. Betegek nem szívesen veszik. Legjobb gelatin-tokocskákban rendelni. Adag az oxaphorból: 0,5—1,0 napj. 2—4-szer.

879 Rp. Oxaphori (50%) 10,0.
Aquae Amygdal. amar. 4,0.
Spir. vini gall. 20,0.
Aque dest. 150,0.

880 Rp. Oxcamphorae 2,0
Aque dest. 130,0.
Spir. vini gall. 50,0.
Linct. gummos. 20,0.

M.DS 2 ór. 1 evők.

MDS. Napj. 2—4. evők.

Oxygar. Agar-agarhoz kötött hydrogensuperoxyd. Bélantisepticumnak ajánlották. Adag 3× napj. 1 gm. étkezés előtt ostyában v. vízzel kissé megnedvesítve.

Oxysparteinum hydrochloricum. A spartein (l. ott) oxydatiója útján készül. Színtelen, vízben jól oldh. jegeczek. Haszn. l. spartein cz. a. Megszokás gyorsan következik be, midőn hatástalanná lesz. Opium is megszünteti hatását. Adag a digitalis javalatai alapján 0,04—0,1 pro die.

†**H. Oxymel Scillae.** L. Scilla.

H. Oxymel simplex. Izjavító, mint a syrupok.

Pancreatinum. Sokféle készítmény van forgalomban. Kivonata a sertés v. szarvasmarha hasnyálmirigyének. Legtöbbször e mirigy mindhárom fermentumát tartalmazza; néha hiányzik a zsírfermentum. Fehérjét csak lúgos közegben emészt. A száraz készítmény a mirigynek v. beszárított vizes, v. borszeszszel kicsapott vizes kivonata; a folyékony készítmény glycerines kivonat. Digestivum. Per os nem használható, gyomorban nem emészt. Leginkább végbélen át való táplálásnál használtatik vagdalt pancreas helyett (L. Klysma cz. a.)

Pankreon. Hasnyálmirigyből készült szürke, szagtalan, nem rossz ízű por. Mindhárom p.-enzymet tartalmazza. Lúgos oldatban emészt. Gyomornedv csak hosszabb behatásra emészt meg, azonban helyes, ha beadása előtt a gyomorsavat neutralizáljuk. Diabetes mellitus, reconvalescentia, gyermekek bél-

Caps. Amyli nitrosi Egger a leghatásosabb szer angina pectoris ellen.

Pancréatine Defresne kit. hat. dyspepsiáknál, tejes és zsíros ételek elleni intoleranciánál, a hasnyálmirigy elégt. működésénél cukorbetegségek részére. (L. hird.)

Nural, diet. digestivum és mesters. megemésztett tápláló- és erősítőszer, gyomorbajoknál, anaemia, chlorosis, reconvalesc., phthisis, cachexia, hyperemesis eseteiben. (L. hird.)

Pankreon dietét. és robor., kit. bevált étrendi hibák következményeinek meggátolására és az emésztés szabályozására ang. pectoris, arterioscl. stb. eseteiben. (L. hird.)

hurutja a javalatok. Tápcsőrék készítésénél is hasznos. Adag felnőtteknek 0,5—1,0 pro die, gyermek. 0,1—0,2 pro die.

Pannae s. Uncomocomo rhizoma. (*Aspidium athamanticum*. Filices.) Anthelminticum. Főleg taeniák ellen. Adag 8,0—10,0 porban, éhgyomorral. Előkészítő étrend czélszerű.

Pantopon. Sósavas sók alakjában tart. az opium összes alkaloideit. Kb. 5% morphin van benne. Vízben jól old. Oldatok sterilizálhatók. Bels. adag fele, mint az opium purumból. Bőr alá kétszer annyi, mint a morphinből, tehát 0,01—0,03 gmig. Pilulák, tabletták 0,01 gm. tartalommal, 2%-os oldat ampullákban, sterilizálva a bőr alá fecskendezésre készen, éppen úgy 2%-os cseppek is cseppentő üvegesében.

Papainum. *Carica Papaya* nedvéből előállított, fehér porból álló erjesztőanyag, mely fehérjét és fehérjeféléket épp úgy emészt savanyú, mint alcalicus közegben. Feloldja 5%-os oldatban a croup-hártyát. Küls. 5—10%-os oldat ecsetelésre croup, diphtheritis eseteiben, esetleg belégzésre is. Bels. pepsin helyett 0,1—0,5 pro dos. borbán.

881 *Rp.* Papaini 2,0.
Aquae dest.
Glycerini aa 9,0.
MDS. 10%-os papainoldat.
Ecsetelésre.

882 *Rp.* Papaini 3,0.
Div. in dos. aequ. No. 10.
DS. Napj. 3 × egy portokaji pohár borbán feloldva, étkezés előtt.

†**H. Papaveris somniferi capsulae s. capita.** (*Papaveraceae*.) Opiumalcaloidokat tartalmaz. Syrupus diacodii készítésére használtatik.

Parabismuth. *Bismuthum paranucleinicum*. Fehér, szagtalan por. Diarrhoea, enteritis follicul., ulcus ventric., dysenteria-nál Adag felnőtteknek 1,0 3—5-ször naponta, gyermeknél 0,5 3—5-ször naponta.

Parabromacetanilid. l. Antisepsin.

Pancreatine de Defresne, *Pilules digestives à la Pancreatine de Defresne*, kit. hat. gastralgia, gyomorbajok, émelygés, nehéz emésztés stb. ellen. (L. hird.)

Leurose, javít. Leube-Rosenthal húsoldat dr. Mirus (R. Stütz jenai udv. gyógysz. kit. tápszer gyomorbajok, typhus, dysenteria tuberk. bélbajok, peritonitis, gyomor- és bélvérzések eseteiben (L. hird.)

Pepsorthin kit. gyomorjavítószert, jav. heveny és különöse időült gyomorbajoknál csökkent gyomornedvképződéssel. (L. hird)

Lactobacilline erjesztőanyag kit. hat. diarrhoea, enterit. folie dysenteria eseteiben. (L. hird.)

H. Paraffinum solidum. Fehér, merev, kristályos, viasznemű, zsíros tapintatú, petroleumszagú, íztelen, $74-80^{\circ}$ C-nál olvadó tömeg; vízben nem, 35 r. víztelen és forró borszeszben oldódik, aetherben, benzolban, zsíros és illó olajokban jól. Gyógyszerészeti technikában fontos szer. Néha kenőcsökhöz véteik mint alapanyag.

Paraffinum liquidum. Vaselineolaj. Petroleumgyártásnál mellékterményül nyerik a vaselinával együtt. Tiszta, olajos, szagtalan folyadék. Kenőcsökhöz haszn. Vele készül az

Unguentum Paraffini. 1 r. paraffinum solidum + 4 r. paraffinum liquidum. Haszn. mint a vaselin. Az utóbbi jobb kenőcsalapanyag.

Paraform s. Paraformaldehyd. Trioxymethylen. Fehér por, meleg vízben oldh. Bélantisepticum, de adagolása sok kellemetlenséggel jár. Adag: 3,0—4,0 gm. pro dos.

H. Paraldehydum ($C_6H_{12}O_3$). Színtelen, sajátos fűszeres és egyszersmind fojtó szagú folyadék. 10 sr. vízben oldódik; aetherrel, borszeszszel elegyíthető. Sedativum, hypnoticum chloralhydrat helyett. Szívre hatása alig van. Strychnin és más görcsokozó mérgek hathatós pharmacologicus ellenszere. Bels. sedativ adag 1,5—2,0 pro dos.; hypnoticus adag 3,0—5,0! pro dos. Ha alvás nem állana be, $\frac{1}{2}$ —1 óra múlva ismét ennyi adandó. Dos. maxim. pro die 10,0! Morphinnal néha sikerrel kombinálható.

883 Rp. Paraldehydi 6,0.
Aquae dest. 100,0.
Syrup. cort Aurant. 20,0.
Olei Menthae pip. gtt. 2.

MDS. Este felét bevenni;
ha 30 percz alatt
álom nem jelentke-
zik, másik fele is
elfogyasztandó.

884 Rp. Paraldehydi
Rhum an 10,0.
Ol. Citri gtt. 5.
Aquae dest. 90,0.
Syrup simpl. 20,0.
MDS. $\frac{1}{3}$ részét egyszerre
bevenni; ha nem
jön létre alvás, ismét
 $\frac{1}{3}$ részt.

885 Rp. Paraldehydi 4,0.
Trionali 2,0.
Butyri Cacao qn. s.
nt f. suppositoria No. 10.
DS. Este egy alkalmazandó.
Enyhe hypnoticum.

Paranephrin. Mellékvese-készítmény. Az adrenalin főlöslegessé teszi.

Paraplastok. Bőrszínű kantschuktapaszkok különböző a bőrgyógyászatban használt gyógyszerekkel készítve (acid. salicyl.

Lactobacilline erjesztőanyag, meggátolja a bélbeli rothadást, kit. bélantisepticum. (L. hird.)

chrysarobin, hydrargyrum, ichthyol, pyrogallol, resorcin, zink-oxyd.). Baidersdorf gyára hozza forgalomba Unna előírása alapján.

Parisol. Desinficiens. Tart. formaldehydet, mentholl és spir. sapon. kalinit s egy kevés karbott. Haszn. mint a lysoformé.

H. Pasta Guarana. l. Guarana.

† **H. Pastilli Nitroglycerini** l. Nitroglycerinum cz. a.

† **H. Pastilli santonini** l. Cina cz. a.

Pegnin. Oltóerjesztő, mely a tehéntejhez teendő, hogy azt gyermek könnyebben emészsék.

Pelletierinum l. Granati Punicae cort.

Pellotinum hydrochloricum. (Anhalonium Williamsii). Alcaloida sója ($C_{13}H_{19}NO_3.HCl$). Hypnoticum per os 0,05—0,08 adagban. Szédülés, fejfájás mint mellékhatás előfordul. Bőr alá 0,01—0,02 elegendő.

H. Pepsinum. Kevéssé tapadós, finom, sárgásfehér por, sós-savanyú ízű, vízben oldódik. Hatása (a peptonképzés) csak savanyú közegben jelentkezik. Bels. dyspepsia bizonyos alakjainál. Adag porban, pilulában, pastillákban 0,1—0,5—1,0 pro dos. étkezés közben vagy után. Egyidejűleg acid. hydrochlor. dilut. vagy acid. tartar. is rendelendő.

H. Vinum Pepsini. (Tartalmaz 100 gm.-ban 2,0 pepsint s. u. a. híg éssavat.) Adag étkezés után $\frac{1}{2}$ —1 tokaji pohárral.

I.

886

II.

Rp. Pepsini 3,0.
Sacchar. alb. 2,0.
M. f. pulv. div. in dos. aequ.
No. 10.

DS. Étkezés után 1 port.
Utána acid. hydrochlor. dilut.

Rp. Acid. hydrochlor. dil. 10,0.
Det. in vitro cum epistom.
guttatorio clauso.

S. Étkezés után $\frac{1}{2}$ pohár vízben 5—S cseppet.

Vinum Pepsini „Kriegner“ a legjobb tokaji pepsinbor-készítmény. (L. a szemben levő hird.)

Pancreatine de Defresne, Pilules digestives à la Pancreatine de Defresne, kit. hat. gastralgia, gyomorbajok, émelygés, nehéz emésztés eseteiben. (L. hird.)

Oltó-kivonat, por és tableta a legjobb minőségben kapható Bayer-Augsburg. (L. hird.)

Nural diet. digestivum és mest. megemésztett tápláló- és erősítő-szer, igen jó hat. gyomorbajoknál, anaemia, chlorosis, recon-valesc., phthisis, cachexia, hyperemesis eseteiben. (L. hird.)



Dispepsia

étvágytalanság, ideges
gyomorbajok rationalis
gyógyítására a leghatalma-
sabb pepsin-készítmény

a Kriegner-féle

Tokaji Pepsin-bor

szavatolt minőségű régi
tokaji asszaborból külön-
leges módszer szerint
készül, hosszú érlelés
után hozzuk forgalomba
2% pepsin-tartalommal.
Nagyon kellemes ízű, gyer-
mekek is szívesen veszik.

Kis üveg K 3.20

Nagy üveg K 6.—

Egyedüli főraktár:

Korona gyógyszertár

Budapest, VIII. Kálvin-tér, Baross-utca sarok.

Postai szétküldés naponta utánvétellel vagy
a pénz előzetes beküldése után.

Guajakol-Perdynamin, 5% natr. sulfoguajakolt tartalmazó Perdynamin a lélekzőszervek megbetegedéseinél. Egy üveg ára 5 korona. Adag felnőtteknek 1 evőkanál 3-szor napjában, gyermekeknek 1 kávéskanál 3-szor napjában. (reggeli után, délben és este félórával étkezés előtt). *Prof. Dr. A. Moeller, Berlin*, a következőket írja: A tüdőtuberkulózis kezelésére használt újabb gyógyszerek közül itt csak a Guajakol Perdynamint óhajtom megemlíteni, mint egy jól megválasztott kombinációját a tuberkulotikus szövetre ható guajacolnak és a szervezet erősítését elősegítő perdynaminnak, mely utóbbi egy vérkészítmény, amint az az élő szervezetben megvan és amelynek jó íze van. Perdynamin teljesen megemészthető és resorbeálható. Majd minden betegnél, kinek Guajakol-Perdynamint rendeltem, a közérzet javulását állapíthattam meg, jó hatással volt a gyomorbél-tractusra. Ezt a szert szívesen rendelem a tüdőbajosoknak, mint segítő szert a higiénias diétás kezelés mellett. A betegek mind jóízűnek mondják és szívesen veszik.


Lecithin-Perdynamin, 1% licithint tartalmazó Perdynamin. Jóízű és könnyen megemészthető készítmény, haemoglobinnal és lecithin tartalma következtében biztos hatású neurasthénianál, hystériánál és egyéb idegbajoknál, továbbá rossz tápláltság és angolkór eseteiben. Adag: gyermekeknek naponta háromszor és pedig fél órával reggeli után, fél órával ebéd és vacsora előtt egy-egy kávéskanállal tisztán vagy vízzel, tejjel stb.; felnőtteknek 3-szor napjában 1 evőkanállal esetleg borban. 1 üveg (gyermekek részére körülbelül 15–20 napra, felnőttek részére 8–10 napra elegendő) 5 korona 50 fillér.

Perdynamin, jóízű, olcsó haemoglobinnal készítmény, előnyei következtében gyorsan előrehaladt a használatban. Kiváló tápláló és erősítő szer anaemia, chlorosis, rhachitis eseteiben, lábadozás szakában, egyszóval mindenütt helyén van, ahol haemoglobinnal adagolása javalt. Adag, mint a Lecithin Perdynaminnál. Üvege 3 kor. 50 fillér.

Irodalmat az orvos uraknak szívesen küld:

Chemisch-diätetisches Laboratorium

Mr. Camillo Raupenstrauch

 [kiérd. gyógyszerész]

Wien, II/1. Castellezgasse No. 25.

I.

887

II.

Rp. Pepsini 0,5.
 Sacchar. alb. 2,0.
 M. f. pulv. div. in dos. aequ.
 No. 10.

DS. Étkezés után 1 port.
 Utána acid. hydrochlor. dil.
 Csecsemőnek.

888 *Rp.* Pepsini 10,0.
 Acid. hydrochlor. dilut. 1,5.
 Pulv. Gummi arab.
 Sacchar alb. aa qu. s.
 ut f. cum aqua dest.
 gtt. nonnull. pastilli
 No. 30.

DS. Étkezés után 1—2 dbot.

Rp. Acid. hydrochlor dil. gtt. 5—8.
 Aquae dest. 80,0.
 Syrup. simpl. 8,0.

MDS. Étkezés után 1 kk. v.
 gyak.
 Csecsemőnek.

889 *Rp.* Pepsini 5,0.
 Acid. hydrochlor. dil. 1,0.
 Tinct. Aurant. 5,0.
 Syrup. simpl. 20,0.
 Aquae dest. 200,0.

MDS. 2 ór. 1 evők.

Hyperemesis gravidarum.

Perco l. Peru cognac.

Perdynamin. Folyékony vas-fehérje készítmény; chlorosis, anaemia, gyengeség esctén; felnőttnék 3-szor napj. egy cognac-os pohárral, gyermeknek gyak.-al tisztán vagy tejben, teában, borban.

Pergenol. Szilárd hydrogensuperoxyd-készítmény, mely kb. 12% H_2O_2 -ad, 0,5 gmos tabletták. Száj- és torokviznek 2 tablettát oldandó fel 1 pohár vízben.

Perhydrol. (H_2O_2). 30%-os hydrogenhydroxyd. Haszn. mint a hydrogenhydroxyd (l. ott).

Peristaltin. A Cascara Sagradából állítják elő. Gycosidicus természetű. Vízben jól oldh. Hashajtó. Bőr alá fecskendezve is hat. Peros 0,05 gmos tablettákból 1—2 db. Bőr alá 0,5 gmos ampullákból 1 használandó el.

Peronin l. Opium és morphin.

Elixir Condurango pept. „Immermann“ kitting dyspepsiánál és más gyomorbajoknál. (L. hird.)

Guajacol-Perdynamin (5% natr. sulfogujac.)

Lecithin-Perdynamin (1% lecithin). (L. hird.)

Nural diet. digestivum és mesters. megemésztett tápláló- és erősítőszet, kit. bevált gyomorbajoknál, anaemia, chlorosis, reconvalesc., phthisis, cachexia, hyperemesis eseteiben. (L. hird.)

Pepsorthin kiváló stomachicum, elősegíti az emésztést, javalt heveny és különösen idült gyomorbajoknál elégtelen gyomorsav-elválasztással. (L. hird.)

Pertussin (Extractum Thymi saccharatum). Tartalmaz oleum thymit, azaz a thymus vulg. és th. serpyllum illó olaját. Haszn. pertussis esetén. Rendelés 200,0 az eredeti üvegben. (Rp. Extr. thymi saccharati Taeschner lag. orig.) Adagja 2 éves gyermeknek $4 \times$ napj. 1 kk., 3 évesnek $4 \times$ napj. $\frac{1}{2}$ evőkanállal, 6—10 évesnek $\frac{3}{4}$ evőkanállal.

Peru-Cognac. s. Perco. 50,0 bals. peruv. 1000,0 cognacban oldva. Sárgásbarna, jellemző szagú, savi kémh. folyadék. Tuberculosis ellen ajánlották faliéjsav-tartalma miatt. Adag kávéskanalanként.

Perugen. Mesterséges perubalzsam. 60% cinnamein tartalmú. Haszn. mint a perubalzsamé. (L. ott.)

Peruolum. Benzoesavas benzylester 25%-os oldata ricinusolajban. Küls. perubalzsam helyett scabies ellen. 3 nap egymásután a beteg helyek bedörzsölendők, azután szappanos fürdő.

Peruscabin. A perubalzsam egyik hatóanyaga, a benzoesavas benzylester, melyet synthetice állítanak elő. Szintelen, híg, majdnem szagtalan olaj. A peruol előállítására haszn. l. ott.

Petrolan. Kőolaj és szappan keveréke. Barna, kenőcsszerű anyag. Haszn. mint a kátrányok.

H. Petroleum rectificatum. Szintelen, híg, közömbös kémhatású, átható szagú, kesernyész, csipős ízű folyadék. Haszn. mint az aether petrolei, l. e cz. a.

Petrosapol. A petroleum-lepárlás maradékának szappannal való keveréke. Haszn. mint a kátrányok. Előnye, hogy a test melegénél nem folyósodik el.

Petrosulfol. Az ichthyolhoz hasonló készítmény. Haszn. bőrbajokban, mint az ichthyol. Kenőcsöklöz 5% arányban.

Phagocythin Dr. Richter. Natrium-nucleinicum, mely konyhasóval keverve sterilizált üvegcsékben jön forgalomba. Vízben barna színnel könnyen oldódik. Haszn. subcután injectióra leukocytosis előidézésére, sebészi műtétek előtt az infectio megelőzésére v. leküzdésére a phagocyta-elmélet alapján. Adag subcután 0,5—1,0 pro dosi.

†**H. Phenacetin s. Acetphenetidin.** (C_6H_4O [O_2H_5] NH (CH_3CO) 1. 4.) Fehér, fénylő jegeczlapocskák. Szagtalan, íztelen, vízben nehezen, glycerinben könnyebben, borszeszben könnyen oldódik. Antipyreticum, analgeticum, antirheumaticum, influenza-ellenes; hasonlóan hat, mint az antifebrin, de népszerűbb. Antipyreticus hatása = 2 annyi antipyrin hatásával; az antifebrin

Haemalbumin-Lecithin Dr. Dahmen, genuin vérvas lecithinnel idegerősítő tápanyag: chlorosis, plithi-sis, rhachitis, vérvesszeség, hószámvazar, lábadozás stb. (L. hird.)

Lactobacilline erjesztőanyag sebészeti célokra finom por alakjában kerül forgalomba. (L. hird.)

nem egészen még egyszer oly hatékony. Egyszeri nagyobb adag p. o. 0·50—0·70 — 1·0 czélszerűbb, mint ór. v. 2 ór. kis adagok p. o. 0·15—0·20. Cognacban, borban is rendelhető. Napjában 2,0 gmon felül nem szükséges emelkedni. Anodyn czélból 1,0—1,5 pro dos. Gyerme. 0,1—0,2 pro dos.

- | | |
|--|--|
| <p>890 <i>Rp.</i> Phenacetini 5,0.
 Div. in dos. aequ. No. 10.
 Det. in caps. anylac.
 <i>S</i> Szüks. szerint 1—2 dbot.
 Antipyreticum. Neuralgia.
 Hemicrania. Influenza.</p> | <p>891 <i>Rp.</i> Phenacetini 5,0.
 Coffeini citr. 2,0.
 M. f. pulv. div. in
 dos. aequ. No. 10.
 <i>DS.</i> Hemicrania esetén
 napj. 1—3 port.</p> |
|--|--|

Phenocollum hydrochloricum. Sósavas amidoacetparaphenetidin. Fehér jegeczpor, 16 r. vízben oldódik. Antipyreticum, antineuralgicum, antirheumaticum, mint a phenacetin. Adag bels. porban v. oldatban 0,5—1,0 gm. pro dos. 3,0—5,0 gm. pro die

Phenolphthalein l. Purgó.

Phenolum l. Acid. carbolicum.

Phenolum monobromatum l. Bromphenolum.

Phenolum monochloratum. ($C_6H_4Cl.OH$). Vízben nehezen, borszeszben, aetherben könnyen old. rossz szagú jegeczek. Erős antisepticum. Erysipelas ellen 2%-os kenőcs, lupus ellen 25%-os pasta, gégetuberculosis ellen 5—20%-os glycerinoldattal ecsetelések. Bels. nem haszn.

- | | |
|---|---|
| <p>892 <i>Rp.</i> Phenoli mono-
 chlorati 1,0.
 Vaselinei 50,0.
 <i>MDS.</i> Bedörzsölésre.
 Erysipelas.</p> | <p>893 <i>Rp.</i> Phenoli monochlor.
 Lanolini
 Vaselinei
 Amyli aa 10,0.
 M. f. pasta
 <i>DS.</i> Külsőleg. Lupus ellen.
 A pasta 10—12 órán
 át a luposus helyen
 marad.</p> |
|---|---|

Influenza után visszamaradt makacs hurut legjobb gyógyszere a Liqueur Thiorobini comp. Eibach!

Algocratin megbízh. antipyret., analg. és antirheumat. kiváló specif. dysmenorrhoeánál, kit. fájdalomcsillap. neuralgia, migrén, ischias stb. eseteiben. (L. hird.)

Influenza: *Rp.* Gelodurat „Pohl“
 scat. orig. c. acid. salic. 0·25.
S. 3—4-szer naponta 2 dbot.

Rheumasan (Dr. Reis-) kitűnő szer csúv, közvény, ischias, influenza, migrén, pleuritis, tylosis ellen. (L. hird.)

Phenolum sulfo-ricinicum. Sárga, szörpsterűségű, vízben, alkoholban oldh. folyadék. Van 25 és 30% phenolt tart. készítmény (Merck). Erős antisepticum. Főleg tuberculoticus gége-, orrfekélyek ecsetelésére haszn. Adag 20—30%-os oldatok.

Phenosol. Salicylecetsavas phenetidin. Színtelen, vízben oldh. lemezek v. tűk. Bélben salicylecetsavra és phenetidiure hasad. Antipyreticum, antirheumaticum. Adag, ostyában 0,5 pro dos. napj. 3—5-ször.

Phosphatine-Falliére. Zsírtalanított cacao, keményítő, cukor és calciumphosphat keveréke. Tápszer gyengén fejlett csontrendszérű gyermekek számára. Adag a hasz. utasításban.

Phosphotal (Kreosotphosphit). Tartalmaz 90% kreosotot és 9% phosphort. Haszn. gümőkórban mint hatásos kreosot-készítmény. *Clin-féle capsulákban* (0,20 egyben; 4—12 naponta), vagy *Clin Phosphotal emulsiójában* (kávéskanalanként 0,50 tart. 2—6 kávéskanállal tejben.)

††**H. Phosphorus.** Fehér vagy sárgás, áttetsző rudacskákból fordul elő. Főleg csontbántalmak esetében, nevezetesen rhachitismél, osteomalaciánál rendelik olajoldatban, emulsióban, pillulában. Bels. adag felnőtteknek 0,0005—0,001 pro dos. és 0,002—0,003 pro die, gyermekeknek 0,0002—0,0005 pro dos. és pro die. Azon kész gyógyszerekülönlegességek, melyek a phosphort olajos oldatban v. pastillában, pillulában tartalmazzák, nem megbízhatók, mert bennük a phosphornak legtöbbször nyomai sincsenek, az u. i. oxidálódik időnként folytán. Megbízható csupán csak a *hiv. Ol. phosphoratum*, mely a gyógytárban készletben van, a célból, hogy olajos phosphoroldatok kényelmesen készíthetők legyenek. Dos. max. pro die 0,001! pro die 0,003.

††**H. Oleum phosphoratum.** 2 gm. tartalmaz 0,01 gm. tiszta phosphort. Ha olajos phosphoroldatot rendelünk, a gyógyszerész ezt a készítményt használja fel, hígítván ezt a kellő mennyiségű egyéb olajjal.

Liquor Thiorobini comp. Eibach fölöslegessé tesz minden külföldi antituberk. készítményt, mert hatásban felülmúl mindannvit!

Sirop Famel könnyen oldh. lacto-kreosot-készítm., a legérzék. betegek is szívesen beveszik, a gyomor jól tűri, specif. makacs köhögés, bronchitis stb. ellen. (L. hird.)

Tabulae cacaotinae phosphorat. sec. Prof. Gärtner, a foszforcsukamájolaj pótszerei angolkór, nehéz fogzás és csontlágynulás eseteiben. (L. hird.)

Haemalbumin-Lecithin Dr. Dahmen, genuin vérvas, idegerősítő tápanyag: chlorosis, phthisis, rhachitis, vérvesztés, hószámvavar, lábadozás stb. (L. hird.)

894 Rp. Phosphori 0,02.
Mucil. Gummi arab.
Pulv. Tragacanthae
aa qu. s.
ut. f. l. a. pilul. No. 30.
Consp. pulv. Lycopod.
D.S. 2—3-szor napj. 1
szemet.
Felnőttnek.

895 Rp. Phosphori 0,01.
Olei Amygdalar. dulc.
30,0.
Pulv. Gummi arab.
Sacchar alb. aa 15,0.
Aqua dest. 40,0.
f. l. a. emulsio.
D.S. Napj. 1 kk.
Gyermekeknek rhachitis ellen.

896 Rp. Phosphori 0,01.
Olei Jecor. Aselli 100,0.
M. f. solutio.
D.S. Napj. 1 kk.
Gyermekeknek rhachitis ellen.

††**H. Physostigminum s. Eserinum salicylicum**
($C_{15}H_{21}N_3O_2.C_7H_6O_3$). A calabarbab egyik hatóanyagának sója. Színtelen, vagy kissé sárgás jegeczekből áll. 150 sr. vízben és 12 sr. borszeszben oldható. A szemészetben használtatik mint myoticum cseppentések alakjában; oldat 0,02—0,05 : 10,0. Bels. ajánlották 0,0005—0,001 l adagban tetanus, epilepsia, atropin és strychnin-mérgezés ellen, de nem vált be. Dos. maxim. pro die 0,003 !

898 Rp. Physostigmini salicyl. 0,015.

897 Rp. Physostigmini salicyl. 0,02—0,05.
Aqua dest. 10,0.
M.D.S. Külsőleg. Szemcseppek. Myoticum.

Pulv. et. extr. Liquir. qu. s.
ut. f. pilulae
No. 30.
Obduc. fol. Argenti.
D.S. Napj. 2—3-szor 1 dbot.

Physostol. Physostigmin steril olajos oldata 1%-nyi mennyiségben. Szemészetben 1—2 csepp. Készen kaphatók cseppentő üvegcsék 5 gm. tartalommal.

Phytin. Növényi magvakból előállított, kb. 23% phosphort tartalmazó szerves vegyület. Fehér, íztelen, vízben oldható por.

Phosphor-csokoládé-bonbon „Finy“ kit. hat. csontképző-szer angolkór ellen. (L. hird.)

Phosphatine Faliéres kit. tápl. és csontképző-szer rhachit., scrophul. gyermekek részére. (L. hird.)

Biocitin a jelenkor legtok. lecithin-készítm., kit. hat. rhachit., osteomal., anaemia, chlorosis, neurasth., scroph., ulc. ventr. stb. eseteiben. (L. hird. a címlappal szemben.)

Haemalbumin-Lecithin Dr. Dahmen, genuin vérvas, idegerősítő tápanyag: chlorosis, phthisis, rhachitis, vérvesztesség, hőszámzavar, lábadozás stb. (L. hird.)

Roborans; rachitis, osteomalacia esetén adag 0,25 pro dosi, felnőtteknek 4-szer, gyermeknek 2-szer vízben, levesben, tejben. **Picrotoxinum** ($C_6H_{10}O$). Anamirta Cocculus (Menispermaceae) magvainak hatóanyaga. Színtelen, fénylő, szagtalan, igen keserű, mérges anyag; 400 sr. hideg vízben oldódik, meleg vízben, valamint borszeszben könnyen. Görcsokozó nagy méreg. Strychnin-készítmények helyett haszn. Angliában, Amerikában körzeti hűdések, sphincterhűdések, éjjeli ágybavizelés ellen; Senator tuberculoticusok éjjeli izzadása ellen használta. Régen pediculosisnál, fejszörmőnél, prurigónál is alkalmazták kenőcsök, tincturák alakjában. Adag bels. oldatban, pilulában v. bőr alá fecskendve 0,0005—0,001 pro dos. 2—3-szor napj. Külsőleg felesleges, de veszélyes is (!)

899 <i>Rp.</i> Picrotoxini	0,01.	900 <i>Rp.</i> Picrotoxini	0,01.
Aquae dest.	20,0.	Extr. et. pulv. Liquir.	
M. f. solut.		qu. s.	
<i>DS.</i> 15—20 cseppet egy-		ut. f. pillul. No. 30.	
szerre. Subcután 1		Consp. c. pulv. Liquir.	
fecskendővel, mely-		<i>DS.</i> 1—2 pilulát este be-	
ben 0,0005 picro-		venni. Hyperhydrosis.	
toxin van.			

††**Pilocarpinum hydrochloricum** l. Jaborandi fol.

H. Pilulae ferratae
H. Pilulae Ferri carbonici } l. Ferri praeparata.
H. Pilulae Ferri-jodati

H. Pilulae laxantes l. Aloe.

Piper methysticum s. Cava-Cava s. Kava-Kava. A gyökér bódító gyantás anyagokat tartalmaz; a Sandwich és Fidji szigetek benschülöttjei bódító italt készítenek belőle. Haszn. készítménye az

Extractum fluidum Kavae. Gonorrhoea, cystitis catarrh. eseteiben adag 30—60 csepp pro dos. 3—4 × napj.

Piperazinum. ($C_2H_4(NH)_2C_2H_4$). Diaethylendiamin. Színtelen, vízben jól oldh. fénylő táblácskák. Uratoldó hatású. Köszvény esetén 0,5—2,0 pro dosi és pro die szódavízben italul. 1—2%-os oldatok a húgyhólyag kiöblítésére.

Piperazinum hydrochloricum. Színtelen, vízben jól oldódó jegeztük. Haszn. mint a piperazinnál.

Piperazin Midy, a húgysav legjobb oldószere, kitűnő csúz, köszvény, húgyhomok, húgys. diathesis ellen. (L. hird.)

Lycetol granulát. efferv. Egger (borkősavas dimethyl-piperazin) kell. ízű, uratoldó készítmény.

Gonorrhoea: *Rp.* Gelodurat „Pohl“
scat. orig. c. Kava-Santal 0·3.
S. 4-szer naponta 2 dbot.

Kawotal (Res. kava-kava + Ol. sant. ostind. pur in caps.) kiv. antigonorrh., fájdalomcsillap., váladácsökk., cystitisnél a vizeletet deríti, a dysuriát megszünt. (L. hird.)

PIPÉRAZINE


**pezsgő
szemcsékben**

MIDY

**egyedül Képes föloldani 92%-ot
a húgysavas sókból és csökkenti a
húgysavas lerakódásokat,
fokozván a máj tevékenységét.**

Húgysavas kő 71 órán át 37^o-nál érintkezve a következő
vegyületek 1%-os oldatával, súlyából veszít:


Adagolás
mint
óvószer
1—3 kávé-
kanállal
kevés víz-
ben étkezési
idő-
közökben,
10 napon át
hónapon-
kint.



Adagolás
heveny
rohamoknál:
3—6 kávé-
kanállal
naponta,
(minden
kanál vagy
mérték
tartalmaz
0.29 gr.
tisztá
Piperazint).

**Köszvény, csúz, húgyhomok
arthritises diathesis**

Mintát kívánatra bérmentve küld:
Julien Meyer, Wien, XVIII. Gersthofstr. 79.
Pharmacie Midy 140 Faubourg Saint-Honoré, Paris.



Az új, synthetikusán elő-
állított hashajtóknak
Prof. Blumenthal, Dr. Berg-
mann, Dr. Marschall, Dr.
Frank és mások kutatásai
szerint kellemetlen, sőt
gyakran veszedelmes
mellékhatásaik vannak.

Mely hashajtókat vegye tehát tekintetbe az
orvos és mely laxantiák alkalmasak hosszabb
ideig tartó és állandó használatra? Csak azok a
hashajtók, melyek növényi anyagokból készültek
és amellet biztosan és fájdalom nélkül hatnak.

Pil. aperientes Kleewein

hashajtszernek megvannak ezek a jó tulajdon-
ságai. Ezeknek a labdacsoknak alkotó részei:
Extr. Cascar. sagr. rec. par., Extr. Rhei chinens.
rec. par. aa 3·0, Podophyllini, Extr. Belladonnae
aa 0·50, Pulv. Cascar. sagrad. qu. s. ut fiant pil.
No. 50. Obduc. c. Sacchar, alb. et fol. argent.

Ára 2.— korona.

1—2 pilulának este vízzel
való bevétele után, az éjjeli
nyugalom megzavarásánél-
kül, reggelfájdalmatlan. bő-
séges ürülés következik be.

Ez okból ezeket a labdacsokat az összes kultur-
államok orvosai 25 év óta mint legmegbizha-
tobb hashajtót fönti vényminta szerint vagy rö-
viden mint Pil. aperientes Kleewein rendelik.
Kísérleti minták az orvos urak részére dij-
talanul és bérmentesen állanak rendelkezésére.



Adler-Apotheke S. E. Kleewein
Krems bei Wien.

Piperidinum bitartaricum. ($C_5H_{11}N.C_4H_6O_6$). Színtelen, jó ízű, vízben oldh. jegeczek. Uratoldó szer. Adag: porban v. szénsavas vízben 0,5—1,0 pro dos. napj. 3-szor.

Piperidinum guajacolicum. [$C_5H_{11}N.(C_7H_8O_2)_2$]. Vízben oldh. jegecztük. Tüdőtuberculosis ellen napj. $3 \times 0,2$ —2,0 erősen édesített oldatban.

Piscidia erythrinae cortex. (Leguminosae.) Hatóanyaga a piscidin ($C_{26}H_{24}O_8$). Amerikában mint anodynum, sedativum, hypnoticum szerepel opium helyett. Adag a kéreg porából bels. 0,5—1,0 pro dos. 3—5-szor napj. (pulv.) Czélszerű készítményei:

Extractum Piscidia fluidum. Adag 0,3—0,5—2,0 pro dos. 3—5-ször napj.

Tinctura Piscidia. Gyengébb az előbbinél. 2—3 ó. 30—40 csepp.

901 Rp. Extr. Piscid. fluidi 10,0.

Aquae Menthae pip. 120,0.

Syrup simpl 30,0.

MDS 3—4-szer napj. 1 evőkanállal.

Dysmenorrhoea.

902 Rp. Tinct. Piscidia

Aquae Amygdalar.

amar. aa 20,0.

Det. in vitro coerul.

S. 2 ór. 20—40 cseppet kis pohár czukros vízben.

903 Rp. Extr. Piscidia fluidi 10,0.

Syrup.cort. Aurant. 20,0.

MDS. 1—3-szor napj. 1 kk.

904 Rp. Pulv. cort. Piscidia 0,5.

Det. in caps. amyl.

Dent. tal. dos. No. 20.

S. 3—5-szor napj. 1 darabot.

Pittylen. Barnássárga finom por, szeszben oldható. Fenyőkát-rány formaldehydes összeköttetése. Haszn. a bőrgyógyászatban mint a pix liquida. Acut eczemáknál ne használjuk! Idült és impetiginosus eczemák, prurigo, scabies ellen 5—10%-os kenőcsök, pasták.

H. Pix liquida. Erdei bükkfából száraz lepárlás útján állítatják elő; folyékony, nyúlós, víznél nehezebb, olajos, fekete-

Pivako hatásos int. antigen., bals. copaivae és extr. cubebae emulsiója, fok. a vizelet aciditását és bactericid. hatásúvá teszi, olesó. (L. hird.)

Urol és Urocol (Urol + Colchicin.) azonnal enyhíti a heveny köszvényroham fájdalmait. (L. hird.)

Vesicaesan-labdacsok tart. a Fol. uvae ursi összes hatóanyagait, bevált hólyag-fertőtlenítőszer acut és idült gonorrhoeánál, gyomorra, vesékre káros hatásuk nincsen. (L. hird.)

Pityriasis, herpes tons., psoriasis, scabies eseteiben igen jó hat. a Lysoform-kenőcs, 5—10—15% Lysoform vaselinnel vagy vasogennel.

Haemalbumin-Lecithin Dr. Dahmen genuin vérvas, idegerősítő tápanyag: chlorosis, phthisis, rhachitis, vérvesztesség, hószámvazavar, lábadozás stb. (L. hird.)

barna, félig átlátszó, füstös-kreosotszagú, undorító, keserű ízű. Tartalmaz toluolt, xylolt, phenolt, kozmás katechint, guajacolt, kreosotot, phlorolt, naphtholt, eczetsavat stb. Küls. haszn. bőrgyógyászatban idült bőrbántalmak ellen (eczema, psoriasis, prurigo, pityriasis, herpes tonsurans, favus, scabies). Tisztán v. inkább kenőcsök, linimentumok alakjában szőrecsettel beecsetelendő. Bels. nem; helyette a kreosot czélszerűbb.

905 <i>Rp.</i> Picis liqu.	60,0.	906 <i>Rp.</i> Picis liqu.	5,0—10,0.
Cretae albae	20,0.	Vaselinæ	15,0.
Sapon. kalini		M. f. ungu.	
Spiritus	aa 120,0.	<i>DS.</i> Külsőleg.	
M. f. linim.			
<i>DS.</i> Ecsetelésre.		907 <i>Rp.</i> Picis liqu.	20,0.
Scabies.		Aetheris	10,0.
		<i>MDS.</i> Külsőleg ecsetelésre.	

Pix liquida betulina l. *Ol. Rusci.*

Plasmon s. Caseon. Tejfehérje-készítmény. Tápanyag, mely levessel, tejjel keverve használandó. Forró vízben jól oldódik. Felnőttek 30—50—100 gmot használhatnak el naponta, gyermek 10—30 gmot.

Pleistopon. Pantopon, mely narcotinmentes. Haszn. mint a pantopon (l. e. cz. a.).

†**H. Plumbum aceticum basicum solutum.** Ólomeczet. Színtelen, átlátszó, édeses, később fanyar ízű folyadék; kémhatása lúgos. Causticum. Bels. nem. Küls. készítményei:

H. Aqua plumbica. (Plumb. acet. bas. sol. 2 r., + Aqua dest. 98 r.). Külsőleg borogatások alakjában hűtő, összehúzó, gyulladást, elválasztást csökkentő.

H. Aqua Goulardi. (Plumb. acet. bas. sol. 2 r., Spir. dil. 5 r., Aqua font. 93 r.). Külsőleg mint az aqua plumbica

†**H. Plumbum aceticum crystallisatum s. Saccharum Saturni** [$Pb(C_2H_3O_2)_2 \cdot 3H_2O$]. Színtelen, áttetsző jegeczek; légen elmállik. Íze eleinte édes, később összehúzó, fémcs; kémhatása gyengén savas, 1,75 sr. vízben, 8 sr. borszeszben oldódik. Küls. adstringens; szemcseppeknek 0,05 : 10,0, szemvíznek 0,05—0,1 : 100,0, húgycsőbe fecskendésre 0,1—0,3 : 100,0, hólyagmosásra 0,05—0,1 : 100,0. Bels. nem rationalis adni. Ólommérgezés veszélye is fennforoghat. Adag porban, pilulában 0,01—0,03—0,1! pro dos. 3—4× napj. Dos maxim. pro die 0,5!

Plasmon íztelen, szagtalan, olcsó táp- és erősítőszér, Plasmon-kakao, csokoládé, zaucakao, kétszersült. (L. hird.)

Kátrány-gyógyszappan, kátr. glicerin-szappan a kolozsvári (Heinrich József) gyógyszappangyárból, kit. hat. id. bőrbánt. (eczema, psoriasis, pityriasis, stb.) ellen. (L. hird.)

Lactobacilline erjesztő anyag poralakban kit. hat. különf. bőrbajoknál (eczema, urticaria, sycosis stb.) (L. hird.)

Unguentum Plumbi acetici. Összehúzó, gyulladást csökkentő. Nem liv. már.

908 Rp. Plumb. acet. depur. 0,05.

Aquae dest. 10,0.

MDS. Szemecseppek.

Conjunct. catarrh.

909 Rp. Plumb. acet. depur. 0,2.

Aquae Rosar. 100,0.

Cocaini hydrochlor. 2,0.

MDS. Húgycsőbe fecskendezésre.

Gonorrhoea.

†**H. Plumbum carbonicum hydroxydatum s. Cerussa** [$2PbCO_3.Pb(HO)_2$]. Tiszta fehér, nehéz por v. darabok. Vízben nem oldható. Bels. nem. Küls. hintőporban szárító.

H. Unguentum Cerussae s. Unguentum album. Szárító kenőcs.

†**H. Plumbum oxydatum s. Lithargyrum** (PbO). Vörössárga porból v. pikkelyalakú darabkákból áll. Vízben nem oldható. Készítményei haszn., ezek köv.:

H. Emplastrum diachylon simplex l. Emplastra.

H. Unguentum diachylon dr. Hebrae. Ólomoxydos kenőcs. Fedő, szárító kenőcs, különösen nedvező bőrbántalmak ellen haszn.

Pneumin. Methylenkreosot. Sárgás, szag- és íztelen, vízben nem oldh. por. Kreosot. guajacol helyett tuberculosis ellen bels. 0,5—2,0 pro dos. napj. többször, porban.

†**H. Podophyllum.** Podophyllum peltatum (Berberideae) gyöktörzséből Gyantás anyag. Sárgás por. v. laza, könnyen szétdörzsölhető, sárgás, v. barnásszürke, alaktalan tömeg, mely borszeszben, forró kalilugban teljesen, aetherben részben oldódik. Tartalmaz hatóanyagokul podophyllotoxint és picro-podophyllint. Kis adagban laxans, nagy adagban drasticum. Kolikát okoz. Laxans adag porban 0,02—0,05 pro dos, drasticiens adag 0,1. Obstip. habit.-nál elegendő naponta reggel v. este 0,01 pilulában. Dos. max. pro dos. 0,05! pro die 0,2!

Pilulae aperientes Kleeweini (Extr. Cascar. sagr., Extr. Rhei chin., Podophyllum, Extr. Bellad.) bevált laxans káros hatás nélkül. (L. hird.)

Thaolaxine kit. kopragog., jav.: obstip. habit., ideges székek, terhes és szopt. nők béldug., enterit. muc, sem laxans, sem purgans. (L. hird.)

- 910 Rp. Podophyllini** 0,3.
 Extr. Belladonnae 0,1.
 Pulv. rad. Liquirit.
 Extr. Tarax. aa qu. s.
 ut. f. pilul. No. 30.
 Consp. pulv. Lycopod.
 S. Reggel v. este 1—2
 szemet. Obstip. habit.
- 911 Rp. Podophyllini**
 Extr. Hyosciami
 aa 0,2.
 Sacchar. alb 4,0.
 M. f. pulv. div. in
 dos aequ. No. 10.
 DS. 1—2 port egyszeri
 hashajtásra.

H. Potio Magnesiae citricae effervescens s. Limonada solvens. Enyhe laxans nők, gyermekek számára. Felnőttek egész üveggel, gyermeknek kor szerint $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ üveggel.

H. Potio Riveri l. Kalium carbonicum

Propaesin. A p. amidobenzoésav propylestere. Színtelen, vízben nehezen, szeszen, aetherben jól oldh. por. Helyi anaestheticum. Nem izgat, alig mérgező. Bels. gyomorhyperaesthesia, hyperemesis ulcus ventriculi, tengeri betegség esetén 0,2—1,0 gm. pro dos. ostyában. Hintőpor száj, garat, orr nyálkahártyájára, égési sebekre.

Proponal. $[(C_3H_7)_2C.(COOH)_2CO]$ A veronallal rokon, annál erősebben ható hypnoticum. Dipropylbarbitursav. Fehér, kristályos por, vízben nehezen oldódik. Adag 0.15—0.50.

Protargol l. Argentum proteinicum.

Proton. Tejből készült, fehér, laza, vízben jól oldh. 90. r. fehérjét tartalmazó tápszer, mely hasonló a plasmonhoz. Haszn. l. plasmon cz. a.

Protosal. A salicylsav glycerinformalestere, Olajos folyadék, színtelen, szeszen jól oldh. Haszn. mint a mesotan (l. e. cz. a.). Olajos oldatban 1:2 arányban bedörzsölések alakjában.

Protylin. 6% phosphorsavat tartalmazó fehérje-készítmény. Vízben oldhatatlan, fehér, íztelen por. Készítenek brom- és vas-protylint is.

Pulmoformium. Methylenidignajacol. Sárga, vízben nem oldh. íztelen por. Haszn. mint a pneuminé. l. ott.

Pulvis Goa. l. Araroba.

Purgatin. s. Purgatol. A trioxyanthrachinon diacetylestere. Narancsszíni, íztelen, könnyű, meleg vízben is nehezen oldh. jegeczpor. Enyhe laxans, mint a rheum, melynek hatóanyagai is anthrachinon származékok. A vizelet adagolása után vérpiros színi. (Beteget figyelmeztetni előre!) Adag 0,5—1,0 porban, v. a már kész tablettákból 2—4 db.

Purgatol l. Purgatin.

Purgo. Enyhe laxans, kólikát, vérbőséget, mérgezést nem okoz. Illatos czukortabletták alakjában jön forgalomba; hatóanyaga

Noffke oldódó bougie-jai a gonorrhoea (urethr. ant. et post. postat. chr.) kezelésére c. Protargol 1—10%. (L. hird.)

Thaolaxine kit. kopragog., jav.: obstip. habit., terhes és szopt. nők bédug., ent. muc., sem lax., sem purg. (L. hird.)

Pilulae aperientes Kleewein (Extr. Casc. ogr., Extr. Rhei chin., Podophyllin, Extr. Bellad.) bevált laxans. (L. hird.)

a *phenolphthalein* ($C_{20}H_{14}O_4$), melyből a *P. mitior* 0,05 gr.-ot, a *P. fortior* 0,10 gr.-ot tartalmaz. Székrekedés, bélhurut, bélatonia eseteiben rendelhető. Adagja igen különböző; 0,10—1 gr. között váltakozik (1—10 szem *P. fort.*); járó betegek kevesebbet, fekvők többet igényelnek. Csecsemőknek is rendelnek $\frac{1}{2}$ —1 pastilla *P. mitior*.

H. Pulpa Prunorum. Ízjavító. Electnariumok alapanyaga. Indifferens.

H. Pulpa Tamarindorum depurata l. *Tamarindus*.

H. Pulvis aërophorus Seidlitzensis. (Kék papirban kalium natrio-tartaricum 10,0 + natr. hydrocarb. 3,0, fehér papirban acid. tartar. 3,0.) Enyhe laxans.

†**H. Pulvis Doveri.** l. *Opium*.

H. Pulvis gummosus l. *Gummi arabicum*.

H. Punica Granatum l. *Granati Punicae cort. rad.*

H. Pulvis Liquiritiae compositus l. *Sennae folia*.

Puro. Hydranl. nyomással nyers húsból készült húslé, 21% alvadó fehérjét 2,9% enyvet, 6,8% peptont, összesen 33% fehérjét, 19% húsbasisokat tart. Barna, sűrű, tiszta, hideg vízben kissé zavarosan old. alkalikus kémh. folyadék. Erős táplálék. Főleg üdülőknek, phthisicusoknak, gyenge gyermekeknek czél-szerű. Felnőttek napj. 3—5-ször 1 kk. tejbe cacaoba, borba, sörbe, levesbe keverve, v. pirított kenyérre kenve rendelhető.

Pyocyane. Elölt bacillus pyocyaneus tenyészetekből készül. Barna folyadék. Sprayvel együtt kapható kis üvegekben steril alakban. Diphtheria helybeli kezelésére haszn. spray alakjában. Serum antidiphtheriticummal való kezelés azért szükségesnek mutatkozik és nem nélkülözhető. Ajánlják meningitis cerebrospin. ellen is 3—5 ketmt intraduralis befecsk. alakjában is, ugyanekkor 5—10 csepp a két orjáratba is beöntendő.

Pyoktaninum aureum és coeruleum. Anilinszínek bizonyos arányú keveréke. Vízben sárgán, illetőleg kékes ibolyaszínen oldódik, de nehezen. Stilling szerint mindkettő antisepticum és genyet pusztító hatású. Haszn. rosszindulatú, nem operálható tumorokba fecskendésre, valamint gümös fekélyek

Myrticol „Csatádi“ igen kell. ízű guajacol-áfonya-készítm., kitűnő a légzőszervek bántalmainál, különösen csúcs- és hörghurutok ellen. (L. hird.)

Hygiama alimentum est concentratum valoris maximi.

Tabl. Eulaxans Dr. Sztankay, a hashajtó hatást a gyomorsav behat. alatt képz., molekul. vált. nem szenvedett phenolphthalein idézi elő, a hatás azért sokkal jobb, mint az elraktározott, molekul. változáson átment phenolphthaleiné. (L. hird.)

kezelésére. Adagok küls. 1 : 1000—5000 oldatban, 0,1—1,0:100 hintőporban, kenőcsben. Diphtheria ellen 5—10%-os oldatokkal ecsetelések.

Pyramidon (Dimethyl-amido-antipyrin). Antipyrin származék. Sárgásfehér, kristályos por, vízben 1 : 10 oldható, íztelen. Antipyreticum, antineuralg. Haszn. mint az antipyriné, de az adag sokkal kisebb: 0,2—0,5—0,75; gyakran már a kis adagok is erősen hatnak.

912 Rp Pyramidoni 3,0.
Sacchar. alb. 4,0.
M. f. pulv. div. in
dos. aequ. No. 10.
DS. Antipyreticum. Napj.
2—4 port.

913 Rp. Pyramidoni
Citropheni \overline{aa} 0,5.
Sacchari alb. 4,0.
M. f. pulv. div. in
dos aequ. No. 10.
DS. Antineuralgicum.
Napj. 1—1 port.

Pyramidonum salicylicum. Fehér, vízben jól oldh. édeses kesernyés por. Haszn. mint a pyramidoné, csak hogy valamivel nagyobb (0,6—0,7 gm.) adagokban.

Pyrenol. Keveréke benzoesavnak, thymolnak, natr. benzoicumnak és oxybenzoatnak. Fehér, vízben oldh. por. Asthma, pertussis ellen, de mint antipyreticum, antirheumaticum is használható. Adag porban, tablettákban oldatban 0,5—0,75 gm., gyermeknek 0,1—0,3 gm.

Pyridinum (C_5H_5N). Állati anyagok száraz átpárlási terménye. Tiszta, színtelen, illó, kellemetlen szagú folyadék, égető ízű. Vizzel, borszeszszel, aetherrel, zsírokkal keverhető, Antiasthmaticum. (Főleg asthma nervosum.) A légzési központ ingerlékenységét s a reflexingerlékenységet lefokozza. Alkalmazás: 3,0—5,0 (1,0 = 28 esep) pyridin tányérra öntendő, s az a betegszobában elhelyezendő 15—30 perczre. Napj 3× ismételhető a belégzés. Szívbántalmaknál, elgyengült betegeknél nem.

Pyrodin s. Hydracetin. Acetylphenylhydrazin. Fehér, jegezes, szag- és íztelen por; vízben rosszul old. Bels. nem. Küls. pyrogallol v. chrysarobin helyett a bőrgyógyászatban, kenőcsök 1 : 10—15.

†**H. Pyrogallolum** l. Acidum pyrogallicum.

Menthocapsol „Skala“ fájdalomcsillapító bedörzsölés, analget. rubefaciens, resorptiv. (L. hird.)

Algocratin, megbízh. antipyret., analg. és antineuralg., káros hatás nélkül a szívre és gyomorra, specif. dysmenorrhoea ellen, fájdalomcsillap. neuralg., migrén, ischias stb. eseteiben. (L. hird.)

Pyrosal. Salicylecetsavas antipyrin ($C_9H_8O_5.C_{11}H_{12}N_2O$) Színtelen savanyú ízű lemezkék v. tűk; vízben neh. old. Bélben salicylecetsavra és antipyrinre hasad. Antipyreticum, anti-rheumaticum. Adag bels. porban (ostyában) 0,5—1,0 pro dos. napj. 4—6-szor.

Quabain. Alighanem azonos a strophanthin nevű glycosidával. Az acocanthera Schimperii hatóanyaga. Adaga vízoldatban 0,0003—0,0004 gm. per os v. bőr alá. Cardiacum mint a digitalis-készítmények.

Quassiae lignum. (Quassia amara. Simarubeae.) Hatóanyaga quassin (keserű anyag). Amarum. Haszn. mint a rad. Gentianae. Adag bels. decoct. v. maceratum 5,0—10,0 : 150,0, mely tokaji poharanként fogyasztandó. Keserű theakeverékek alkotórésze.

Extractum Quassiae. Vizes kivonat. Adag porban, pillulában, oldatban 0,1—0,5 pro dos. 2—3 × napj.

Quebracho cortex. (Aspidosperma Quebracho. Apocynae.) Quebracho blanco. Főhatóanyagai aspidospermin ($C_{22}H_{30}N_2O_2$) és quebrachin ($C_{21}H_{26}N_2O_2$), alcaloidok, melyek a légző központ ingerlékenységét csökkentik; ezenkívül csersav. Antidyspnoeticum. Haszn. készítmény az

Extractum fluidum Quebracho. Adag 1—2 kk. 2—4-szer napjában.

Aspidospermin. A quebracho-kéreg hatóanyaga. Színtelen, vékony jegeztűk; alkoholban oldhatók, hideg vízben nehezen. Haszn. mint a cort. quebracho. Adag bels. 0,001—0,002. gm. pro dos. napj. 3-szor, főleg sósavas sója alakjában, tehát aspid. hydrochlor.

H. Quercus cortex. (Quercus robur. Cupuliferae.) Hatóanyagai csersav és keserű anyag (quercin). Adstringens. Adag bels. decoct. 1 : 10, ritkán; helyette inkább tannint rendelünk.

Quietol. Nagyon bonyolult chemiai szerkezetű bromot és vale-rolt tartalmazó, utóbbira emlékeztető szagú, keserű ízű fénylő kristálytűk. Vízben jól oldh. Nervinum, antineuralgicum. Adag: 0,5 gm. porban v. tokocskákban napj. 2—4 × étkezés közben, utána $\frac{1}{2}$ —1 pohár víz.

H. Quillajae cortex. (Quillaja Saponaria. Rosaceae.) A senegagyökér pótszere. Hatóanyagai mint a senegának u. i. quillajasav és sapotoxin, melyekből azonban 5-ször több van benne,

Ester-Dermasan, erősebb Rheumasan, kitűnő a csúsz, köszvény, ischias makacs eseteiben, psoriasis és pytiriasis ellen. (L. hird.)

Extr. Thymi Kern 3 koncentrációban, kitűnő asthma, pertussis, bronchitis, phthisis eseteiben. (L. hird.)

mint a senegában. Erős expectorans. Vigyázat (!), helybelileg erősen izgat; ellenjavallják alkalmazását gyomor-, bélbántalmak, garatfekélyek, valamint erős köhögési inger. Adag bels. decoct. 3,0—4,0:150,0 2 ór. 1 evők. felnőttek; 1,0:100,0 nagyobb gyermeknek. Csecsemőknek s 1—3 évesnek nem.

914 Rp. Decoct. cort. Quillajae
e 3,0—4,0.

l. a. p. ad. colat. 150,0.

Natrii hydrocarb. 3,0.

Syrup. cort. Aurant.

10,0.

MDS. 2 ór. 1 evők.

915 Rp. Pulv. cort. Quillajae,
1,5.

Pulv. Doveri 1,0.

Sacchar. alb. 3,0

M. f. pulv. div. in dos.

aequ. No. 10.

DS. 3× napj. 1 port.

Radiogen. Állandó emanációval bíró radium-készítmény, melynek segélyével radiogenvíz, iszap, fürdők készíthetők. Bels. 500 egységből fokozatosan felfelé, 15,000 egység erősségig itatnak radiogenvizet betegekkel 4—6 héten át. Fürdőknél 2—3 napi időközökben 100,000 egységes vizet használnak. Bővebben l. a Radiogen-Gesellschaft füzetét.

Radium. Elemi állapotban még nincs előállítva, de chloridja RCl_2 és bromidja RBr_2 ismeretes. Mindkettő fehér sötömeg, hosszabb idő alatt megsárgul. Sötétben kékes ibolyafényt sugároz. Milliagramnyi söt kis üvegcsőbe forrasztva használják súlyos eczema, lupus, carcinoma gyógykezelésére.

Ramisyru. Szörpben oldott bromoform. Kávéskanalanként pertussis, asthma esetén.

Ramogen. Gyermektápszer, mely 7% caseint, 16% zsírt és 36% cukrot tart. Tejjel, vízzel adagolják. Régi neve „*Biedert's Rahmgemenge*“.

H. Ratanhiae radix. (*Krameria triandra*. Polygaleae.) Hatóanyaga csersav. Adstringens. Bels. adag decoct. 7,0—10,0:150,0 2 ór. 1 evők. mint antidiarrhoeicum, gyakran opium-készítményekkel összekötve.

H. Extractum Ratanhiae depuratum. Beszárított vizes kivonat. Adstringens tannin helyett. Küls. száj-, torokvíznek 2—5% os oldatok, kenőcsnek 1:5. Bels. porban, oldatban 0,4—1,0 pro dos. 3—5× napj.

H. Tinctura Ratanhiae. Küls. mint adstringens ecsetelésekre; bels. 15—30 csepp pro dos.

Sanitol szájvíz és fogpor sec. Halász dr. a modern foggyógyászat elvei szerint előállított, a szájhig. követ. megf., komolyan hasznos és értékes száj- és fogápolószerek, inunctiós kuráknál kit. bevált öblögető. (L. hird.)

Trencsenteplisz természetes iszapfürdői és 36—42 hőfokú radiumos kénes forrásai kit. hat. izom- és ízületi csúsz, köszvény eseteiben. (L. hird.)

916 Rp. Decoct rad. Ratanhiae
e 10,0.
l. a. p. ad colat. 150,0.
Tinct. Opii simpl. 1,0.
Syrup. Cinnamomi 10,0.
MDS. 2 ór. 1 evők.
Diarrhoea.

918 Rp. Infusfol. Salviae e15,0.
l. a. p. ad. colat. 300,0.
Extr. Ratanhae dep.
6,0.
Spirit. aromat. 20,0.
MDS. Száj- és torokvíz.
Adstringens.

920 Rp. Tinct. Ratanhiae
Tinct. Myrrhae
aa 20,0.
MDS. Foghús ecsetelésére.

917 Rp. Extr. Ratanhiae dep
4,0.
Opii puri 0,1.
Elaeosacch. Menthae.
2,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
DS. 2 ór. 1 port.
Diarrhoea.

919 Rp. Extr. Ratanhiae dep
0,2—0,4.
Tinct. Opii simpl. gtt.1.
Aqua dest. 80,0.
Syrup. cort. Aurant.
8,0.

MDS. 2 ór. 1 kk.
Csecsemőnek bél-
hurut esetén.

921 Rp. Tinct Ratanhaie gtt.10.
Tinct. Opii simpl.
gtt. 1—2.
Aqua dest. 80,0.
Syrup. simpl. 8,0.
MDS. 3 ór. 1 kk.
Csecsemőnek bél-
hurut esetén.

Regulin. Hashajtó. Nem egyéb mint agar-agar-ral vegyített cascara sagrada kivonat. Adag napj. 1—2 evők. almapurrében v. befőttésleében szétkeverve. 0,6 regulint tartalmazó kész tabletták is vannak forgalomban.

Renes siccati pulverati l. Organotherapeuticus készítmények.

Reniin-Poehl l. Organother-készítm.

Renoform. Nátha-ellenes szer. Acid. boric. és sacch. lactis keveréke 2% extr. suprarenale-val. (Vigyázat!)

Resaldol. Chlormethylen-salicylaldehyd és resorcin condensációs terméke. Barnás, vízben nem oldh. por, alkoholban old. Bélantisepticum fekélyes, tuberculosus bélbajoknál. Bels. 0,5—1,0 pro dos. napj. 3—5-ször caps. amylaceában. Csőrének 1,0—3,0:200 keményítés folyadékra.

†**H. Resina Jalapae.** l. Jalapae tubera.

Lactobacilline erjesztő anyag, kit. bélantisepticum, meggátolja a bélbeli rothadást. (L. hird.)

Myrticol „Csatádi“ igen kell. ízű guajacol-áfonya-készítm., tüdőbetegék gyomorzavarai és bélbánt. ellen specificum. (L. hird.)

II. Resina Pini burgundica. Tisztított fenyőgyanta. Tapaszok készítéséhez szükséges a gyógyszerészeti technikában.

Resorbinum. Jó kenőcsanyag, különösen kénesős bedörzsölő gyógymód alkalmával. Lásd hydrargyrum-készítmények. Összetétele: lanolin, ol. amygdal. dule., cera, gelatina, sapo.

†**H. Resorcinum** ($C_6H_6O_2$). Metadioxybenzol. Majdnem színtelen, vagy kissé sárgás, hasáb- vagy lemezalakú jegecekből áll. Sajátságos gyenge szagú s kellemetlen, karczó, édes ízű. Vízben, borszeszben, aetherben könnyen oldódik. Eleinte mint antipyreticum szerepelt, ma ezen használata obsolet. Mint antisepticum jól használható az acid. carbol. pótszeréül, mert az utóbbinál kevésbé mérges. Sebkezelésben 0,5—5%-os oldatait haszn. Pora lágy fekélyek edzésére jól haszn. Hólyagmosásra 3—6%-os oldatok. Bels. sarcina ventriculi vagy a gyomorban székelő erjedési folyamatok ellen 0,5—1,0 pro dos. 3—4× napj. oldatban vagy caps. amylaceában. Dos. maxim sing 0,5! pro die 5,0! Resorcin-kötszerek jól használhatók.

922 Rp. Resorcini 30,0.
Aquae dest. 1000,0.
M. f. solutio.
DS. Hólyagmosásra.
Langyosan használandó.

924 Rp Resorcini 5,0—10,0.
Ol. Ricini 45,0.
Spiritus vini 150,0.
Bals. peruvian. 0,5.
MDS. Küls. Bedörzsölésre
pityriasis versicolor ellen.

926 Rp. Resorcini
Acid salicylici aa 1,0.
Spiritus vini rectif.
Spirit. Lavend.
aa 50,0.
MDS. Külsőleg. Hajszesz.

923 Rp. Resorcini 5,0—10,0.
Div. in dos. No. 10.
Dent. in caps. amyl.
S. 3× napj. 1 capsulát.

925 Rp. Resorcini 5,0—10,0.
Vasellini 25,0.
Amyli
Zinci oxyd. aa qu. s.
ut. f. pasta.
DS. Küls.
Herpes tonsurans.

927 Rp. Resorcini 3,0—4,0.
Zinci sulf. 1,0.
Aquae dest. 200,0—300,0.
M. f. solut.
DS. Húgycsőbe fecskendésre. Gonorrhoea.

Noffke oldódó bougie-jai a gonorrhoea (urethr. ant. et post.) prostat. chr.) kezelésére c. Resorcin-Tannin aa 5%. (L. hird.)

Resorcin-gyógyszappan, resorcin-salicyl-kénszappan a kozzsvári (Heinrich József) gyógyszappangyárból kit. hat. psoriasis, ichthyosis, májfoltok, szeplők, zsíros teint ellen. (L. hird.)

Gonorrhoea: Rp. Gelodurat „Pohl“
scat. orig. c. ol. sant. 0,5.
S. 3-szor naponta 2 dbot.

928 Rp. ResorciniAcid. salicyl. \overline{aa} 4,0.

Empl. saponati 40,0.

M. f. empl. molle

D.S. Tapasz

Eczema tyloticum.

H. Rhei rhizoma. (Rheumfajok gyökere. Polygoneae.) Főhatóanyagai cathartinsav, emodin, de tartalmaz csersavat is. Kis adagban (0,1—0,5 pro dos. napj. 3—5-ször) adstringens, tonicum, stomachicum, nagy adagban (1,0—2,0 pro dos.) laxans. Adagolás porban.

H. Extractum Rhei. Beszárított kivonat. Haszn. mint a radix. Kis adag 0,1—0,2 pro dos. 3—5× napj., nagy adag 0,5—1,0 pro dos. porban, pilulában, oldatban. Gyakori alkatrésze hashajtó piluláknak aloeval, jalapával együtt.

H. Tinctura Rhei Darellii s. vinosa. Főleg mint tonicum stomachicum. Adag 3× napj. 1 kk.

H. Infusum Rhei s. Tinct. Rhei aquosa. Laxans. Adag. ór. 1—2 evők. a széktürülés beálltáig.

929 Rp. Pulv. Rhei
 Extr. Rhei \overline{aa} 5,0.
 Mucil. Gummi arab.
 qu. s. ut f. pill. No. 50.
 Consp. pulv. Lycopod.
 D.S. Reggel, este 1—2—3
 szemet. Obstip.
 habit.

930 Rp. Pulv. Rhei 1,0.
 Extr. Nucis. vom. 0,1.
 Natrii sulfur 5,0.
 M. f. pulv. div. in
 dos. aequ. No. 10.
 D.S. 3—4-szer napj. 1 port.
 Idült gyomor- v.
 bélhurut.

931 Rp. Pulv. Rhei 1,0.
 Kalii hydrotart. 4,0.
 Sachar. alb. 10,0.
 M. f. pulv. det. in scat.
 S. 4-szer napj. 1 kés-
 hegygyel. Nagyobb gyer-
 meknek icterus catarrh.
 esetén.

932 Rp. Pulv. Rhei 0,5.
 Natrii hydrocarb. 1,0.
 Sacchar. alb. 3,0.
 M. f. pulv. div. in
 dos. aequ. No. 10.
 D.S. 2 ór. 1 port. 3—8
 éves gyermeknek icterus
 catarrh. esetén.

Pilulae aperientes Kleewein (Extr. Cascar. sagr., Extr. Rhei chin, Podophyllin, Extr. Bellad.) bevált laxans káros hatás nélkül. (L. hird)

Elixir Condurango pept. „Immermann“ kitűnő tonic., stomach., roborans mindenféle gyomorbajnál. (L. hird)

Joricin (jóizú ricinusolaj) kitűnő hashajtó!

Thaolaxine kit. kopragog., jav.: obstip. habit., ideges székrek., terhes és szopt. nők béldng., enterit. muc., sem laxans, sem purgans. (L. hird.)

933 Rp. Extr. Rhei
 Extr. Gentianae
 Extr. Ferri pomati
 aa 3,0.
 M. f. pillul. No. 50.
 Consp. pulv. Cinna-
 momi
 DS. Napj. 3-szor 3—5
 szemet. Tonicum.

935 Rp. Infus. Rhei cum
 Natr. carb. 100,0.
 Olei Menthae pip.
 gtt. 2.
 Syrup. Menthae 20,0.
 MDS. Or. 2 evők., míg has-
 hajítás beáll. Enyhe
 laxans.

934 Rp Tinct. Rhei Darelli
 10,0.
 Syrup. Menthae 30,0.
 MDS. 2 ór. 1 kk. — 1 gyk.
 míg hashajtás be-
 következik.
 1—2 éves gyermek-
 nek hashajtó.

936 Rp. Rad. Rhei pulv. 13,0.
 Aloes 10,0.
 Myrrhae 6,0.
 Olei Menthae pip.
 gtt. 5.
 M. f. pill. No. 100.
 Consp. pulv. cort.
 Cinnam.
 DS. 2—4 szemet 1—2 ×
 napj.
 Obstip. habit.

Rheumatin. (Zimmer). Salicylsavas salicylcchinin. Vízben nehe-
 oldh. fehér jegeczek. Íztelen. Ajánlották polyarthrititis ellen
 napi 1,0— emelkedő adagokban, porban.

Rhomnol. Tart. nucleinsavat. Organikus phosphortartalma 9·63%.
 Kaph. pilulák alakjában, granulálva is és ampullákban. Roborans.

Rhus aromaticus. Északamerikai növény. Haszn. a belőle
 készült.

Tinct. Rhois aromaticae. Enuresis nocturna, diurna ese-
 teiben gyerm. adagja 10—20 csepp 3—4-szer napj.

Roborat. Rozsból készült növ. fehérjekészítmény. (95% fehérje,
 2% lecithin és glicerinsav, 1% amylum és dextrin.
 Fehér, szagtalan, kenyérízű, meleg vízben, tejben, levesben jól
 szétkeverhető anyag. Tápszer. Készítenek *vas, kola* és *kreosotos*
roboratot is.

Roborin. Marha- v. borjúvérből készült íztelen por. Tartalmaz
 4·7% vasoxydot, 74·2% fehérjét. Vastartalmú fehérje-készítmény-
 nek tekinthető. Vas benne erős organicus kötésben van. Adag:
 napj. 3-szor 1/2—1 kk. vízben, tejben, v. borban, étkezés után.

Rodagen. Pajzsmirigyüktől megfosztott kecskék tejéből 50% tej-

Stoll diet. Kola készítményei: Kola-bor, Kaiser kola-elixir,
 Kola-gran. stb. kitűnő gyomorzsongító és idegerősítő szerek.

Menthocapsol „Skala“ fájdalomcsillapító bedörzsölés, csúszos,
 neuralgiás, köszvényes fájdalmak ellen. (L. hird.)

ezukor hozzáadásával nyert készítmény. Basedow-kór (?) esetén 5—10 gr. pro die.

H. Roob Juniperi l. Juniperi fructus.

H. Roob Sambuci l. Sambuci fructus.

H. Rosmarini folia (Rosmarinus offic. Labiatae.) Haszn. az ol. rosmarini előállítására.

Rubidium ammonium-bromid. [$RbBr_3.(NH_4)Br$]. 100 sr.-ben van 36 sr. rubid. bromid és 64 sr. ammon. brom. Fehér v. kissé sárgás, jegeczes por; íze kezdetben kissé hűtő, majd csipős, sós. Egyenlő sr. vízben oldódik. Bromkali pótszere. Antiepilepticum. (Laufenauer.) Enyhe sedativ és hypnoticus hatása is van. Adag bels. oldatban 4,0—7,0 pro die mint anti-epilepticum; többszörre bevenni. Insomnia ellen 4,0—5,0 pro die és pro dos.

937 Rp. Rubidii Ammonii
 bromati 18,0.
 Aquae dest. 300,0.
 Syrup. simpl. 60,0.
MDS. Három-négy napra.
 Egy evőkanál 1
 gmot tartalmaz a
 készítményből.
 3 ór. egy evők.
 Epilepsia.

938 Rp. Rubidii Ammonii
 bromati 5,0.
 Aquae dest. 50,0.
 Syrup. simpl. 15,0.
MDS. Este egyszerre be-
 venni. Insomnia.

Rubidium jodatum. (*RbJ*) Színtelen, vízben jól oldh. koczkás jegeczek. Jodkali helyett használható. Bels. 0,5 pro dos. napj. 3—4-szer oldatban. Szembe csepegtetésre 5%-os oldatok.

Rubrum scarlatinum s. scarlatinum. Színanyag, mely a górcsővi készítmények festésére régen használtatik; újabban tapasztalták, hogy sebekben a hámképződést kitünően mozdítja elő. 2—5%-os kenőcsök szokásosak.

939 Rp. Rubri scarlatini
 1,0—2,0.

Vasellini.

Lanolini aa 20,0.

M. f. ungu.

DS. Külsőleg.

Sabadillae semina. (Schoenocaulon offic. Melanthaceae.) Hatóanyaga veratrin. Bels nem. Küls pediculosis ellen kenőcsalakban. Hiv. kenőcs az

Unguent. Sabadillae s. Ungu. contra pediculos (50 : 200).

Alimentum Theinhardt optimo jure nominatur „solubile“.

†H. **Sabinae frondes.** (*Juniperus Sabina*. Pinaceae.) Hatóanyaga az oleum sabinae. Kenőcsalakban (1 : 1—5) izgató, bőrvörösítő. Bels infus. 4,0 : 150,0 diureticum. Ritkán haszn. Főlőseges. Nagy adagban veszélyes (!). Dos. maxim. sing. 1,0! pro die 2,0!

Sabromin. Dibrombethiensusavas calcium. 29% br. és 3·8% Ca-tart. Haszn. mint a bromsóké. Előnye nincs. Adag 1—2 gr. pro dos. napj. többször.

†H. **Saccharinum** ($C_7H_5SO_3N$) Benzoesavas sulfimid. Fahlberg-féle. Fehér, alaktalan, kevésbé mandulaszagú, rendkívül édes por, hideg vízben nehezen, forróban könnyen oldódik, borszeszben, aetherben szintén. Nem tápszer, a cukrot nem pótolhatja. Ízjavító, a mennyiben 280-szor oly édes, mint a sacchar alb. A szervezetet változatlanul hagyja el. Diabeticusok étkeinek, italainak édesítésére alkalmas, ép úgy chinakészítmények ízének javítására is. Készítenek chininum saccharanicum-ot (36 r. saccharin+64 r. chinin), morphinum saccharanicum-ot (64,4 r. morphin+39,1 r. saccharin). Kapható már kész tablettákban is.

940 Rp. Saccharini 3,0.
Natr. carb. 2,0.
Manniti 60,0.
M. f. l. a. pastilli
No. 100.

DS. Egy pastilla egycsésze
kávé, tea stb. édesítésére elegendő.
Diabetes mellitus.

942 Rp. Saccharini 10,0.
Natrii carb. 11,0.
Aquae dest. 1000,0.

MDS. Saccharin szörp.

941 Rp. Saccharini 0,2.
Antipyrini 10,0.
Natr. bicarb. 0,1.
Infus. Coffeae 150,0.
DS. napj. 2—3 evők.
Diabetes mellit.

943 Rp. Saccharini 1,0.
Spirit. vini 50,0.
MDS. 1 kávéskanállal 1/2
polár vízre. Ezzel
napj. 5× ecsetelni.
Szájpenész (soor) ellen

H. **Saccharum album.** Ízjavító, vivőanyag

H **Saccharum lactis.** Tejczukor. Haszn. mint a sacchar. alb
Különösen vízszívó porokhoz célszerű, mint vivőanyag.

Regenerol a vérsavó só-t tartalmazó tabletták, jav.: arteriosclerosis, oxaluria, uraturia stb. (L. hird.)

Vichy-Célestine-forrás kit. hat. diabetesnél. (L. hird.)

Wildungeni gyógyvizek a legjobb asztali italok cukor-bajosok részére. (L. hird.)

Biocitin a legtokélet. Lecithin-készítm. mai nap, kit. hat. rhachitis, osteomalacia, anaemia, chlorosis, neurasth., scrophul., ulcus ventr. stb. eseteiben. (L. hird. a címlappal szemben.)

Sajodin. Monojodbehensavas calcium. 26% jodot, 4% Ca-ot tart. Színtelen, szagtalan és vízben nem oldh. por. JK és JNa. helyett adagolják 1,0 pro dos. napj. 3—6 szor.

Sal Alembrothi s. Ammonium-higanychlorid. $(NH_4)_2HgCl_4 + 2H_2O$. Vízben nehezen oldható, légen elmálló, színtelen jegeczek. Lister a sublimát helyett használta az anti-septicus sebkezelésnél. Oldatok, mint a sublimatból.

Sal ammoniacus depur. l. Ammon. chloratum.

Sal anaestheticum. A Schleich-féle eljárásához (l. cocain cz. a.) szükséges oldatok kényelmes készíthetésére szükséges porkeverék, tabletták alakjában (Borroughs Wellcome et Comp.). No. I. erős, II. normal, III. gyenge oldatok számára. Tartalmaznak: cocaint, morphint és NaCl-ot. Egy tablettá 100 gr. vízre.

Sal physiologicum (Poehl). Fehér, vízben oldh. por, v. kereskedésbeli comprimált 1 gmos tabletták. A vérsérüm sóit tartalmazza. 1½%-os oldat készítendő s ez egyenlő a vérsérüm sótartalmával. Ily oldat haszn. nyálkahártyák mosogatására, hypodermoklysis, transfusio céljaira.

H. **Sal Seignetti** l. Kalium natrio-tartaricum.

H. **Sal Carolinum factitium.** l. Natr. sulfur. cz. a.

Sal. thermarum Carolinarum l. Natrium sulfuricum.

H. **Salep tubera.** (Különböző Orchis-fajok gumója.) Hatóanyagai növényi nyák, keményítő. Decoctum 0,5—1,0: 100,0 bevonó és jó vehiculum csipős, keserű, savanyú anyagok számára.

H. **Mucilago Salep** (1:200). Alkalmas czélszerű eljárással készített nyákos folyadék. A decoct. Salep rendelésekor a gyógyszerész ezt szolgáltatassa ki. Ezentúl tehát csak a decoctum összes mennyiségét kell jelezni pl. így. Rp. Decoct. tub. Salep gm. 150.

944 Rp. Decoct. tub. Salep 140,0.
Tinct. Opii simpl. 1,0.
Syrup Ipecac. 10,0
MDS. 2 ór. 1 evők.
Diarrhoea.

945 Rp. Decoct. tub. Salep 80,0.
Aluminis 0,4.
Tinct. Valerian. gtt. 10.
Syrup simpl. 8,0.
MDS. őr. 1 kk.

Csecsemőnek heveny gyomor-, bélhurut esetén, ha collapsus jelentkeznék.

Sztraka-féle tannin-csokoládé kis gyermekek és felnőttek hasmenése ellen kit. hat. és kell. ízű (L. hird.)

Menthocapsol „Skala“ fájdalomcsillapító bedörzsölés, igen hatásos ott, hol a salicylatok resorptiv hatását akarjuk érvényesíteni. (L. hird.)

Salacetolum. (Salicylacetol.) Színtelen jegecztűk. Keserű ízű, vízben nehezen oldh. Belekben salicylsav hasad le belőle. Hatása, haszn. bels. mint a salolé. Adag bels. felnőttnek porban 2,0—3,0 pro dos. napj. többször. Gyerm. 0,3—0,5 pro dos.

Salazonon l. Salipyrin.

Salen. A salicylsav methyl- és aethylglycolsavestereinek keveréke. Fehér kristályok. Oldható alkoholban, aetherben, ricinusolajban és ricinusolaj keverékében. Szagtalan. Haszn. küls. bedörzsölés alakjában 50%-os olajos v. szeszes oldatban.

Salicin. Fűzfa és nyárfafélék kergéből előállított glycosida, mely a gyomorban saligeninre és dextrose-ra hasad. A saligenin úgy hat, mint a salicylkészítm. általában. Adag 2,0 napj. többször. Keserűízű s így mint amarum is adható 0,1—0,3 pro dos.

Salicylamidum. ($C_6H_4.OH.CONH_2$.) Színtelen, táblás jegeczek; hideg vízben nehezen, melegben könnyen old. A szervezetben salicylsav hasad le belőle. Antirheumaticum és analgeticum, mint a salicylsav. Adag bels. porban 0,15 ór., vagy 3 ór. 0,25. Pro die 1,0.

Salifebrin. (Antifebrinum salicylicum) Fehér por; vízben nem, alkoholban oldható. Antipyreticum, analgeticum. Adag 0,25—0,35 gr. többször napjában.

Saliformin (Hexamethylen-tetramin-salicylat.) Húgsavoldó és hólyag-desinficiens. Adag 1—2 gr. pro dosi vizes oldatban napj. többször.

Saligallol. (Pyrogallol-disalicylat.) Enyhe pyrogallol hatást fejt ki. Haszn. mint a pyrogallol 2—20%-os acetonos v. chloroformos oldatban ecsetelésre.

Salimenthol. Salicyl-avas menthol-ester; világos sárga folyadék. Haszn. küls. 25%-os kenőcs alakjában, mely készen „Šamol“ néven kapható; bedörzsölések rheumatismus ellen. Bels. n. ezen esetekben caps-ban 0,25 pro dos. 2—3× napj.

Salitum purum. Salicyl-avas borneolester. Olajszerű folyadék, vízben nem old., alkoholban, aetherben, olajokban jól oldh. Kereskedésbe „Šalit“ néven $\frac{1}{3}$ r. olajjal készült linimentum alakjában jó. Haszn. küls. bedörzsölésre rheumatismus stb. ellen.

Salmiak. l. Ammonium chloratum.

Bengué balzsam (menthol, methylsalicylat, lanolin) kítőző fájdalomcsillapító csúsz, migrén, lumbago, pruritus eseteiben. (L. hird.)

Algocratin megbízh. antipyret., analg. és antineuralg., kiv. specif. dysmenorrhoeánál, kit. fájdalomcsillap. neuralgia, migrén, ischias eseteiben. (L. hird.)

Salochinin. (Salicylsavas chininester.) Színtelen, íztelen, vízben oldhatatlan kristályok. Antineuralgicum, anodynum, antirheumaticum. Állítólag nem okoz kellemetlen mellékhatást. Adagja 2 gr. pro dos. 1-szer vagy többször napjában. (Overlach).

Salocoll. (Salicylsavas phenocoll.) Vízben rosszul oldódó, édeses por. Antipyreticum, antineuralgicum. Adagja 1,0—2,0 gr. pro dosi, napj. többször, porban.

Salocreol. Salicylsav és kreosot összeköttetése (kreosot salicylsavestere?). Barna, olajos folyadék, vízben nem oldódik. Haszn. küls. polyarthrititis, mirigydagulatok, erysipelas esetén; 6,0—20,0 pro die a száraz bőrre dörzsölendő tisztán. Bőrrel fel tud szívódni, azt nem színesíti meg s nem is izgatja.

†**H Salolum.** [$C_6H_4(OH)COO.C_6H_5$.] Salicylsavas phenylester Fehér, jegeces, vízben majdnem oldhatatlan, csaknem íztelen, aromaticus szagú por. Borszeszben, aetherben, zsíros olajokban könnyen oldható. Gyomorból nem szívódik fel, a bélben salicylsavvá és phenollá hasad szét. Hintőpor, vagy olajos oldat, v. kenőcs alakjában, v. borszeszes oldatban desinficiens. Mint a salicylsavas natrium pótszere használtatik; főleg azonban mint bélantisepticum. Kellemetlen mellékhatásai mint a natr. salicyl.-nak Adag bels. porban 1,5—2,0 pro dos. 3—5× napj. felnőtteknek. 0,3—0,5 pro dos. 3—5× napj. gyermekeknek. Küls. poralakban, v. talcummal, amylummal (1—2:10) hintőpornak; olajjal v. kenőccsel (1:10—20) ecsetelésre, bekenésre; száj-, torokvíznek 5—10% os borszeszes oldatból kávéskanálnyi 1 pohár langyos vízre. Dos. maxim. pro dos 1,5! pro die 5,0!

946 *Rp* Saloli 5,0.
Amyli 50,0.
M. f. pulv. det. in scat.
S. Hintőpor.
Fekélyekre, decubitusra.

947 *Rp* Saloli 10,0.
Gummi arab. 5,0.
Aquae dest. 200,0.
M. f. l. a. emuls.
DS. Külsőleg. Gonorrhoeánál húgycsőbe fecsk. 3-szor napj.

948 *Rp* Saloli 3,0—4,0.
Ol. Sesami 40,0.
M. f. linim.
DS. Külsőleg.
Eczema. Pruritus.

949 *Rp* Saloli 10,0.
Amyli 1,0.
M. f. pulv. div. in dos. aequ. No 20.
Comprimantur.
DS. 1—2 ór. 1—4 drbot.

Extern salicyl-therapia: Rheumasan, Ester-Dermasan, Chrysarobin- (s kátrány-Dermasan, Ester-Dermasan-vaginál kapszulák, kitünően bevált készítmények. (L. hird.)

Vesicaesan-labdacsok tart. a Fol. uvae ursi összes hatóanyagait, bevált hólyag-fertőtlenítőszer acut és idült gonorrhoeánál, gyomorra, vesékre káros hatás nélkül. (L. hird.)

950 Rp. Saloli 0,5—5,0.
 Spirit. dil. 1000,0.
 Tinct. Coccionellae.
 3,5—5,0.
 Ol. Rosar. gtt. 1.
 Ol. Menthae 1 ip.
 gtt. 2.

MDS. Száj- és torokvízhez.
 Egy kávéskan. 1
 pohár vízre.

951 Rp. Saloli 10,0.
 Olei Menthae pip.
 gtt. 2.
 M. f. pulv. div. in
 dos. aequ. No. 10.
 Det. in chart. cerat.
 S. 1—2 ór. 1 port.

Salophenum. (Acetparamidosalol.) Fehér, szag- és íztelen, vízben nem old. por. A bélben salicylsavra és acetylparamidophenolra hasad. Haszn. mint a salolé és natr. salicylicnmé. 51% salicylsav van benne. Adag pro dos. 1,0 napj. 4—6-szor porban.

Salosantal. Oldata 33 $\frac{1}{2}$ % salolnak ol. santaliban. Ízjavítónl ol. menthaet tartalmaz. Heveny húgycsőblennorrhoea és cystitis esetén, ha a helyi kezelés még nem lehet 3 × napj. 10—20 cseppet. Tokocskák is vannak forgalomban 0,5 gm. tartalommal; ezekből 2 db. napj. 3-szor.

Saluminium. insolubile. (Aluminium salicylicum.) Finom, jegeczes, pirosas, vízben neh. oldh., adstringens, antisepticus por. Ozaena ellen befúvások az orrba.

Saluminium solubile. (Alumin. salicylicum ammoniatum.) Sárgás, vízben jól oldh. neutr. por. Hatása mint az *insolubile* készítményé, csakhogy erősebb helybeli izgató. Haszn. u. az, de lehet oldatban is alkalmazni. Garatecsetelésre 2r. : 3r. vízre és 5r. glycerin.

Salvarsan („Ehrlich-Hata 606.” s. Arsenobenzol recte dioxyd amidoarsenobenzol). Sárga, vízben oldható, savanyú kémhatású por. As-tartalma 31,6%. Syphilis és recurrens ellen specificum, a mennyiben a spirochaetákat előli eminens parasitotrop saját-ságánál fogva. Syphilis utáni tabes, paralysis progr., arterio-sclero-is ellen nem használ, sőt ártalmas is lehet. Bőr alá, intramuscularisan, v. intravenasan fecskendik be natronluggal közönbösített vizes oldatait (vizes oldat savanyú, ezért a közönbösítés). Az oldatok mindig frissen készítendőek. Adag felnőtteknek 0,4—0,8 gm. egyszerre. Egy hó múlva ismételni lehet a befecskendést. Kellemetlenségek nem ritkák: pl. fájdalom a befecskendés helyén, duzzadás, sőt bőrellhalás is; továbbá lázas mozgalmak, rázóhideg, főfájás, szédülés, gyomor-béltünetek, exanthemák, látási, hallási zavarok. 0,6 gmos ampullákban kapható (drága).

H. Salviae folia. (Salvia offic. Labiatae.) Hatóanyagai illó olaj és csersav. Gyenge adstringens. Leginkább száj- és torokvíznek. Infus. 1 : 10.

Kawotal (Res. kava-kava + Ol. sant. ostind. pur. in caps.) kiv. antigonorrh., fájdalomesillap., váladékesökk., cystitisnél a vizeletet deríti, a dysuriát megszünteti. (L. lúrd.)

A kolozsvári (Heinrich József) ásvány- és gyógyszappangyár r.-t. gyógyszappanjai:

Szent-László fertőtlenítő-szappan, bakteriumölő ereje vetekedik a szublimátéval, a kéz desinficiálására igen alkalmas.

Kátrány-gyógyszappan a külföldi kátrányszappanokat gyógyhatás tekintetében felülmulja, mert első minőségű fakátrányt tartalmaz, mely nem mérgező, mint némely kőszén-kátrány.

Anthrasol (fehér kátrány) gyógyszappan, nem színesíti a bőrt, azért az arcz, kéz, fejbőr kezelésére igen alkalmas.

Creolla gyógyszappan igen alkalmas viszkető, lobos bőrbajok kezelésére.

Kénes gyógyszappanok: kéntej, homokos kénes, kénes kátrány, kénes fehér kátrány, kénes salicyl gyógyszappan, ezekben a kén oldott állapotban és nem egyszerűen hozzákeverve foglaltatik, gyógyítóhatásuk azért erősebb, mint más kénes szappanoké.

Resorcin-gyógyszappan kitűnő hatása azon bőrbajoknál, hol hámlasztani kell a bőrt (májfoltok, szeplők) és a felhalmozott felhámot el kell a bőrrel távolítani (psoriasis, ichthiosis stb.)

Resorcin-salicylkén-gyógyszappan, idültebb bőrbántalmaknál javalt.

Salicyl-gyógyszappan hatása ugyanolyan, de enyhébb, mint a Resorcin-szappané.

Ichthyol-gyógyszappan, kitűnő hatása fagydaganatok, orr és arc vörössége ellen.

Chrom-gyógyszappan a legjobb hyperhydrosis megszüntetésére.

Ichthyol-salicyl-gyógyszappan javalt ott, ahol a két szer együttes hatására van szükség.

Lanolin-gyógyszappan a legenyhébb hatású bőrápolószappan.

Borax-gyógyszappan eczemáknál, ótvárnál igen jó hatású.

Benzoe gyógyszappan elsőrendű toilette-szappan.

Petrol-gyógyszappan a fejbőr korpázásának megszüntetésére igen alkalmas.

Camphor-gyógyszappan igen jó rheumás fájdalmak csillapítására.

Carbol-glycerin gyógyszappan impetigo, akne, pyodermia ellen igen alkalmas.

Tannin-gyógyszappan kitűnő fejbőrápoló-szappan, hyperhydrosis ellen is igen hatásos.

*Az itt felsorolt gyógyszappanok kaphatók minden
gyógyszertárban, drogériában és illatszer-kereskedésben.*

A fertőtlenítés házilag

tökéletes eredménnyel, minden leg-
csekélyebb veszély és ártalom nélkül

A BRÁZAY-féle SALUS fertőtlenítő szappan

rendszeres alkalmazása által eszközölhető.

A Brázay-féle SALUS fertőtlenítő- szappan,

amint azt az idevágó elsőrangú laboratoriumi vizsgálatok is teljes-
séggel bizonyítják, még a legszívósabb bakte-
riumok és ezek csiráinak jelenléténél is a
legtökéletesebben fejti ki fertőtlenítő és a
fertőzéstől biztosan megóvó hatását és
emellett a rendszeren használatos fertőtlenítő
szerek alkalmazásával mindig együttjáró
maró, edző és mérgező hatást teljesen ki-
zárja. Nélkülözhetlen tehát a mindennapi
orvosgyakorlatban, beteglátogatások és vizs-
gálatok közben és után, ugyancsak az ápoló
személyzet, beteg látogatók részére, bete-
gek ruháinak mosására stb.

Kapható mindenütt. Ára 70 fillér.

Főraktár : **BRÁZAY KÁLMÁN** cégnél
Budapest, VIII. Baross-utca 43.

Névre és védjegyre tessék vigyázni!

H. Sambuci cymae s. flores. (*Sambucus nigra*. Caprifoliaceae.) Hatóanyaga illatos olaj. Diaphoreticum. Infus. 1 : 10.

H Sambuci fructus. Belőle készül a

H. Roob Sambuci. Izjavító, electuariumok alapanyaga.

Samol, l. Salimenthol.

Sanatogen. (Glycerin-phosphorsavas natriumcasein.) Vízze tej-szerű folyadékot alkot. Tonicum, roborans. Adag: felnőttek evők., gyermekek kávésk. többször napjában.

Sanguinal. Vérből készült vaskészítmény 10% haemoglobintartalommal. *Krewel*-féle pillulák készen kaphatók; egy pillula 5,0 vérnek felel meg. Adag: felnőttek a vas javalatai alapján 3-szor 3 drb napj.; gyermekek 3-szor 1—2 pillulát.

Sanguinarin. A *sanguinaria canad.* gyökeréből előállított alcaloid. Sziürkés-fehér, vízben nem, alkoholban, aetherben is kevésé oldódik. 0,005—0,008 expectorans, 0,015 emeticum.

Sanoform. (Dijod-salicylsav-methylester.) A jodoformnak szagtalan, nem mérgező pótszere. Substantiában hintőpor; kenőcs. 1 : 10 arányban.

Sanose. Tápszer, mely 80% caseint és 20% albumoset tart. Fehér, szag- és íztelen por. Jól szívódik fel. Vízze jól emulgeálható. Adag: 1 csésze levesre, teje 20—30 gm.

Santali ligni oleum l. Oleum Santali ligni.

Santalol l. Gonorol.

†**H. Santoninum** l. Cinae flores.

Santyl. A santalolaj salicylestere. Alig szagos, íztelen olaj. 60% ol. santalinak felel meg. Antigonorrhoeicum. Bels. tejbén 30 csöppet napj. 3-szor.

H. Sapo durus. A *sapo szegediniensis* v. albiss. droguistarum helyett. Natronszappan.

H. Sapo kalinus. Kenőcsszerű, fehér, v. kissé sárgásszínű, szagtalan; meleg vízben és szeszben hígós hatással oldódik. Bőrgyógyászatban mint bőrizgató, pörköket oldó, antiparasiticus hatású szer haszn. Külsőleg bedörzsölések, mosások

Sztraka-féle santonin-gilisztá-csokoládé (L. hird.)

Noffke oldódó bougie-ja a gonorrhoea (urethritis anter. et post., prostatitis chr.) kezelésére c. Sanoform 33 $\frac{1}{3}$ % (L. hird.)

Pivako hat. intern. antigonorrh., bals. copaivae és extr. cubebae emulsiója, fok. a vizelet acid. és bactericid hat. teszi, olesó. (L. hird.)

Kawotal (Res. kava-kava + Ol. sant. ostind. pur. in caps.) kiv. antigonorrh., fájdalomcsillap., váladékesökl., cystitisnél a vizeletet deríti, a dysuriát megszünteti. (L. hird.)

alakjában seborrhoea, psoriasis, eczema chron, pityriasis versicolor, herpes tonsurans, favus, scabies eseteiben tisztán v. kenőcsökben. (L. ol. cadini és pix liquid.) Bels. nem.

H. Sapo kalinus venalis s. viridis. Csak állatorvosi gyakorlatban.

H. Sapo medicinalis. Natronszappan, mely sesamolajjal készül. Küls. haszn. a bőr tisztántartására. Bels. hashajtó pillulákhoz.

Sapo Picis. Natronszappan, mely pix liquidát tartalmaz. Bőrgyógyászatban haszn. a bőr tisztogatására ott, hol a kátrány különben is javalva van.

Sapo sulfuratus. Natronszappan, mely kénalkalit tartalmaz. Bőrgyógyászatban haszn. a bőr tisztogatására ott, hol a kénalkali különben is javalva van.

Sapo venetus. Natronszappan, mely faolajjal készül.

*

Sapocresol. Olajszerű, a lysolhoz hasonló, barnás-sárga, cresolszagú folyadék. Vízben tisztán oldható, felrázva habzik. 3—5% os oldatok antisepticus hatásúak mint az u. ilyen lysololdatok.

Sapocresolin. Olajszerű, barnás-fekete, cresolszagú folyadék. Vízben tejszerű zavarodással oldódik mint a creolin. Haszn. mint a creoliné. Antisepticum.

Sapoform. Formaldehyd szappanos oldata Desinficiens. Haszn. mint a lysoformé.

Sapolan. Kátránykészítmények pótlására használt sötétbarna ichtyolszagú anyag, mely tart. 2½r. nyers naphtát, 1½r. lanolint és 4% szappant. A bőrre dörzsölendő.

Saprol. l. Cresolkészítmények.

H. Sarsaparillae radix. (Különböző forróövi amerikai smilax-fajok gyökere.) Hatóanyagai smilacin v. parillin. Csekély értékű diureticum, diaphoreticum. Adag bels. decoct. 10,0—30 : 250, egy nap alatt elfogyasztani. Belőle készül:

H. Decoctum Zittmanni fortius. Egyszerre 8 üveget (1000 gmos) szokás rendelni. Kénest tartalmazó antidyscraticum, antisymphiliticum. 1000 gm. készítéséhez 2,0 calomel és 15,0 sennalevél és 60,0 sarsaparillagyökér vétélik. Adag reggel melegen ½—1 üveggel, napközben vagy este a gyengébb decoctumból

Kátrány- és Chrysarobin-Dermasan kitünő szerek eczema chr., prurigo, scabies, psoriasis, pityriasis ellen. (L. hird.)

Brázay-féle sósbornesz-szappan a legjobb pipere-szappan.

Szent-László fertőtlenítő-szappan a kolozsvári (Heinrich József) gyógyszappangyárból, a kéz- és testbőr fertőtlenítésére kitünő, bakteriumölő ereje vetekedik a sublimátéval. (L. hird.)

(l. köv.) szintén $\frac{1}{2}$ —1 üveggel. Szokás féldosist is felírni, ekkor 500 gmos üvegekben kapjuk. A gyógymód 2—4 hétig tart.

II. Decoctum Zittmanni mitius. Egyszerre 8 üveget (1000 gmos) szokás rendelni. Enyhébb hashajtó és izasztó hatású. Kéneseit csak nyomokban tartalmaz. Használatát l. fent.

952 Rp. Rad. Sarsaparillae
Ligni Guajaci
Ligni Sassafras
aa 25,0.
Aqua font 500,0.
Macera per 24 horas,
dein coque ad
reman. 250,0.
DS. Délelőtt 3-szorra el-
fogyasztani.
Decoct. Zittmanni
helyett, csakhogy
Hg-ot nem tar-
talmaz.

953 Rp. Rad. Sarsaparillae 50,0.
Aqua fontis 500,0.
Macera per 24 horas.
dein coque usque
ad reman. 300,0.
adde
Aqua laxat. viennens.
Syrupi manati
aa 40,0.
DS. Egy nap alatt elfo-
gyasztani.
Decoct. Zittmanni he-
lyett, csakhogy Hg-ot
nem tartalmaz

Sartol. A soja hispida magvaiból készült szénhydrátmentes diabetes-tápszer, mely sok fehérjét és zsírt tartalmaz. Tányér húslevesbe 80 gm. teendő. Belőle egyéb ételek is készíthetők.

Scammonium. Resina. (Convolvulus Scammonia) Sziürkés darabok 0,05—0,1 laxans, 0,2—0,5—1,0 drasticum. Haszn. mint a res. jalapae.

Scharlachvörös l. Rubrum scarlatinum.

†**H. Scillae bulbus.** (Urginea maritima. Liliaceae.) Hatóanyagi scillitoxin, scillipicrin, scillin; a két előbbi oly hatású, mint a digitoxin; scillin a szívre nem hat, hanem hánytató hatású. Diureticum, némely egyéneknél (gyermekek) emeticum. Főleg készítményei haszn.

†**H. Scilla siccata.** (Összemetélt és 40° C-nál szárított tengeri hagymalevelek.) Bels. adag porban, pillulában, infusumban 0,02—0,2! pro dos. 3—5-szor napj. Dos. maxim. pro die 1,0!

†**H. Extractum Scillae.** Dextrinnel beszárított borszeszes kivonat. Bels. adag porban, pillulában, 0,02—0,2! pro dos. 3—4-szer napj. Dos. maxim. pro die 0,8!

†**H. Acetum Scillae.** Adjuvans diureticus szerekhez. Bels. adag 20—30 csepp pro dos.

H. Oxymel Scillae. Adjuvans diureticus v. hánytató szerekhez. Kis gyermekek 1—2 kk.-tól már hánynak.

Urobalkan, karlsbadi húgyhajtó thea, gyorsan hat a szív- és vesehajók nyomában fellépő hydropsnál. (L. hird.)

- 954** *Rp.* Scillae sicc. 3,0.
Folior. Digitalis 6,0.
Baccar. Junip. 30,0.
Kalii acet. sol. 20,0.
Spirit. diluti 50,0.
Vini albigener. 400,0.
Macera per 24 hor.
et colat. express.
filtra.
DS. Vinum diureticum.
Ór. v. 2 ór. 1 evök.
- 957** *Rp.* Aceti Scillae 50,0.
Kalii carbon. dep.
qu. s. ut. f. l. a
saturatio, admisce.
Spirit. Aether. nitrosi
5,0.
Roob Juniperi 50,0.
DS. 2 ór. 1 kk.
Diureticum.
- 955** *Rp.* Extr. Scillae 1,0.
Roob Juniperi 50,0.
M. f. electnarium.
DS. 3-szor napj. 1 kk.
Diureticum.
- 956** *Rp.* Extr. Scillae 0,5.
Chinin. sulf. 1,0.
Elaeosacch. Junip.
3,0.
M. f. pulv. div. in
dos. aequ. No. 10.
DS. 2 ór. 1 port.
- 958** *Rp.* Oxymel Scillae.
Kalii acet. sol.
aa 50,0.
Aquae dest. 100,0.
MDS. 2 ór. 1 evök.
Diureticum.

††H. **Scopolaminum hydrobromicum.** ($C_{17}H_{21}NO_4$, HBr , $3H_2O$). Scopolia atropoides hatóanyaga. A hyoscinkészítmények főleg ezen anyagból állanak. Színtelen kristályok; vízben, szeszben jól old. Mydriaticum az atropin helyett. 0,01—0,02 : 10,0 szembe cseppentésre. Főleg subcután haszn az ú. n. scopol-morphinnarcosis előidézésére, mely előkészítője a chloroform- v. aethernarcosisnak. Adag ilyenkor bőr alá: scopol. hydrobrom. 0,0003—0,0005 + morphin. hydrochlor. 0,02, egyszerre v. két részre osztva, óras időközben kétszerre elhasználva. Erre 1—1½ óra múlva megkezdhető a chloroform- vagy aethernarcosis. A scopolamin-morphinnarcosis amnesiával járó félálom (Dämmer-schlaf). Igen sok chloroformot v. aethert takarítunk meg ily eljárással. Szülészetben is használják a scop. + morph.-narcosist (chlorof. és aether nélkül) a fenti adagban, a szülőfájdalmak ellen. Kényelmes készítm. a Korff-féle Skopomorphin nevű sterilizált és ampullákban forgalomba bocsátott keverék; egy ampullában 0,0012 scopol. hydrobrom + 0,03 morph. hydrochlor. + 2,0 aqua dest. van; egy narcosishoz $\frac{1}{3}$ -része v. fele elegendő lesz, ha utána chloroform- v. aethernarcosis következik. Dos. maxim. pro dos 0,0005! pro die 0,0015! Nagy vigyázat! Inkább kisebb

Modiscop morphin-dionin scopolamin-injectiók sec. Prof. Schlesinger, morphin-befecsk. helyett, előnyei: *nem szokják meg*, exact adag. és eltarth., gyors hatás, igen alk. morphin-megvonó-kúrákhoz. (L. hird.)

Urobalkan, karlsbadi húgyhajtó tea kit. hat. mindenféle hydrop. nedvgyülemeknél szív- és vesebajok következtében. (L. hird.)

Ergotina styptica

Dr. Egger

**Nőgyógyászati haemostatikum,
analeptikum.**

Fluid-Extract Secale cornutum c. 5%. Stypticin.
A nőgyógyászati gyakorlatban kitűnően bevált
specifikus vérzéscsillapító hatásával, azonkívül
igen alkalmas az agyban mutatkozó kóros
keringési zavaroknak és azok következményei-
nek leküzdésére, ugyszintén a szív működés
fokozására és szabályozására.

Használat:

mint vérzéscsillapító méhvérzéseknél,
szülés utáni vérzéseknél; vértódulás
következtében fellépő szédülésnél, fél-
oldali fejfájásnál, hószámzavaroknál:
mint szivtonikum stb.

Adagolás:

15—20 csepp háromszor napjában.

Eredeti üveg Ergotina styptica Dr. Egger K 3.—

Gyakorlóorvosok előszeretettel rendelik a

DEMETER solut. kalisulfoguajacol-t,

mert kitűnő összetételénél fogva **tüdő- és rokonbajoknál elsőrendű gyógyszer.** A készítmény szerencsés összeállítása és technikai tökéletessége biztosítja sikeres alkalmazását.

Javallatok: Tuberkulosisnál és a tüdő rokonhevény és idült bajainál. Vérhányásnál, katarrhális bajoknál, idült légcső- és gégefőkatarrhusoknál, valamint asthmában szenvedőknél. A lázt és éjjeli izzadást megszünteti. Pertussisnél, influenzás tüdőgyulladásoknál és typhusos tüdőinfiltrationál. Antithermikus hatású.

Adagolás: gyermekek naponta 1–2, felnőttek 4 teáskanálnyit vesznek be.

Ára	Kapható minden	Ára
2 korona.	gyógyszertárban.	2 korona.

KÉSZÍTÉSI FŐRAKTÁR:

DEMETER KORNÉL

GYÓGYSZERÉSZNÉL, SZÁSZVÁROS.

adagokkal dolgozzunk, ha nem ismerjük a beteg érzékenységét a scopol.-al szemben.

Scopomorphin l. Scopolamin.

H. Sebum ovile. Juhfaggyú. Kenőcsökhöz alapanyag.

H. Sebum salicylatum. 2% os salicylsavas faggyú. Küls. bőz-
zős lábizadás ellen.

†**H. Secale cornutum.** (*Claviceps purpurea*. *Pyrenomycetes*.)
Hatóanyagait az egyes szerzők más-más névvel s különböző
vegyképletekkel jelölik. Egyik hatóanyaga az ergotoxin, s
annak összekötetései, továbbá az isamylamin és a parahydroxyl-
phenylaethylamin. Bels., mint haemostaticum, méhösszehúzó-
dásokat előmozdító szer haszn. Tapasztalatilag némely ideg-
bántalomnál is jól hat, különösen azoknál, melyek edény-
mozgató zavarokon alapulnak. Dos. maxim. sing. 1,0! pro die
3,0! Főleg készítményei haszn.

†**H. Extractum Secalis cornuti spissum.** 1 súlyrész 6
sr. anyarozs hatóanyagait tartalmazza. Igen hatékony, jó ké-
szítmény. Fölöslegessé teszi a Bombelon-, Dentzl- stb. készít-
ményeket. Bels. adag: 0,1—0,5! pro dos. szükség szerint ór.
v. 2 ór. oldatban per os v. subcután. Dos. maxim. pro
die 1,5!

†**H. Extractum Secalis cornuti siccum pro pulvere.**
Bels. adag porban, pillulában 0,1—0,5! pro dos. ór. v. 2 ór.
Dos. maxim. pro die 1,5!

†**H. Extractum Secalis cornuti fluidum.** Egy gm. megfelel
ugyanannyi anyarozs hatóanyagtartalmának. Bels. cseppekben.
15—30 cseppet napj. többször. Dos. maxim. pro dos. 1,0! pro
die 3,0!

Cornutinum citricum. Spermatorrhoea ellen ajánlották
Adag 0,003—0,006 pro die pilulában.

Secacornin. Az anyarozs hatóanyagainak steril oldata. 1 köb-
cm. = 4,0 secale corn. hatásával. Haszn. mint a secale corn.
készítményeké. Adag. bels. 5—10 csepp 2—3-szor napj., bőr alá
fecsk. $\frac{1}{2}$ —1 köbcm.

Ergotina styptica Egger. Jó készítmény, melyet a seca-
cornin helyett lehet használni.

Ergotinol. L. e cz. a.

Ergotina Styptica Egger megbízható készítmény fokozott
ergotin-hatással.

Haemalbumin-Lecithin dr. Dalmen genuin vérvas, ideg-
erősítő tápanyag: chlorosis, plithisis, vérvesztés, lószám-
zavar, lábbadozás stb. (L. lúrd.)

959 Rp. Extr. Secalis cornuti
 spissi 1,0.
 Aquae dest.
 Glycerini aa 5,0.
 M. filtra

DS. 10%-os ergotin-oldat.
 Bőr alá fecskendésre.
 Egy fecskendőben 0,1.
 ergotin.

961 Rp. Extr. Secalis corn.
 sicci 0,5.
 Sacchar. alb. 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.

DS. 2 ór. 1 port.
 5 éven túli gyermek-
 nek haematuria,
 haemoptoë esetén.

964 Rp. Infus. s. decocti Secalis
 corn. e 5,0.
 l. a. p. ad. colat. 150,0.
 Acid. phosphor. 1,0.
 Tinct. Cinnam.
 Syr. simpl. aa 20,0.

MDS. 2 ór. 1 evők. atonia
 utáni gyermekági
 vérzéseknél.

H. Senegae radix. (Polygala Senega. Polygaleae.) Hatóanyaga,
 mint a quillaja-kéregnek. Expectorans. Bels. adag decoct.
 10,0—15,0: 150,0 2 ór. 1 evők.

966 Rp. Decoct. rad. Senegae
 e 10,0.
 l. a. p. ad colat. 140,0.
 Natrii hydrocarb. 3,0.
 Tinct. Opii simpl. 0,5.
 Syrup. Senegae 10,0.

MDS. 2 ór. 1 evők.
 Expectorans.

960 Rp. Extr. Secalis corn.
 spissi 10,0.
 Aquae Cinnamomi 100,0.
 Syrup. Aurant. 10,0.
MDS. ór. v. 2 ór. 1 kk. —
 evők.

962 Rp. Extr. Secalis corn.
 sicci 1,0.
 Pulv. folior. Digitalis 3,5.
 Sacchar. alb. 1,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.
DS. 2 ór. 1 port.

963 Rp. Extr. Secalis corn.
 fluidi 10,0.
 Extr. Cannabisind. 0,5.
 Extr. fluidi Hamame-
 lidis
 Tinct. Chamomillae
 aa 25,0.

MDS. 3-szor napj. 1 kk.
 Metrorrhagia, menor-
 rhagia.

965 Rp. Extr. Secalis corn.
 fluidi 20,0.
MDS. 3-szor napj. 15 cseppet.

967 Rp. Decoct. rad. Senegae
 e 4,0.
 l. a. p. ad colat. 100,0.
 Liquor. Ammon. anis
 gtt. 10—15.
 Syrup. simpl. 10,0.

MDS. 2 ór. 1 gyk.
 Gyermeknek köptető.

Haemalbumin-Lecithin Dr. Dahmen, genuin vérvás lecithin-
 nel, idegerősítő-tápanyag: vérveszteség, hőszámozavar, chlorosis.
 phthisis, lábadozás stb. (L. hird.)

Ergotina Styptica Egger megbízható készítmény fokozott
 ergotin-hatással.

Wildungeni Helenen-forrás kit. hat. haematurianál. (L.
 hird.)

H. Sennae Indicae folia. (*Cassia angustifolia* Caesalpinae.) Kis adagban laxans, nagy adagban drasticum. Bels. infus. 5,0—15,0:150,0 ór. 1 evők., míg székiürülés nem jelentkezik (enyhén hat), v. felét, esetleg az egészet egyszerre elfogyasztani (drasticusan hat). Célyszerű irrigátorral allövet alakjában is. Készítm. következők:

H. Sennae folia spiritu extracta. Szoszszel kivont s így gyengített hatású levelek. A species laxantes készítéséhez kellenek.

H. Species laxantes St. Germain. Hashajtó thea-elegy. (*Senna spir. extracta*, flores Sambuci és kalium hydrotartar.) Házilag infusum (tea) készítenő és 1—1 kk., esetleg 1 evők. veendő 1 csésze vízre. A forrázat édesítendő s 1—2-szerre elfogyasztandó.

H. Infusum laxativum s. Aqua laxat. viennensis s Infus. Sennae comp. (Hashajtó.) Felnőttnek 2 evőkanállal gyermeknek 1—2 kk

H. Syrupus mannatus. s. Syrupus Sennae cum Manna
1. Syrupi omnes

H. Electuarium lenitivum. Laxans gyermekeknek, nőknek. Adag: gyerm. kávéskanalként, felnőttnek evőkanalként.

H. Hydromel infantum. (Infus. laxat. 4 r. + Syrup. Aurant 1 r.) Hashajtó gyermekeknek. Adag ór. 1 kk.

968 Rp. Infus. fol. Sennae 10,0.

l. a. p. ad colat. 150,0.

Natrii sulfur. 15,0.

Syrup. mannati 10,0.

Olei Menthae pip. gtt. 2.

MDS. 2 óra alatt elfogyasztani. Erősebb laxans.

970 Rp. Aquae laxat. vienn. 40,0.

Aquae Amygdal. amar.

1,0.

Syrup mannati 10,0.

MDS 1 óra alatt elfogyasztani. Gyengébb laxans

972 Rp. Syrup. mannati 20,0.

Salis Seignetti 10,0.

Aquae dest. 100,0.

MDS. Ór. 1 gyk., míg a hatás beáll.

3—5 éves gyerm. hash.

969 Rp. Aquae laxat. vienn.

60,0.

Syrup. Aurant. 20,0.

MDS. Ór. 1 gyk. míg a hatás beáll.

6—10 év gyerm. hashajtó.

971 Rp. Elect. lenitivi 20,0.

Syrup Aurant. 10,0.

MDS. 1—2 kk. ór. míg a hatás beáll.

3—6 éves gyermeknek hashajtó.

973 Rp. Hydromel. infant. 40,0.

DS. 2 ór. 1 gyk. míg a hatás beáll.

2—3 éves gyerm. hashajtó.

Hygiama est aptissimum alimentum liquidum, cuius ope aegrotos facillime lacte nutrimus.

Joricin (jóízű ricinusolaj) a legjobb hashajtó!

Serum antidiphtheriticum v. Diphtheria-antitoxin.

Nálunk hatféle származású van használatban: 1. a höchsti gyár ú. n. Behring-féle seruma; 2. a berlini Schering-gyár Aronson-féle seruma; 3. a budapesti ú. n. magyar serum; 4. a párisi Roux-féle; 5. a Merck-czég seruma; 6. a bécsi Paltauf-serum.

1. A höchsti Behring-féle serumnak 4 fajtája van: 0, 1, 2, 3 számú sárga, zöld, fehér és piros czímkés üvegcsekben, melyek 200, 600, 1000, 1500 *immunítási egység* értékkel bírnak. Egy ötödik fajta höchsti igen magas egységű serum is van, mely 1 köbctmben 500 egységet tartalmaz, s ebből az üvegcsekben 2000—3000 egységet tartalmazó mennyiség van. Magas áránál fogva kiterjedtebb használatban utóbbi nincsen. Az egységet Behring és Ehrlich a következőleg számítják: Normalis toxin-oldat azon tenyész-bouillon-toxinoldat, melyből 0,4 köbcentiméter 1 kilogrammos tengeri malaczozt bizton megöl; normalis antitoxin-oldat az, melynek 0,1 köbctmje az 1 köbctm. normalis toxinoldat ölő hatását meggátolja; ezen *normal antitoxin-oldatból 1 köbctm az ú. n. immunítási egység*. Az üvegcsek tartalma egészben és egyszerre használandó el bőr alá fecskendés alakjában. A 0 számú különbség nélkül prophylacticus alakra; az 1. számú körülírtabb torokdiphtheriánál; a 2. számú kiterjedtebb torokdiphtheriánál; a 3. számú súlyos torok-, gége- és orrdiphtheriánál. 2—3 nap múlva a befecskendést ismételni lehet. Befecskendés a kulcsalatti tájon vagy a mellkas oldalsó részletén végezhető. Fecskendőül legkedveltebb a Luer-féle üveg dugattyús (10 köbctm.) továbbá a fémdugattyús Jetter- és Scheerer-féle (Tuttlingen). Minden használat előtt a fecskendőt sterilizálni kell és pedig kifőzéssel, vagy úgy, hogy előbb alkohol abs.-al, majd azután aether sulfuricus-al öblítjük át. Befecskendés előtt a befecskendésül választott helyét a bőrnek szappannal, aetherrel, majd alkohollal kell lemosni. A befecskendés után a folyadékot *nem szabad* elmasszálni. A fecskendés helyére gyapottampont s erre tapaszticskót tegyünk.
2. A berlini Schering-gyár Aronson-seruma fehér és kék czímkével ellátott üvegcsekben jó forgalomba. A fehér czímkés 10 köbctm-ében 1000 egység, a kék 10 köbctm-ében 2000 egység van. Az első egészben és egyszerre enyhébb, a másodikat súlyosabb esetben használjuk különbség nélkül. Befecsk. cautelák mint a Behring-serumnál.
3. A magyar serum (Preisz Hugó-féle) megfelel a Behring 2. sz. és a Schering fehér czímkés serumának.
4. Roux-féle nálunk ritkán használtatik mai nap.
- 5—6. A Merck- és Paltauf-serum a höchsti savóval *aequivalens*. Gége-stenosis esetén intubálás sürgős javaslatot képez; ezen esetben a serum az intubatiót nem teszi nélkülözhetővé.

Serum antiscarlatinum Moser. A höchsti gyár készíti. Adagja 100 cm³—200 cm³. E mennyiség egyszeri befecskendezése elegendő. Eredmény néhány esetben mutatkozott.

Serum antistreptococcicum Marmorek. Gyermekekágyi láz, septicämia, súlyos erisipelas esetében próbálják kétes eredménnyel. Adagja: 5—10 cm³ naponta.

Serum antistreptococcicum Paltauf. Gyermekekágyi láznál bevált, ha az infectiót tényleg streptococcus okozta. A hatás elérésére igen nagy adagok kellenek. 100 cm³ egyszerre befecskendezve (a két czomb bőre alá) rendszerint elegendő. Néhány esetben másnap meg kellett ismételni az adagot. A befecskendezés helyén nem látszott egyéb elváltozás, legfeljebb gyenge erythema.

Serum antitetanicum. Tetanotoxinnal lassanként immunizált lovak vérséruma. Kaplható poralakban s folyadékalakban is különböző számú egység (erősség) tartalommal. 20 antitoxin-egységtől 100, 200, 400 egységig (antitoxin-egység jelzése A. E.). Ha már a tetanusroham kifejlődött, nem használ. Rationalis akkor prophylacticumképen használni, ha oly fertőzött sebzésekkel van dolgunk, melyek gyanút ébresztenek esetleges tetanus-infectióra.

Serum antithyreodinicum, I. Antithyreoidin-serum.

Sidonal (Chinasav és piperazin összetétele). Húgysavoldó és húgysav-képződést gátló jó szer. Adagja naponta. 5—8.0.

Sidonal Neu. A sidonal olcsó pótszere (I. ott). Tartalmaz 75% chinasav-anhydridet és 25% chinasavat. Adag 2—5 gm. naponta. Kész tabletták kaplathók.

H Sinapis semina. (Sinapis nigra Cruciferae). Ha összezúzva és vízzel elegyítve langyos helyen áll, ol. sinapis aether. képződik benne. Készítményei használatnak s ezek a következők:

Farina seminum sinapis. (Hevenyében összetört magvak.) Mustárliszt. Langyos vízzel péppé alakítva cataplaszmák alakjában bőrvörösítő. Bels. 0,5—1,0 pro dos. porban stomachicum; 5,0—10,0 pro dos. emeticum.

H. Charta sinapisata. Mustárliszt-pép helyett. Meleg vízbe mártva s nedvesen a bőrre kötve bőrvörösítő; jó a vörösítendő bőrfelületre egy darab selyempapírt tenni, s erre alkalmazni a mustárpapírt, különben a fájdalom igen nagy lenne.

†**H. Oleum Sinapis aethereum.** Színtelen vagy sárgás, közzömbös kémhatású, átható, csipős szagú és égető ízű illó olaj. 150 r. vízben, 10 r. híg borszeszben, tömény borszeszben minden arányban oldható. Erős izgató, lobokozó. Önállóan nem használtatik, csak borszeszes oldatban.

Piperazin Midy, a húgysav legjobb oldószere köszvény, csúz, húgylhomok, húgys. diathesis eseteiben. (L. hird.)

II. Spiritus sinapis. (2:98) Küls. bőrvörösítő bedörzsölésre.

Siran. Kalium sulfogujacolicum 10 r. + acid. thymenicum 1 r. + extr. thymi 8 r. + syrupus menthae 150. r. Pertussis, tuberculosis pulm. esetén gyermek. 2—1 kk. felnőttek 2—4 evők. pro die.

Sirolin (10% thiocol tartalmú narancsszörp.) Haszn. gümőkór ellen. Rend. eredeti üvegekben (La Roche); napi adag felnőttek 3—4 kk. gyermeknek 1—2 kk. Haszn. készítm. a *Demeter-féle Solutio Kalii sulfogujacoli*, valamint az *Eibach-féle Liquor thiorobini comp.*

Soamin. Nem más mint atoxyl.

†† **H. Solutio arsenicalis Fowleri** l. Acidum arsenicosum.

Solurol l. Acid. thymenicum.

Solutio Calcii oxysulfurati l. Miscella Calcii oxysulfur.

Solutol. l. cresolkészítmények.

Solveol. l. cresolkészítmények.

Somagen. Tápszer, mely húsfehérjét jól oldható alakban tartalmaz.

Somatose. Tápanyag. Roborans. Húsból állítják elő. Szagtalan, íztelen por, melyet tápanyagokhoz kevernek (l. nutrose.) Adag. felnőttek 3—4-szer napj. 1 kk. gyermeknek 3-szor napj. 1—2 gni.

Somnal. Chloralhydrat és urethan keveréke alkoholban. Hypnoticum. Bizonytalan hatású. Adag 1,0—2,0 pro dos.

Somnoform. Keveréke 5% bromoethylnek, 60% chloraethylnek és 35% chlormethylnek. Sebészi belégzési narcosis céljaira szolgál. 5—5 gmra graduált sötét és automaticus zárral ellátott üvegekben kapható. 5,0 gm. 50 másodperctől 5 perczig tartó narcosist ad; tovább adagolással a narcosis időtartama meghosszabbítható. Kisebb műtéteknél jól haszn.

Demeter-féle Sol. kalii sulfogujacolt előszeretettel rendelik a gyak. orvosok, mert kit. összetétele mellett egyúttal a legolcsóbb ilyen készítm. is. (L. hird.)

Liquor Thiorobini comp. Eibach erősítő és étvágygerjesztő hatása következtében jobb minden más guajacol-készítménynél!

Ozoena ellen $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{10}$ -os Lysoformoldat, gonorrhoea, vaginitis ellen $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{10}$ -os Lysoformoldat alkalmazandó.

Sirop Famel könnyen oldh. lacto-kreosot-készítm., a légérzék. betegek is szívesen beveszik, a gyomor jól türi, specifikum makacs köhögés, bronchitis stb. ellen. (L. hird.)

Sophol (formomchinsavas ezüst. 20% argent. tart.). Sárgás, vízben jól oldh. por. Haszn. mint az argent. proteinicumné. A szemészetben 3—5%-os oldatokat használnak.

Soxhlet féle tápczukor Dextrin, maltose és *NaCl*. keveréke Csecsemők mesterséges táplálásakor a kornak megfelelően ligított tejbe keverendő, $\frac{1}{2}$ literre 4—9 kávéskanállal. Van cacaoval kevert készítmény is.

Sozal. s. Alum. paraphenolo sulfuricum $Al_2(C_6H_4OHSO_3)_3$ Színtelen, phenolra emlékeztető szagú, kristályos, vízben könnyen, glycerin és alkoholban jól old. Antiseptium. 1—2%-oldatban. haszn.

Sozjodolum. E néven két szer szerepel, a **Natrium sozjodolicum** ($C_6H_5J_2(OH)SO_3Na$) és a **Kalium sozjodolicum**. ($C_6H_5J_2(OH)SO_3K$). Szagtalanok. Jodoform helyettesítői. ennél kevésbbé mérgezők. Küls. bőrmycosisok, renyhe fekélyek, zúzott égési sebekre hintőpor (1 : 15 talcumra), kenőcs (1 : 10 vaselina) alakjában. Ozaena, gonorrhoea, vaginitis ellen 1—3%-os oldatok.

974 Rp. Natrii sozjodol. 6,0.
Aqua dest. 200,0.
M. f. solut.

DS. Külsőleg az orr kifecskendésére.

Ozaena.

976 Rp. Natrii sozjodol. 3,0
Vaselinæ 30,0
M. f. ungu.

DS. Kenőcs.

978 Rp. Kalii sozjodol. 3,0.
Talc. venet. 40,0.
M. f. pulv. det. in scat.
S. Hintőpor.

Sparteinum sulfuricum ($C_{25}H_{17}N_2H_2SO \cdot 8H_2O$). A spartium scoparium hatóanyagának kénsavas sója. Színtelen, áttetsző, rhomboedricus jegeczek vagy színtelen por; vízben jól oldódik. Hasonlóan hat, mint a digitalis, csak hogy nem oly megbízható; csekély narcoticus hatása is van. Haszn. a digitalis pótszeréül. Bels. adag pillulában, cseppekben 0,01—0,05 pro dos. 3—5-ször napj.

979 Rp. Sparteini sulfur. 0,2.
Aqua Amygdal. amar. 10,0.

MDS 2—3 ór. 15—20.
cseppet.

975 Rp. Kalii sozjodol. 4,0.
Ungu. emollient. 50,0.
Olei Bergamottæ

gtt. 2.

M. f. ungu.

DS. Kenőcs.

977 Rp. Natrii sozjodol.
1,0—2,0.

Mentholi 0,5.

Sacch. albi 20,0.

M. f. pulv. det. in scat.

S. Orrba fúvásra. Rhinitis necrotica scarlatina folyamán.

980 Rp. Sparteini sulf. 0,5.
Pulv. et extr. Liquir.

aa qu. s.

ut. f. pillul. No. 30.

Consp. pulv. Liquirit.

DS. 2—3 ór. 1—2 pillulát.

Loeflund-féle tejczukor, vegyileg tiszta, Soxhlet tanár eljárása szerint, külön a gyermektáplálás céljaira elkészítve. (L. hird.).

H. **Species Althaeae** l. **Althaeae rad.**

H. **Species amaricantes.** Keserű theaelegy. Stomachicum. Infus. vagy maceratum készítendő házilag vízzel vagy borral. Adag: 1 csészére 1 evőkanállal.

H. **Species diureticae.** A népszerű karlsbadi tea helyett. Tartalmaz: scilla sicc. + baccae junip + rad. ononidis, + rhiz. gramin. + fol. sennae + lb. equiseti + lb. leonuri lan. Adag egy csésze teára egy tetézt evőkanál. Forrázat készítendő, mely többször felkeverve álljon egy órahosszat; utána teaszűrőn szűrendő; a szűrőmaradékot ki kell kanállal nyomkodni. Kétszerre elfogyasztandó.

H. **Species laxantes** St. Germain l. **Sennae folia.**

H. **Sperma Ceti.** l. **Cetaceum.**

Sperminum (Poehl). Ménlovak heréjéből készül ($C_5H_{14}N_2$). Tonicum. Kétféle készítmény van. a) *Essentia spermini* Poehl. Adag: 20—30 csepp napj. 2—3-szor, meleg égvényes ásványvízben. b) *Sperminum* Poehl 2%-os, in solutione physiologica sterilisata in ampullis. Bőr alá fecskendésre szolgál. Napjában 1 fecskendővel. Összesen 10—12 fecskendőes egy curára.

Spinolum. Parajból készül és 2.57% organicusan, erősen kötött vasat tartalmaz. — *Sp. siccum* barnás-zöld, sajátos szagú, sós ízű por. — *Sp. liquidum* czukor-tartalmú folyékony kivonat. Vas javalatai alapján rendelik.

H. **Spiritus concentratus.** 90 térf. %-os szesz. Aethylalkohol (C_2H_6O).

H. **Spiritus concentratissimus.** 94—96 térf. % os szesz. (Aethylalkohol.)

H. **Spiritus dilutus.** Hígított szesz. 70 térfogat % aethylalkoholt tartalmaz.

H. **Spiritus Aethereus** (Aether dep. 250 r. + Spiritus cinc. 750 r.) Hoffmann-cseppek. Szaglószer ájulásnál stb. Bels. excitans aether helyett 10—20—40 csepp pro dos. czukorra cseppentve, vagy czukros vízben.

Spiritus Aetheris chlorati. Keveréke alkoholnak, aethylchlorürnek, chloralnak és acetylchlorürnek. Haszn. mint a spir. aetheris, ezenkívül mint gyenge diureticum.

Urobalkan, karlsbadi húgyhajtó tea kitünő hatású mindenféle hydropikus nedvgyülemeknél, szív- és vesebajok következtében. (L. a szemben levő hird.)

Stoll. diet. kola-készítményei: Kola-bor, Kaiser-kola-elixir, Kola-elixir, Kola-granulé stb., kit. gyomorzsongító és idegerősítő szerek. (L. hird.)

Urobalkan

karlsbadi hugyhajtó tea

áll főképen a «*Ballota lanata*» nevű sziberiai
gyapjas növényből.

Rögtöni hatás mindenféle hydropikus nedv-
gyülemeknél szív- és vesebajok követ-
keztében.

Napi adag: két csésze a teafőzetből.

Készíti:

Fr. Ed. WORLIČEK

gyógyszerész

ADLER APOTHEKE, KARLSBAD

Minta és részletes használati utasítás
az orvos uraknak rendelkezésükre áll.

Főraktár: *Vereinigte Drogen-Grosshandlungen*
G. & R. Fritz Pezoldt & Sülss, A.-G. Wien I.

A prágai cs. kir. helyhatóság 1895. évi október
1-éről kelt 148.363. sz. leirata értelmében a gyógy-
szertárakban való árusítása meg van engedve.

Magyarországi (budapesti) lerakatok: *Thall-*
mayer és Seitz, Török József, Kriegner György,
Dr. Egger Leó és Egger I. (VI. ker.), Radanovits
Testvérek (VIII. ker.), Kochmeister utódai.

Sperminum-POEHL

Essentia Spermini Poehl 30 csepp naponta 3-szor: alkal. vízben vagy tejben $\frac{1}{2}$ órával étkezés előtt.
Sperminum-Poehl pro injectione, naponta 1—2 és több injectio.

Sperminum-Poehl sicc. pro clysm. 1—2-szernaponta, neurasthenia, marasmus senilis, hysteria, szívbetegedések (myocarditis, szívelzsírosodás), arteriosclerosis, syphilis, tuberculosis, typhus, hátrinczbajok, impotentia neurasth., paralysis, idült rheumatismus, podagra, sápkórság stb. stb. ellen, túlfáradtságnál és lábbadozók részére.

CEREBRIN-POEHL (Synergo-Cerebrin) epilepsia, alkoholismus, idegbajok ellen.

BIOVAR-POEHL (Synergo) klimaxbell tünetek, ovariectomia után, hysteria, chlorosis ellen.

MAMMIN-POEHL (Synergo-Mammin) fibroma uteri, menorrhagia, metrorrhagia, dysmenorrhoea stb. ellen.

RENIIN-POEHL (Synergo-Reniin) nephritis parench., vesainsufficiencia, uraemia ellen,

THYREOIDIN-POEHL (Synergo) elzsírosodás, myxoedema, idegbajok stb. ellen,

ADRENAL-POEHL mellékvese-készítmény. Edényösszehúzó, nyálkahártyalobok, vérzések stb. ellen. Tubusok à 0.002. Solutio 1 : 1000, 10.0 és 30.0.

Kapható minden nagyobb gyógyszerárban.

Irodalmat ingyen és bérmentve küld:

Organotherapeutisches Institut

Prof. Dr. v. Poehl & Söhne, St.-Petersburg, Russland.

Vezérképviselő Ausztria-Magyarország részére:

G. & R. Fritz-Pezoldt & Süss A.-G., Wien, I.

Utánzatoktól és hamisítványoktól óva intünk.

Szives megkeresésére díjtalanul küldjük organotherapeutikus compendium füzetünket, mely az összes organo-készítmények irodalmát, indikációt és alkalmazásmódjait tartalmazza.

1. Tabletták belső használatra.
 2. Ampullák injectiók részére.

H. **Spiritus aethereus ferratus** l. **Ferrum** cz. a

Spiritus Aetheris nitrosi. Tartalmaz aethylalkohol mellett aethylnitritet, aldehydet és eczetaethert. Bels. excitans, diureticum, diaphoreticum. Adaga bels. 10—20—30 csepp pro dos. szükség szerint.

H. **Spiritus aromaticus.** Küls. bedörzsölések alakjában, mint enyhe bőrizgató. Pruritusnál is haszn.

H. **Spiritus camphoratus** l. **Camphora.**

Spiritus Cochleariae. Scorbutos szájbántalomnál szájvizekhez; 1 kkanállal. 1 kisebb pohár vízre.

H. **Spiritus Ferri sesquichlorati aethereus** l. **Spir. aether. ferr. cz. a.**

Spiritus formicarum. Hangyasav 2 r. + borszesz 35 r. + víz 13 r. Színtelen, tiszta. savanyú folyadék. Küls. bőrvörösítő bedörzsölésekre haszn. mint a spir. sinapis.

H. **Spiritus Mindereri** l. **Ammonium acet. sol.**

†H. **Spiritus salis ammoniaci anisatus** l. **Ammonii anisati liquor.**

H. **Spiritus saponatus.** (Sapo medic. borszeszes oldata.) Küls. bőrre dörzsölve izgató. Bőrgyógyászatban seborrhoea, idült eczema és psoriasisnál mosogatások alakjában haszn.

H. **Spiritus saponis kalini.** (Sapo kalinus albus borszeszes oldata.) Haszn. mint a spir. saponatus, de annál erősebb hatású.

H. **Spiritus Sinapis** l. **Sinapis semina.**

Spirosal. (Saliylsavas monoglycolester). Színtelen, szagtalan olajos folyadék. Külsőleg a bőrre dörzsölendő, mint a *mesotan*, melynek helyére ajánlották. Napj. 2—3 szor használandó tisztán v. olajos oldatban.

Stagnin. Lovak lépjének autolyzise útján készült folyadék, melyhez kevés chloroformot kevernek, hogy eltartható legyen. Haemostaticum. Intramuscularis befecskendések alakjában használják méh és tüdővérzések ellen.

H. **Stearinum.** Fehér, szagtalan, íztelen; vízben nem, forró szeszen és aetherben oldható. Kenőcsökhöz szükséges.

†H. **Stibium sulfuratum aurantiacum** s. **Sulfur auratum Antimonii** (*Sb₂S₃*). Igen finom, narancsvörös színű, szagtalan

és íztelen por. Vízben nem oldódik. Expectorans. Bels. adag porban, pillulában 0,03—0,05—0,1 pro dos. 3—5 × napj. fel-
nőttnek.

981 Rp. Stibii sulfur. aurant.

0,5.
Acidi benzoici 1,5.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in
dos. aequ. No. 10.

DS. 2—3 ór. 1 port.

982 Rp. Stibii sulfur. aurant

0,5.
Pulv. Doveri 1,0.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in
dos. aequ. No. 10.

DS. 2 ór. 1 port.

983 Rp. Stibii sulfur. aurant.

Extr. Hyosciami aa 0,05—0,1.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos aequ.
No. 10.

DS. 3 ór. 1 port. 2—6 éves gyer-
meknek idült hörghurut
esetén.

Stibium sulfuratum nigrum (Sb_2S_3). Súlyos, szürkés-
fekete, fémfényű, jegezes darabok. A stib. sulf. rubr. készí-
téséhez használtatik.

Stibium sulfuratum rubrum s. Kermes minerale.
($Sb_2S_3 + Sb_2O_3$). Finom, könnyű, vörösbarna színű, szagtalan
és íz nélküli por. Expectorans, nagyobb adagban emeticum.
Ritkán használtatik. Bels. expect. adag 0,01—0,05 pro dos. por-
ban 3—5 × napj.

Stigmata Maydis. A zea mays szárított stigmái. Diureticum,
némelyek szerint kőoldó. Adják húgyhomok, vesekövek, hydrops
eseteiben. Decoct. 5,0—10,0 : 100,0—150,0.

Stovain. Igen bonyolult szerkezetű vegyület. Kicsiny, fénylő
lemezkek, vízben, alkoholban, eczetaetherben könnyen old.
Helybeli érzéstelenítő, állítólag kevésbé veszélyes, mint a cocain.
Localis és lumbalis anaesthesia céljaira befeeszkendezésre
2—10%-os oldatok haszn. Utóbbi célra a sterilizált oldatból
(készen kapható üveg tubusokban) 0,05 gmnyi stovain elegendő.

Gyermekek idült hörghurutjának legjobb gyógyszere
a **Liquor Thiorobini comp. Eibach!**

Radeini gyógyforrás, legdúsabb natr.-lith.-savanyúvíz, kit.
hat. hólyag- és vesebajoknál, köszvény, húgyhomok és fővény,
hurutos megbet. ellen. (L. hird.)

Wildungeni Helenen-forrás kit. hat. húgydara, vese- és
hólyagbajok, id. vesegyulladás eseteiben, albuminúriával vagy
anélkül. (L. hird.)

Teufel

Klebro-polyája

ruganyos, ragadós tekercs-polya
Ferd. v. Heuss dr. szerint.

Kitűnő eredménnyel alkalmaztatik ándulásoknál, csont-
töréseknél mindenféle sebcknél, fekélycknél és bőrbajoknál.

A Klebro-polya a bőrt nem izgató és félre nem
csúszó kötés.



Orvosi tekintélyektől legmelegebben ajánlva.

Kapható 1½, 2½, 4, 5, 7 és 10 cm. szélességben,
kívánatra szélesebben is. Hossza 4 m. Az 1½ és
2½ cm. széles polyák 2 m. hosszúságban is rak-
táron vannak, még pedig ez esetben pléhdobozok-
ban, úton való használatra túristák részére stb.

Megrendelhető minden gyógyszerárban,
kötőszerek- és egészségi cikkek üzletében.

Prospektust ingyen és bérmentve

Teufel's

Diakon-szalagja

porózus, tartósan ruganyos polya-szalag.



Gummifonalak nélkül, oldalt
zárt szegélylyel, nem foszlik fel.

Szinte határtalan ideig használható.

Orvosi autoritások a legjobban ajánlják.

Kapható 4—28 cm. szélességben, minden
kötőszerek- és egészségi cikkek üzletben.

Képes prospektus ingyen és bérmentesen.

Wilh. Jul. Teufel, Stuttgart

sebészeti és testegyenészeti cikkek gyára.

Granules de Catillon

tartalmazzák a

Strophantus

1 mgnyi titrált kivonatát.

Ezen pilulákkal végeztettek azok a kísérletek, melyek az Académie de Medicine 1889-iki ülésében megbeszéltek.

E kísérletek eredménye: napi 2–4 pilula adagolásánál a **diuresis rohamosan emelkedik, a csökkent szív működés gyorsan erősödik, enyhül az asystolia, mitrálbaj, dyspnoe, oedema, a gyermekek és öregek szívbetegségei stb.**

A hatás közvetlen. intolerantia nem mutatkozik, vasokonstriktio nem lép föl, a használat akadály nélkül folytatható. Sürgős esetben 8–12, sőt 16 szemcse is adható egy nap alatt a diuresis forszirozása céljából.

Granules de Catillon

á $\frac{1}{10}$ mg. kristályos

Strophantin.

Kitűnő szívtonikum, nem húgyhajtó, határtalan tolerantia. — Sok strophantus hatástalan, mások mérgesek, a tinkturák megbizhatatlanok; tessék ezért az igazit rendelni:

Granules de Catillon, 3. Bould St.-Martin, Parls.

„Strophantus és Strophantine“ az Académie de Médecine de Paris díját kapta. Az 1900. Párisi világkiállításon az aranyéremmel tüntetett ki.

Kapható a gyógyszerárakban, orvosi rendelésre.

Kivonat a párisi Académie de Médecine jelentéséből: „Kitartó vizsgálatok útján Catillon úrnak sikerült először a Strophantus magvából egy aktív kristályos hatóanyagot, a Strophantint előállítani. Tanulmányozta ez utóbbinak physiologikus és pharmacologikus hatásait és leírta a therapiában használható készítményeit. A bizottság ezeket a munkákat díjazásra érdemeseknek ítélte és az Académie Catillon úrnak a „Nativelle-díj“-at adta oda.

Stramonium l. Datura.

Strontium bromatum. ($Sr.Br_2 + 6H_2O$.) Hosszas, törékeny hygroskopos kristályok, vízben jól oldh. Fájdalmas gyomorbetegségekben, Bright-kórban 4,0 pro die, epilepsiában 10,0 pro die.

Strontium jodatum. ($Sr.J_2 + 6H_2O$.) Színtelen, vízben oldh. táblácskák. Bels. mint a jódkali.

Strontium lacticum. [$Sr(C_3H_5O_2)_2 + 3H_2O$]. Fehér, vízben oldh. por. Ajánlják Bright kórban. Adag 0,5—1,0 pro dos. és 1,0—8,0 pro die.

††H. **Strophanthi semina.** (Apocynae.) Hatóanyaga a strophanthin ($C_{20}H_{34}O_6$). Digitalis pótszere. Szívre úgy hat, mint a digitalis, csakhogy gyorsabban s tartósabban; edényszetre nincs hatással. (FRASER.) Állítólag nem cumulatív hatású. Mint diureticum nemcsak szívbántalmaknál, hanem némelyek szerint vesebántalmaknál is beválik. Gyomor-belekre alig van kellemetlen hatással. Dos. max. sing. 0,05! pro die 0,15! Magvakból tinctura készül és az használtatik; a hatóanyag rendelkezése nem czélszerű, mert a különböző forrásokból származó készítmények különböző tisztaságúak és erélyűek. A *Granules de Catillon de Strophantine crist. cardiac.* nem diuret., jól haszn. készítmény; 1 drb $\frac{1}{10}$ milligm. strophantint tart. Adag 2, majd 3 v. 4 drb naponta. *Granules de Catillon à 0,001 titr.* Stroph. kivonat, cardiac., diuret., 2—4 drb naponta.

††H. **Tinctura sem. Strophanthi** (1:10). Adag bels. 4—5—10 csepp pro dos. 2—4-szer napj. Igen keserű, ízjavítóról gondoskodni kell. Subcután nem, mert erős fájdalmat okoz. Dos. max. sing. 0,5, pro die 2,0. Vigyázat (!)

984 *Rp.* Tinct. Strophanthi hisp. 1,0.

Aquae dest. 80,0.

Syrup. Aurant. 20,0.

MDS. 3 ór. 1 evők.

985 *Rp.* Tinct. Strophanthi hisp. 5,0.

Aquae Amygdalar. amar. 15,0.

MDS. 3—5-ször napj. 10—20 cseppet.

986 *Rp.* Tinct. Strophanthi gtt. 6.

Aquae dest. 80,0.

Syrup. Monthae 20,0.

MDS 3—4 ór. 1 gyk. 5—10 éves gyermeknek.

Morbus Brighti: *Rp.* Gelodurat „Pohl“
scat. orig. c. fol. digit. titr. 0,1.
S. 3—5-ször naponta 1 dbot.

987 *Rp.* Macer. folior. Digit. e
1,0.

l. a. p. ad colat.

150,0.

Tinct. Strophanthi

hisp. 2,0.

Kalii acet. sol. 10,0.

Syrup. Aurant 20,0.

MDS. 3. ór. 1 evők.

Erős diureticum, car-
diacum.

††*H.* Strychninum nitricum l. Nux vomica.

Stypticin. A kotarnin ($C_{12}H_{13}CO$) sósavas sója. Sárga, könnyen oldh. por. Vértzéscsillapító; haemoptoe, vesevérzések, metrorrhagiák és menorrhagiák ellen. Merck-féle tabletták alakjában, porban 0,025—0,05 pro dos. napj. 3—4-szer; subcutan egyszerre 0,1—0,2.

988 *Rp.* Stypticini 1,0.

Aquae Chinnam. 20,0.

MDS. 3—5-ször napj. 15—
20 cseppet czukros-
vízben.

989 *Rp.* Stypticini 1,0.

Aquae dest. 10,0.

M. filtra

DS. Bőr alá fecskendésre.
Egyszerre egy fecs-
kendővel.

Styptol. Phtalsavas cotarnin. Hideg vízben rosszul, melegben jól oldódik. Haemostaticum főleg méhvérzéseknél. Adag bels. 0,05 gm. 3—5-ször napj. tablettá alakjában.

Styracol. l. Guajacolum cinnamylicum.

H. Styrax depuratus. Liquidambar orientalis (Balsamiferae) balzsama. Mézszerű, kevésé nyúlós, szürkés vagy szürkésbarna anyag; sajátos erős illatos szagú és tűszeres, csípős, alig keserű ízű. Küls. haszn. a bőrgyógyászatban állati paraziták (phthiriasis és scabies) ellen úgy, mint a bals. peruvianum. Scabiesnél előkészítő eljárás (kaliszappan-fürdő) szükséges. Célyszerű a

H. Linimentum Styrcis (Styrax 1 r. + ol. sesami 1 r.), melyből egyszeri bedörzsölésre 80,0—150,0 szükséges.

Ergotina Styptica Egger megbízható vértzéscsillapító szer.

Stypticum: *Rp.* Gelodurat „Pohl“

scat. orig. c. acid. tannic. 0,3.

S. 2-szer naponta 1 dbot.

990 *Rp.* Styracis liqu. dep.
Sulf. praecip.
Sapon. kalini \overline{aa} 20,0.
Axung. Porci 80,0.
M. f. ungu.

DS. Kenőcs. Élődiés bőr-
bajok ellen.

Subcutin. Paraphenolsulfosavas anaesthesin (l. e cím a.).
Vízben oldható kristályos vegyület. Ártalmatlan helybeli érzés-
telenítő. 1%-os oldata főleg a Schleich-féle infiltratio alakjában.

991 *Rp.* Subcutini 0,8.
Natr. chlor. 0,7.
Aqu. dest. 100,0
M. f. sol. sterilisata.

DS. Schleich-anaesthesia
céljaira.

Subliman. (Hg. sulfat-aethylendiamin). Desinficiens. A sublimat
pótszere. A fehérlét nem csapja ki, a bőrt még 2 %-os oldat-
ban sem támadja meg. 3 gr-os pastillákban kapható. Sebészet-
ben 3 pro milles oldatok haszn. 1 pro milles sublimat-oldatok
helyett.

H. Succus Liquiritiae depuratus }
H. Succus Liquiritiae venalis } l. Liquiritiae radix.

**Sudoral seu Aluminium borobenzoicum tartaricum
liquidum.** Benzoésav, bórsav és borkősavnak timsós oldata.
Adstringens, antisepticum, desodorans.

Sulfaminolum. (Thiooxydiphenylamin). Világos-sárga, szag-
és íztelen, alkáliákban, borszeszben, eczetsavban jól old. por.
Antisepticum. Por alakban befúvások gégetuberculosis esetei-
ben; hintőpor sebekre, fekélyekre. Bels. cystitisnél 0,25 pro
dos. 3—4-szer napj.

Sulfidal. Colloid kén. Szürke por, mely vízzel tejszerű folyadé-
kot ad. Bőrgyógyászatban kén helyett haszn. 1—10%-os oldat-
ban, 5—10%-os kenőcsök és pasták alakjában.

Sulfoform. Organicus kénvegyület; fehér kristályok. 10%-os
kenőcs alakjában az alopeciák kezelésére ajánlották.

† **H. Sulfonal** $[(CH_3)_2C(SO_2.C_2H_5)_2]$. Színtelen, szagtalan, íztelen
prismaticus jegeczek v. táblácskák. Oldódik 500 r. hideg és
15 r. forró vízben. borszeszben könnyen. Sedativum, hypnoti-
cum, s mint ilyen a chloralhydrat pótszere. Anodyn hatása
nincs, szívre, edényekre (?) nem hat s így szívbántalmak ese-
tében is használható. Kellemetlen mellékhatások csekélyek.
Adag bels. porban 1,0—2,0—3,0 pro dos. 1—2-szer este lefek-
vés előtt; ezen mennyiség forró levesben vagy tejben, vagy
gyöngye theában oldva veendő be. Gyermkeknek 0,25—0,5 pro
dos. koruk szerint. Éjjeli izzadás ellen elegendő 0,3—0,5 este. Dos.
maxim pro die 2,0 (!)

992 Rp. Sulfonali subtil. pulv. 3,0.
 Sacchar. alb. 2,0.
 M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10.
DS. Este lefekvés előtt
 meleg italban 1 port.
 Izzadás ellen.

994 Rp. Sulfonali subtiliss. pulv. 2,5—4,0.
 Div. in. dos. aequ. No. 10.
DS. 1 port este pohár
 forró tejben vagy
 makk-kávéban.
 5—10 éves gyermek-
 nek hypnoticum.

993 Rp. Sulfonali subtiliss. pulv. 10,0.
 f. pulv. div. in dos. No. 10
DS. Este lefekvés előtt
 1—2 port. Hypnoti-
 cum.

995 Rp. Sulfonali subtil. pulv. 3,0.
 Sacchar. alb. 5,0.
 M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 20.
DS. 3-szor napj. 1 port
 kisebb gyermek. na-
 gyobbnak 5-ször
 napj. mindig meleg
 folyadékban. (Cho-
 rea minor).

Sulfoid 1. Sulfidal.

Sulfosot-Syrup Roche. (Kreosotsulfosavas kalium oldata.)
 Sötétbarna, vízzel ligítható. A kreosot helyett ajánlják. Adagja
 felnőtteknek 3, gyermekeknek 1—2 kávéskanál pro die.

Sulfur colloidale 1. Sulfidal.

Sulfur jodatum. (I_2S_2 ?) Nem valódi vegyület; könnyen bom-
 lik és jód-hatást fejt ki. Vízben nem, glycerinben oldódik. Ilaszú.
 bőrbajoknál, scrophulosisnál. Kenőcs 1:10. Bels. pillulában
 0,03—0,10 gr. pro dos.

H. Sulfur praecipitatum s. Lac sulfuris. Alaktalan, sár-
 gás-fehér por. Küls. bőrgyógyászatban növényi és állati para-
 siták ellen kenőcs úgy rendeltessék, hogy a kenőcsben kéni-
 alkali képződjék (szappannal, szénsavas kalium v. natriummal).
 Diphtheritisnél, croupnál pora befúvatik a torokba, gégébe.
 Bels. laxans. Adag porban, pillulában, electuariumban 0,5—
 1,0—3,0 pro dos.

996 Rp. Sulfur. praecip. 5,0.
 Magnes. ustae 10,0.
 M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10.
DS. 1—2 port napj.
 Laxans. Obstip habit.

997 Rp. Sulfur. praecip. 10,0.
 Melis rosati 30,0.
 M. f. electuar.
DS. Napj. 1—3 kk.
 Laxans.

Liquor Thiorobini comp. Eibach fölülmul minden
 más antituberk. szert, mert nemcsak bactericid,
 hanem étvágyfokozó és erősítő hatása is van!

Sirof Famel könnyen oldh. lacto-kreosot-készítm., a legérzék.
 betegek is szívesen beveszik, a gyomor jól tűri, specifikum
 makacs köhögés, bronchitis stb. ellen. (L. hird.)

998 *Rp.* Sulfur. praecip.
 Kalii carb.
 Glycerini
 Spiritus
 Aetheris aa 5,0.
 M. f. linim.

DS. Küls. Comedók, acne disseminata ellen. Este a beteg helyek beecsetelendők; lemosás csak reggel

999 *Rp.* Sulfur. praecip. 10,0.
 Aquae rosar. 60,0.
 Glycerini 2,0.
MDS. Külsőleg. Felrázandó.
 Acne rosaceánál a beteg bőr napj. 2-szer bepamacsolandó.

H. Sulfur sublimatum. Belőle állítatik elő a

Sulfur sublimatum lotum s. Sulfur. depur. s. Flores Sulfuris. Világossárga, finom por. Haszn. küls. és bels. mint a sulf. praecip. Adag bels. mint laxans 3,0—5,0—8,0 pro dos.

H. Unguentum sulfuratum s. Unguentum ad scabiem. Tartalmaz sulf. subl.-ot, pix liquidát, sapo kalinust és creta albát. Haszn. főleg scabiesnél, de használható herpes tonsurans, favus, pityriasis versicolor ellen is.

1000 *Rp.* Sulfur. subl. loti 20,0.
 Kalii carbon. depur. 10,0.
 Axung. porei 80,0.
 M. f. unguent.

DS. Zöld szappannal ledörzsölés és fürdő után a beteg helyek 1/2 órán át dörzsölendők a kenőccsel. Ezután fürdőben lemosandó a kenőcs.
 Scabies.

1001 *Rp.* Sulfur. sublim. loti
 Picis liquidae aa 15,0.
 Cretae alb. 10,0.
 Sapon. kalini 30,0.
 Spirit. dilut. 60,0.

MDS. Bedörzsölésre scabies ellen; 3-szorra elhasználni 12 órai időközben. Utána fürdő.
 Hebra-féle rühtinctura módosítva.

Suprarenin. Mellékvesekivonat. L. Organotherap. készítm. és Adrenalin cz. a.

Kén-Mattan cuticular a bőrön nem látszó paszták a fedetlen testrészek nappali kezelésére. (L. hird.)

Kénes gyógyzappan, kéntej-szappan, homokos kénes gyógyzappan, kénes salicyl- és kénes kátrány-gyógyzappan a kolozsvári (Heinrich József) gyógyzappangyárból, kit. hat. mindazon bőrbajoknál, melyek ellen a kén haszn. javalt. (L. hird.)

Scabies, herpes tons., pityriasis vesic. ellen igen jó szolgálatot tesz a Lysoform 5—10—15%-os kenőcse vaselinnel vagy vasogennel.

Symphorol. (Coffeinsulfonsav). Ennek Na, Li, Sr-sói vannak forgalomban. Főleg a Na-só haszn. ($C_8H_9N_4O_2.SO_3Na$). Ez keserű por. Coffein és theobromin (diuretin) készítm. helyett. Adag caps. amyliceában 1,0 napj. többször. Pro die. 4,0—6,0.

Syrgol. Fehérjés ezüstkészítmény, (argent. colloid + albumosok). Haszn. mint az argent. protein.

Syrupus Althaeae. Illatos ízjavító.

H. **Syrupus amygdalinus.** Fejetszerű. Ízjavító fejetekhez.

H. **Syrupus Aurantiorum.** Illatos ízjavító, különösen jó kellemetlen szagú folyadékokhoz.

Syrupus capillorum Veneris. Igen kellemes illatú ízjavító.

H. **Syrupus Cinnamomi.** Illatos ízjavító.

Syrupus Citri. Savanykás limonade-ízű.

†H. **Syrupus Diacodii.** Kevés morphint tartalmaz. Ízjavító opiatokat tartalmazó folyadékokhoz l. Opium.

†H. **Syrupus Ferri-jodati** l. Ferri praeparata.

†H. **Syrupus hypophosphorosus compositus.** A Fellow-syrup mintájára készült lív. készítmény. (Tartalma: calc. kalium, natr. hypophosphit, ferrolactát, acid. citr. mangan-chlorid, chinin hydrochl. tinct. nucis vom.) 200 gmos iüvegekben kapható. Adag. kkanalanként napj. 2—3-szor.

†H. **Syrupus Ipecacuanhae.** Ízjavító köptetőkhöz.

†H. **Syrupus kalii sulfoguaiajcolici** l. Kalium sulfoguaiajolicum cz. a.

Syrupus Liquiritiae. Ízjavító köptetőkhöz, különösen ammon. chlorat. oldatához.

H. **Syrupus mannatus.** Ízjavító hashajtó folyadékokhoz. Gyermekeknek kk. v. gyk. hashajtó.

H. **Syrupus Menthae.** Hűtőízű, kellemes ízjavító.

Syrupus Mororum. Szép piros színű, íz- és színjavító. Különösen a savakat tartalmazó folyadékokhoz szokásos.

II. **Syrupus Rhei.** Ízjavító hashajtó folyadékokhoz.

Syrup Hypophosph. Egger semper idem, principem locum tenet, antecedit omnes.

Neurolin Balla (Syrup hypophosph.-polybromat.) egyesíti a hypophosphit zsong. és a brom csillap. hatását; igen jó idegesség, neurasthenia, hysteria, hypochondria, melancholia eseteiben, kitűnő szer lábbadozók részére (L. hird.)

SYRUP HYPOPHOSPHIT. COMP. Dr. EGGER

Az orvos urak ezen készítményben egy állandó és megbízható szerrel rendelkeznek, mely hosszú évi klinikai kísérletek tanúsága szerint a várt hatást mindig meghozza.

A külföldinél jelentékenyen olcsóbb!

Nem kimérve nyitott üvegekből, hanem csak eredeti légmentesen zárt üvegekben jön forgalomba.

Teufel's

Universal - haskötői

világszerte ismeretesek és kiváló orvosi
autoritásoktól a legjobban ajánlhatnak.



UNIVERSAL - LEIBBINDE.

- I. minta: terhesség idejére
- II. " a hasfalak petyhüdttségé-
nél (szülés után)
- III. " lógó hasnál és nagyfoku
elhízottságnál
- V. " köldöksérvnél
- VI. " vándorvesénél

Teufel's

Mars-öv

a háti részen levő záró készülék kivételével ki-
zárálag „ODISSEUS” gummitricot-szövet-
ből készül, mely rendkívül ruganyosan
tágulékony. *es es es es es es es es es es es es*

Különösen alkalmas viselet elhízott testalkatnál,
a hasi izmok petyhüdtségénél, a szokványos
székrekedés erőművi kezelésénél stb. *es es es*



Teufel's

Világhírű higiénikus és betegápoló czikkerei:

mindenféle rendszerű és kivitelű haskötők, műtéti kötők,
szülésl kötők, sérvkötők, havi kötők, orthopäd egyenes-
tartók, suspensorlumok, orthopäd- és Reform-fűzők stb.

Kaphatók minden jobb fajta kötöszer- és egészségi czikkek üzletben.

~~Ne~~ Tessék Teufel féle eredeti gyárt-
mányokat kérni a kézírással és után-
zatokat visszautasítani.

Teufel

Képes prospektusok és broszürák ingyen és bérmentesen.

Wilh. Jul. Teufel, Stuttgart
sebészeti és testgyógyászati czikkek gyára.

H. **Syrupus Rubi Idaei.** Piros színű íz- és színjavító; különösen savakat tartalmazó folyadékokhoz szokásos.

H. **Syrupus Senegae.** Ízjavító köptetőkhöz.

H. **Syrupus simplex.** Közömbös ízjavító.

*

Syzygium Jambolanum. Jambul. A növény magvai haszn. Adstringens. Diabetesnél rendelik. Főleg az **Extractum Syzygii Jambolani** haszn. Adag. 5,0—6,0 pro dos. 15,0—20,0 pro die.

Taca-diaстase. Az aspergillus oryzae diastaticus enzimje. A ptyalin-hiány pótlására adható gyermekeknek az első életévekben, különösen lázas hasmenés esetén; ajánlották diabeticusoknak is. Fehér, hygroskopos por. Adag porban v. oldatban 0.1—0.3 étkezés közben.

H. **Tamarindorum fructus.** (Tamarindus indica. Leguminosae.) Barnás-fekete, kissé szívós, lágy tömeg. Kellemes savanyú éskevössé összehúzó ízű. Gyenge hashajtó, nagyobb adagban (10,0—30,0) v. decoctum alakjában (30,0 : 300,0). Különben mint electuarium-alapanyag haszn.

1002 *Rp.* Decoct. pulp. Tamarindor.

	e 10,0.
l. a. p. ad colat.	100,0.
colat. fervid. adde	
Kalii hydrotartar.	2,0.
Syrup. simpl.	10,0.

MDS. 2 ór. 1 gyk.

4—8 éves gyerm. hashajtó
icterus catarrh. esetén.

Tanargentan. Barna. vízben alig oldh. por. 6% argentumot. 15% csersavat tart. fehérjés vegyület. Adstringens és antisepticum. Bels. antidiarrhoeicum gyanánt 0,5 gm. napj. 2—3-szor Dysenteria, typhus abdom. és bél tuberculosis eseteiben.

Tannalbin. Tannin fehérjés összeköttetése. A gyomoremésztésnek ellenáll, de hasad és oldódik a bélben; barnás-sárga íztelen, mintegy 50% tannint tartalmazó por. Béladstringens

Vin et Syroup Nourry (jódos tannin vegy. megkötve), jav.: lymphat., arterioscler., rheum. chr., tert. syph. (L. hird.)

Antramel bevált specificum diabetes ellen. (L. hird.)

Chiemsee-Szanatorium és gyógyintézet parti szálloda Prienben (Felső-Bajorország) szív-, ideg-, emésztési, anyagcsere és női betegs. kezelésére orvosoknak és hozzátartozóiknak 25—40% engedni., egész éven át nyitva, magyar előkelő orvosok ajánlják. (L. hird. a hátsó belső borítékold. szemben.)

hasmenések ellen. Adagja felnőttnek 0,5—2,0 pro dos. és 5,0—20,0 pro die. Gyerm. 0,3—0,5 pro dos. napj. 2—4-szer.

Tannalum insolubile s. Alum. subtannicum. Szürkés barna por, vízben nem old. Adstringens. Hintőpor.

Tannalum solubile. (Aluminium tannico-tartaricum.) Sárga, vízben és glycerinben jól oldható por. Adstringens alumen v. tannin helyett; orr, gége ecsetelésére haszn. 20—30%-os glycerin oldata, belehelésre 30%-os vizes oldata, gargarismának 1—2%-os oldata.

Tannigen (Diacetyltannin). Sárgás-szürke, szagtalan, íztelen por. Nehezen oldh. Adstringens. Por alakban befűvásra az orrba, gégebe. Bels. 1,0—2,0 porban. Gyomorból változatlanul megy át a bélbe, hol tannin válik le belőle.

1003 Rp. Tannigeni 2,0.

Bismuthi subsalic. 1,0.

Sacchar. albi 2,0.

M. f. pulv. div. in

dos. aequ. No. 10.

DS. 2 ór. 1 port.

1—2 éves gyermek.

enteritis follic. ellen.

H Tanninum. l. Acid. tannicum.

H. Tanninum albumin. keratin l. Honthiin ez. a.

Tannismut. (Bismut. bitannicum.) Sárga por. Haszn. mint a bism. tannicumé. (L. ott).

Tannisol. Formaldehyd és tannin condensatiós productuma. Piros, szag- és íztelen por. Adstringens, antisepticum bélbetegségek esetén. Adag: 0,1—0,3—0,5 gm. porban napj. 3—5-ször.

Tannobromin. Alkoholban oldható bromocoll-készítmény. Sárgás-barna, vízben oldhatlan por, tartalmaz 25% brómot. Haszn. és adag. mint a bromocoll (l. ott).

Tannocoll. (Tannin és enyv összeköttetése) Haszn. és adag, mint a tannalbin.

Tannoform. (Tannin és formaldehyd összeköttetése.) Rózsaszínű, könnyű, alkoholban oldh. por. Szárító, desinficiens, összehúzó. Küls. hintőpor sebekre, eczemákra és izzadás ellen. Bels. 0,5—1,0 béllhurutok ellen.

Tannon s. Tannopin. (Hexamethylentetramin s. formin, s. urotropin — $(CH_2)_6N_4$ — összeköttetése tanninnal). Barnás,

Alimentum Theinhardt est pinguissimum et phosphorum copiosissimum.

szag- és íztelen, vízben oldh. por. Antidiarrhoeicum. Felnőttnek 1,0, gyermek. 0,2—0,5 pro dos. napj. többször porban.

Tannopin l. Tannon.

Tannothymal. Formaldehyd, tannin és thymol condensációjából keletkező fehéres, vízben nem, szeszben jól oldható por. Antidiarrhoeicum, bélantisepticum. Adag: $3 \times$ napj. 0,5—1,0 gm.

Tannyl. Az oxychloroacetic csersavas vegyülete. Piros-sárga, vízben nem oldh. por. Antidiarrhoeicum. Adag: 1,0—3,0 gm. napj. 3-szor. Vannak készen tabletták is 0,3 gm. tartalommal.

Tanosal. Csersavas kreosot. Barna, amorphi, elfolyósodó por; vízben oldh. Nem mar, nem éget. Bélben hasad. Haszn. mint a kreosot. Adag. oldatban 0,3—1,0 pro dos.

II Taraxaci radix. (Leontodon Taraxacum. Compositae.) Hatóanyaga taraxacin (keserű anyag). Amarum Használtatik az

Extractum Taraxaci. Folyékony vizes kivonat. Főleg mint pillula-constituens hashajtó pillulákhoz.

Tartarus boraxatus. (Kalium tartaric. boraxatum). Fehér, vízszívó, könnyen oldható, savanyú por. Diureticum, húgysavoldó; nagy adagban hashajtó. Adag: mint dinretic. 0,5—2,0 gr., mint hashajtó 5—7 gr. mindkét esetben oldatban.

II. Tartarus depuratus l. Kalium hydrotartaricum.

H. Tartarus natronatus l. Kalium natrio-tartaricum.

H. Tartarus emeticus l. Kalium stibiato-tartaricum.

II. Tela depurata Gaze hydrophyllum. Sterilizált állapotban hiv. Szélessége 80—82 ctm. és $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$, 1—2 m. hosszú, szabályosan csomagolt dobkban kapható.

II. Tela acido carbolico impraegnata. Karbolgaze. Körülbelül 5% carboltartalmú. Szélesség, hosszúság, mint az előbbi.

H. Tela hydrargyro bichlorato impraegnata. Sublimatgaze. Körülb. $\frac{1}{2}\%$ -os szublimattartalmú. Szél., hossz. mint az előbbinél.

H. Tela jodoformio impraegnata. Jodoformgaze. 10% jodof.-tart. Szélesség, hosszúság mint az előbbinél.

Szlatvini Anna-gyógyforrás lithiumban legdúsabb ásványvíz, legkell. üdítő, legjobb húgyhajtó és húgysavoldó gyógyvíz, nyálkahártya-, hólyag- és tüdőhurutnál kit. bevált. (L. hird.)

Sirop Famel könnyen oldh. lacto-kreosotkészítm., a legérzék. betegek is szívesen beveszik, a gyomor jól tűri, specifikum makacs köhögés, bronchitis stb. ellen. (L. hird.)

H. *Tela impraegnata secundum Billroth*. Billroth batiszt. Zsírsavas ólommal átitatott vízhatlan batisztszövet. Szélesség, hossz, mint az előbbinél.

H. *Terebinthina communis*. *Pinus silvestris* és más pinus és *picca*-fajok balzsama. Halványsárga v. sárgásfehér, zavaros, át nem látszó, nyúlós, mézsfűrűségű, kevésbé szemcsés, ragadós, fenyűszagú, keserű ízű balzsam. Borszeszben, aetherben. illó és zsíros olajokban oldódik. Küls. főleg a népgyógyászatban mint derivans haszn., különben tapaszok készítéséhez a gyógyszerészeti technikában.

H. *Terebinthina veneta*. *Pinus larix* balzsama. Az előbbinél több ol. *terebinthinae*-t tartalmaz és azért drágább.

Terpinol ($C_{10}H_{18}O + C_{10}H_{16}$). Terpinhydratból állítatik elő. Színtelen, könnyen mozgó, erősen fénytörő, jáczint szagú folyadék, mely vízben oldhatatlan, borszeszben, aetherben jól oldható. Légutak váladékát csökkenti. Adag bels. capsulában v. pillulában 0,1—0,15 pro dos. 2—3 ór. v. 2—5 csepp pro dos.

1004 <i>Rp.</i> Terpinoli	2,0.	1005 <i>Rp.</i> Terpinoli	
Ol. Sesami	6,0.	└ Natrii benzoici aa	2,5.
M. f. solut.		Sacchar. alb.	1,0.
Det. in caps. gelatin.		Mucil. Gummi arab.	
	No. 20.		qu. s.
<i>D.S.</i> 0,1 gmos terpinol-		ut f. pillul. No. 30.	
capsulák. 2—3 ór.		Consp. pulv. Liquir.	
1 darabot.		<i>D.S.</i> 1—2 ór. 1—2 sze-	
Expectorans.		met. Expectorans.	

H. *Terpinum hydratum*. Színtelen, rhombicus, fénylő, kissé szagos, aromaticus ízű jegeczek. Hideg vízben alig, forróban 32 r.-ben oldódik, borszeszben jól oldódik. Az ol. *terebinthinae* pótszere. Kis adagban expectorans, a váladékot elfolyósítja. Nagy adagban edényösszehúzó, miért is a légutak váladékát csökkenti. Haemostaticum, ezért haemoptoe esetén indikált. Diureticumnak nem ajánlható. Jól hat cystitis és gonorrhoea eseteiben is. Bels. pillulában v. vizes és borszeszes oldatban mint expectorans 0,1—0,2 pro dos.; mint haemostaticum és váladékcsökkentő 0,2—0,5 pro dos. 2—3-szor napj.

1006 *Rp.* Terpini hydrati

2,0.
Spiritus
Aquae. dest.
Syrup. cort. Aurant. aa
50,0.
<i>M.D.S.</i> 3 ór. 1 evők.
Expectorans.

Vesicaesan-labdaesok tart. a *folia uvae ursi* összes hatóanyagait, kit. hólyagfertőtlenítő szer acut és chr. gonorrhoeánál, káros hatás nélkül gyomorra és vesékre. (L. lúrd.)

Haemostaticum: *Rp.* Gelodurat „Pohl“
 scat. orig. c. Extr. Hydrast. 1,0.
S. 3—4-szer naponta 1 dbot.

1007 *Rp.* Terpini hydrati 5,0.
 Sacchar alb.
 Mucil. Gummi arab.
 \overline{aa} qu. s.
 ut. f. pillul. No. 30.
 Consp. pulv Lyco-
 pod.
DS. 3-szor napj 1—2
 szemet.

1008 *Rp.* Terpini hydrati 0,5.
 Aquae dest.
 Syr. cort. Aurant.
 \overline{aa} 40,0.
 Spir. vini dil. 10,0.
MDS. 2 ór. 1 gyermek.
 Gyerm. catarrh.
 bronch. ellen.

Terralin. Égetett gipsz, kaolin, lanolin, glycerin és antisepticus szereknek keveréke; sárgás-fehér, földes-aromás szagú, lanolin-állományú kenőcs-alapanyag, mely a hozzá kevert gyógyszerektől változást nem szenved. Ha beszáradna, kevés glycerin hozzáadására eredeti állományát visszanyeri. Zsíros olajokkal nem szabad elegyíteni.

Testaden. Bikaheréből készül; 1 gr.-ja megfelel 5 gr. friss here-állománynak. Ideg- és gerinczvelőbetegeknek 6—8,0 gr.-os adagokban.

Tetanus antitoxin I, Serum antitetanicum.

Tetrachlormethan (CCl_4). Illó, jószagú folyadék. Jod, brom, kautschuk, paraffin stb. oldószere. Nem tűzveszélyes, mint az alkohol és aether. A *chirosoter* (l. c. cz. a.) is tartalmazza. Műtők kezének desinficiálására ajánlják jodnak 1%-os tetrachlormethanos oldatát, melybe $\frac{1}{2}\%$ paraffint is tesznek.

Teucrin. (Extractum Scordii depur.) A teucrium scordium nevű növény folyékony, vizes kivonata. Barna, csípős ízű, savi vegyhatású folyadék. Helybelileg lobosít. Ajánlják hideg tályogok, fungosus csont- és mirigy-lobok esetén a beteg szövetbe fecskendésre. Acut lobot és gyorsabb gyógyulást idéz elő. Adag befecskendésre 3 gr.

Tetronalum. Parallel vegyület a sulfonallal, csakhogy 4-szer van aethylizálva. Nagy, szüntelen, rhombos jegeczlemezek. Vízben nehezen old. Hypnoticum. Oly értékű, mint a sulfonal. Adag u. az.

Thallinum sulfuricum [$C_{10}H_{13}NO_2H_2SO_4$]. Sárgás-fehér, jegeczes por, kellemes szagú, keserű, sós, aromaticus ízű. 8 r. hideg vízben oldódik, borszeszben nehezen. Gonorrhoea ellen befecsk. 1—2%-os oldatokkal. Bels. antipyreticum. Erős izzadás, szívdepressió. Adag bels. oldatban, porban 0,25—0,5 pro dos. ór. v. 2 ór. szükség szerint.

Thallinum tartaricum ($C_{10}H_{13}NO.C_4H_6O_6$). Sárgás-fehér kellemes szagú, keserű, aromaticus ízű por. 10 r. hideg vízben oldódik, borszeszben nehezen. Hatása, haszn. bels. mint a thall. sulf.

Hideg tályogok antisept. öblítéséhez, lemosásához a legjobb szer a Lysoform $\frac{1}{2}$ —1%-os oldata.

Thanathol l. Guaethol.

†H. Theobrominum natrio-salicylicum. s. Diuretinum (l. o. is). Fehér, amorph, néha jegeczes, enyhén édeses, majd sós-keserű, lugos ízű por, hideg vízben nehezen, melegben jól old. Húgyhajtó. Sziytonicum, mint a coffein. Jobb oldatban rendelni. Adag 0,5–1,0! pro dos. 4,0–8,0! pro die.

1009 Rp. Theobromini natr.
salicyl 8,0.

Aquae Menthae pip.

130,0.

Syr. cort. Aurant.

20,0.

MDS. 1–2 ór. 1 evők.

1010 Rp. Theobromini natr.
salicyl 8,0.

Sacch. lactis 4,0.

M. f. pulv. div. in

dos. aequ. No. 10.

D. in caps. amylac.

S. 2 ór. 1 dbot.

Theocin. Synthetice előállított theophyllin, tehát a theobromin-nal isomer dimethylxanthin. A természetben mint a thea-levelek egyik alkaloidja ismeretes. Erős húgyhajtó; excitans hatása nincs. Színtelen, táblaalakú jegeczek; hideg vízben rosszul, melegben elég jól oldható. Haszn. mint diureticum. Adagja porban (mely meleg theában oldható) 0,3–0,5.

Theocin-natrium-aceticum. Vízben rosszul oldódó kettős só; gyomorban theocin hasadhat le belőle. Diureticum, mint a diuretin. Adag 0,3 pro dosi többször napj. poralakban.

Theolactin. (Theobromin-natrium cum natrio lactico). Diuretin pótszere, melyben 10%-nál több a theobromin tartalom. Vízben oldható por. Haszn. mint a theobrom. natrio salicyl. Ize rossz, ezért caps. amylaceában rendeljük. Adag: 1,0 gm. napj. 3–5-ször.

Theophyllin (Dimethylxanthin) l. Theocin.

Thephorin (Theobromino-natrium-natrium-formicium). Fehér, szagtalan, édeses lúgos ízű, vízben jól old. por. Úgy haszn. mint a diuretin.

Thermodinum. (Acetylaethoxyphenylurethan). Fehér, szagtalan, vízben nehezen old. jegeczek. Gyengébb antipyreticum. Egyes adag 0,5–0,7 napj. többször. Antipyrinnel nem mérkőzhet. Gyakran kanyarószerű kiütés mint mellékhatás; izzadás ismételi hőemelkedéskor borzongás.

Thigenol. 10% kötött ként tartalmazó syntheticens sulfo-olaj. Kellemetlen szaga és íze nincs. Vízben, alkoholban oldható. Az ichthyol pótszere. Haszn. mint ez. Húgyeső-gonorrhoeánál

Uroballan, karlsbadi húgyhajtó tea, gyorsan hat a szív- és a vesebajok nyomában föllépő hydropsnál. (L. hird.)

Diureticum: Rp. Gelodurat „Pohl“

scat. orig. c. Theobr. natr. salic. 0,25.

S. 4-szer naponta 2 dbot.

Thigenol-Mattan (Mattan + 2% Thigenol) a bőrön nem látszó paszta a fedetlen testrészek nappali kezelésére. (L. hird.)

20%-os oldat. Bőrbajok ellen tisztán vagy 20%-os kenőcs v. pasta alakjában.

Thilandinum. Lanolin és kén 2300-nál történő összeolvasztásából származó, 30% ként tart. sárgás-barna, kenőcsszerű anyag. Bőrbajok, kül. eczema ellen bedörzsölés alakjában haszn.

Thiocol (Roche) (Orthogujacolulfosavas kalium). Fehér, kissé sós ízű por, vízben jól oldódik. A kreosot pótszere. Haszn. l. ott. Adag 2—3× napjában 1,0 gm. porban v. oldatban. *L. Sirolin.*

Thiocoli comp liquor (sec. Eibach). Tart. 6% kalium sulfogujacolicumot, 1% natr. benzoic.-ot, 0.2% cetrarint és 93% kávészörpöt. Tuberculosoknak kk. napj. 3—4×. Étvágyat is javítja.

Thioform. (Bázisos dithiosalicylsavas bismuth). Szürkés-sárga íz- és szagtalan por, vízben nem old. Sebekre hintőpornak, mint a jodoform v. dermatol. Szembe, orrba szintén poralakban. Eczemánál, viszketésnél 10%-os kenőcs.

Thiolum. Nem egységes test. A barnaszén destillatio-terméke. Az ichthyol pótszere. Kereskedésben kétféle alak van. 1. **Thiolum liquidum**, mely szörpsűrűségű 40%-os vizes oldat. 2. **Thiolum siccum**, fekete, fényes pikkelyek. Mindkettő kissé kátrányos szagú, kesernyész, összehúzó ízű. Vízelvonó, keratoplasticus, edényszűkítő, gyöngén antisepticus hatású. Haszn. az ichthyol helyett. Adag küls. kenőcsben, linimentumban 30,0—50,0 : 100,0. a folyékonyból; hintőpornak a száraz tisztán.

1011 <i>Rp.</i> Thioli liqu. 30,0—50,0.	1012 <i>Rp.</i> Thioli liqu. 50,0.
Aquae dest. 100,0.	Glycerini 100,0.
<i>MDS.</i> Külsőleg.	<i>MDS.</i> Külsőleg.

Liquor Thiorobini comp. Eibach nemcsak a tuberkulózisnak specifikuma, hanem igen hatásos a légzőszervek összes hurutos és gyulladásos betegségei ellen!

Myrticol „Csatádi“ igen kell. ízű guajacol-áfonya készít., kit. a légzőszervek bántalm., kül. csúcs- és hörghurut ellen. (L. hird.)

Sirop Famel könnyen oldh. lacto-kreosotkészítm., a légzőszék. betegek is szívesen beveszik, a gyomor jól tűri, specifikum makacs köhögés, bronchitis stb. ellen. (L. hird.)

Vitum cordis: *Rp.* Gelodurat „Pohl“
scat. orig. c. Theobr. natr. salic. 0,25.
S. 4-szer naponta 2 dbot.

Haemalbumin-Lecithin dr. Dahmen genuin vérvás, idegerősítő táplálék: plithisis, chlorosis, rhachitis, hószámvavar, lábadozás stb. (L. hird.)

1013 *Rp.* Thioli liqu. 10,0.
 Ungu simpl. 50,0.
 M. f. ungu.
D.S. Kenőcs.

1014 *Rp.* Thioli sicci pulv. 30,0.
 Det. in scat.
S. Hintőpor.

Thiophenum bijodatum. ($C_4H_2J_2S$.) 75-5% J-ot tart. Vízben oldhatlan, aetherben oldh. kellemes szagú jegecztáblák. Sebészetben jodoform, jodol helyett hintőpor; egy idő múlva égő érzés.

Thiosinamin seu Rodallin. (Allylsulfocarbamid.) Színtelen v. sárgás, hagymaszagú jegeczek; vízben, alcoholban, aetherben oldhatók. Mint szöveteket oldó szer, lupus, caries, csontnekrosis esetén bőr alá fecskendezik 15%-os alkoholos oldatban; eleinte 0,2, később 0,3—0,4 köbctm.-t 2—3-szor hetenként. Az alkoholos oldat befecskendezése fájdalmas lévén, helyette *Th.-szappant* is lehet használni.

Thymacetin. A phenacetinnel rokon vegyület. Hatása, használata, mint az utóbbié. Fehér, vízben oldhatatlan por. Adag 0,25—1,00 gr.

H. Thymolum. ($C_6H_5(CH_3)(C_3H_7)OH$). Methylpropylphenol. Tábla-alakú, színtelen, kakukfű-olajszagú, fűszeres, csipős ízű jegeczek. Vízben alig, borszeszben, aetherben, zsíros olajokban, glycerinben könnyen oldható. Antisepticum. Sebkezelésben 1:1000 oldatban haszn. Bronchitis putrida, bronchiectasia, gangraena pulm., plithisis eseteiben belégzésre 0,5—1,0:1000. Bels. ritkán. Kereskedésben thymolos kötszerek is vannak forgalomban.

1015 *Rp.* Thymoli 1,0.
 Glycerini 20,0.
 Spiritus 10,0.
 Aquae dest. 1000,0.
 M. f. solutio.
D.S. 1‰ thymololdat.
 Külsőleg.

1016 *Rp.* Thymoli 1,0.
 Olei Amygdal. dulc. 50,0.
M.D.S. Külsőleg. Trichorexis nodosa ellen a bajszot bekenni.

1017 *Rp.* Thymoli 0,2.
 Spiritus qu. s. ad solut.
 Aquae dest. ferv. 200,0.

M.D.S. Belégzésre.

Thymotol. (Thymolum carbonicum). l. Tyratol.

Thyreoidea-készítmények. A juh pajzsmirigyéből előállított különféle készítmények myxoedema, cachexia strumipriva, polysarcia (?) és cretinismus eseteiben, nemkülönben psoriasis és

Extr. Thymi Kern bevált thym.készítm., 3 koncentrációban, kitűnő bronchitis, plithisis, pertussis, asthma ellen. (L. lúrd.)

Bronchiectasia: *Rp.* Gelodurat „Pohl“
 scat. orig. c. ol. Terebinth. rect. 0,5.
S. naponta 3—6 dbot.

ichthyosisnál (?) adagoltattak eddig. 1. *Tablettae thyreoideae Richter*. Egy db. tart. 0,5 friss pajzsmirigy hatóanyagait. 2. *Thyraden seu Extractum thyreoideae Haaf*. Knoll et Comp. ludwigshafeni gyárából a) Tejczukorral készült por. 1 rész megfelel kétannyi súlyrész mirigynek, azonkívül b) pillulák, és c) tabletták, mindeniknek darabja 0,3 gm. mirigynek megfelelő. Adag felnőtteknek Kocher szerint a porból 1,0—1,5 gm. pro die emelkedőleg 5,0 pro die; a pillulákból és tablett. 6—9 db. Gyerm. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ része ennek. 3. *Thyreoidinum siccatum. Merck*. Tabletták. Egy üvegcsében 50 db. 1 db 0,1 juhmirigynek felel meg. Adag felnőtteknek pro die. 4—6 db. 4. *Thyreoidin-Poehl* Tabletták 0,3 gm. tart.; napj. 1 db. 2—4-szer. 5. *Tabloids of compressed ary thyroid gland. Burroughs, Wellcome et Co. London*. Egy db 0,3 gm. juhmirigynek felel meg. Adag $\frac{1}{2}$ db — 3 db napj. 3-szor, étkezés után, meleg tejjel v. levessel. v. vízzel. 6. *Thyreoidin-Pastillen. Hofapotheke, Dresden*. Egy db tartalmaz 0,3 gm. vacuumban 30° C-nál szárított juhmirigyet. Adag első 3 nap napj. 1 db. teli gyomorral, később 2 db. pro die, majd 3 db. pro die, de nem egyszerre. 7. *Thyroidin vagy Jodothyrim. Ferd. Bayer. Elberfeld. Baumann E.* által előállított valószínű hatóanyaga a pajzsmirigynek. a) *Poralakban* adag 0,002 gm. — 0,05 pro die. b) *Tabletták alakjában*. Egy db megfelel 0,3 gm. mirigynek. Adag pro die 1—3 db. emelkedőleg. c) Magyar tabletták Egger-félék. 3 db. felel meg egy mirigynek. Adag 1—3 db. pro die. 8. *Aiodin. Hoffmann—Laroche. Basel*. 0,4% J-tartalommal. 1,0=10,0 friss mirigygyel. Tabletták 0,1—0,3—0,5 aiodintartalommal vannak forgalomban. 9. *Thyrogen. A gl. thy.* vizes kivonatából nyert jódtart. coagulum. Állítólag a thyreoidea jódfehérjéje. 10. *Thyreoproteid. A zsírtalanított mirigy thymolos vízzel készült kivonata*, mely NaCl-al van kicsapva. 11. *Thyroglandin seu Jodoglobulin. Komplikált módon készült kivonat. Mellékhatások és mérgezési tünetek minden készítm. gyakoriak; pulusszaporaság, szívgyengeség, ájulások. stenocardia, palpitatio, collapsus, lesóványodás, eclampsia, comatosus állapot, glycosuria, albuminuria, lázak. Nagy vigyázat! Az egyes készítmények árai igen különbözőek.*

Thyreoidserum, l. Antithyreoidin serum (Moebius).

Thyresol. A santalol methylestere. Olajszerű, aromás, színtelen folyadék. Vízben nem oldh. Antigonorrhoeicum az Ol. santali helyett. Készen kaphatók geletinecapsulák 0,25 gm. tartalommal, valamint tabletták is, melyek magn. carbonattal készülnek. Adag: 3—4× napj. 0,5 gm., azaz 20 csepp.

H. Tiliae flores. (*Tilia grandifolia et parvifolia. Tiliaceae*). Hatóanyaga illó olaj. Diaphoreticum. Házilag készíthető belőle infusum. Egy csésze theára 1—2 evőkanál veendő; melegen fogyasztandó el.

Pivako hat. int. antigon., bals. copaivae és extr. cubebae emulsiója, fok. a vizelet acid. és bacteric. hatásúvá teszi. (L. hird.)

- H. Tinctura amara.** Amarum. Stomachicum. Adag belsőleg 20—30 csepp. — kk. napj. többször.
- H. Tinctura aromatica.** Keserű aromás stomachicum. 20—30 csepp. — kk. napj. többször.
- H. Tincturae omnes** l. a megfelelő drogue-ok czímei alatt.
- Tinctura Ferri Athenstaedt.** Aromás, folyékony vaskészítmény. Tart. 0,4% vasoxydot. Haszn. mint a többi vaskészítményeké. Adag: mint a tinct. Ferri pomati.
- Tiodin.** Thiosinamin és jódaethyl összeköttetése. Vízben jól oldh. szintelen kristályok. Úgy haszn. mint a thiosinaminum és a fibrolysin. Adag: bels. $2\times$ napj. 0,1 gm. vagy bőr alá 10—20%-os oldatból 1 fecskendővel pro die. Belsőleg csak étkezés közben.
- Tolypyrin.** (Toly-antipyrin). Fehér, keserű, vízben elég jól oldható por. Az antipyrin pótszere, főleg láz ellen; mint fájdalomcsillapító kevésbé megbízható. Adagja 1,0 gr. többször napj.
- Tolysal** (Salicylsavás-tolypyrin). Vörhenyes, keserű, vízben nehezen oldható por. Antipyreticum, antirheumaticum. Adag 1—1,5 többször napjában, porban.
- Tonogen suprarenale.** (Richter.) Folyékony mellékvese-kivonat. L. Organo-therapeuticus készítm. és adrenalin. *Tablettae tonogeni Richter* belső haszn. 1 db-ban $\frac{5}{10}$ milligm. hatóanyag.
- Tonocain suprarenale Richter:** (Tonogen + B. Eucain) 1 kctm. tartalmaz 0,02 eucaint és 0,18 tonogen suprarenale Richtert (1:1000). Szemészetben, orr- és gégegyógyászatban, valamint urologiában nyálkahártya érzéstelenítésére és vértelenítésére. Sebészetben: kisebb műtétek előtt 10 percczel 1—2 kctm. a vértelenítendő terület alá fecskendezve. Foghúzás előtt néhány percczel $\frac{1}{2}$ —1 kctm. a foghús alá viendő. (5 gm.-os üvegekben és 1 kctm. tart. steril üveg-fiólakban van forgalomban.)
- Tonol.** Gyári neve a Schering-féle gvár glycerophosphat készítményeinek. Calcio, ferro, natrio, kalio, lithio, magnesio, mangano, chinono és strychnono-tonol van forgalomban. (L. glycerophosphat cz. a.)
- H. Tragacantha.** Különböző astragalusfajok mézgája. Gyógyszerészeti technikában fontos szer. Haszn. mint a gummi-arabicum.
- Traumaticin.** Guttapercha chloroformban oldva. Haszn. mint a collodium.
-
- Thyreoidin-Poehl** a pajzsmirigy synerg. csoportja, myxoedema, struma, obesitas stb. eseteiben. (L. hird.)
- Menthocapsol** „Skala“ fájdalomcsillapító bedörzsölés, csúsz, pleurodynia, lumbago, ischias, coxalgia ellen. (L. hird.)
- Lactobacilline** erjesztő anyag por alakban kit. eredménnyel alkalm. az orr-, gégegyógyászatban, sebészetben. (L. hird.)

Traumatol. (Jodkresol). Ibolyaszínű, szagtalan, finom por. Antiszepticus és szárító hatású. A jodoform pótszere. Híutópor substantiában; kenőcs 1 : 10.

Tribromphenol. ($C_6H_2Br_3OH$). Fehér, brom-szagú, vízben nem, alkoholban, zsírokban jól oldható por. Edző és antiszepticus hatású. A gyomorban nem változik, csak a bélben oldódik és desinficiál. Haszn. küls. atoniás fekélyekre mint hintőpor magában v. talcummal; kenőcsben 1 : 10. Bels. mint bél-desinficiens 0,1 gr. porban, pillulában többször napjában.

Tiferrrin l. *Ferri praeparata*.

H. Trifolii febrini folia. (*Menyanthes trifoliata*, *Gentianeae*.) *Amarum*. Keserű theakeverékek alkotórésze.

††H. **Extractum Trifolii febrini.** Főleg mint hashajtó pilulák constituense haszn.

Trigemin. Pyramidon és butylchloralhydrat összeköttetése. Vízben jól oldódó, aromás szagú, kristályos, légen nyirkosodó anyag. Anodynum, neuralgia, fogfájás és haemicrania esetén. Adag: 0,25—0,5 gm. pro dosi napj. többször. Charta ceratában rendeltessék, mert különben elfolyósodik s megbarnul, midőn tapasztalat szerint gyomorfájdalmakat is okoz. Főlöszleges!

Trimethylamin seu Secalin. Heringlének mésztejjel kezelése és deszillatiója útján készül. Színtelen, átlátszó, heringszagú folyadék, mely vízben és alkoholban oldódik. Ízületi csúz, chorea és paralysis agitans eseteiben 2—6 cseppet többször napjában.

††H. **Trinitrin** l. Nitroglycerin.

†H. **Trionalum.** A sulfonallal parallel vegyület, csak hogy 3-szor van aethylizálva. Színtelen jegeczpor. Vízben nehezen old. Hypnoticum, mint a sulfonal. Adag l. sulfonal. Dos. max. pro die 2,0!

Triphenin. (Propionyl-paraphenetidin.) Fehér, vízben rosszul oldódó por. Hatása és használata mint a phenacetiné. Adag: mint antipyreticum 0,3—0,5 gr., többször napjában, mint analgeticum 1,0 pro dos.

Tropacocainum hydrochloricum. Az alcaloid előfordul egy jávai cocanövényben, de syntheticus úton is előállítható. Színtelen, vízben jól oldh. jegecztk. Hatása, mint a cocainé, kivéve, hogy a pupillát kevésbé tágítja. Kevésbé mérges. Eddig a szemészek haszn. 2—3%-os steril physiol. konyhasós oldatban érzéstelenítésre. Bels. nem.

Ízületi csúz eseteiben kit. hat. Trencséuteplicz természetes iszapfürdői és 36—42 hőfokú radiumos kénes forrásai. (L. lúrd.)

Tropon. Különböző húsokból, vérből és növényi anyagokból (pl. hüvelyesek magjából) készülő fehér por; íztelen, szagtalan, vízben oldhatatlan; 99% tiszta fehérje van benne. Egyéb fehérjetartalmú tápszerek helyettesítésére szolgál, pl. tejben (1 evőkanállal $\frac{1}{2}$ lit. tejre) vagy tropon-csokoládé, kétszersült, levestabletták alakjában.

Trygase. Élesztő. (L. furunculin cz. a.).

Trypanvörös. A benzopurpurinek közé tartozó festőanyag. Trypanosomiasis, azonkívül nyakmirigygyulladások, sőt rák ellen is ajánlották. Adag: 0,5 gm. physiol. sóoldatban oldva bőr alá.

Tuberculocidin. (Klebs.) Tuberc.-bacillusok tenyészetéből készül. Állítólag toxintól ment, csak gyógyító anyagokat tartalmaz. Egészséges egyénekre hatástalan, tbc.-betegeknél lázat okoz. Haszn. 1%-os oldatából per os 5 csepp-től óvatosan 20 cseppig emelkedve; egy kúrára összesen 100—200 km. Reggel éhgyomorra egyszer napj. veendő. Local-tbc.-nál 3%-os oldata befecskendésre.

H. Tubuli acido carbolico praeparati. Kül. vastagságú és hosszúságú, oldalnyílásokkal ellátott draincsövek. 5% os carbol-oldatban tartatnak.

Tulase. Behring által készített és ajánlott antitubercoticum. Tuberculum bacillus-culturákból készülő átlátszó, mézszerű folyadék. Bels., v. subcután, v. intravenásan kezdetben 0,01 köbctm. adandó. Az adagot fokozatosan emelni kell.

Turiopin. Fenyőfák friss hajtásainak kivonata, mely az illó olaj mellett (Ol. terebinth.) gyantákat is tartalmaz. Balsamicum. Adag 2 ór. 1 kk. légutak hurutja ellen.

Tumenolum venale. Bitumenes közetből nyert barna, sűrű, kátrányszerű, vízben oldh. anyag, melyben tumenol-olaj (tumenol-sulfon) és tumenolsulfonsav foglaltatik. Bőrgyógyászok alkalmazzák szárító, lobellenes hatásáért. A viszketést is csillapítja. Nedvező eczemánál, pruritushnál 10%-os oldat ecsetelésre, vagy 5%-os kenőcs. Borogatásokra 3—5%-os oldat.

1018 *Rp.* Tumenoli 3,0.
Aetheris sulfur.
Spirit. vini.
Glycerini aa 10,0.
MDS. Ecsetelésre

1019 *Rp.* Tumenoli
Zinci oxyd aa 3,0.
Ungu. emoll. 30,0.
M. f. ungu.
DS. Kenőcs.

Pertussis, kanyaró, influenza után visszamaradt makacs hurutoknál kitűnő a Liqueur Thiorobini comp. Eibach!

Extr. thymi Kern 3 koncentrációban, kitűnő pertussis, bronchitis, phthisis, asthma ellen. (L. hird.)

Tussolum. (Phenylglycolsavas antipyrin). Színtelen, vízben jól oldh. por. Pertussisnál csökkenti és rövidíti a rohamokat. Adagok: egy éven alóli gyermek 0,05—0,1, 1—2 évesnek 0,1, 2—4 évesnek 0,25—0,4, 5 éven felülinek 0,5 napj. 3—4-szer, oldatban. Egvényes italok, tej kerülendőek.

1020 *Rp.* Tussoli 3,0.

Aquae dest. 80,0.

Syr. cort. Aurant 20,0.

MDS. Napj. 2—3-szor 1 kk.

2—3 éves gyermek.

Pertussis.

Tutulin. Tápszer, mely főleg fehérjéből áll. (96%).

Typhase. (Klebs.) Typhus-bacillusok tenyészetéből készül. Rend szerint tuberculocidinnel együtt rendelik, ha magas lázak vannak s egyedül tuberculocidinre nem szűnnek. Adagolás: 1 %-os oldatából 5 cseptől 20-ig emelkedve a tuberculocidinhez keverve. L. utóbbit is.

Tyratol. Thymolcarbonat. Fehér, kristályos por, mely gyengén thymolszagú. Taenia és ascaris elhajtására felnőtteknek 3—4-szer napjában 2 gr., gyermekeknek 0,5—1 gr.

Tyramine. Nem más mint *Barger* p. hydroxyl-phenylaethylaminja, melyet ő a secale corn. hatóanyagának tart. A Burroughs-Wellcome cég állítja elő. Adag minden oly esetben, melyben secalekészítmények vannak javalva: pro dos. 0,005 a kész tabletták alakjában per os., vagy egy tablettát vízben oldva subcután.

Unguenta.

H. Unguentum acidi borici l. Acid. boricum.

H. Unguentum adipis lanae. (Lanolin 100,0 + víz 25,0 + ol. sesami 25,0) Kenőcsalapanyag.

Unguentum aromaticum. Illatos kenőcs-alapanyag. Tiszta a bőrre dörzsölve gyengén izgató, elvonó.

Unguentum Autenriethi l. Kalium stibiato-tartaricum.

Unguentum caseini. Alkali-caseinat, glycerin, vaselin és víz keveréke. Sűrű, nyúlós emulsió. Bőrön beszáradva ruganyos, síma bevonatot képez. Magában izgatott bőrfelületek bevoná-

Mattan, fénytelen Coldcream, a fedetlen testrészek (arcz, kéz, szembéjak) nappali kezelésére. (L. hird.)

Bengué-balzsam (menthol, methylsal., lanolin) kit. fájdalomcsillap. csúsz, migrén, lumbago, pruritus eseteiben. (L. hird.)

sára, továbbá mint bőrizgató, antiparasiticus, antisepticus, ad stringens szerek vivőanyaga használtatik.

H. Unguentum *Cantharidum*. Pro usu veterinario.

H. Unguentum *Cerussae* l. *Plumbum carbonicum*.

H. Unguentum *diachylon* Dr. *Hebra* l. *Plumbum oxydatum*.

H. Unguentum *emolliens* s. *Crème céleste*. Közömbös kenőcs-alapanyag. A gazdag gyakorl. haszn.

H. Unguentum *Glycerini*. (*Tragacantha* 2 r. + *Spiritus* 10 r. + *Glycerini* 98 r.) Bevonó, védő kenőcs. Közömbös kenőcs-alapanyag. Kül. nyáron használható, midőn zsíros kenőcsök könnyen avasodnak.

H. Unguentum *Hydrargyri* l. *Hydrargyrum*.

H. Unguentum *Kalii jodati cum jodo* l. *Jodum*.

Unguentum *paraffini*. (1 rész *paraffinum solid.* + 4 r. *paraffin. liquid.*). A kereskedésbeli vaselint pótolja. 40–50°-nál olvadó kenőcs. Haszn., mint a vaselin.

H. Unguentum *Plumbi tannici* s. *Ungu. contra decubitus*. (*Acid. tannicum*. 1 r. + *Plumb. acet. bas.* 2 r. + *Vasolina* 17 r.) Decubitusokra mint összehúzó kenőcs.

H. Unguentum *simplex*. (Feh. viasz 50 r. vaselin 50 r. *axungia* 150 r.) Közömbös kenőcs-alapanyag.

H. Unguentum *sulfuratum* l. *Sulfur. sublim.*

H. Unguentum *Zinci oxydati* l. *Zincum. oxyd.*

*

Urea pura. Húgyany. [$CO(NH_2)_2$] Színtelen, vízben és alkoholban igen jól oldható kristályokból áll. Húgyhajtó és uratoldó. Mint diureticum főleg *cirrhosis hepat.*-nél jó; *nephritis* esetén megbízhatatlan. Mint uratoldó köszvény, húgykő esetén haszn. Adag 10–20 gr. pro die 5–10 %-os vizes oldatban.

Uresin. (*Urotropin* és *lithium citric.* kettős sója). Vízben oldható, fehér por. Uratoldó. Adag 1–2 gr. pro dosi többször napjában.

Urethanum ($C_3H_7NO_2$). Színtelen, oszlopos hűtő ízű jegeczek; vízben, borszeszben, aetherben jól oldódik. Sedativum, hypnoticum. Chloralhydrat pótszere, de kevésbbé biztos hatású. Szívre nem hat. Nem-anodyn hatású, ezért oly álmatlanságnál, mely fájdalmak, köhögés miatt áll fenn, nem használható. Adag bels. oldatban 2,0–4,0 pro dos. felnőtteknek, 0,1–0,3. gyermekeknek.

„Helfenberg“

védjegyű készítmények:

Blutan (alkoholmentes) 2 korona.

Siquor Ferro-Mangani peptonati

Siquor Ferro-Mangani saccharati

(500 gr.) 3 korona,

a jelenkor legkönnyebben emészthető és
legjobb ízű vasmangan-készítményei.

Regulin

természetes szer a bélürülés szabályozására
50 gr. 1 korona 60 fillér, 100 gr. 3 korona.

Valofin

**Spiritus valerianae compositus „Helfen-
berg“** jóízű, határtalan ideig eltartható
valeriana-készítmény fodomentával

1 eredeti üveg á 30 gr. 1 kor. 50 fillér.

Fiók Ausztria-Magyarország részére:

A. Kremel, Adler-Apotheke, Wien

XIV/1 Märzstrasse 49.

KÖSZVÉNY

és húgysavas diathesis ellen évek óta a legjobb szernek bizonyult Noorden tanár által a therapiába bevezetett

UROL

(chinasavas húgysav) D. R. P. 124 426

10 grammot tartalmazó fiola ára M 2 50.

1 karton 5 fiolával à 10 gr. . » 12.50.

Urol-tabletták

1 fiola à 10 tabletta à 0.5 gr. Urol M. 1.50.

1 karton 5 fiolával à 10 tabletta M 7.50.

Urocol (törv. véd.), az Urol összeköttetése Colchicinnal (Urol-Colchicin-tabl., 0.5 gr. Urol, 1 miligr. Colchicin-tartalommal) pontosan adagolva, akut köszvényrohamoknál kitűnően beváltak, mert a

☞ **fájdalmat** majdnem **rögtön enyhítik.** ☞

10 tablettát tartalmazó fiola ára M 1.90.

1 karton 5 fiolával à 10 tabletta M. 9.50.

Dr. Gemmel, egészségügyi tanácsos, fürdőorvos **Bad Salzschlirf**, a Mediz. Klinik 1909 iki 43. számában ezeket írja az **Urocol**-ról: Az Urocol tabletták használatánál igen kellemesen hatott a betegekre, hogy a fájdalommal együtt az izületek duzzadása is alábbhagyott, hogy a drasztikus hatás csak enyhe módon nyilvánult és hogy a szív működés, még tartósabb használatnál is, semmiképen sem befolyásoltatott. Csak néhány esetben történt, hogy magas korú és különben is gyöngye emésztésű betegeknél erős hashajtó hatás mutatkozott és utána gyöngyeségi érzés lépett fel. A tabletták szokásos számának csökkentésével azonban ennek elejét lehetett venni és a köszvényroham is legtöbbször már a harmadik napon elmúlt. Rendetlen szív működésű, arteriosclerotikus betegeknél is eredményesen voltak alkalmazhatók ezek a tabletták, a nélkül, hogy a szív működése befolyásoltatott volna.

rodalmat és mintát küld

Dr. SCHÜTZ & Co. BONN N. W.

Fabrik chemisch-pharm. Praeparate.

1021 *Rp.* Urethani 6,0.
Aquae dest.
Syrup. capill. Veneris
aa 30,0.

MDS. Este lefekvéskor 2
evők.; ha álom nem
jelentkeznék, még
egy kanállal.

1023 *Rp.* Urethani 10,0.
Aquae dest. 30,0.
M. f. solut.

DS. Bőr alá fecskendésre.
2—3 fecsk. hypnoti-
cum.

1022 *Rp.* Urethani 0,5—1,5.
Aquae Menthae pip.
Syrup. cort. Aurant
aa 25,0.

MDS. 1—2 kk. egyszerre.
1 kk.-ban körülbe-
lül 0,1 gm. urethan.
Gyermekeknek.

1024 *Rp.* Urethani 5,0.
Aquae dest. 100,0.
Syrup. capill. Vener.
20,0.

MDS. Ór. 1 evők.
Sedativum.

Uricedin Stroschein. (Czitromsavas natrium és lithium, chlor-
natrium és kénsavas natrium keveréke.) Megbízhatatlan húgy-
savoldó. Adag. köszvény ellen 1,0—2,0 pro dos. napj. kétszer.

Urisolvin. (Hugyany és lithium citric. összeköttetése.) Uratoldó.
Adag 3 óránként 0,2 gr. szódavízben.

Urocitral. Theobromin-natriocitrat. Vízben jól oldható, sós-keserű
por. Diureticum, mint a diuretin. Adag 0,5—1,0 többször napj.
vízben v. aqua cinnamoniban oldva. Syrupok, különösen gyü-
mölesből készült savanyú syrupok kerültessenek rendelésénél.

Urol. (Chinasavas hugyany.) Színtelen, savanyú, vízben jól old-
ható kristályos anyag. Uratoldó. Köszvény, húgyfőveny esetén
reggel és este 1,0—2,5 meleg vízben oldva.

Uropherinum s. Uropher. salicyl. (Lithium-diuretin.)
 $LiC_7H_7N_4O_2 + LiC_7H_5O_3$. Fehér, langyos vízben old. por. Diu-
reticum. Adag. 1,0 pro dos.; 3,0—4,0 pro die.

1025 *Rp.* Uropherini 6,0.

Aquae dest. 120,0.

Aquae Menthae pip. 30,0.

MDS. 2 ór. 1 evők.

Piperazin Midy a húgysav legjobb oldószere, kit. köszvény,
csúz, vesekólika, húgyhomok, húgys. diath. eseteiben (L. hird.)

Urol (chinas, húgyany), **Urocol** (Urol + colchiceni) Noorden
tanár által bevezetett, kit. bevált, gyorsan ható szerek kösz-
vény és húgys. diath. ellen. (L. hird.)

Lactobacilline erjesztő anyag kit. hat. cirrhosis hepatis,
nephritis, arteriosclerosis, köszvény, vesehomok stb. eseteiben.
(L. hird.)

Cirrhosis hepatis: *Rp.* Gelodurat „Pohl“

scat. orig. e. Theobr. natr. salic. 0,25.

S. 4-szer naponta 2 dbot.

Uropherinum benzoicum. Benzoesavas parallel vegyülete az előbbinek. Haszn., adag, mint az előbbinél.

Uropural. Nem más, mint extr. folior. uvae ursi siccum. (L. Uvae ursi fol.) Tabletták, melyek 0,25 gmot tartalmaznak, készen kaphatók, esetleg salollal, aspirinnel, hexamethylentetraminnal is keverve.

Uropurin l. **Uropural.**

Urosin (Chinasavas lithium). Jó húgysavoldó. Készen kapható 0,5-os tablettákban. Adagja naponta 4–10 tablettá (2–5,0.), szénsavas vízben oldva.

Urotropin s. **Formin** s. **Hexamethylentetramin.** (C12H12N4) Színtelen, vízben jól old. lúgos kémhat. kristályok. Húgysavoldó és diureticum. Húgyhomok, köszvény eseteiben adag. 1,0–1,5 pro dos. reggel.

Urotropinum chinicum. l. **Chinotropin.**

Ursal. (Hungyansalicylat). Fehér, alkoholban oldható kristályos anyag. Hatása, adagolása, mint a Na. salicylic.-é.

Ustilago Maydis. A zea mays magvának helyén fejlődő s néha nagy tömeggé növő gomba. Alkotórészei egy alkaloid (ustilagin), sclerotinsav, trimethylamin. Amerikában a secale cornutum helyett használják szülészetben, nőgyógyászatban. Készítménye az

Extractum fluidum Ustilaginis Maydis. Adag. bels. méh-
vérzések, amenorrhoea, dysmenorrhoea eseteiben $\frac{1}{2}$ –1 kk.
pro dos. napj. többször, szükség szerint.

H. Uvae Ursi folia. (Arctostaphylos Uva Ursi. Ericaceae). Hatóanyagai arbutin és csersav. Adstringens. Miután az arbutin a szervezetben hydrochinonra és cukorra hasad s a hydrochinon részint tisztán, részint kénsavval párosulva ürül ki a vizelettel, *pyelitis*, *cystitis* bizonyos eseteiben a medveszőlő-leveél mint antibactericum ajánlatik; ehhez járul még a csersav jelenlétéhez kötött adstringens hatás is. Adag. bels. decoct. 10,0–15,0 : 150,0 ór. 1 evők. Az extr. uvae ursiből egy adagra 0,2–0,3 gm. rendelkezhető. Ily kivonatnak az *uropural* v. *uropurin* nevet is adták (l. e. cz. a.). A fol-uvae ursiből állítatik elő a következő glycosida is:

Urocol sec. dr. Schütz, tabletták. à 0,5 Urol és 1 milligr. Colchicin, bevált specific. köszvény ellen. (L. hird.)

Vesicaesan-labdacsok tart. a fol. uvae ursi összes hatóanyagait, kit. hólyagfertőt. szer. acut és chr. gonorrhoeánál, káros hatás nélkül gyomorra és vesékre. (L. hird.)

Piperazin Midy a húgysav legjobb oldószere köszvény, csúz, vesekólika, húgyhomok, húgys. diath. eseteiben. (L. hird.)

Lactobacilline erjesztőanyag, kit. hat. köszvény, húgyfővény, vesehomok, veselob stb. eseteiben. (L. hird.)

Vesicaesan-labdacsok.

VESICAESAN-LABDACSOK tartalmazzák a Folia Uvae Ursi összes alkatrészeinek ható anyagait.

VESICAESAN-LABDACSOK bevált hólyagfertőtlenítők heveny gonorrhoeánál a hólyag hurutos megbetegedésének és a húgycső hátulsó részei meglobosodásának megakadályozására, ugyszintén idült állapotoknál és a vesék keresztülöblítésére.

VESICAESAN-LABDACSOK az étvágyra, a gyomorra és emésztésre, a vesékre káros hatással nincsenek.

VESICAESAN-LABDACSOK eredeti üvegekben 100 darabonkint (2 kor. 50 fill.) és 250 darabonkint (4 kor. 50 fill.) kerülnek forgalomba.

Mintát és irodalmat az orvos uraknak szívesen küld:

Chemische Fabrik Reisholz

G. m. b. H.

**Reisholz 19. Düsseldorf
mellett.**

Ascher-féle javított mesterséges fogzománcz

(Improved Arteficial Enamel) D. R. P. szabadalmazva a legtöbb kulturállamban. Első synthetikus transparenz cément.



Ascher mesterséges fogzománcza megjavított alakjában az összes plasztikus tömőanyagok között a legtökéletesebb, elérhetetlen átetszőségű és az összes tömőanyagok között a legnagyobb foghasonlatossága.

A. K. Z. tökéletesen mentes arzéntől és más ártalmas tisztátalanságoktól.

A. K. Z. esztetikus szempontból és összetulajdonságai révén az összes tömőanyagok fölött áll; minden esetben tehát nagy konturoknál és rágófelületeknél is biztos sikerrel alkalmazható. „A. K. Z.” 12-féle színben állittatik elő, köztük RÓZSA-színben (foghus-színben) is.

Szavatolunk érte, hogy A. K. Z. minden ártalmas anyagtól mentes. Megrendelhető a legtöbb nagy Dental-Depot-tól, ahol nem kapható, közvetlenül is utánvétellel alulirott cégétől:

General Dental Manufacturing Co. m. b. H.

Berlin W. 8, Jägerstrasse 61.

Arbutinum ($C_{12}H_{16}O_7 + H_2O$). Selyemfényű, tűalakú jegeczek. hideg vízben nehezen, forróban könnyebben oldhatók. Haszn. mint a fol. uvae ursi. Adag bels. porban, pillulában 0,5–1,0, pro dos. 3–5× napj.

979 Rp. Decoct. folior. Uvae
Ursi e 15,0.
l. a p. ad colat. 150,0.
Tinct. Opii simpl. gtt.
10.
Syrup. capill. Veneris
10,0.

MDS. 2 ór. 1 evők.

980 Rp. Arbutini 5,0.
Div. in dos. aequ. No. 10.
DS. 3 ór. 1 port.

H. Valerianae radix. (Valeriana officin. Valerianeae.) Hatóanyaga illó olaj, mely borneolt tart. és valerianasav. Excitans, antispasmodicum (hysteria, epilepsia stb.). Adag: klysmának infus. 8,0–10,0:100,0. Bels. infus. 10,0–15,0:150,0 2 ór. 1 evők. más excitans vagy antispasmodicus szerekekkel összekötve.

H. Tinctura Valerianae aetherea. (Rad. valer. 10: spir. aether. 50 r.) Adag bels. 15–30 csepp pro dos. 3–5× napj.

1028 Rp. Infus. rad. Valerianae
e 10,0.
l. a p. ad colat. 100,0.
Tinct. Opii simpl. gtt. 5.
MDS. Csőrének.
Antispasmodicum.

1029 Rp. Tinct. Valerian. aeth.
Tinct. Castorei aa 15,0.
MDS. Ór. v. 2 ór. 20–30.
cseppet.
Excitans.

1030 Rp. Infus. rad. Valerianae
e 15,0.
l. a p. ad colat. 150,0.
Tinct. Castorei 5,0.
Syrup. cort. Aurant.
10,0.
MDS. 2 ór. 1 evők.
Antispasmodicum (hysteria).

1031 Rp. Rad. Valerianae
Fol. Aurantior.
Fol. Menthae pip.
Fol. Trifolii fibr.
aa 20,0.
Conc. cont. m. f. species.
DS. 1 evők. 3 csésze
vízre, Heim-féle thea
hysteriásoknak.

Radeini gyógyforrás, legdúsabb natrium-lithium-savanyúvíz, kit. hat. hólyag- és vesebajoknál, köszvény, húgyhomok, hurutos betegségek ellen. (L. hird.)

Urol (chinas. lugyany), **Urocol** (Urol + Colchicin) Noorden tanár által bevez. kit. bevált, gyorsan ható szerek köszvény és húgys. diath. ellen. (L. hird.)

Sedativum: *Rp.* Gelodurat „Pohl”

scat. orig. c. Tinct. Valer. tripl. 0,25.
S. 3-szor naponta 2 dbot.

Valerydin. (Isovaleryl-paraphenetidin.) Fehér, íztelen, vízben nem, alkoholban jól oldható por. Hatása és használata, mint a valeriana-gyökér készítményeié. Adag 0,5—1 többször napjában.

Validol. (Valeriansavas menthol). Színtelen, sűrű, erősen menthaszagú, csípős ízű folyadék. Ideges gyomorzavarokban, hyperemesis gravidarumban. Belsőleg 5—15 csepp czukorral 2—3× napj. Használhatni a Zimmer-féle Validol-pralinét is, a melyben csokoládéburokban van 5 csepp validol

Validolum camphoratum. (1 r. Camphor + 10 r. validol.) Színtelen, sűrű folyadék. Fogfájás csillapítására az odvas fogba teendő. Belső, mint analepticum 10 csepp czukorral.

Valisan. A borneol (valeriana egyik hatóanyaga) bromisovalerianasavestere. Olajos, szagos folyadék. Sedativum, mint a bornyval, melynek concurrens készítménye. Adag: 0,25 gm. pro dos. (kész kapsulákban) v. 2—5 csepp. napj. 2—3-szor.

Valyl. Valeriansavas diaethamid. Csípős; szagú folyadék, mely alkohol és aetherben oldható. Csak gelatintokokban jó forgalomba. 1 db tokban 0,125 valyl és u. a. cetaceum van Anodylum neurastheina, neuralgiák, hysteria, fájdalmas hószám eseteiben. Adag: 3-szor naponta 1—2 capsula.

H. Vaselineum flavum. Sárgás, áttetsző, kissé fluoreskáló, lágy, szagtalan, közömbös kémhatású, kenőcsösszeállású anyag. Vízben, glicerinben nem oldódik, borszeszben kevésbé, aetherben, chloroformban könnyen; zsíros és illó olajokkal összeolvasztva, azokkal minden arányban elegyíthető. Közömbös kenőcsalapanyag.

H. Vaselineum cum acido borico. L. Acid. boricum.

Vasenol. 25% vizet tartalmazó vaselin emulsió. Sárgás fehér, kenőcszerű, síkamlós anyag mely még több vizet és vízben oldott anyagokat is tud felvenni. Jó kenőcsanyag. Vannak készítményei is; ezek a következők: *Vasenolum liquidum.* Linimentumszerű. 35% vizet tart. *Vasenol formalin.* 5—10% formalint és 1% salicylsavat tartalmaz. Por, melyet lábizzadás esetén nem hinteni, hanem kézzel szétdörzsölni célszerű. *Vasenolum mercuriale* 33 1/3% higanyt tartalmaz. Az ungu. hydrargyri helyett használható.

Valerianate de Pierlot görcs-csillapító és idegmegnyugtató-szer neurosisok, neuralg., neurasth., ideges rángások, szívgyörcsök, epileps. és hyst. rohamok ellen. (L. hird.)

Brom-Fersan-Pastillák, vasat, foszfort tart. acidalbumin brómmal, jav. neurasth., hyster. anémiás alapon. (L. hird. II.)

Neurasthenia: Rp. Gelodurat „Pohl“

scat. orig. c. ac. arsen. 0,001.

Ferr. corb. Bland. 0,2.

S. 3-szor naponta 2 dböt.

Vasogenum. (Oxydált vaselin). Barna, sűrű, gyengén lúgos folyadék; vízzel könnyen emulgeálható, a bőrbe jól behatoló kenőcs. Magában mint bevonó szer, főleg azonban mint kenőcs-alapanyag használatos. Készítményei: jodvasogen (6%), jodoform-v. (1.5 és 3%) higany-v. ($33\frac{1}{3}$ és 50%), ichthyol-v. (10%), salicyl-v. (10%) stb. indicatiojukat a hatóanyag szabja meg. Haszn. rendszerint külsőleg bedörzsölés, borogatás alakjában; egyes készítményeit belsőleg is ajánlják.

†H. **Veratri rhizoma.** (*Veratrum album*. Liliaceae). Embergyógyászatban obsolet.

†H. **Tinctura Veratri.** Helybeli erős izgató. Állatgyógyászatban haszn.

††H. **Veratrinum.** A tiszta veratrinnek vegyképlete: $C_{37}H_{75}NO_{11}$, azonban forgalomban csak tisztátlan készítmények vannak, ilyen az is, melyet a M. Gyk. II. kiad. megjelöl. Fehér, laza, igen csipős ízű por, szaga nincs, de erősen tüszögtető. Vízen alig oldható, 3 sr. borszeszben, 2 sr. chloroformban lúgos kémhatású folyadékká oldódik. Küls. kenőcsök (0,1—0,3:10,0) alakjában mint erős izgató, derivans haszn. Bels. ma már ritkán, ezelőtt mint antipyreticum, cardiacum volt divatban. Adag bels. 0,001—0,005! pro dos pillulában, porban 2—3-szor napj. Dos. maxim. pro die 0,02! Nagy vigyázat! Szívméreg!

1032 <i>Rp.</i> Veratrinii	0,2.	1033 <i>Rp.</i> Veratrinii	0,1.
Chloroformii	1,0.	Chloroformii	10,0.
f. solut. adde		M. D. ad vitr. nigr.	
Ungn. simpl.	20,0.	S. Külsől. bedörzsölésre.	
M. f. ungu.			
<i>DS.</i> Kenőcs.			

1034 <i>Rp.</i> Veratrinii	0,10.
Lanolini	
Vaselinæ	\overline{aa} 5,0.
<i>MDS.</i> Homlokkenőcs. Szem- izmok bénulása ese- tében.	

Hygiama prae caeteris alimentum est excellens infirmorum et invalidorum.

Chiemsee-Szanatorium és gyógyintézet parti szálloda Prienben (Felső-Bajorország) különös súlyt helyez a szív-, idegemésztési, anyagcsere- és női betegségek kezelésére, orvosoknak és hozzáfartozóiknak 25—40% engedmény, egész éven át nyitva, magyar előkelő orvosok ajánlják. (L. hird. a hátsó belső borítékold. szívében.)

Veratrolum syntheticum. (Pyrocatechin-dimethylaether.) A guajacol pótszere; erősen maró (!) Belégzésre 1—2 csepp. Kenőcsben, mint bőrizgató 1:10. Bels. 2 csepp caps. gelatinában 3-szor napjában. (Nem ajánlható haszn.)

Veronal. Diaethylmalonylhugyany Fehér, kissé keserű, vízben rosszul oldódó por. Hypnoticum. Adag 0,5—0,75 pro dosi porban caps. amyl.-ban lefekvés előtt egyszerre chloralhydrat v. más altató helyett. Gyengébb egyéneknél 0,3 is elegendő.

Veronal-natrium. (A diaethylbarbitursav=veronal mononatrium-sója). Fehér kristályos, hideg vízben 1:5 old. por. Meleg vízben 30% is oldódik. Oldatok lúgosak és nem kellemes ízűek. Jobb oldhatósága miatt gyorsabb hatásúnak mondják a veronalnál. Per rectum klysmában 0,3—0,5 5 grm. vízben oldva. Subcutan 10%-os oldatból 5 köbcent. (Fájdalmas.) Per os mint a veronal.

Vesipyrin. 1. Acetylsalol (Phenylum acetylosalicylicum) A salol helyett haszn. Adag n. az. A bélben hasad, mint a salol.

Vinopyrin. (A paraphenetidin tartaratja). Jegeczlapocskák, vízben jól oldh. Haszn. adagolása mint a phenacetiné.

H. Vinum Chinae l. Chinae succirubr. cort.

Vinum Condurango l. Condurango cortex.

H. Vinum Pepsini l. Pepsinum german.

†**H. Vinum stibiato-tartaricum** l. Kaliumstibiato-tartaricum.

H. Vinum Tokajense. 2 puttonyos aszú legyen, 100 köbctmben legyen 10 gm. alkohol és 8 gm. extractivanyag. Gyógyborok előállítására kizárólag ez használtatik.

Xaxaquin. Az acetylsalicylsav chininsója. Színtelen jegeczpor. Antipyreticum, anodynum. Kész tabletták forgalomban 0,194 tartalommal. Adag: 1—3 db napj. többször.

Vioform. (Jód-chlor-oxychinolin) A jodoformnak szagtalan pótszere. Erős antisepticum, helybelileg nem izgat. Haszn. hintőpor és impraegn. kötőszerek alakjában.

Xeroform (Bismuthum tribromphenylicum.) Csaknem szagtalan, íztelen, sárgás-barna, oldhatlan por. 50% tribromphenolt és 49,5% bismuthoxydot tart. Küls. desinficiáló hintőpor sebekre, mint a jodoform. Sebeket nem izgatja. Bels. bélantisepticum 0,5—1,0 pro dos. 3—5-ször napj.

Elixir Condurango pept. „Immermann“ kitűnő stomachicum, gyomorbajoknál, emésztési zavaroknál. (L. hird.)

Liebe-féle gyógyborok (China-, Condurango-, Pepsin-, Kola-, Chinavasbor) kit. ízű, mindig egyenl. hatóerejű, e téren elismerten legmegbízhatóbb készítmények. (L. hird.)

1035 *Rp. Xeroformii* 2,0.
 Zinci oxyd.
 Amyli trit. \overline{aa} 10,0.
 Vaselini 20,0.
 M. f. pasta.
D.S. Kenőcs Napj. kétszer
 haszn.
 Nedvező eczema.

1036 *Rp. Xeroformii* 10,0.
 Amyli trit. 40,0.
 M. f. pulv. det in scat.
S. Hintőpor.
 Eczema, intertrigo.

Xylolum (C_8H_{10}). Színtelen, tiszta, erősen fénytörő, kátrányszagú és ízű folyadék, mely kőszénkátrányból állítatik elő fractionált lepárlás útján. ZÜLZER ajánlotta variolánál 10—20 cseppnyi adagban (nyákos vagy illatos mixturában vagy capsulában); a himlőhólyagok tartalmát közlések szerint gyorsan meg-alvasztja, a hegképződés ritka, a leszáradás szövődmények nélkül történik

1037 *Rp. Xyloli puri* 3,0.
 Aquae Menthae pip.
 Aquae dest. \overline{aa} 50,0.
 Syrup. Cinnamomi
 Mucil. Gummi arab.
 \overline{aa} 10,0.

MDS. 2 ór. 1 evők.
 Gyermekeknek.

1038 *Rp. Xyloli pur.* gtt. 10.
 Det. in caps. gelat.
 opercul.
 Dent. tales dos. No. 10.
S. Napj 3-szor 1 capsulát.

Yerba santa. Az eriodictyon glutinosum nevű amerikai növény leveleiből készül egy fluid. extractum, mely 1,0—4,0 pro dos. haszn. göresős köhögés, asthma nerv., továbbá hólyaghurut ellen. Úgy látszik az ingerlékenységet csillapítani tudja. Helybelileg a szájban az ízérzést letompítja, azért keserű, csípős szerekhez is tétetik.

Extractum fluidum Yerbae sanctae l. Yerba santa.

Yoghurt. Egy fajta aludt-tej, mely úgy készül, hogy a tej $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ részre befőzetik s ha 50° C-ra lehült, Maya-fermentummal megalvasztatik. A fermentumból vegyünk 2 kctmt 1 liter tejre. Langyos helyen 8—12 óráig állani hagyjuk. A pudding-szerűen összálló tej enyhén savanykás ízű.

Yohimbium hydrochloricum. (Spiegel). A Yohimbene fa kérgéből előállított hatóanyag. Fehér por. Állítólag aphrodisiacum. Erős méreg. Vigyázat! Adagja 0.005 gm. 3-szor napj. 1—2 hétig. Tablettákat is készítenek (Tablettae Yohimbini Spiegel), melynek 0,005 hatóanyagot tartalmaznak; ezekből napj. 3—4-szer 1 szemet.

Szlatvini Anna-gyógyforrás lithiumban legdúsabb ásvány-víz, legkell. üdítő, leghat. húgyhajtó és húgysavoldó gyógyvíz, nyálkahártya-, hólyag- és tüdőhurutnál kit. bevált. (L. hird.)

1039 *Rp.* Yohimbini hydrochl.
0,30.
Aquae destill. 30,0.
Chloroformii gtt. 1.
D. ad vitr. coerulenum
S. 3-szor napj. 10 cseppet.

1040 *Rp.* Tablettae Yohimbini
hydrochl.
0,005 pro dosi
lag. origin.
D.S. Naponta 3—4 szemet

H. Zedoariae rhizoma. (Curcuma Zedoaria, Scitamineae.)
Hatóanyagai illatos olaj, gyanta, keményítő. Stomachicum,
carminativum. Adag bels. porban, pillulában 0,5—1,0 pro dos.
2—3-szor napj.

Zincum aceticum [$Zn(C_2H_3O_2)_2, 3H_2O$]. Finom, színtelen,
lemezalakú jegeczekből áll; 3 sr. hideg $\frac{1}{2}$ sr. forró vízben
és 30 sr. borszeszben oldható. Küls. substantiában lámfosz-
tott helyeket, nyákhártyákat edző, higabb oldatokban adstrin-
gens. Bels. nervinum, mint a zinkkészítmények általában
Szemvíznek, húgycsőbe fecskendésre 0,1—0,2 : 100,0. Bels.
0,05—0,1! pro dos. 2—5-ször napj. Dos. maxim. pro die 0,5.
Mint emeticum ne rendeltessék.

1041 *Rp.* Zinci acet.
Extr. Belladonnae
aa 1,0.
Pulv. rad. Valerianae
qu. s.
ut. f. l. a. pillul. No. 50.
Consp. pulv. Liquir.
D.S. 2—3-szor napj. 2 sze-
met. Lehet emel-
kedni is az adaggal
Epilepsia.

1042 *Rp.* Zinciacet. 0,4.
Aquae dest. 200,0.
Cocaini hydrochlor. 2,0.
M.D.S. Húgycsőbe fecsken-
désre. Gonorrhoea
esetén.

Zink-alumnol l. Zinol.

†H. Zincum chloratum ($ZnCl_2$). Fehér, v. kissé szürkés-fehér
por; vízben és borszeszben igen könnyen oldódik. Légen
megnedvesedik és szétfolyik. Substantiában causticum. Olda-
tokban desinficiens, antisepticum. Bels. nem haszn. Causticus
céllokra szolgálnak a bacillusok (kali nitr.-al összeolvasztva
és formába öntve), azután a pasta Canquoini és a pasta Lan-
dolfi. Sebkezelésben mint desinficiens 1,0 : 100,0—500,0, szem-
víznek 0,02 : 100,0, húgycsőbe fecskendésre 0,05 : 100,0.

1043 *Rp.* Zinci chlorati 5,0.
Farinae Secalis 10,0.
Glycerini 1,0.
M. f. pasta.
D.S. Késhátvastagon tel-
kenni. Külsőleg.
Pasta Canquoini
II. sz.
MENIÉRE módosítása
szerint.

1044 *Rp.* Zinci chlorati
Farinae Secalis
aa 10,0.
M. f. c. aqua dest
qu. s. pasta.
D.S. Késhátvastagon fel-
kenni. Külsőleg.
Pasta Canquoini I. sz.

1045 *Rp.* Zinci chlorati 1,0.
Aquae dest. 1000,0.
MDS. Külsőleg.
Sebmosó folyadék.

1047 *Rp.* Zinci chlorati 10,0.
Aquae dest. 100,0.
MDS. 10%-os chlorzink-
oldat.
Az orvos kezéhez.
Méhnyak edzésére.

1046 *Rp.* Zinci chlorati
Stibii chlorati
Acid. hydrochlor.
conc. \overline{aa} 10,0.
Lycopodii qu. s.
nt. f. pasta.
DS. Küls. Pasta canstica
Landolti HEBRA
módosítása sze-
rint.

Zincum hypermanganicum. [$ZnMnO_{4,2}$]. Ibolyaszínű, vízben jól oldható jegeczek. Antisepticum és adstringens. Főleg húgycső- és hólyag blennorrhoea esetén 0,025 : 100, befecskendezésre.

II. Zincum oxydatum s. Flores Zinci (ZnO). Finom, fehér, alakatlan por; vízben nem oldható. Küls. mint hintőpor a bőrön szárító, izgalmat csökkentő, a nyákhártyákon enyhén edző, izgató. Kenőcsben szárító. Bels. nervinum, antispasmodicum, főleg epilepsia, chorea, hysteria, eclampsia eseteiben. Adag bels. porban, pillulában 0,05–0,1–0,3 pro dos. napjában. 3–5-ször.

H. Unguentum Zinci oxydati (1:9). Szárító, fedő kenőcs.

1048 *Rp.* Zinci oxydati 2,0.
Lycopodii 30,0.
M. exact. f. pulv.
det. in scat.
S. Hintőpor.
Intertrigo, pruritus
puerendi.

1049 *Rp.* Zinci oxyd. 1,0.
Magnes. carb. \overline{aa} 5,0.
Talei \overline{aa} 5,0.
M. f. ungu.
DS. Hintőpor.
Intertrigo gyermek.

1050 *Rp.* Zinci oxyd. 2,5.
Extr. Gentianae qu. s.
nt. fiant pillul. No. 25.
DS. Naponta 3–6 szemet.
Tüdővészések izza-
dása ellen.

1051 *Rp.* Zinci oxyd.
Moschi \overline{aa} 0,3.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in
dos. aequ. No. 10.
DS. Napj. 3–4 port
Gyermeknek anti-
spasmodicum.

1052 *Rp.* Zinci oxyd.
Asae foetid.
Pulv. Valerianae.
 \overline{aa} 2,5.
Mucil. Gummi arab.
qu. s.
nt. f. l. a. pillulae
No. 50.
Obduc. foliis Argenti.
DS. 2–3-szor napj. 2–5
szemet. Hysteria.

1053 *Rp.* Zinci oxyd. 0,3.
Calomelanos 0,1.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in
dos. aequ. No. 10.
DS. 2 ór. 1 port.
6–8 hónapos csecse-
mőnek eclampsia,
laryngospasmus
ellen.

1054 *Rp.* Zinci oxyd.
 Acid. borici \overline{aa} 1,0.
 Lanolini
 Vaselini \overline{aa} 10,0.
MDS. Szemhéjkenőcs.
 Eczema.

1055 *Rp.* Zinci oxydat. 1,0.
 Sacchar. alb. 4,0.
 M. f. pulv. div. in
 dos. aequ. No. 10.
DS. 3—4-szer napj. 1 port.
 Epilepsia, chorea.

1056 *Rp.* Zinci oxyd. 0,2.
 Sacchar. alb. 3,0.
 M. f. pulv. div. in
 dos. aequ. No. 10.
DS. 4-szer napj. 1 port.
 Csecsemőknek ec-
 lampsia ellen.

Zinkperhydrol l. **Zincum superoxydatum.**

Zincum phosphoratum (Zn_3P_2). Phosphor-szagú, vízben és alkoholban oldhatatlan. A sárga phosphor hatásait fejti ki, s annak indicatiói alapján használtatik. Adag 0,001—0,005 gr. pro dosi pillulában többször napjában. Vigyázat!

Zincum stearanicum. [$Zn(C_{18}H_{35}O_2)_2$]. Fehér, oldhatlan por. Antisepticum és adstringens. Égési sebekre mint hintőpor, orr- és gégebajoknál befúvásra, substantiában.

Zincum sozodolicum. Szagtalan, vízben jól oldható por. Töményen causticum, higan antisepticum és adstringens. Haszn. húgycső és hólyagmosásra 1—2 : 100. Orrba-gégébe fúvásra 1 : 20-ra.

Zincum sulfo-carbolicum. $Zn.(C_6H_5SO_4)_2.8H_2O$. Színtelen, áttetsző, légen elmálló, oszlopos v. lemezes jegeczek. 2 r. vízben oldh. Egyesíti a desinficiens és összehúzó hatást. Haszn. a sebkezelésben és a húgycsőgonorrh. gyógykezelésénél. Befecskendésekre $1/2—1\%$ -os oldatok.

Zincum sulfoichthyolicum. Barna, kátrányszerű anyag. Vízben, alkoholban és zsírokban oldható. Hatás, haszn. l. Ichthyol.

† **H. Zincum sulfuricum** ($ZnSO_4.7H_2O$). Színtelen, hasábos, v. tűalakú jegeczekből áll. Hideg és meleg vízben egyaránt könnyen oldódik. Vizes oldata csípős, undorító fémízű és savanyú kémhatású. Substantiában edző, de ezen hatását fel

Bardella, Bardeleben dr. bismutos égési pólyája, mindenfokú égéseknél és leforrázásoknál rögtön csillapítja a fájdalmat. (L. hird.).

Tüdővészések éjjeli izzadása ellen igen hatásos a Lysoform 1—2% os oldata.

Alimento Theinhardt dentitio optime iuvatur.

A hüvely mosására kolpitis, fluor albus eseteiben a legalkalm. szer a $1/2—1\%$ -os Lysoform-oldat.

nem használjuk. Híg oldatokban desinficiens, de gyengébben, mint a chlórziuk; jó adstringens és mint ilyen haszn. szem-víznek 0,03—0,1:10,0, húgycsőbe fecskendésre 0,3—0,5—1,0:100,0, száj-, torokvíznek, sebek, hüvely mosására 0,5—1,0:100,0. Bels. emeticum adag 0,3—1,0!

1057 *Rp.* Zinci sulf. 0,3.
Aqua dest. 10,0.
MDS. Szemcseppek.
Conjunct. catarrh.
chron.

1059 *Rp.* Zinci sulf. 0,2.
Tinct. Opii croc. gtt. 10.
Aqua dest. 100,0.
MDS. Szemvíz.

1061 *Rp.* Zinci sulf. 0,5—1,0.
Aqua dest. 100,0.
Syrup. cort. Aurant. 25,0.
MDS. 10—15 perczenként
1 evők. míg hányás
nem jelentkezik.
Emeticum.

1058 *Rp.* Zinci sulf. —
Aluminis aa 10,3.
Aqua dest. 200,0.
Tinct. Opii croc. 1,0.
Húgycsőbe fecskendésre. Gonorrhoea.

1060 *Rp.* Zinci sulf. 0,5.
Aqua dest. 200,0.
Acid. carbol. liquid. 1,0.
MDS. Húgycsőbe fecskendésre. Gonorrhoea.

1062 *Rp.* Zinci sulf. 0,5.
Aqua dest. 100,0.
Tinct. Opii simpl. 1,0.
MDS. Belégzésre.
Laryngitis catarrhalis.

Zincum superoxydatum. Zinkperhydrol. Fehér, vízben nem oldh. por, mely 50% ZnO_2 -ot és 50% ZO -ot tart. Savakkal, pl. borkősavval keverve H_2O_2 fejlődik, mely azután activ oxygent ad le. Tehát úgy hat, mint a hydrogenperoxyd, csakhogy lassabban fejlődik az activ oxygen. Hintőpornak acid. tartar.-al v. citricummal. Kenőcsnek (1:10) csak vaselinnel v. ungu. paraffinivel (zsir nem jó).

H. Zincum valerianicum [$Zn(C_5H_9O_2)_2 \cdot 2H_2O$]. Zsírfényű, lemezes kristályokból áll, valeriansav-szagú. 90 sr. vízben, 40 sr. borszeszben oldható. Nervinum, antispasmodicum, mint a zinc. oxyd. Adag bels. 0,05—0,1 pro dos. porban, pillulában. Dos. maxim. pro die 0,5!

Zink-Mattan cuticular, a bőrön nem látszó Pasta Zinci. — **Zink-Sulfur-Mattan cutic.** (Mattan + 10% ZnO + 5% S.) (L. hird.)

Ester-Dermasan-hüvely-tokocskák igen jók para- és perimetritis, oophoritis, gonorrhoea ellen. (L. hird.)

Valerianate de Pierlot görcs-esillapító- és idegmegnyugtató-szer neurosisok, neuralg., neurasth., ideg. ráng., szívgyöres, epileps. és hyst. rohamok ellen. (L. hird.)

1063 *Rp.* Zinci valerian. 0,2.
 Sacchar. alb. 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.
DS. 4 × napj. 1 port.
 5 éven túli gyermek-
 nek chorea minor
 esetén.

1064 *Rp.* Zinci valerian. 0,5.
 Sacchar. alb. 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.
DS. 3—4 × napj. 1 port.
 Epilepsia, hysteria.

H. Zingiberis rhizoma. (Zingib. offic. Scitamineae.) Ható-
 anyagai illó olaj, gyanta. Stomachicum, carminativum. Keserű
 és illatos theák alkatrésze.

H. Tinctura Zingiberis. Adag bels. 10—30 csepp. Keserű
 v. illatos tincturák alkatrésze.

**Zinol. seu. Alum. β naphtalo-disulfonicum — zink-
 acetat** $[C_{10}H_7OH(SO_3)_2]_3 A^{1/2} Zn(CH_3O_2)_2$ Fehér szagtalan por,
 vízben jól old. Adstringens, antisepticum.

1065 *Rp.* Zinoli 3,0
 Aqu. dest. 1000,0
MDS Külsőleg hüvely-
 mosásra.

Zuckerin. A saccharinnal rokon anyag. 550-szer édesebb a
 czukornál. Haszn. l. Saccharin. Na sója *Crystallöse* név alatt
 jön forgalomba.

Zymphen. (Metaoscycyan fahéjsavas natrium.) Sárgás, táblás, víz-
 ben jól oldh. Kristályok. Kesernyész aromás ízű. Napj. 3—4 ×
 0.1 gm. porban, oldatban, stomachicum, chilogogum(?), diure-
 ticum.

XV. Betegek asztala.*)

1. Üdülők étrendje.

Lázas betegségek után a láz múltával az emésztőszervek műkö-
 dése még korántsem tökéletes és az emésztőcső nyálkahártyája még
 erősen sérülékeny; ezért nagy vigyázat, különösen typhus abdom.

*) Ezen fejezetet dr. Elischer Gyula úr volt szíves átnézni s
 kiegészíteni.

Ízletes táplálék betegek részére: Maggi-féle ízesítő
 a keresztesillaggal. Az étvágyat és emésztést növelő, különben
 minden ingerítő mentes ízjavító szer levesek és ételek részére,
 sea mi ártalommal; ered. üvegcs. 12 fillértől kezdve. (L. hird.)
Karlsbadi víz-kétszersült (Sprudel) a legjobb üdülők részére.

Készíti Karl Bayer udv. szállító Karlsbad. (L. hird.)

Lábadozó betegek részére a legjobb erősítő ital a Szent
 István védj. dupla malátásör a kőbányai Polgári Serfőződéből.
 (L. hird. a 337. old. mellett.)

Izletes táplálék betegek részére.

✦ **MAGGI**-féle ízesítő

a keresztosillaggal.

Az étvágyat és emésztést növelő,
különben minden ingertől mentes, iz-
javító szer levesek és étkek részére,
Semminemű ártalmas hatással. —

Eredeti üvegecskékben 12 fillértől kezdve.



✦ **MAGGI**-féle húsleves-kocka

a keresztosillaggal.

Zamatos húsleves
azonnali előállítására
1 kocka egy tányérra 5 fillér.



✦ **MAGGI**-féle levesek táblákban

a keresztosillaggal

a házilag készített levesek ter-
mészetes alkatrészelt tartalmaz-
zák és osupán vízzel főzve néhány
peró alatt izletes, tápláló, könnyen
emészthető levest adnak.

1 tábla 2 — 3 tányérra 15 fillér.



Több mint 20 fajta!

Tessék Maggi Gyula és társa cégtől, Wien V/2.
mintákat és irodalmat kérni.



BAYER KÁROLY

cs. és kir. udv. szállító

KARLSBAD

el nem ért jó minőségben készíti
világhírű

karlsbadi

ostyáit,

karlsbadi-viz

kétszersültjét



SCHUTZMARKE

Marke „Sprudel“.

valóban és hatósági engedelemmel a »Sprudel«
vizével előállítva. A legegészségesebb sütemény
teához, kávéhoz, tejhez stb. orvosoktól ajánlva.
Mintaküldemény 4 kor. 40 fillértől följebb.

peritonitis, dysenteria után. Az üdülő éhsége, étvágya félre ne vezessen. Ételek kezdetben folyékonyak, később félfolyékonyak, majd laza összeállásúnak legyenek. Szabály: fokozatosan haladni a szokott étrend felé s inkább napjában többször keveset, mint ritkábban, de sokat nyújtani.

Folyékony ételek: erős húsleves, rántott leves, tejleves, becsinált lé (mindez tojássárgával vagy a nélkül), tej (!), gyenge tejes kávé, chocolate, zsírtalanított cacao-forrázat; *félfolyékonyak:* lágytojás, tejes pépek, sűrű becsináltak; *laza összeállásúak:* vagdalt borjúhús (hâché), sodar- vagy nyers vesepecsenye vakarék, csirkesült fehér húsa, gyenge borjúsült, fogoly, fâezán, császármadár, halak közül fogas, kecsge (fűszeres mártások nélkül). Húsételekhez alma, almapuré vagy aszalt szilva compote adható. Tészták helyett tojáshabfelfújt, citrom felfújt, omlette, piskótatészta (rizsliszttel készítve) adandók. Friss gyümölcsök közül csakis a szőlő (magja és héja nélkül) engedhető meg. Kenyér helyett kétszersült, piritott vizes- vagy eszszármaglye.

Italul délelőtt kis pohár tokaji aszú, malagabor, délben kis pohár könnyű veres bor, vagy fehér bor vízzel, vagy kis pohár sör. Az üdülés 3-ik hetében térhetni át a megszokott rendes étrendre, midőn a táplálék fehérjedús legyen, fokozatosan bővítve annak mennyiségét; kevés vaj is meg van engedve.

Nem valók üdülőknél: zsíros hús, erősebb összeállású hús, saláta, gomba, főzelékek, gyúrt- vagy zsírban kisült, vagy élesztős tészták, rétesek, pulha kenyér.

Ugyanezen szabályok állanak a *gyermekágyasokra* nézve is.

2. Heveny-lázás betegek étrendje.

Ezen betegek összes emésztőnedvei esőkent mennyiségben választatnak el, az emésztőcső nyálkahártyája hyperaestheticus, a gyomor-bélizomzat tonusa gyengült; mindezért nagy vigyázat (!). Folyékony vagy félfolyékony, igen könnyen emészthető, hűvös vagy langyos (nem meleg) ételek adassanak. Étrend lehetőleg változatos legyen és fehérjefélékben dús, míg a zsírok és szénhidrátok hátterbe szorítandók. Adjunk napjában 5—7-szer keveset s ne ritkán sokat. A lázas hőmérsék napi remissiójakor (reggel) jobb az étvágy, jobb az emésztés. Étkezés előtt és után a száj vízzel kimosandó.

Célszerű ételek: rántott leves, tejleves, húsleves, enyvtartalmú levesek (borjúlábból), becsinált lé, mindezekbe tojás habarható, v.

Ízletes táplálék betegek részére: Maggi-féle húsleves-koczká a keresztesillaggal, zamatos húsleves azonnali előállítására, 1 koczká 1 tányérra 5 fillér. (L. hird.)

Karlsbadi víz-kétszersült a legjobb sütemény lázas betegek részére, készíti Karl Bayer udv. száll. Karlsbad. (L. hird.)

Szent-Margitszigeti üdítővíz a legkiválóbb szénsavval telített ásványvíz, kitűnő üdítő ital lázas betegek részére. (L. hird.)

Nestlé-liszt, mint könnyen asszim. és telj. resorb. dietét. lábad. bet. r. specifikum.

árpadara, rizs, szagó főzhető; lefőlözött édes tej, tejfel nélküli aludt tej (ha nincs hasmenés), gyenge tejes kávé, succus carnis recenter pressus, beef-tea, húspepton, sanatogen, tojáshabfelfűjt.

Czélyszerű italok: friss víz, jeges víz (szükség szerint), limonade, málnaszörpös víz, fehérjés víz, rizsvíz, cukros víz, szén-savas víz, vizes bor, cognacos víz, gyenge tea tejjel langyosan vagy hidegen.

Öregeknél vagy nagyon elgyengülteknél, ha stimulantiaák szükségesek: borleves, ó-bor, tokaji, pezsgő, cognac adhatók. Iszákosoknak a fenti ételek mellett az általuk megszokott italokat, az általuk megszokott mennyiségben kell adnunk.

Ezen szabályok általánosak s az egyes betegségek, de a beteg egyénisége szerint is módosítandók.

3. Idült lázas betegek, főleg tüdővérszesek étrendje.

A láz következtében támadt napi testsúlyfogyást czélyszerű módon pótolni kell, sőt ha lehet, túlpótolni. Ezen betegek emésztőképessége általában jobb, mint a heveny-lázás betegeké; az emésztőcső nyálkahártyája sem oly sérülékeny, a felszívódás is tökéletesebb; mindez különösen a lázas mozgalmak remissiója s még inkább intermissiója alatt észlelhető. A táplálát javulása, a testsúly növekedése csökkenti a lázat, sőt az a betegségre is kedvező befolyású.

A táplálék főleg zsirokat, szénhydratokat és enyvanyagokat tartalmazzon nagy mennyiségben, míg fehérjéket csak közép mennyiségben; azon élvezeti anyagokra, melyek az étvágyat, emésztőképességet serkentik, nagy gond fordítandó. Változatosság az étrendben elengedhetlen. Testsúlymérések ellenőrizték az étrend czélyszerűségét. Étkezés naponta 5—6-szor.

Czélyszerű ételek és italok: Tej (!), iró, gyenge tejes kávé, tejszínes tea, cacao-forrázat, chocolate, kephir, nem erős sajtok, különösen zsiros sajtok (liptói, szepesi túró), vaj, füstölt és nem paprikázott szalonna, sódar zsirjával, csontvelő, tojás nyersen vagy lágyan, erős és zsiros húslevesek belefőtt tésztákkal, enyvós becsinált levesek, bab-, borsó-, vagy lencseliszttel készült levesek, vagy ily liszttekkel készült pépek, burgonya különböző alakban, LEUBE-

Myrticol „Csatádi“ igen kell. ízű guajacol-áfonyakészítm. tüdőbetegek gyomorzavarai és bélbántalmái ellen specificum. (L. hird.)

Thum-kávé, pörk. előtt megtiszt. kávészemek, telj. aromával és koffein-tart., káros hatása a gyomorra és szívre nincs, ártalmatl. ital betegek részére. (L. hird.)

„**Leurose**“ jav. Leube-Rosenthal husoldat a dr. Mirus (R. Stütz)-féle udy. gyógyszer-tárból Jena, kit. tápszer gyomorbet., typhus, dysent., tuberc. bélbánt., perit., gyomor- és bélvérz. eseteiben. (L. hird.)

Maltolecin sec. Weinreich dr. elősegíti a gyors súlygyarapodást tüdőbajosoknál. (L. hird.)

Egger Emulsio c. 5% Thiocol tüdővérszesek. r. kit. tápszer.

NINCS
„UNICUM”
más, mint ZWACK-féle.



Csakis eredeti
üvegből fogadjunk el.

Hasonló üvegben sokféle utánzat létezik.

Dupla maláta sör

Szt. István védjeggyel

a kőbányai *Polgári Serfőző Részvénytársaság* készítménye, mely rendkívül dús extract-tartalmánál fogva felülmúlja a forgalomban levő összes többi maláta-söröket: Klinikákon kipróbált hatásos

GYÓGYITAL

álmatlanság, idegesség, emésztési zavarok, gyomorbajok, étvágytalanság, gyengeségi állapotok ellen; különösen fontos lábbadozó betegeknek, valamint szoptató nőknek. Kapható eredeti palacktöltésben a nagyobb fűszerkereskedésekben és a városi raktárban

BUDAPESTEN

VIII., Népszínház-u. 22.

□□ TELEFON 56-43. □□

Ajánlják: *dr. Ángyán, dr. Elischer, dr. Herczel, dr. Kétly, dr. Korányi, dr. Laufenauer és dr. Liebermann* egyetemi tanár urak Budapesten. *Dr. Glax* tanár, cs. és kir. kormánytanácsos, fürdőelöljáró, *dr. Ebel, dr. Gorsky, dr. Kostecky, dr. Szemere és dr. Szilgeti* orvos urak Abbáziában. *Dr. Ebers* cs. tanácsos úr, *dr. Colleti úr*. József főherceg ő császári és királyi fensége udvari orvosa Cirkvenicán.

Orvos uraknak szívesen küldünk mintapalaczkot.

féle húsoldat, peptonok, sülték, főleg szárnyas, vad, borjú, bány, puhább marhasülték, soványabb sertéssült, halak közül kecsge, fogas, harsa aspikkal, sardina és tinnhal-conservék, tejbefőtt rizs, darás-metelt, omlette, palacsinta, felújítak, írósvajas könnyű tészták, rizslisztes sütemények (piskóta tészta), fehér búzalisztból készült kávé-sütemények piritva, kétszersült, friss vagy párolt gyümölcs, befőttek; italul maláta-sör,*) veres bor, édes borok, pezsgő, cognac.

Indigestio v. hasmenés felléptével azonnal csak folyékony vagy fél folyékony ételek adassanak s kerültessenek zsíros ételek és édességek. Haemoptoe jelentkezésekor kerültessenek szeszes italok, szénsavas italok, kávé, tea, meleg ételek; jégbe hűtött tej gyakori kis adagokban adandó.

DETTWEILER tr. *fulkensteini* intézetében (tüdővészések sanatoriuma) körülbelül következő a tüdővészések átlagos étrendje: *Reggel* 7—8 ó. Tejes kávé, vagy tejes tea, vagy cacao-forrázat, javalatok szerint; kétszersült vagy zsemlye vajjal s kávé-sütemény a jólakásig, erre egy pohár tej kortyonként. *D. e.* 10 ó. 1—2 pohár tej kortyonként elfogyasztva, vagy 1 üveg kumys (jól helyettesítheti ezt a nálunk kapható kephír), vajas kenyér; külön javalatra bouillon tojással és vajas kenyér, vagy hideg hús és vajas kenyér, 1 pohár borral; ha lehet még ezután 1 pohár tej kortyonként. *Déli* 1 ó. Ebéd, mely áll sültből, főzelékből és csemegéből; italul bor tisztán vagy Seltersi (nálunk szolyvai, bikszádi, bártfai Orvos, v. lúhi Margit források) vízzel. *D. u.* 4 ó. 1 pohár frissen fejt tej vagy kumys (kephír), sonkás-vajas kenyér, 1 pohár borral, vagy 1 pohárka cognac-al. *Este* 7—7½ ó. Meleg húsétel burgonyával, rizzsel, metelttel, vagy hideg hús, vagy szárnyassült saláta és compote-tal. Bor. *Este lefekvés előtt* 1 pohár tej egy kávéskánál cognac-kal.

4. Heveny gyomor- és bélhurutban szenvedők étrendje.

Ha a gyomor nagyon hyperaestheticus (hányás, fájdalom), kopaljjon a beteg 1 napig, legfeljebb jéglabdacok, vagy jeges víz, vagy behűtött szénsavas víz, orosz tea adassék neki evőkanalankint; másnap már nyújtható behűtött tojásfehérjés víz ½ ór. 2—3 evőkanállal. A hányás szüntével megengedhető nagyobb mennyiségű

*) Duola maláta-sör a Kőbányai polgári serfőzdéből. (L. szemben levő oltat.)

Ízletes táplálék betegek részére: Maggi-féle húsleves-koczká a keresztesillaggal, zamatos húsleves azonnali előállítására, 1 koczka 1 tányérra 5 fillér. (L. hird.)

Gyomorbélbajosok részére kitűnő erősítő és étvágygerjesztő ital a gyógynövények kivonataiból készült Unicum. (L. hird.)

Szent-Margitszigeti gyógyvíz gyomor-bélbajosok részére a legjobb asztali ital. (L. hird.)

Karlsbadi víz-kétszersült a legjobb gyomorbajosok részére, készíti K. Bayer udv. száll. Karlsbad, (L. hird.)

tojásfehérjés víz, kevés sovány és tiszta rántott leves (kömény nélkül). További javulás beálltával rántott leves tojással, lágytojás, borjúvelő, főtt galamb, sült csirke fehér húsa rendelendő. Marhahús, tészta nem ílik csak később. Tej tapasztalat szerint nem tesz jót!

5. Idült gyomorbántalmakban szenvedők étrendje.

a) *Idült gyomorkurut, idült dyspepsia.* Étrend a szerint határozandó meg, amint a nyálkahártya vérbő, v. vérszegény, vagy izgalmi tünetek, v. atonia vannak jelen, v. csökkent a gyomorsav elválasztása, v. fokozott az, v. esetleg erjedési folyamatok jelei mutatkoznak.

Általános szabályok: óra szerinti pontos étkezés, lassú evés, az ételek jól megrágandók, hiányos fogazat rendbe hozandó! Kerülni kell a hideg és forró ételeket és italokat; egyszerre keveset szabad csak enni; számítani kell a komplikált ételeket.

Ha *vérszegény a nyálkahártya*, vagy ha *dyspepsia atonica* van jelen, könnyű, de kissé izgató animalis étrend van javalva; erős húslevesek, esetleg LIEBIG-kivonattal, barna leves, sovány sódar, csirkesült, szárnyas vad, borjúsült, tej, tejben rizs, pirított fehér buzakenyér vagy zsemlye, kétszersült, (barna kenyér kerüendő), könnyű piros bor vagy fehér bor vízzel. Izgató hozzátétel az ételekhez lehet konyhasó, szegfűszeg, macisvirág, zimmer, kevés bors, szerecsendió (paprika nem).

Ha a *nyálkahártya vérbő* vagy ha *hyperaestheticus*, szigorúan kerülni kell az izgató anyagokat, mint a fűszereket, szeszeket, erős húslevest, fekete kávé; elvetendő a könnyen erjedő ételek, italok is. *Czélyszerűek:* tej, zsírtalanított cacao forrázata, gyenge tea lefőlőzött tejjel, tejleves, rántott leves (kömény nélkül), babliszt- és borsóliszt-leves, becsináltak (nem savanyúan), hideg csirkesült, hideg borjúsült, tejben rizs és dara, kétszersült, pirított zsemlye. Étkezés ritka legyen, legfeljebb 3-szor napj.

Ha *erjedés* van a gyomorban, az étrend általában olyan legyen, mint azt az imént előadtuk, csak szigorúan kerülni kell a zsirokat, amylaceákat, cellulose tartalmú ételeket, édességeket, édes bort, liqueurt, sört, tejet (!), tejes ételeket; füstölt hússok ajánlatosak.

b) *Hyperchlorhydria* esetén csak meleg vizet és egyéb italokat igyék a beteg. Hideg italok szigorúan tilosak. Ha a gyomor üres

Bu Co, kazein- és zsírszegény, fehérje gazdag, elta th. tejkészítm., kit. tápszer gyomorbélbajos felnőttek és gyermekek részére. (L. hird.)

Bilini savanyúkút, kiv. alk. savanyúvíz, kit. gyomorbélbajok, köszvény, aranyér eseteiben. — Bilini pasztillák gyomorégés ellen. (L. hird.)

Hyperchlorhydria, dysp. nerv., ulc. ventr. eseteiben a legalk. tápszer Kufekelisz. (L. hird.)

Thum-kávé

tiszta bab-kávé
a legnagyobb élvezeti értékkel.

Pörkölés előtt a kávészemek felületéről a természetes szin-, zsír- és savanyagok letisztítatnak.

Tökéletes zamat és teljes koffeintartalom dacára kellemes, enyhe hatás.

Élvezet egészségesek és betegek számára.

(IRODALOM: *Münchner Medizinische Wochenschrift* 1911. évi 35. szám.)

Tudományosan és orvosilag ajánlva.

Irodalmat és mintát küld:

Thum-Maschinengesellschaft
m. b. H.
Dresden, Röcknitzstrasse Nr. 3.

Kitüntetést kapott :

*Bruxelles, Halle, Frankfurt, Wien, Genf,
Páris, Nizza, Berlin városában.*

**Dr. Mirus'sche Hofapotheke
(R. Stütz), Jena készítménye**

LEUROSE

**a javított
Leube-Rosenthal-féle
húsoldat.**

Peptonizált hús, rendkívül könnyen emészthető, a legmagasabb tápláléértékkel, jóízű és határtalan ideig eltartható. Nem csupán a **gyomorbajosoknál** fogjuk nagy hasznát venni e húsoldatnak — mondja Leube, — hanem mindazon esetekben, melyekben az orvos kötelessége, hogy az emésztőszerveknek semmiképen sem izgató táplálékot nyújtson, mint **typhus, dysenteria, tuberkulotikus bélfekélyek, peritonitis, gyomor- és bélvérzések** eseteiben.

Kapható a gyógyszertárakban.

Főraktár :

Török József gyógyszertára

Budapest.

és fájdalmi rohamok jelentkeznek, 3 deczi meleg vizet vagy egy pohár langyos tejet igyék a beteg. Kerülendő: nyers gyümölcs, nagyon sós ételek, bors, paprika, mustár, retek, hagyma, torma, eczet s minden fűszer, épp úgy szeszes italok, kül. erős szeszek. 3 óránként mérsékes étkezés. Korányi Sándor báró klinikáján a köv. étrend szokásos:

Reggeli: Tej, tejes cacao, tejes thea. *Tízórás:* Tojás, nyelv, sonka, pirított kenyér, kétszersült. *Ebéd:* Húsleves, 100—150 gr. sült hús. Borjúmrigy. Borjúvelő. Hal. Burgonyapürée. Rizs. Paraj. Karfiol. Sárgarépa. Kalarábé. *Délután:* Tejes cacao vagy thea kétszersült. *Vacsora:* Hideg hús, nyelv, sonka, vaj, tojásétel. *Italul:* Szolyvai, Luli Margit viz. Közben, valamint éjjel is gyomorégés esetén 1—1 kis pohár tej.

c) *Dyspepsia nervosa.* Fő az általános kezelés. Roborans, könnyű étrend, olyanforma, mint midőn hyperaestheticus a gyomor-nyálkahártya.

d) *Ulcus ventriculi.* Erőművi-, vegyi-, hőingerektől gondosan óvni kell a fekélyt s így persze a gyomrot. Csak folyékony és könnyen emészthető ételek nyújtassanak, főleg tej (!); lehet adni LEUBE-féle húsoldatot, KEMMERICH-féle húspeptont, tojáshabot is. A súlyos tünetek múltával félfolyékony vagy laza összeállású ételeket is meg lehet engedni; ilyenek a csirke- és borjú-becsináltak (de nem savanyúan), főtt galamb, főtt borjúvelő, főtt borjúkedsz (brizli), sódarvakarék, tejben rizs, kétszersült. Vérzés esetén jéglabdacskok, jég-hólyag a gyomorra, koplalás, végbélen át táplálás; vérzés szüntével egyideig csak hideg, esetleg jeges tej. Korányi S. báró klinikáján a köv. étrend szokásos:

Ízletes táplálék betegek részére: Maggi levesei táblákban a keresztesillaggal, a házilag készített levesek természetes alkatrészeit tartalm. és csupán vízzel főzve, pár perc alatt ízletes, tápl. és könnyen emészth. levest adnak; 1 tábla 2—3 tányérra 15 fillér. (L. hird.)

Szent-Margitszigeti gyógyvíz a gyomorbaj minden alakjánál kitűnő hatással van. (L. hird.)

Bu Co, kazein- és zsírszegény, fehérje gazdag, eltarth. tejkészítm., kit. tápszer gyomorbélbajos felnőttek és gyermekek részére. (L. hird.)

Maltolecin sec. Weinreich dr., elégt. táplálk. mellett is fenn tartja a testi erőt, azért igen alk. tápszer gyomor- és anyagcserebetegségeknel. (L. hird.)

Gyomor-bélbajosok részére kitűnő erősítő és étvágygerjesztő ital a gyógynövények kivonatából készült Unicum. (L. hird.)

„**Leurose**“ jav. Leube-Rosenthal húsoldat, kész. dr. Mirus'sche Hofapoth. (R. Stütz) Jena, kit. gyomorbet., typh., dysent., tuberc. bélbajok, perit., gyomor- és bélvérz. eseteiben. (L. hird.)

	I.	II. javulás esetén	III. további javuláskor	IV. recon- valescentia
Regg. 8 ó.	250 gr. for- ralt tej, 1 cakes	250 gr. forralt tej, 2 cakes	500 gr. tej, kétszersült	500 gr. tej, kalács
R. 10 ó.	250 gr. üres húsleves, 1 cakes	250 gr. tej, 2 cakes	Húsleves to- jással, 50 gr. kalács, 100 sódar	Húsleves to- jással, kalács, 100 gr. hideg hús
D. u. 1 ó.	200 gr. hús- leves egy tojással, egy cakes	200 gr. húsle- ves egy tojással 100 gr. borjú- velő v. mirigy v. fiatal csirke	Húsleves velő- vel, 100 gr. beefsteak bur- gonya puréével 50 gr. kalács	Húsleves, borjúvelő v. kis csirke, so- vány hal, roast beef, burgonya purée, v. rizs, kalács
D. u. 4 ó.	250 gr. tej	250 gr. tej, 2 cakes	250 gr. tej, 3 kétszersült	250 gr. tej, 3 kétszersült
D. u. 7 ó.	200 gr. hús- leves egy tojással, egy cakes	200 gr. hús- leves egy tojás- sal, 100 gr. főtt borjúvelő v. mirigy v. fiatal csirke	Kis sült csirke, burgonya pu- rée, 250 kalács	100 gr. sült- hús, burgonya purée, rizzsel, kalács
Éjjel	250 gr. tej	250 gr. tej	250 gr. tej	250 gr. tej

e) *Gastrectasia*. Folyadékoknak egyszerre nagyobb mennyiségben való felvételétől lehetőleg tartózkodni kell: kerülendők a könnyen erjedő és puffasztó ételek, italok. Ajánlatok: híg tojás, sovány sódar, hideg sovány szárnyas-, borjú-, marha-sült, levesbe főtt húspuréék, geléek, rizs, darapép, burgonyapurée, húspepton, cacao, piritott semlye. Szeszkes italok lehetőleg kerülendők.

Idült gyomorhurut: Robitschi Styria és Tempel. (L. hird.)

Gyomor-bélbajosok részére kitűnő erősítő és étvágygerjesztő ital a gyógynövények kivonatából készült Unicum. (L. hird.)

Leurose javított Leube-Rosenthal husoldat, kész. dr. Mirus'sche Hofapoth. (R. Stütz) Jena, kit. gyomorbet., typh., dysent., tub. bélbánt., perit., gyomor- és bélvérzések eseteiben. (L. hird.)

Bilini savanyúkút, kiv. alk. savanyúvíz, kit. gyomorbélbajok, köszvény, aranyér eseteiben. — **Bilini pasztillák** gyomorégés ellen. (L. hird.)

f) *Carcinoma ventriculi*. A szenvedések enyhítése mellett a táplálást lehetőleg fentartandó folyékony, nem izgató, könnyen emészthető ételek segélyével, melynek a LEUBE-féle húsoldat, somatose, KEMMERICH-féle húspepton, vad hâché, bojjú hâché, rizs, híg tojás, jeges tej, tojásfehérjés víz, kétszersült. Mindez napj. többször, de mindig kis mennyiségben adandó. Elvezeti szerek közül megengedhető a tea; erősítőnek jó az ó-bor (nem édes bor). Szomjúság és égető érzés ellen kanalankint jeges víz. Ha végbélben át táplálás szükséges lenne l. klysina cz. a.

6. *Diarrhoea chronicában szenvedők étrendje.*

Kerültsenek: gyümölcs, organikus savakat tartalmazó ételek és italok, szénsavas vizek, cukros dolgok, kávé, tej, főzelékek, zsírok, fekete kenyér, durva összeállású ételek, sós ételek, fűszerek. *Előnyösek:* amylaceák s azokkal készült levesek, nyers hús- és sódarvakarék, fehér húsok, westfáliai sódar, híg tojás, tojásfehérjés víz, fanyar piros bor, áfonyabor, hosszan állott orosz tea (cukor nélkül), makk-kávé. *Szabály:* órára étkezni, egyszerre keveset enni (inkább többször napjában), kevés folyadékot inni. Korányi S. báró klinikáján a következő étrend szokásos: *Reggeli:* Thea, cacao, makkcacao, kétszersült, (tej). *Tízórás:* Cacao, kétszersült. *Fbéd:* Nyákos leves, darás leves, zablisztleves, sagoleves. Könnyű sovány sült hús. Burgonya purée. Sovány hal. Vörös bor. Áfonyabor. Pirított zsemle. *Délután:* Cacao. Kétszersült. *Vacsora:* Sovány könnyű hideg hús, nyelv. Lisztes leves, nyákos leves. Dara. Rizs. Pirított zsemle. Kétszersült. Vörös bor vagy áfonyabor. *Italul:* Kevés víz, rizsvíz, hideg thea. *Kerülendők:* Gyümölcs, főzelékek, saláták, tej, tésztaneműek, zsíros ételek, fekete kenyér, sör, fehér bor, erősebb szeszes italok. Sok folyadék. — Hasát tartsa melegen!

7. *Szokványos székszorulásban szenvedők étrendje.*

A bél peristaltikáját fokozó tápszerek lehetőleg bőven nyújtásnak; legalkalmasabb a vegyes koszt. *Előnyösek:* friss hideg víz

Mycodermin „Blaës“ kitűnő obstipatio ellen. (L. hird.).

Diarrhoea chronica és köszvény: Rohitschi Donati forrás, székszorulás: Rohitschi Styria. (L. hird.)

Karlsbadi víz-kétszersült a legjobb sütemény diarrhoea chronicánál, készíti K. Bayer udv. száll. Karlsbad. (L. hird.)

Gyomor-bélbajosok részére kitűnő erősítő és étvágygerjesztő ital a gyógynövények kivonatából készült Unicum. (L. hird.)

Bilini savanyúkút, kiv. alk. savanyúvíz, kit. gyomorbélbajok, köszvény, aranyér eseteiben. **Bilini pasztillák** gyomorégés ellen. (L. hird.)

Gastrectasia, carc. ventr. eseteiben jól türi a beteg a Kufekeliszttet. (L. hird.)

Diarrhoea chr. ellen kit. a Gréb-féle áfonyabor.

egyszerre bőven (főleg reggel éhgyomorra), vagy kortyonként, de hosszabb időn át, celluloseban dús főzelékek (tök, sárgarépa, paraj, paradicsom), friss gyümölcs, gyenge fehér bor, iró, méz, korpake-nyér, Graham-kenyér, tej tejezukorral édesítve, sardella, caviár, fiis-tölt sonka. Kerültessenek: piros bor, tea, cacao, chocolate, rizs, dara, burgonya. Korányi Sándor báró klinikáján a következő étrend szokásos: *Éhgyomorra*: Pohár hideg víz. Sült alma, füge, szőlő, eper, málna. *Reggeli*: Kávé. Zsemle vajjal és mézzel. *Tízórás*: Vajaskenyér, sonka. *Ebéd*: Leves, hús vagy hal. Sok könnyű főzelék. Sok gyümölcs. Édes tészta. Sajt vajjal. Graham kenyér. *Délután*: Vajas kenyér, alma vagy körte. *Vacsora*: Sonka, hideg hús. Félliter sör. Barnakenyér vajjal. Graham kenyér. *Lefekvés előtt*: Gyümölcs (alma, szőlő, füge, eper, málna). *Tiltott ételek*: Káposzta, vörös káposzta, vörös bor, cacao, fehér kenyér. — Hashajtó orvosi rendelés nélkül ne használjon, szükség esetén inkább beöntést csináljon. — Sokat mozogjon. — Próbálja meg naponként reggeli után székletét elvégezni.

8. Scorbutban szenvedők étrendje.

Ajánlatos ételek: burgonya (!), friss vagy conserv zöldség- és gyümölcs-ekből készült ételek, friss hús, húskivonattal készült erős levesek, nedvdús gyümölcs, nyáron az itthon termettek, télen citrom, narancs. *Ajánlatos italok*: limonade (!), bor, sör.

9. Kószvényes bántalmakban szenvedők étrendje.

Az ajánlott étrendek közül ma leginkább az EBSTEIN-féle van alkalmazásban, mely szerint a tápanyagok bevitele általában mérséklendő, kerülendő a szénhidrátok, tehát a cukor és az anylaceák; a zsírok bevitele mérsékelt mennyiségben meg van engedve, ezek t. i. ha más tápanyagokkal kevertetnek, a jóllakottság érzetét gyorsabban létrehozzák. Különben vegyes legyen az étrend, de purinszegény. Kívér húskok kerülendő. A gyümölcs a tapasztalás

Karlsbadi víz-kétszersült a legjobb kószvény-nél, készíti K. Bayer udv. száll. Karlsbad. (L. hird.)

Simons-kenyér malátás rozsából, ideális specifikum szokv. szék-szorulásnál. (L. hird.)

„**Leurose**“ jav. Leube-Rosenthal husoldat, kész. dr. Mirus'sche Hofapoth., Jena, kit. gyomorbet., typh., dysent., tuberc. bélbánt., perit., gyomor- és bélvérzések eseteiben. (L. hird.)

Diarrhoea chr., dysent., lázas bet. eseteiben legmegfel. dietét. tápszer a Kufeké-liszt. (L. hird.)

Thum-kávé, pörk. előtt megtiszt. kávészemek, teljes aromával és koffein tart., a gyomorra és szívre nincs káros hat., ártal-matl. ital betegek részére. (L. hird.)

szerint jót tesz a köszvényeseknek. Sör legyen eltöltve, bor megengedhető napj. két kis pohárával. Tiszta vizet vagy gyenge égvényes ásványvizet igyék a beteg napj. 2—3 litert. Kávé, tea, cacao, chocolate mérs. mennyiségben megvannak engedve. A részletes étrendet l. alantabb az EBSTEIN-féle soványító étrend czíme alatt. Kiadós testmozgás szigorúan követeltessék; ha az activ mozgás ki nem vihető, massage rendelőndő el. Különben individualizálni kell. Korányi Sándor báró klinikáján a követk. purin szegény étrend szokásos:

Reggeli: Tej, tejeskávé, thea, cacao, sült alma. Zsemle, kétszersült. *Tízórás:* Tojás, tej, zsemle. *Ebéd:* Hamisleves zöldséggel, tojással. Tészták. Burgonya. Gesztenye. Főzelékek. Saláták. Gyümölcs. Sajt, vaj. Kenyér. *D. u.:* Tej, tejeskávé, thea, cacao, zsemle. *Vacsora:* Tojás. Tej, tejes ételek, aludtej, kefir. Gyümölcs. Sajt, vaj, kenyér.

10 Diabetes mellitusban szenvedők étrendje.

Csak az étrend szigorú megtartása biztosítja a jó eredményeket.

Tiltott dolgok: répa-, nád-, szálló- és tejczukor, amylaceák, valamint ezekkel készült vagy ezeket tartalmazó ételek és italok, p. o. tészták, torták, kenyér, tejes kávé, édes gyümölcs, burgonya, édes bor, sör, liqueur, pezsgő, cacao, chocolate. Ételek, italok édesítésére használhatók inosit, mannit, laevulose, glycerin, saccharin (l. e cz. a. vénygyűjt.).

Megengedetttek: bármily mennyiségben lisztet nem tartalmazó levesek, minden fajta húsétel bőséges zsírral (de lisztet tartalmazó mártások nélkül), aszpic, sajtok, tojás, tojásételek; mérsékelt mennyiségben zöld saláta, paraj, spárga, kalarábé, carfiol, zeller, kis retkek, gomba, zöld bab; kis mennyiségben aludt tej, tejfel, kephír, tejsűrű, idős sajtok, savanyú gyümölcs (ribizke, eper, málna, savanyú narancs), dió, mandula; továbbá fekete kávé, tea, limonade, mindhárom esetleg saccharinnal édesítve; savanyú borok. Kenyér helyett készíttessünk *diabetes-kenyereket*, melynek a SEEGEN-féle *mandulakenyér*, vagy a KÜLZ-féle *inulinkenyer*. A SEEGEN-féle mandulakenyér következőleg készíthető. Mozsárban $\frac{1}{2}$ kilo hámozott édes mandulát $\frac{3}{4}$ órán át finomra kell törni, amint csak lehet; a mandulaliszt sok czukrot tartalmazván, belőle a czukrot úgy kell eltávolítanunk, hogy a lisztet vászonzacskóba kötjük s a zacskót $\frac{1}{4}$ órára forrásban levő vízbe helyezzük, miután a vizet néhány csepp eczetsavval vagy erős eczettel megsavanyítottuk. A czukortól megszabadított mandulalisztet most 100 gm. vajjal s 2 egész tojással jól összekeverjük s e keverékhez hozzáelegyítünk 3 tojássárgát és kevés konyhasót. Ha ez megtörtént, 3 tojás fehérjét habbá verjük s a

Mycodermin „Blaes“ bevált szer diabetes ellen. (L. hird.)

Diabetesnél kitűnő a Rohitschi Donati-forrás vize. (L. hird.)

Simons-kenyér malátás rozsból czukorbajosoknak. (L. hird.)

Tablion Citri sec. dr. Egger telj. szénhydratmentes savanykás bonbon, czukorbet. r. kit. szomjúságcsillapító.

tésztával összehabarjuk. Az így elkészült tésztaanyagot vajjal kikent formába helyezzük s enyhe tűznél megsütjük. A KÜLZ-féle *inulin-kenyér* következőleg készül: 50 gr. inulint vízfürdőn porcelláncsészében kevés meleg vízzel és mintegy 30 grammnyi tejjel, 4 tojássárgával s kevés konyhasóval péppé kell összehabarni. Ezután habot kell verni 4 tojás fehérjéből, mely habot az előbbi péppel erősen össze kell elegyíteni. Az így elkészült tésztaanyagot vajjal kikent pléhformában meg kell sütni. Kitűnő készítmény a HUNDAUSEN-féle *aleuronat* kenyér, mely aleuronat lisztből készül; az aleuronat búzából készült növ. fehérje, mely 80—90% növ. fehérjét és kb. 5% szénhidrátot tartalmaz. Az aleuronatlisztet egyenlő mennyiségben keverve buzalisszal, a belőle készült kenyér 50% növ. fehérjét és 30% keményítőt tartalmaz. Legjobb ízű kenyér készül 1 rész aleuronatból és 2—3 rész buzalisszból.*) Ajánlatosak a RADEMANN-féle sütemények; ezek liszt, vaj és dióból, vagy liszt, vaj és mandolából készülnek, kevés szénhidrátot és sok zsírt tartalmaznak; tápláló értékiük nagy. Különösen értékes ételük a cukorbeteg kosztjában (Noorden és Hirschler-Terray után): növényi olajok, vaj, szalonna, tejföl, sajt (Gervais, Neufchatel, Stracchino), szafaládé, sonka, kövér sertéshús, füstölt marhahús, zsíros sajtok, tojás sárgája, libahús, angolna, caviár, kövér lazac frissen v. füstölve, RADEMANN féle sütemények.

Diabeticus egy napi étrendje p. o. a következő lehetne: *Reggel* 7—8 ó. Csésze tea vagy kávé tejszínnel, saccharinnal (l. e. cz. a. vénygyűjt.) s egy db. diabeteskenyérrel. *Dél előtt* 10—11 ó. Beefsteak ökörszemmel s 1 pohár piros bor. *Déli* 1—2 ó. Húsleves tojással; kevés főzelék a megengedett zöldségnekeműek közül, de liszt (rántás) és cukor nélkül elkészítve; sült bőven, hozzá zöld saláta (cukor nélkül készítve); tojás hab felfújt mannittal vagy saccharinnal édesítve, kevés dió, savanyú gyümölcs, savanyú bor. *Délután* 5 ó. Fekete kávé tojássárgával és esetleg saccharinnal, 1 db. diabetes kenyér. *Este* 8 ó. 2 db. sardina, vagy 2 db. híg tojás, utána sült vagy hal sajt, vizes bor, tea, esetleg saccharinnal vagy mannittal édesítve.

11. Vesebetegek étrendje.

Korányi S. báró klinikáján a köv. étrend szokásos: *Reggeli*: Tej, kávé, cacao, thea, kétszersült, zsemle, vaj. *Tízórás*: Tej, cacao, kefir, savó. *Féld*: Főzelék (karfiol, paraj, spárga, sárgarépa, kelkáposzta, borsó, lencse, bab) burgonya, rizs, dara, kenyér, édes tészta, gyümölcs. *Délután*: Tej, kávé, cacao, thea, kétszersült, zsemle, vaj. *Vacsora*: Tej, tejes étel, gyümölcs. *Kiegészítés. Tízórás*: Tojás, leves. *Féld*: Húsleves, hamisleves, csirke, borjú, marhahús, sós tészta. *Vacsora*: Tojás, hús, leves. *Kerülendők*: Sózott és fűszerezett ételek. Retek, hagyma, zeller. Sör, bor. Erősebb szeszes italok. Sajtok. — Testét, főleg lábait, hasát melegen tartsa, meghűléstől óvakodjék! — Kifáradást, megizzadást kerüljön!

*) Ezen, valamint az összes diatétikai tápszereket Glasner udvari szállító árúsítja. (Budapest, VI., Király-utca 56.)

12. *N és NaCl-szegény fűszermentes étrend.*

Korányi Sándor br. klinikáján szokásos: *Reggeli*: Tej, kávé, cacao, thea, kétszersült, zsemle, vaj. *Tízórás*: Tej, cacao, kefir, savó. *Ebéd*: Főzelék (karfiol, paraj, spárga, sárgarépa, kelkáposzta, kalarábé, káposzta, borsó, lenese, bab) burgonya, rizs, dara, kenyér, édes tészta, gyümölcs. *Délután*: Tej, kávé, cacao, thea, kétszersült, zsemle, vaj. *Vacsora*: Tej, tejes rizs, gyümölcs. *Kiegészítés*. *Reggeli*: Tojás, leves. *Ebéd*: Húsleves, hamisleves, csirke-, borjú-, marhahús, sós tészta.

13. *Lipomatososisban (hájkór, túlságos kövérség) szenvedők étrendje.*

Soványító gyógymód, illetve étrend, többféle áll rendelkezésünkre, mindenik terhes, sőt néha kínos is a betegnek, mindeniknek vannak hátrányai, de ha szigorúan megtartatnak, mindenikkel lehet eredményeket elérni.

a) *Banting-Harvey-féle* gyógymód. Főelve a zsirok és szénhidrátok elvonása. *Reggel*: orosz tea vagy kávé, tej és cukor nélkül, 50 grm. sovány sódar vagy hideg hús, Graham-kenyér. *Délben*: 60—100 grm. sovány hús (marhahús, vagy vad, vagy szárnyas, vagy hal), friss zöld főzelék (sós vízben megfőzve, vaj vagy rántás nélkül), savanyú gyümölcs párolva (cukor nélkül), 2—3 pohárka piros vagy fehér bor. *Délután*: 1 pohár tej cukor nélkül, 1—2 drb kétszersülttel. *Este*: 40 grm. sovány sült vagy hal, 1—2 pohárka bor. Különböztetestsúly, alkat, klíma, évszak szerint módosítandó az étkek és italok mennyisége. Nagyobb fokú erőhianyatlás esetén a gyógymódot meg kell szakítani. Testmozgás szükséges.

b) *Ebstein-féle* gyógymód. A betegek szívesebben alávetik magukat ezen gyógymódnak, mint a BANTING-félének. Szigorúan eltiltandók a szénhidrátok (tészta, cukor, édességek, burgonya); egyedül kenyér van megengedve 80—100 grm. pro die. Zsirok nemcsak meg vannak engedve, sőt rendelendőek, ezek u. i. étkekhez keverve hamar előidézik a jóllakottság érzetét. Étkezés 3-szor napj. Étrend a következő: *Reggel* 7^{1/2} ó. Nagy csésze orosz tea cukor, tej és rhum nélkül, 50 grm. fehér pirított kenyér, vagy fekete kenyér bőven vajjal. *Délben*. 120—180 grm. tiszta húsleves, melléje vagy beléje

Karlsbadi víz-kétszersült (Sprudel) a legjobb vesebetegek, kövérek részére, készíti Karl Bayer ndv. száll. Karlsbad. (L. hird.)

Szent-Margitszigeti gyógyvíz kitűnő hatású ásványvíz máj, epe-, vese- és hólyagbetegek részére. (L. hird.)

Nestlé-liszt, mint extractiv anyag mentes tápl. specif. vesebajoknál. (L. hird.)

Thum-kávé, pörk. előtt megtiszt. kávészemek, teljes aromával és koffein tart., a gyomorra és szívre nem hat károsan, ártalmatl. ital betegek részére. (L. hird.)

csontvelő (kenyér nélkül), 120—150 grm. kövér főtt vagy sült hús, zsíros mártással, zöld főzelék angolosan készítve mérsékelt mennyiségben (kizárva: burgonya, sárgarépa, répa), saláta, sült alma, vagy friss alma, vagy meggy-kompót cukor nélkül elkészítve. 2—3 pohárka könnyű fehér bor. Ebéd után nagy csésze erős orosz tea keserűen. *Este*: nagy csésze orosz tea keserűen, hozzá egy db híg tojás, vagy kevés zsíros sült, vagy kövér sódar, vagy hal; 30 grm. kenyér, sok vajjal, néha kevés sajt, friss gyümölcs. Kerülje a beteg az ételek erős sózását, fűszerezését. Ha dyspepsia jelentkeznék, a mi nem ritkaság, a táplálék soványabb legyen.

c) *Örtel-féle gyógymód*. Főleg a lipomatosus azon eseteiben ajánlatik, midőn a szíven történt zsírfelhalmozódás folytán szívgyengeség s így keringési zavarok vannak jelen. LEYDEN és LICHTHEIM buvárlatai óta szívántalmak eseteiben a javalatok nagyon meg vannak szorítva. A gyógymód három részre oszlik: 1 *Étrend*. Főelv a víznek lehető megvonása, hogy így a test *víz tartalma csökkentessék*, továbbá oly táplálék nyújtása, mely a zsír felrakódásának nem kedvez, de a test fehérjetartalmát gyarapítani tudja. Ily étrend lenne a következő: *Reggel*. 120 gram. tea vagy fekete kávé, 30 grm. tejjel, 5 grm. cukorral és 35 grm. buzakorpa-kenyérrel. Víz semmi. *Délben*. Az egyéniség szerint semmi leves, vagy legfeljebb 100 grammnyi, 200—250 grm. főtt vagy sült marhahús, vagy borjúhús, vagy vad zöld salátával, 25—50 grm. friss zöld főzelék sós vízben megfőzve (vaj vagy rántás nélkül). 25 grm. kenyér, vagy helyette ugyanannyi tésztaemű, 100 grm. friss gyümölcs; italul eleintén 1—1½ decilit. sör, vagy gyenge fehér bor, később semmi ital. *Délután*, 100 grm. fekete kávé, 25 grm. tejjel, 5 gram. cukorral, egy-két korty víz. *Este*. 2 híg tojás, 150 grm. sült, 25 grm. zöld saláta, 10 gram. sajt, 25 grm. kenyér, kevés gyümölcs, 2 decilit. bor és 1—2 korty víz. A szomjúság ezen étrend mellett erősen kinozza a betegeket, collapsus néha előfordul. 2. *Rendszeresen végzett testi munka*, mely főleg abból áll, hogy a beteg állapotához képest majd sík úton, majd emelkedő utakon sétálva (Terrainkur), fokozatosan emelni igyekszik szívizomzatának munkáját. 3. *Utógyógy-mód*, melynek célja megakadályozni a már megfogyott testnek újra hízását, miért is az el nem hanyagolandó rendszeres testi munka mellett a táplálék a fenti elvek értelmében választandó meg.

14. Hizlaló gyógymód.

Javalatok: idült betegségek utáni nagy súlyfogyás, olygaemia, chlorosis, vérvesztések utáni kimerülés, hysteria bizonyos alakjai, neurasthenia, vándorvese (enteroptose).

Thum-kávé, pörk. előtt megtiszt. kávészemek, teljes aromával és koffein tart., a gyomorra és szívre nem hat károsan, ártalmatl. ital betegek részére. (L. hird.)

Bilini savanyúkút, kiy. alk. savanyúvíz, kit. vese-, hólyagbajoknál, diabetesnél stb. (L. hird.)

Vesebajoknál, hugys. diath.-nél kit. bevált a Kufeké-liszt. (L. hird.)

Ellenjavalatok: csillapíthatlan hányás, hystericus görcsök, agy-izgalmak, különböző elmébántalmak.

A cél a betegnek testsúlyát, táplálását javítani. A gyógymód 4—6 hétig tart; ha a beteg azt nem tűrné, az vagy megszakítandó, vagy egészen megszüntetendő. A beteget szokott környezetéből lehetőleg el kell távolítani és melléje kellemes, értelmes és ügyes ápoló személyzetet rendelni. Nyugodt, ágyban fekvés a gyógymód 2—3 első hetében szigorúan követeltessék; ezután is a nap legnagyobb részét a beteg ágyban töltsse. Az aktív testmozgást a passivnak kell helyettesítenie, ezért naponta $\frac{1}{2}$ —1 órai általános *massage*-t kell elrendelni, melyet a beteg neme szerint férfi vagy nő végezzen; ezenfelül az orvos napjában egyszer gyenge faradikus árammal villamozza a beteget.

A táplálék mennyiségét fokozatosan kell emelni. Az első napokban túlnyomólag tej nyujtassék, és pedig 2 óránként 60 grm. A 3—5-ik napon már $\frac{1}{2}$ —2—3 literet tegyen ki az elfogyasztott napi tej mennyiség. A tejet a betegek kortyonként lassan igyák hideg vagy meleg tej alakjában. Ha a beteg undorodnék a tiszta tejtől, akkor ahhoz kevés tea vagy kávé vagy cognac teendő. Ha a kizárólagos vagy túlnyomó tejétrend kezdetben már nem sikerül, célszerűbb azt nem erőszakolni, hanem elejétől fogva a bőven nyújtott tej mellett azonnal vegyes kosztot adni, (BINSWANGER.). 6 nap múlva köv. legyen az étrend: *Reggel* 7 ó. $\frac{1}{2}$ liter tej, mely $\frac{1}{2}$ óra alatt kortyonként fogyasztandó el, 8 ór. $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$ liter tejszínes kávé, fehér kenyér vagy kávé sütemény vajjal, 80 grm hideg sült, 1 tányér zsirban kisütött burgonya (pommes de terre frites). 10 ór. $\frac{1}{2}$ liter tej kétszersülttel. *Déli* 12 ór. $\frac{1}{2}$ liter tej, mely $\frac{1}{2}$ óra alatt fogyasztandó el. 1 ór. Húsleves, sült bőven, főzelék, édes tészta, kompót. 3 ór. 30 p. $\frac{1}{2}$ liter tej kortyonként, 5 ór. $\frac{1}{2}$ liter tej, vajas kenyér, 80 grm. hideg hús. 8 ór. Meleg sült, kenyér vajjal, $\frac{1}{2}$ liter tej. 9 ór. 30 p. $\frac{1}{2}$ liter tej, kétszersült.

Levesekben, húsokban, főzelékekben, édes tésztákban változatosság. Korányi Sándor báró klinikáján a köv. hízaló étrend szokásos: *Reggeli:* $\frac{1}{2}$ liter tej, zsemle sok vajjal és méz. *Tízórás:* $\frac{1}{3}$ liter tej. Kenyér, sok vajjal. Lisztes leves. *Ébéd:* Leves (tojással, tésztával, maccaronival). Lisztes leves. Hús burgonyával. Édes befőtt. Tészta. $\frac{1}{2}$ liter sör. *Délután:* Cacao vagy $\frac{1}{2}$ liter tej, vajas kenyér. *Vacsora:* Lisztes leves, sonka, nyelv. Marhasült. Szelet. Rizs. Burgonya. Befőtt-gyümölcs. Tea tejszínnel. Kenyér sok vajjal. *Este* $\frac{1}{2}$ 10-kor $\frac{1}{3}$ liter tej, 1—2 kétszersült.

Ízletes táplálék betegek részére: Maggi-féle ízesítő a keresztesillaggal. Az étvágyat és emésztést növelő, különben minden ingertől mentes ízjavító szer levesek és ételek részére, semmi ártalommal, ered. üveges. 12 fillértől kezdve. (L. hird.)

Elzsirosodásban szenvedők részére a legmegfelelőbb ásványvíz a Rohitschli Donati-forrás vize. (L. hird.)

A hízaló gyógymód leghat. segítőszere a Szent István védj. dupla malátasör a kőbányai Polgári Serfőződéből. (L. hird. a 337. oldal mellett.)

15. Vérszegények táplálása.

Vérszegény, chlorosisos felnőtteknek vagy gyermekágyból üdülő nőknek, továbbá vérszegény, rhachitises stb. gyermekeknek a vasas gyógy-zerek mellett oly tápanyagokból igyekezzünk az étrendet összeállítani, melyek tetemes *Fe*-tartalmúak.

Tápanyagaink vastartalma. Abderhalden táblázata.

100 gm. száraz anyagban van milligm. Fe.			
	mgm.		mgm.
Cukor	0·0	Kelkáposzta (belső le-	
Tojásfehérje	0·0	velek)	5·6
Méz	1·2	Kelkáposzta (külső le-	
Piros cseresznye . .	1·2	velek)	17—38
Rizs	1—2·5	Burgonya	6·4
Narancs	1·5	Borsó	6·2—6·6
Fehér kenyér	1·5	Bab	8·3
Buzaliszt.	1·6	Földi eper	8·1—9·3
Fekete cseresznye . .	1·9	Búzakorpa	8·8
Alma	1·9	Lencse	9·5
Körte	2·0	Mandula	9·5
Tehéntej	2·3	Mogyoró	12·7
Asszonytej	2·3—3·1	Marhahús	16·9
Cacaomag	2·5	Spárga	20·0
Málna	3·7—3·9	Tojássárgája	10—24
Rizs	3·7—4·9	Spenót	33—39
Árpa	4·5	Disznóvér	226
Búza	5·5		

Ízletes táplálék betegek részére: Maggi levesei táblákban a keresztesillaggal, a házilag készített levesek természetes alkatrészeit tartalm. és csupán vízzel főzve, pár perc alatt ízletes, tápláló és könnyen emészth. levest adnak, 1 tábla 2—3 tányérra 15 fill. (L. hird.)

Diasana a legkönny. old. és legtök. növényi táplálék betegek részére. (L. hird.)

Dr. Krompecher Ottó táblázata növényi tápanyagok vastartalmáról.

1000 gm. száraz anyagban Fe_2O_3 alakjában kiszámított Fe-tartalom.

1000 gm. száraz anyagban van Fe_2O_3 gmokban			
	gm.		gm.
Virágkel	0.02	Zöld borsó	0.14
Fekete retek	0.04	Tök	0.14
Vörös répa	0.05	Fokhagyma	0.19
Ugorka	0.05	Vöröshagyma	0.21
Bab	0.06	Tejgomba	0.25
Paradicsom	0.06	Articsóka	0.29
Káposzta	0.07	Sóska	0.31
Zöld paprika	0.07	Endíviasaláta	0.39
Zeller	0.11	Porélagyma	0.44
Fejes saláta	0.14	Kelkáposzta	0.49
Petrezselyem	0.14		

16. Ca-fogyásban szenvedők v. fokozott Ca-ot igénylők táplálása.

Növő v. rhachiticus gyermekeknek, szoptató és gravid nőknek vagy csontlágyulásban, osteoporosisban szenvedőknek fokozott Ca-szükségletüknek megfelelően keressük ki étrendjük számára a legtöbb Ca-ot tartalmazó ételanyagokat s gondoskodjunk elegendő Ca-ot tartalmazó ivóvizről (l. földes ásványvizek).

Tápanyagaink Ca-tartalma:

100 gm. száraz anyagban van Ca kiszámítva CaO-alakjában			
	mgm.		mgm.
Cukor	0	Fekete cseresznye	123
Méz	7	Cacaomag	126
Marhahús	29	Tojásfehérje	130
Disznóvér	33	Vörös cseresznye	136
Fehér kenyér	46	Borsó	137
Búza	65	Asszonytej	243
Rozs	62—71	Tojássárgája	380
Alma	66	Málna	404
Graham kenyér	77	Narancs	575
Körte	95	Kelkáposzta	717
Burgonya	100	Földi eper	873
Rizs	103	Tehéntej	1510

Maltolecin sec. Weinreich dr., kit. tápl. és erősítősz. anaemia, chlorosis eseteiben. (L. hird.)

Diasana a legkönny. old. és legtök. növényi táplálék betegek részére. (L. hird.)

XVI. Az egészséges és beteg gyermek étrendje.

Irta: *Bókay János dr.*

egyetemi ny. r. tanár, a „Stefánia“ gyermekkórház
igazgató-főorvosa.

1. A gyermek táplálása az első életévben.

A legtermészetesebb táplálék az anyatej. Az anya nem szoptathat, ha gümőkóros, vagy nagy fokban vérszegény; nem szoptathat oly betegségek esetén sem, melyek nagy mértékben gyengítik (idült veselő, diabetes stb.). Ideges bántalmak, mint erősebb hysteria, epilepsia hasonlóképp tiltják a szoptatást. Veleszületett syphilisben szenvedő csecsemőt szoptassa az anyja, ha a szoptatásra különben képességgel bír.

Az anyatej legjobban dajkatejjel pótolható. Dajkaválasztásnál a dajka gyermeke mindig megvizsgálandó, éppúgy a dajka is syphilis, gonorrhoea, tuberculosis tekintetében. Újszülöttnél hat-nyolcz hetes tejű dajkának előnyt adunk, hogy a congenitalis lues-t a dajka gyermekénél kizárhassuk. A dajka életkora húsz-harmincz év között álljon; előnyben részesüljön a másodszor szülő.

A szoptatás rendszeresen történjék, és pedig: $3\frac{1}{2}$ —4 óránként. 24 órában 5—6-szor szopjék a csecsemő. A havi vérzések nem akadályozzák a szoptatást. Újabb terhesség a fokozatos elválasztást, illetőleg a szoptatónő változtatását teszi szükségessé.

Az elválasztás lassan, fokozatosan, négy-nyolcz hét alatt történjék. Az elválasztásra legalkalmasabb időszakok az ősz és a tavasz. Legjobb, ha az elválasztást a 7-ik hóban kezdjük meg bouillon-grizzel, majd fokozatosan egy-egy szopást helyettesítünk megfelelő hígítású tejkeverékkel. Diarrhoea ab lactatorum szükségessé teheti a gyermeknek újból emlőretételét.

A mesterséges táplálásra legalkalmasabb tápszer a tehéntej (a szármártej vegyi összetételét illetőleg közelebb áll a női tejhez, de nehezen hozzáférhető). A tehéntejet jól felforralva adjuk a csecsemőnek; a felforralás pontosan végezhető a SOLTSMANN-féle tejforralóval, még jobban a SOXHLET-féle tejsterilizáló-készülékkel. (A forralás tartama a Soxhlet-féle katlanban tíz perczet ne haladja túl!) Ott, hol sterilizált tejet költségkimelés végett nem alkalmazhatunk, ajánljuk a tejnek ismételt felforralását (használat előtt a tej-adag újból felforraltatik). A forralt tehéntejnek forralt vízzel hígítása az első élethónapokban kb. következőkép történjék:

Tabulae cacao tin. phosphor. sec. Prof. Gärtner, bevált készítm. osteomalacia és fogzási nehézs. eseteiben. (L. hird.)

Maltolecin sec. Weinreich dr. kit. tápl. és erősítőszer gyöngé csecsemők részére. (L. hird.)

Szoptató nők részére a legajánlat. mindennapi ital a Szent István védj. dupla malátasör a kőbányai Polg. Serfőződéből. (L. hird. a 337. old. m.)

NESTLÉ- FÉLE



GYERMEKLISZT.

RÉGBEVÁLT * MINDIG MEGBÍZHATÓ.

A t. orvos uraknak kívánatra mintadobozokkal
és szakirodalommal mindenkor a legnagyobb
készséggel szolgál a Henri Nestlé cég
Wien, I. Biberstrasse 11.

Loeflund-féle

Tej-kétszersült

Csukamájemulsio maláta- kivonattal.

Orvosilag legjobbnak elismert csukamájolaj-
keverék, felnőttek és gyermekek szeretik. Kap-
ható **vassal, mésszel, joddal.** □□□□□□□□□□

Táp-maltose olyan gyermekek részére, kik a szokásos tejkeverékek mellett nem fejlődnek. Helyes adagolás mellett nem okoz sem hasmenést, sem dugulást. ooo

Ed. Loeflund & Co.
G. m. b. H. GRUNBACH, STUTTGART.

Ezen tápkészítmények kaphatók
Török J. gyógyszerárában, Budapest.

Az 1-ső napon táplálékot nem nyújtunk, csak sacharinnal édesített orosz teát,

a 2-ik naptól a 4-ik hétig 2 rész víz + 1 rész tej,

a 4-ik héttől a 4-ik hónapig 1 rész víz vagy nyákos leves + 1 rész tej,

a 4-ik hónaptól a 9-ik hónapig $\frac{2}{3}$ rész víz vagy lisztleves + 1 rész tej,

a 9-ik hónaptól kezdve tiszta steril tehéntejet kaphat a gyermek.

A tiszta, valamint a hígított tehéntejet közönséges cukorral vagy Soxhlet-tápcukorral édesítsük meg. Két decziliter tejre vagy tejkeverékre egy kockacukor, ill. egy késhegynyi Soxhlet-tápcukor vehető. A hetedik hónaptól kezdve a tejet makk-kávéval vagy árpa-kávéval keverhetjük össze.

A tehéntejet a csecsemőnek szopóüvegből adjuk. *A legjobb szopóüveg az, melynél a palaczkra a kautschukszopóka egyszerűen ráhuzatlik.* Használat után a szopóüveg pontosan kitisztíttassék s a szopóka a tisztítás után kiforraltassék s elzárható üvegedénybe helyeztessék. A Soxhlet-féle szopóüveg előnye az, hogy belseje mindenütt legömbölyített és így könnyen tisztítható. Sörétet a palaczk tisztítására használni nem szabad.

Pépeket mesterséges táplálásra a 7—8-ik hónapig ne engedjünk használni. Ezen időn túl kétszersültből, valamint pirított zsemlyeléből tejjel készült pép adható, de természetesen csak akkor, ha a gyermek emésztése rendes.

Gyermekliszteket (NESTLE, KÜFEKE, MELLIN) az első élethónapokban ne rendeljünk; a 4-ik hónaptól kezdve a gyermekliszteket a gyermekek általában jól tűrik.

Tiszta húslevest a gyermek már a 6-ik hónaptól kezdve kaphat. Tojást, húst az első életévben ne adjunk, ellenben finomra tört főzelékeket (spenót, sárgarépa, burgonya) a 7-ik hó után a húsleves mellé rendeljünk el. Úgyszintén főtt gyümölcsöket (compot), gyümölcslevet.

2. A gyermek táplálása a második életévben.

A táplálék álljon a következőkből: Forralt tehéntej, esetleg keverve makk- vagy árpakávéval vagy cacaoval, legfeljebb egy liter 24 órában, húslevesek, becsínált lé, áttört paraj, hüvelyes vetemény purée-alakban, jól kisütött zsemlye, fehér kenyér, kétszersült, gyermeklisztekből készült pépek, tejes ételek, könnyű soufflék,

Küfeke-gyermekliszt (L. hird.)

Mellin-tápszer, ideális keményítőmentes tápanyag egészsz. és beteg csecsemők és gyerm. részére, 45 év óta használatban. (L. hird.)

Liebe-féle neutralis tápszer (javított Liebig-féle leves száraz formában) kit. emésztli., 80% maltoset tart, keményítőment. gyermektápszer, egészsz. és gyomorbajos csecsemők, gyerm., sőt felnőttek tápl. és bélbajosok gyógyítására kit. (L. hird.)

főtt gyümölcsök. Étkezés 24 óra alatt ötször. Túlságos hosszú szünetek nem czélszerűek, mert különben a gyermek mohón eszik. A második év második felében eleinte húshoz, majd tojáshoz szoktatjuk a gyermeket. Kezdetben csak borjú-, szárnyashús sültve, apróra vagdálva. A gyermek érzékenysége táplálkozási ártalmakkal szemben a második évben még mindig igen nagy, ezért tanácsos a 2-ik év első felében még ugyanazon étrendet folytatni, a melyet az egyéves gyermek részére előírtunk. Kerülendők eczetes és savanyú ételek, édességek, nehéz főzelékek, héjjas gyümölcs, durva kenyér, kávé, orosz tea, sör.

3. A gyermek táplálása a 3-ik évtől kezdve.

Két évnél idősebb gyermekek kb. ugyanolyan táplálékban részesülnek, miut a felnőttek. Vegyes kosztot adjunk, ez azt jelenti, hogy kerüljünk minden egyoldalú táplálást, tehát ne adjunk csak tejet, húst, tojást. Alkalmas táplálék: Tehéntej makk-kávéval vagy cacaoval, lágytojás, húslevesek, sülték, vaj, búza- vagy rozsenyér, tejes ételek, burgonya kis mennyiségben. zöld főzelékek, hüvelyes vetemények áttört alakban, érett gyümölcs. Az étkezések száma 24 óra alatt 4—5 legyen. Alkoholt ne adjunk!

4. A rhachitises gyermek táplálása.

A gyermeket lehetőleg természetes táplálásban részesítsük, majd elvül tekintsük, hogy minden túltáplálást és egyoldalú táplálást kerüljünk. A rhachitises gyermek táplálása egyébként nem igen tér el az egészséges gyermekétől, csak a 24 órai tejmenntisége 1 liternél is kevesebb legyen, legfeljebb 7—800 gr., főzelékeket és húst is korábban kezdhetünk adagolni, mint különben tennők. Vegetabíliákra különös súlyt kell helyezni só-, calcium és vastartalmuk miatt!

Sorisin-Ferrarsenat (Syr. Ferri sulfoguaiaacol.-arsen.) kitűnően bevált szer rhachitis és scrophulosis ellen. (L. hird.)

Haematogen (dr. Hommel) vas és halmájolaj helyett kit. erősítő szer rhach. gyerm. részére, nagy foszforsótart. miatt. (L. hird.)

Tabulae cacaotin. phosphor. sec. Prof. Gaertner, bevált szer rhachitis ellen, a gyermekek szívesen veszik. (L. hird.)

Mellin-tápszér. (L. a szemben levő hird.)

Maltolecin sec. Weinreich dr. nagy foszfortart. miatt kit. erősítő szer rhachit. gyerm. r. (L. hird.)

Egger Emulsio, kit. csukamájolaj-készítm. rhachit., scroph. gyerm. részére.

Rüger-féle erő-kakao és csokoládé, a csukamájolaj legjobb pótléka görvélyes gyermekek részére. (L. hird.)

„Kufeke”

**Készítmény speciális indikációi
a csecsemők és elválasztott gyermekek részére :**

1. mint hozzátétel a tejhez egészséges csecsemőknek, akik nem kapnak női tejet, vagy csak keveset kapnak.
2. táplálkozási zavaroknál,
 - a) rossz, illetve elégtelen táplálásnál,
 - b) angolkór, alkati betegségek (syphilis, tuberculosis), a tehéntejjel szemben való bélrenyheség stb. okozta fejlődési visszamaradottságnál,
 - c) gyomor- és bélbetegségeknél, pld. akut és chronikus gyomor-bélhurutnál, choleránál, dysenteria catarrhalisnál és enteritis, follicularisnál, béltuberculosisnál, akut és chronikus dyspepsiánál, dyspepsiás hurutoknál, hurutos diarrhoeáknál, zsirdiarrhoeáknál, vastagbélhurutoknál, a vastagbélhurut fertőzőses alakjainál stb.

az idősebb gyermekek, a serdülő ifjuság és a felnőttek részére :

1. hiányos táplálkozási állapotoknál és hiányzó étváagnál, tehát főképen gyöngéknél, idegeseknél, sápkórosoknál és lábadozóknál is,
2. gyomor- és bélbetegségeknél, különösen gyomorhurutoknál, gyomorfekélyeknél, hypeaciditásnál, carcinománál és ideges alapu emésztési zavaroknál,
3. étvágytalan, rosszul táplált tüdővészesekeknél,
4. vesebajosoknál és húgysavas betegeknek a táplálás elősegítésére,
5. terheseknél, gyermekágyasoknál és szoptatóknál,
6. mesterséges táplálásnál per os vagy per rectum,
7. lázas betegségeknél, pld. typhus, influenza, pneumonia, dysenteria stb. eseteiben mint dietétikus tápláló szer.

Kísérleti anyag. irodalom és főzőkönyv-példányok, melyek 107 praktikus, kipróbált, eredeti főzőreceptet tartalmaznak betegek és egészségesek részére, az orvos uraknak díjtalanul állanak rendelkezésükre.

☞ R. KUFKE, WIEN III. u. BERGEDORF—HAMBURG. ☛

45 év óta ismeretes és rendeltetik a gyermekgyógyászatban.

Csecsemők részére!



Mellin-tápszer

száraz, könnyen eltartható
maláta-kivonat és folyadék-
ban könnyen föloldható.

Mellin-tápszer

buzából és árpamalátából
készül és keményítőtől tel-
jesen mentes, ugyszintén
nádcukortól is, nem tartal-
maz sem hüvelyeket, sem
más emészthetetlen anyago-
kat, mert előállításá rend-
kívül óvatosan és pontosan
történik.

Mellin-tápszer

egy ideálisan kitűnő táp-
láló szer.

Mellin-tápszert

nem kell használat előtt
megfőzni, elkészítése tehát
gyorsan történik.

Mellin-tápszer a csecsemőknek születésük
napjától nyújtható

Mellin-Biskuits

ben adható, akkor, amikor a
térnek a tömörebb táplálékra.

körülbelül 50% Mellin-táp-
szert tartalmaz és a cse-
csemőnek az átmeneti idő-

Mellin-tápszer, üvegje ... 1 kor. 80 fill.

**Mellin-tápszer nagy üvegje vagy 3 kor.
egy doboz Mellin-Biskuits (120 drb)**

Minta az orvos urak részére ingyen és bérmentve.
Kapható a gyógyszerárakban és jobb drogériákban.

Főraktár:

ALEXANDER WOLF, Bécs, II/3, Untere Augartenstr. 34.

5. A görvélyes gyermek táplálása.

A táplálék legyen könnyen emészthető, fehérjedús, lehetőleg cellulosementes. Minden túltáplálást kerüljünk. Csak kevés tej makkkávával vagy cacaoval, inkább főzeléket napj. 1—2-szer finoman áttörve (paraj, burgonya, sárgarépa stb.) főtt gyümölcsöt, továbbá reszelt sonka, sülték (szárnyas, marha- és borjúsült), zsemlye, fehér kenyér, kétszersült, rizs, tejes ételek, érett gyümölcs.

6. A csecsemő táplálása táplálkozási zavarok esetén.

a) *Dyspepsia*. Rendezett szoptatás. Idült, makacs dyspepsiánál a szoptató nő változtatása csak kivételesen vezethet eredményhez, amennyiben ezen esetekben a táplálkozási zavar alapoka többnyire alkati rendellenességben (exsudativ diathesis, neuropathia) rejlik. Nemrég elválasztott gyermeknél esetleg újbóli szoptatás. Nem régen mesterségesen táplált csecsemőknél emlőre-tétel. Mesterségesen táplált csecsemőknél a tej hígítása vagy a hígítás fokozása rövid 8—12 órás oroszthea diaeta után. Vízhozzátétel helyett esetleg nyálkás folyadékok használtassanak a tej hígítására (zabdarafőzet). 3—4 hónapos kortól kezdve esetleg Kufeke-levelessel hígítható a tej. A Kufeke-leves úgy készül, hogy két deciliter vízzel egy kávéskanál Kufeke-liszt főzetik fel. Súlyosabb acut dyspepsiáknál a tehéntej hagyassék ki rövid időre (1 nap!) és helyettesítsék gyenge orosztheával, mely saccharinnal édesíttetik

Loeflund-féle táp-maltose olyan gyermekek részére, kik a szokásos tejkeverékek mellett nem fejlődnek. (L. hird.)

Haematogen (dr. Honnmet) kell. ízű erősítő szer, görvélykóros gyermek szívesebben veszik be, mint a halmájolajat. (L. hird.)

Tabulae cacaotin. phosphor. sec. Prof. Gaertner, igen jó pótszere a foszf. halmájolajnak, kit. scrophulosisnál. (L. hird.)

Kufeke-gyermekliszt. (L. a szemben levő hirdetés.)

Phosphatine Falières kit. tápláló- és csontképzőszer rhachitikus, scrophulotikus gyermekek részére. (L. hird.)

Phosphor-csokoládé-bonbon „Finy“ kit. hat. csontképzőszer angolkóránál. (L. hird.)

Bu Co (Buttermilk-Conserve), kazein- és zsírszegény, fehérjedús, steril. tejconserve, vízzel hígítva kit. ízű tejet ad, bevált diétét. a csecsemők gyomorbélbántalm., nyári hasm., lev. és id. bélhurut eseteiben. (L. hird.)

(Hunger-diät.) Ezután a táplálást csak nagyon óvatosan kezdjük meg erősen ($\frac{1}{8}$) hígított tej kis adagaival, melyek mennyiségét csak lassan, óvatosan, fokozatosan növeljük.

b) *Enterocatarrhus acutus*. Idősebb gyermekeknél: nyálkás húsleves, becsinált lé, a tehéntej mennyiségének csökkentése, esetleg elhagyása, a tehéntej hígítása makk-cacaóval (1—2 kk. egy csésze vízre) történhetik, zsirmentes táplálék, orosz tea, friss, egészséges ivóvíz, kevés vöröshor. A reconvalescentiában könnyen emészthető sovány hús, tehéntej makk-kávéval vagy makk-cacaóval.

c) *Enteritis acuta et chronica follicularis*. Csecsemőknél lehetőleg természetes táplálás (női tej). A tiszta tehéntejet ilyenkor nem tűrik a gyermekek. A gyermeklisztek vastagbél-folyamatoknál (NESTLE, KUFEKE, MELLIN) stb.) jól hatnak. Pl. a *Theinhardt-féle oldható gyermektápszer* is, mely tehéntejből és búzalisztból készül és 17% fehérjét, 50% oldh. szénhidrátot s csak 19% nem oldh. szénhidrátot tartalmaz. Ajánlatos a *Keller-féle* malátaleves, melynek készítése következő: 50 gm. búzaliszt egyharmad liter tehéntejjel forralás közben összekevertetik s átszűretik. Egy másik edényben 100 grm. *Löfflund-féle* malátaleves-kivonatot kétharmad liter vízzel keverünk. A két edény tartalmát összeöntjük, felforraljuk, esetleg öt adagra osztva sterilizáljuk. Súlyosabb vastagbél-folyamatnál több liszt vehető.

A második életévben előnnyel nyújtható a nyers hús. Zsirtartalmú tápszerek, így a tojás is, kerülendő.

d) *Enteritis choleraformis (cholera infant.)*. *Intoxicatio alimentaris*. Mesterségesen táplált csecsemőknél a rendes tápszer, a tehéntej kihagyandó s táplálék gyanánt 1—2 napig csak orosz thea (l. dyspepsia) nyújtandó néhány csepp cognac-kal, esetleg jégbe hűtve. Természetesen táplált csecsemőknél olykor az emlő is elvonandó s helyette 1—2 napig kizárólag orosz thea nyújtandó (ú. n. Hunger-diät). Mesterségesen tápláltnál ezután csak igen kevés, erősen hígított tejjel kezdjük meg a táplálást és annak mennyiségét csak lassan növeljük.

Alimento Theinhardt prae caeteris Cholera infantum et gastroenteritis certe sanantur.

Löfflund-féle malátaleves-kivonat gyomorbélbajos gyermekek részére, dr. Keller breslauer orvos előírása szerint. (L. hird.)

Kufeke-gyermekliszt. (L. hird.)

Liebe-féle neutralis tápszer a legkönny. emészth. gyermek-tápszer, melyből igen ízletes malátaleves készíth. és mely a fehérjeanyagok legn. kihaszn. közvet., gyomorbélzavarokat megakad., illetve meggyógyítja. (L. hird.)

Ramogen (Biedert Rahngemenge) lehetővé teszi a tök. individualizálást a gyomorbélbajos csecsemők és gyermek. kezelésénél, ezért jav. mindenf. emészt. zavarnál, kül. enterit. muc., nyári hasm., cholera infant. eseteiben. (L. hird.)

Ramogen

(a Biedert-féle tejsűrű neve) a leg-tökéletesebben felel meg azon igyekezetnek, hogy a tehén-

tej, a különbségek kiegyenlítése által, a női tejhez hasonlóvá tétessék:

- a) minőség szempontjából a fehérje, zsír és szénhidratok kedvező arányával 1 : 2·3 : 5 (női tejnél 1 : 2·2 : 4),
- b) mennyiség szempontjából az alvadék kedvező befolyásolásával (zsiradékhatás).

Kiváló hatások anyatej-hiány esetében, ha a csecsemő nem tűri a tehéntejet, ha emésztése gyöngye, ha nem gyarapszik, mindenféle emésztési zavaroknál, különösen enteritis mucosa, nyári hasmenés, cholera infantum stb. eseteiben.

BU-€O

(Buttermilch-Conserve rövidített elnevezése), értékes, dietétikus tápszer-készítmény tiszta, steril, állandó össze-

tételű, pontosan fixirozott savtartalmu és kitűnő aromájú irónak ex tempore való elkészítésére. Igen jól bevált a vékonybélnek és függelékeinek (fehérje- és zsirelégztelenség) megbetegedéseinél, továbbá fertőző, dysenteriás bélhurutok eseteiben és nagyon kedvelt mint póttáplálék hiányos tejelválasztásnál.

A t. orvos uraknak mintákat és irodalmat díjmentesen küld

**Oesterreichisch-ungarische
Milchwerke Gesellschaft m. b. H.
Linz a. d. Donau.**

Dr. Weinreich

„MALTOLECIN”

Az orvosi tekintélyek által mint leg-
jobbnek és legolcsóbbnak elismert

Lecithin-tápszer

tartalmaz garantálva tiszta tojássárgá-
ból készült, kb. 10% tiszta ovo-leci-
thint, 50 rész 20% lecithin-albumint.

Elismert kitűnő hatásu: Elgyöngülés-
nél, vérszegénységnél. Rachitissnél,
csecsemők táplálkozásánál, gyomor-
és anyagcsere betegségeknél, vér-
edényelmeszesedésnél és különösen

ideggyöngeségnél és
phthisisnél (tüdőtuberkulozissnál).

Főraktár Magyarország részére:

TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerháza

Budapest, Király-utca 12.

Kapható a nagyobb gyógyszerházakban és drogu-
eriákban; ahol nem kapható, szives-
kedjék a fentebbi főelárusító helyhez
fordulni.

Gyár: Chemische Werke Dr. Weinreich

Berlin, S. W. 61.

XVII. Hogy táplálja és gondozza az anya kisdédét?

Jó tanácsok anyák számára.*)

Ha azt akarjátok, hogy gyermekeitek egészségesek legyenek szoptassátok magatokat, mert a kisdéd legtermészetesebb és legjobb tápláléka az anyatej. Az anya tejétől fejlődik a csecsemő legjobban s az anyatej óvja meg azt legjobban mindenféle betegségtől. Minden egészséges anya tehát táplálja maga a gyermekét. Csak akkor nem szoptathat az anya, ha az orvos ettől eltiltja.

A hetedik hónap előtt nem jó a gyermeket elválasztani. A gondos anya, ha teheti, nyolcz-kilencz hónapig is szoptat. Az elválasztást óvatosan kell végezni. Lassan szoktassátok a csecsemőt a tehéntejhez, melylyel az anya tejét pótoljátok. A legmelegebb nyári hónapokban, a kánikulában veszélyes az elválasztás, mert könnyen támad hasmenés. Ha az elválasztás alatt vagy után hasmenést kap a gyermek, azonnal mutassátok meg az orvosnak, hogy a baj meg ne rögződjék.

Az első hetekben a csecsemőt napközben két óránként szoptassátok, későbbben három óránként. Éjjel nagyobb időközökben kell szoptatni, sőt törekedjete arra, hogy a gyermek minél hamarabb leszokjék az éjjeli szopásról.

Ha a csecsemő nem kaphat anyatejet, vagy ha nem fogadhatok neki jó szoptató dajkát, táplálékul legjobb a tehéntej. Szerzzetek neki jó tehéntejet, s vásároljátok azt olyan helyről, a hol a legtisztábban bánna a tehénnel és a tejjel. A tejet azonnal forraljátok fel és forralás után fődjétek le, nehogy piszok jusson belé; azután tegyétek hideg helyre. Ha a kicsikének adni akartok belőle, nem elég azt csak felmelegíteni, hanem újra fel kell abból annyit forralni, a mennyi egyszerre szükséges. Ez a sok forralás fáradtságos munka ugyan, de megjutalmaz azzal, hogy a gyermek egészséges marad.

A csecsemőnek a tehéntejet kezdetben vízzel keverve adjátok. Eleinte felerész vízzel higítsátok, később ha már két hónapos a gyermek, két rész tejhez egy rész vizet keverhettek. Hat hónapos korától kezdve a gyermek a tehéntejet tisztán, de mindig felforralva kapja. A víz, melylyel a tejet felhigítjátok, legyen tiszta

*) A magy. kir. Belügyministerium által kiadott: „Jó tanácsok terhesek, gyermekágyasok és anyák számára” című füzetecskéből vettük ki ezen jó népszerűen írt sorokat. Aranyszabályok ezek, melyekből okulhat minden orvos és elláthatja jó tanácsokkal az anyákat.

Loeflund-féle csukamáj-emulsio malátakivonattal, orvosilag legjobbnak elismert csukamájolaj-keverék, kapható vassal, mésszel, jóddal. (L. hird.)

Mellin-tápszer ideális keményítőmentes tápanyag egészséges és beteg csecsemők és gyermekek részére, 45 év óta használatban. (L. hird.)

víz, de még ezt is forraljátok fel, mielőtt a forralt tejhez vegyítitek. A tejet közönséges czukorral édesítétek meg. Egy szópó-palaczk tej megédesítésére egy czukorkoczká elégséges.

A legjobb szópóüveg az olyan, melyet a legtisztábban lehet tartani. A legjobb szópóüveg tehát az, melynél a palaczkra egyszerűen reá húzzák a szópókát. A szópóüveget nagyon tisztán kell tartani.

Ha a tejet nem issza ki egészen a csecsemő, a maradékot ne tegyétek félre a gyermeknek, hanem öntsétek ki az üvegből s a palaczkot mindjárt mossátok ki bő vízben tisztára. A szópókát használat után tiszta vízben jól ki kell áztatni; még jobb, ha néhány perczre forró vízbe teszitek. A kitisztított szópópalaczkot s a kiforralt szópókát tartsátok tiszta kendőben bekötve, hogy por ne lepje s be ne piszkolódjék.

Pépeket a gyermek csak hat hónapos korától kezdve kapliat. De közönséges lisztpépet sohase adjatok a gyermeknek, mert ez nem való az ő gyenge gyomrocskájának; beteg lesz tőle. Jó pépet készíthettek jól kisiütött zsemlyehéjából vagy kétszersültből (czvikbakk) úgy, hogy azt tejben jól megáztatjátok s azután az egészet felforraltjátok. Ilyen pépet naponta egyszer-kétszer adhattok a gyermeknek.


A gyermek első fogai a hetedik hónap körül szoktak kibujni. A harmadik év végéig mind a husz tejfog kinő. A fogzás maga nem teszi beteggé a gyermeket, s azért ha a fogzás alatt hasmenése, görcse vagy bármiféle más betegsége támad, forduljatok mielőbb orvoshoz, mert ha ilyenkor elhanyagoljátok, nagyobb baj is származhat.

Húst csak akkor adjatok a gyermeknek, ha már csaknem egy éves s ha már néhány fogacska van. A sült húst (legjobb ilyenkor a csibehús) jól összevagdalya és levessel leöntve adjatok. Egy éves gyermek lúsleveséhez már egy fél tojássárgáját is hozzákeverhetitek.

Czuczli nem kell a gyermeknek. Csúnya, rossz szokás a czuczli s veszedelmes is, mert hasmenést kap tőle a gyermek és szájában penész támad s ha már fogai vannak, azokat odvasokká teszi.

Abban a szobában, a hol a csecsemő van, a levegő mindig tiszta legyen. Dohos, fiüstös, poros, piszkos szobában nem lehet szép, egészséges gyermeket nevelni. Szeles vagy ködös napokon tartsátok szobában a csecsemőt, nehogy meghűljön. Téli időben csak négy hónapos korától kezdve vigyétek ki a szabadba, s akkor is csak a szebb és melegebb, verőfényes napokon és csupán a déli órákban. Hideg évszakban naplemente után a gyermek mindig a szobában legyen.

A Székely-féle gyermekei előállításánál a caseint nem víz hozzáadásával csökkentik, hanem egy részét szénsavnyomással kiválasztják, miközben a bacteriumok is kicsapatnak. A szénsav eltávolítása után, tejszin és tejcukor hozzáadása által a készítmény a női tejhez hasonló összetételű lesz. Főelőnye tehát, hogy idegen anyagot és káros bacteriumot nem tartalmaz és integritását sem vizezés, sem forralás nem változtatja meg.



PHOSPHATINE FALIÈRES

a gyermek legkiválóbb tápszere,
már a hatodik hónaptól kezdve,
különösen az elválasztás időszakában,
már könnyű emészthetőségénél fogva is.

A fogzást megkönnyíti
és biztosítja a csontrendszer fejlődését.

Kapható a gyógyszertárakban.

Magyarországi főraktár :

Zoltán Béla gyógyszertára
Budapesten,

hol kísérleti anyag az orvos urak részére
rendelkezésre áll.

A Székely-féle gyermektej a természetes anyatejhez hasonló összetételű tej, mely állandó állat-orvosi felügyelet alatt álló és tuberkulinra nem reagáló tehenek tejéből készül. A csecsemő individualitásához képest háromféle típusban kerül forgalomba: A 3. számú 3·3%, zsirt, a 2. számú 2·2%, zsirt, az 1. számú 1·1% zsirt tartalmaz. Ezenkívül az orvos bármely összetétellel rendelheti. Rendes körülmények között a 3. sz. gyermektej adható. (Zsir 3·3%, casein 1·2%, albumin 0·5%, cukor 6·3%, caloria pro L 630.) A zsiros tejet nem jól emésztő gyermekeknél a 2. sz. vagy az 1. sz. Székely-féle tej használható vagy pedig az orvos előírhatja a tej összetételét. A Székely-féle gyermektejet nem kell keverni vízzel. A csecsemők szívesen veszik és ép oly jól gyarapodnak tőle, mint a legjobb anyatej mellett. Anyatej mellett és elválasztásnál is igen jól használható.

tejhez hasonló összetételű tej, mely állandó állat-orvosi felügyelet alatt álló és tuberkulinra nem reagáló tehenek tejéből készül. A csecsemő individualitásához képest háromféle típusban kerül forgalomba: A 3. számú 3·3%, zsirt, a 2. számú 2·2%, zsirt, az 1. számú 1·1% zsirt tartalmaz. Ezenkívül az orvos bármely összetétellel rendelheti. Rendes körülmények között a 3. sz. gyermektej adható. (Zsir 3·3%, casein 1·2%, albumin 0·5%, cukor 6·3%, caloria pro L 630.) A zsiros tejet nem jól emésztő gyermekeknél a 2. sz. vagy az 1. sz. Székely-féle tej használható vagy pedig az orvos előírhatja a tej összetételét. A Székely-féle gyermektejet nem kell keverni vízzel. A csecsemők szívesen veszik és ép oly jól gyarapodnak tőle, mint a legjobb anyatej mellett. Anyatej mellett és elválasztásnál is igen jól használható.

A Székely-féle gyógytej hasonló módon készül

mint a Székely-féle gyermektej, de nagyobb zsirtartalommal. Összetétele: 4·5% zsir, 1·5% casein, 0·5% albumin, 4·5% cukor, caloria pro L 685. Kellemes, üdítő ízű, könnyen emészthető, tápduc tej, mely különösen betegeknek, lábadozóknak és általában gyöngye emésztésűeknek kitűnő táplálék.

A Székely-féle gyermek-gyógytej

a Székely-féle gyógytejhez hasonló, de kevesebb zsirt és több cukrot tartalmaz. Egy évesnél idősebb, gyöngye szervezetű gyermekek táplálására különösen alkalmas. ooooooooooooooooooooo

Kaphatók a

BUDAPESTI KÖZPONTI TEJCSARNOK SZÖVETKEZET

összes fiókjában.

Esetleges panaszok a központba VII., Rottenbiller-utca 31. szám intézendők. ooo Telefon-szám 57—04.

Ne engedjétek, hogy a gyermek az anyjával vagy mással egy ágyban háljon. Nagy ember kigőzölgése árthat a gyermeknek, de az is sokszor megesett már, a mitől Isten óvjon, hogy alvás közben az anya agyonnyomta gyenge kis magzatját. Ringató bölesőt ne használjatok. a ringatás árt a gyermeknek, mert elszédíti, elbódítja.

A csecsemő ruházata legyen egyszerű és könnyen változtatható. Valahányszor a gyermek vizes lesz, vagy magát összepiszkolja, a pelenkát cseréljétek ki szárazzal s a gyermeket mossátok meg. A pelenkák legyenek mindig tisztára kimosva. Csak úgy megszáritott pelenkát használni nem egészséges, mert bőrbetegséget kaphat a gyermek.

Az egészséges csecsemőnek naponta két-három széke van; — sárga, olyan, mint a sűrű pép és szaga ninesen. Ha a székelés zöld, túró, vizes, vagy olyan szagú, mint a záptojás, forduljatok orvoshoz, mert a gyermek emésztése megromlott.

Ha rendesen fejlődött a gyermek, körülbelül tíz hónapos korában már járni is kezd. A lábraállást és járást ne erőltessétek addig, míg a gyermek azt magától nem kezdi meg.

Az újszülött szemeire nagy ügyelettel legyetek. Ha a szem gyulladásos, bedagadt, gyenges, mielőbb orvoshoz kell fordulni. Sok gyermek azért vakult meg, mert szülői gondatlanok voltak s nem gyógyították mindjárt az ilyen szemgyuladást.

Fülfolyás csecsemőknél gyakran fordul elő. A fülfolyást sohase hanyagoljátok el, hanem mutassátok meg mielőbb az orvosnak, mert ha az hosszabb ideig tart, könnyen nagyothallás, sőt süket-ség is lehet a következménye.

Az újszülött köldöke 10 nap alatt rendesen begyógyul. Ha hosszabb ideig genyedezik s a bőr körülötte megpirosodik, mindjárt vigyétek orvoshoz, mert baj lehet belőle. Hat héten túl a csecsemő hasát körülpólyázni (fáslizni) nem kell. A pólya (fásli) legyen négy ujjnyi széles s legjobb, ha lágy vászonból van. Piszkos pólyát nem szabad használni.

A csecsemőt az első hónapokban karon fekvé hordjátok, úgy hogy a feje kissé magasabban legyen. Ha a csecsemő karon ülve és megtámasztva már hordozható, a párnából kivethetitek. Ha a csecsemő gyenge, különösen, ha gyengék, vékonyak a csontjai, a feliültetést hagyjátok későbbre, mert könnyen elgörbüli a kicsikének a háta s púpos lesz.

Ha a csecsemő nyugtalan, sír, az nem mindig annak a jele, hogy éhes, hanem hogy vagy rosszul fekszik, vagy be van szennyezve, vagy kólikája van. Ha a csecsemő nyugtalan vagy álmatlan, Isten ments, hogy mákfejből készíttetek neki altatót vagy czuczlit, mert könnyen megesik, hogy megmérgezik a gyermeket s akkor mint bűnösöknek törvény előtt kell felelnetek.

A csecsemőt legalább is az első hat héthen naponta fürösszétetek meg. Később is jól teszitek, ha mentől gyakrabban fürösztitek. A fürdővíz kellemes, langyos meleg legyen. Hideg, valamint túl-

Kaiser-féle gyermekliszt 60% oldódó szénhidrátot tartalmaz az összes gyermekliszttek között a legnagyobb százalékot. (L. hird.)

meleg fürdő egyaránt árt. Hogy a fejen a haj között kosz ne képződjék, a fürösztés alkalmával szappanozzátok azt is jól be. Ha koszos lett a gyermek, törekedjete a koszt mielőbb eltávolítani, mert az nem más, mint piszok s ha sokáig ott marad, a bőr kisebbedik. Ha szappanos vízzel a kosz nem jön le, kenjétek be bőven és többször tiszta olajjal, mert az olaj feláztatja s akkor azután könnyű lesz azt szappannal lemosni.

Ha az újszülött melle megdagad, ne nyomkodjátok, sőt ügyeljetek még arra is, hogy az ingecske se nyomja. A nyomogatás által könnyen gyuladásba jön az ilyen mell, s ebből nagyobb baj is támadhat. A mell daguata néhány nap alatt rendesen magától is elmulik.

Ha a csecsemőnél bárminemű világrahozott testi hibát láttok, vigyétek mielőbb orvoshoz.

A törvény megköveteli, hogy minden gyermek, mire egy éves lesz, be legyen oltva, hogy a súlyos és veszedelmes himlőbetegséget elkerülje. Vigyétek hát gyermekeiteket vonakodás nélkül az oltásra! Oltás előtt fürösszétek jól meg a gyermeket, hogy tisztán kerüljön az orvos elé; oltás után azonban pár napig ne fürösszétek, hanem e helyett mosdassátok meg jól minden nap. A beoltás helyén kis hólyag és körülötte piros udvar támad, — ügyeljete, hogy a gyermek vagy a ruha e hólyagocskákat el ne surolja s kivált, hogy azokhoz piszkos dolog ne érjen.

Az anya ezer szemmel nézze, ezer kézzel gondozza gyermekét, ezért azután az öröme is ezerszeres lesz.

XVIII. Tápanyagok és élvezeti anyagok értékét feltüntető táblázatok.*)

Az ember Caloria-szükséglete.

1. Felnőtt ember.

a) Absolut nyugalomban (pl. ágyban fekvő beteg):

Per óra és kgm.: 1 Caloria.

Tehát 70 kilós ember 24 óra alatt: 1700 Caloria.

b) Szobában tartózkodva, írás, olvasással foglalkozva energia-szükséglete 30—50%-al több, tehát 70 kilós ember 24 óra alatt: 2200—2550 Caloria.

c) 70 kilós fiatal, katonai szolgálatban álló egyének 24 órai szükséglete *nyugalmi napokon*: 2900—3000 Caloria.

Napi 25 km. menetelésnél (30 kgm.: teherrel) 4100—4200 Caloria.

d) Sportoló fiatal emberek (evezős versenyre trainirozók) napi szükséglete kb. 5000 Caloria.

e) Amerikai favágóké: 6000 Caloria.

* Nagyrészt König I., Bauer I., Hirschler és Terray, Zuntz nyomán.

Kaiser-féle gyermekliszt egészséges és beteg gyermekek részére tápláló és könnyen emészthető hozzáátétel a tejhez. (L. hird.)

2. Fejlődő ember.

a) Csecsemő:

Kora hetekben	Testsúly kilókban	Caloria- szükséglet 24 óra alatt	Caloria- szükséglet per kgm.
2	3·2	259	81
4	3·7	329	89
7	4·4	440	100
9	5·2	353	68
10	5·0	420	84
14	5·6	442	79
17	6·1	457	75
20	6·6	468	71
30	7·6	572	75

b) Gyermek:

Kora években	Testsúly kgmokban	Caloria- szükséglet 24 óra alatt	Caloria- szükséglet per kgm.
2—4	12·7	856	75·3
5—6	18	1380	76·7
7—10	24	1480	61·7
11—14	34	1611	47·4
15—16	52·8	2101	39·8
17—18	59·4	2239	37·7
Felnőtt	70·0	2240	32·0

Tápanyagok physiologiai értéke.

1 gm. Fehérje	= 4·1 Caloria.
1 gm. Szénhydrat	= 4·1 „
1 gm. Zsír	= 9·3 „
1 gm. Alcohol	= 7·0 „

Playfair szerint egészséges felnőtt ember napi tápanyagszükséglete:

	Fehérje	Zsír	Szén- hydrátok
Legkisebb szükséglet (fenntartási szükséglet)	57 gm.	14 gm.	340 gm.
Szükséglet nyugalomban	71 „	28 „	340 „
„ mérsékelt mozgásnál	119 „	51 „	530 „
„ erős munkánál	156 „	71 „	567 „
„ erőltető munkánál	184 „	71 „	567 „

Húsfélék és állati egyéb anyagok tápértéke.

H ú s f é l e	Víz	N. tartal- mú anya- gok	Zsír
Igen kövér ökörhús	54·76%	16·93%	27·23%
Közép „ „	72·25 „	21·39 „	5·19 „
Sovány „ „	76·61 „	20·61 „	1·50 „
Kövér tehénhús	70·96 „	19·86 „	7·70 „
Sovány „ „	76·35 „	20·54 „	1·78 „
Sovány borjúhús	78·82 „	19·76 „	0·82 „
Kövér „ „	72·82 „	18·88 „	7·41 „
Közép-kövér juhús	75·99 „	18·11 „	5·77 „
Igen „ „	47·91 „	14·80 „	36·39 „
Özhús	74·63 „	19·24 „	1·3 „
Nyúlhús (mezei)	74·16 „	23·34 „	1·07 „
Kövér sertéshús	47·40 „	14·54 „	37·34 „
Sovány „ „	72·57 „	19·91 „	6·81 „
Kövér sódar	48·71 „	15·98 „	34·62 „
Sovány „ „	69·60 „	20·97 „	8·29 „
Sovány tyúkhús	76·22 „	19·72 „	1·42 „
Kövér „ „	70·06 „	18·49 „	9·34 „
Fiatal hizott kakas húsa	70·03 „	23·32 „	3·15 „
Hizott liba húsa	38·02 „	15·91 „	45·59 „
Fogolyhús	71·96 „	25·26 „	1·43 „
Galambhús	73·00 „	22·14 „	1·00 „
Csukahús	83·89 „	14·81 „	0·15 „
Folyami sügér húsa	80·06 „	18·11 „	0·44 „
Pontyhús	76·97 „	21·86 „	1·09 „
Lazaczhús (folyami)	74·36 „	15·01 „	6·42 „
Füstölt marhahús	47·68 „	27·10 „	15·35 „
„ marhanyelv	35·74 „	24·31 „	31·61 „
„ sonka	28·11 „	24·74 „	36·45 „
Vér	80·82 „	18·12 „	0·18 „
Tüdő	79·89 „	15·21 „	2·47 „
Szív	72·54 „	18·81 „	8·03 „
Vese	75·55 „	18·43 „	4·45 „
Máj	71·62 „	19·91 „	3·65 „
Lép	75·47 „	17·77 „	4·19 „
Nyelv	67·44 „	14·29 „	17·18 „

A marhának legértékesebb része az át nem nőtt (nem inas) eleje és az ú. n. hátsó negyede (farrészek), valamint a nyaki és az ágyéki részek; legértéktelenebb az átnőtt, inas mellő rész.

Görcsövek, mikrotomok, polarizációs és projectiós készülékek a legjobb minőségben és különféle árakon kaphatók: C. Reichert, Wien és Budapest. (L. hird.)

A borjúnak legértékesebb része a szegydarab, a nyaki carbonade és bordacarbonade; legkevéssbbé tápláló a vesés.

Tejfélék tápértéke.

Tejféle	Víz	Cásein	Albu- min	Zsír	Tej- cukor	Sók
	százalékokban					
Tehéntej nem fölözött	87·41	3·01	0·75	3·66	4·92	0·70
Kecsquetej	86·91	2·87	1·19	4·09	4·45	0·86
Juhtej	81·63	4·09	1·42	5·83	4·86	0·73
Kanczatej	90·71	1·24	0·75	1·17	5·70	0·37
Fölözött tehéntej	90·63	3·06		0·79	4·77	0·76
Tejsavó átlag tehen és juhtejből	93·31	0·82		0·24	4·98	0·65
Budapesti tejsarnok teljes teje	88·06	3·302		3·414	3·86	0·767

Sajtok tápértéke.

Sajtféle	Víz	N. tart. anyag	Zsír	Extract anyagok
	százalékokban			
Zsíros sajt	35·75	27·16	30·43	2·53
Félzsíros sajt	46·82	27·62	20·54	2·97
Savány sajt	48·02	32·65	8·41	6·80
Breznóbányai túró (diptói)		24·25	32·19	
„ ostyepka		22·94	32·38	

Zsíros sajtok az Imperial, Roquefort, Eidami, Emmenthali, félzsíros a Gruyères (gróji), Brie; sovány a Parmesan, Neufchatel.

Tojás tápértéke.

a) Tyúktojás súlya átlag 50 gm., ebből 7 gm. a héja, 27 gm. a fehérje, 16 gm. a sárgája.

b) Tyúktojás-fehérjében van: 85·75% víz, 12·67% fehérje, 0·25% zsír, 0·59% hamu.

Górcsővek, mikrotomok, polarizációs és projectiós készülékek a legjobb minőségben és különféle árakon kaphatók: C. Reichert, Wien és Budapest. (L. hird.)

c) Tyúktojás-sárgájában van: 50·82% víz, 16·24 N. tart. anyag, 31·75% zsír, 1·09% hamu.

d) Kaviarban van: 45·05% víz, 31·90% N. tart. anyag, 14·14% zsír, 8·91% sók (főleg $NaCl$.)

Lisztfélék tápértéke.

Lisztfélék	Víz	N. tart. anyag	Zsír	Keménye, cukor, gummi	Cellulose	Hamu
	s z á z a l é k o k b a n					
Legfinomabb búza- liszt	14·86	8·91	1·11	74·28	0·33	0·52
Durvább búzaliszt	12·18	11·27	1·22	73·65	0·84	0·84
Búzadara	12·52	10·43	0·38	75·95	0·22	0·50
Finom rozsliszt	13·99	10·22	1·64	73·54	0·64	0·98
Durva „	14·77	11·06	2·09	67·78	2·61	1·69
Finom árpadara	14·83	10·89	1·23	71·85	0·47	0·63
Durva dara	12·82	7·25	1·15	76·19	1·36	1·23
Kukoriczaliszt	10·60	14·0	3·80	70·68		0·86
Rizsliszt	14·10	7·43	0·89	77·62		

Kenyér tápértéke.

Kenyérféle	Víz	N. tart. anyagok	Zsír	Cukor	N. nélküli extract anyagok	Cellulose	Hamu
	s z á z a l é k o k b a n						
Friss, fehér búza- kenyér	38·51	6·82	0·77	2·37	40·97	0·38	1·18
Friss, feketébb bú- zakenyér	41·02	6·23	0·22	2·13	48·69	0·62	1·09
Zsemlye fehér	37·0	8·1	1·6	3·6	47·4	—	2·3
Kenyér, friss	44·02	6·02	0·48	2·54	45·33	0·30	1·31
Graham kenyér	33·93	11·28	1·01		52·47		1·30

Simons-kenyér (malátás rozskenyér) úgy készül, hogy a rozs előbb a maláta hatásának tétetik ki, miáltal az oldhatatlan keményítő részben maltosere, a fehérje pedig oldékony peptonra változik át. (L. hird.)

Hüvelyesek tápértéke.

Hüvelyes-féle	Víz	N. tart. anyagok	Zsír	Keménye, cukor	Cellulose	Hamu
	s z á z a l é k o k b a n					
Mezei bab	14·84	23·66	1·63	49·25	7·47	3·15
Kerti bab	13·60	23·12	2·28	53·63	3·84	3·53
Borsó	14·31	22·63	1·72	53·24	5·45	2·65
Lencse	12·51	24·81	1·85	54·78	3·58	2·47

Gyökérfélék tápértéke.

Gyökérféle	Víz	N. tart. anyag	Zsír	Keményítő, cukor	N. nélküli extr. anyag	Cellulose	Hamu
	s z á z a l é k o k b a n						
Burgonya	75·77	1·79	0·16	20·56	—	0·75	1·95
Murokrépa	88·32	1·04	0·21	1·60	7·26	0·95	0·71
Fehér répa	91·24	0·96	0·16	4·08	1·90	0·91	0·75
Vörös répa	87·07	1·37	0·03	0·54	9·02	1·05	0·92
Kalaráb	85·01	2·97	0·22	0·40	8·45	1·76	1·21
Czeller	84·09	1·48	0·39	0·77	11·03	1·40	0·84
Apró retek	93·34	1·23	0·15	0·88	2·91	0·75	0·74
Hagyma	85·99	1·68	0·10	2·78	8·14	0·71	0·70

Hygiama vires reconvalescentium reficit brevi tempore.

Górcsővek, mikrotomok, polarizációs és projectiós készülékek a legjobb minőségben és különféle árakon kaphatók: C. Reichert, Wien és Budapest. (L. hird.)

Pontosán járó órák orvosok részére a legjobb minőségben „részletfizetésre is“, kaphatók Magyarország első, legnagyobb és legjobb hírnevű óraüzletében, Brauswetter János mű-órásnál, Szeged. (L. hird.)

Zöldség-neműek tápértéke.

Zöldség-neműek	Víz	N. tart. anyagok	Zsír	Cukor	Egyéb N. nélküli anyagok	Cellulose	Hamu
százalékokban							
Káposzta (nem savanyított)	89.97	1.89	0.20	2.29	2.58	1.84	1.23
Vörös káposzta	80.06	1.83	0.19	1.74	4.12	1.29	0.77
Carfiol	90.09	2.53	0.38	1.27	3.74	0.87	0.82
Kelkáposzta őszi	80.03	3.99	0.90	1.21	10.42	1.88	1.57
Spenót	90.26	3.15	0.54	0.08	3.28	0.77	1.94
Endívia	94.13	1.76	0.13	0.76	1.82	0.62	0.78
Fejes saláta	94.32	1.41	0.31	—	2.19	0.73	1.03
Spárga	93.33	1.98	0.28	0.40	2.34	0.14	0.54
Zöld borsó	80.49	5.75	0.50	—	10.86	1.60	0.80
Zöld bab	88.36	2.77	0.14	1.20	6.82	1.14	0.57

Gombafélék tápértéke.

Gombaféle	Víz	N. tart. anyag	Zsír	Cukor és Mannit	Egyéb szén-hydrat.	Cellulose	Hamu
százalékokban							
<i>A) Frissen.</i>							
Champignon (csi-perke, v. urigomba v. veres galócza)	91.11	2.57	0.13	1.05	3.71	0.67	0.76
Szarvasgomba (trüffli)	72.8	8.91	0.62	—	7.54	7.92	1.21
Kucsmagomba (morchella escul.)	90.0	3.48	0.24	0.72	3.95	0.67	0.94
Tinórú v. hiripi gomba (boletus edulis).	90.79	3.83	0.15	1.0	3.63	0.87	0.95
<i>B) Száritva.</i>							
Champignon (csi-perke)	17.54	23.84	1.21	9.59	34.56	6.21	7.05
Szarvasgomba (trüffli)	17.0	27.18	1.89	—	23.05	24.16	6.72
Kucsmagomba (morchella escul.)	19.04	28.48	1.93	5.80	31.62	5.50	7.63
Tinórú v. hiripi (boletus edulis)	12.81	36.12	1.72	4.47	32.79	5.71	6.38

Friss gyümölcsfélék tápértéke.

Gyümölcsfélé	Víz	N. tart. anyagok	Szabad sav	Cukor	Egyéb N. nélküli anyagok	Cellulose és mag	Hamu
	s z á z a l é k o k b a n						
Alma	83.58	0.39	0.84	7.73	5.17	1.98	0.31
Körte	83.03	0.36	0.20	8.26	3.51	4.30	0.31
Szilva	84.86	0.40	1.50	3.56	4.68	4.34	0.66
Őszi barack	80.03	0.65	0.92	4.48	7.17	6.06	0.69
Kajszinbarack	81.22	0.49	1.16	4.69	6.35	5.27	0.82
Szőlő	78.17	0.59	0.79	24.36	1.96	3.60	0.53
Cseresznye	80.26	0.62	0.91	10.24	1.17	6.07	0.73
Eper, földi	87.66	1.07	0.93	6.28	0.48	2.32	0.81
Málna	86.21	0.53	1.38	3.95	1.54	5.90	0.49
Pöszméte	85.74	0.47	1.42	7.03	1.40	3.52	0.42
Ugorka	95.60	1.02	—	0.95	1.33	0.62	0.39
Sárgadinnye	95.21	1.06	—	0.27	1.16	1.07	0.63

Aszalt gyümölcsfélék tápértéke.

Gyümölcs- félé	Víz	N. tart. anyagok	Zsir	Szabad sav	Cukor	Egyéb N. nélküli anyagok	Cellulose és mag	Hamu
	s z á z a l é k o k b a n							
Alma	27.95	1.28	0.82	3.60	42.83	17.0	4.95	1.57
Körte	29.41	2.07	0.35	0.84	29.13	29.67	6.86	1.67
Szilva	23.00	2.35	0.53	3.72	44.35	17.89	1.48	1.38
Cseresznye	49.88	2.07	0.30	—	31.22	14.29	0.61	1.63
Mazsola	32.02	2.42	0.59	—	54.56	7.48	1.72	1.21
Füge	31.20	4.01	1.44	1.21	49.79	4.51	4.98	2.89

Górcsővek, mikrotomok, polarizációs és projectiós készülékek a legjobb minőségben és különféle árakon kaphatók: C. Reichert, Wien és Budapest. (L. hird.)

Pontosan járó órák orvosok részére a legjobb minőségben, részletfizetésre is, kaphatók Magyarország első, legnagyobb és legjobb hírnevű óratizletében, Brauswetter János műórásnál. Szegeden. (L. hird.)

Mandula, dió, mogyoró, gesztenye, chocolate tápértéke.

	Víz	N. tart. anyagok	Zsír	Szénhyd- rátok	Cellulose	Hamu
	s z á z a l é k o k b a n					
Édes mandula	5.39	24.18	53.68	7.23	6.50	2.96
Dió	4.68	16.37	63.86	7.89	6.17	2.03
Mogyoró	3.77	15.62	66.47	9.03	3.28	1.83
Gesztenye frissen	51.48	5.48	1.37	38.34	1.61	1.72
Chocolate	1.55	5.06 theobro- min is közte	15.25	63.81 cukor	1.15	2.15

*Fontosabb tápanyagaink Caloria-értéke és ára
1912-ben Budapesten.*

Anyag	100 gm anyag Calo- ria-értéke	Ára per kgm. fillér	3000 Caloria ára fillér
<i>Húsfélék:</i>			
Zsíros marhahús	340	270	242
Középszíros marhahús	137	248	544
Sovány marhahús	101	222	660
Zsíros borjúhús	148	360	725
Sovány borjúhús	89	230	775
Zsíros disznóhús	406	240	177
Sovány disznóhús	146	200	410
Csirke	129	232	539
Liba	470	240	100
Őzhús	99	288	872
Nyúlhús	106	400	1132
Füstölthús	254	280	330
<i>Tojásfélék:</i>			
Tyúktojás	167	240	432
Kaviár	250	7200	8640
<i>Tej és tejtermékek:</i>			
Anyatej	69	—	—

Csirke és libánál $\frac{1}{8}$ súly a csontokra esik, ami a számításban figyelembe vétetett.

Anyag	100 gm anyag Calo- ria-értéke	Ára per kgm. fillér	3000 Caloria ára fillér
Tehéntej	67	30	134
Vaj	783	360	138
Emmenthali sajt	404	320	237
Hollandi sajt	389	320	246
<i>Zsirok:</i>			
Disznózsir	930	180	58
Margarin	919	200	73
<i>Növényi táplálékok:</i>			
Búza liszt	349	35	33
Rozs liszt	346	30	26
Árpa dara	338	56	49
Kukoricza liszt	365	36	29
Rizs	355	64	54
Bab (száraz)	315	40	38
Borsó (száraz)	330	52	47
Lencse (száraz)	341	72	63
Burgonya	95	8	25
Zöld borsó	83	150	542
Spárga	19	100	1578
Paraj	35	60	514
Fejes saláta	18	60	1000
<i>Gyümölcs félék:</i>			
Alma	52	40	230
Szilva	62	14	67
Aszalt szilva	270	90	100
Szőlő	66	60	272

Élvezeti italok összetétele.

A) *Fekete kávéban*, ha azt közönséges módon készítik, átlag 1,74% coffein van.

B) *Orosz teában*, ha azt közönséges módon készítik, átlag 1,35% coffein van.

C) *Cognac*, arca szesztartalma 60 vol. % körüli, legtöbbször fölüli.

D) *Liqueur-ök* szesztartalma 45—50 vol %.

E) *Borok*.

A borok fajta, évfolyam, termőhely, készítés, kezelés szerint igen változó szesz, sav, extractiv anyag, cukor és hamu, valamint aethericus olajtartalmúak,

Általában a következőket jegyezhetjük meg:

Górcsővek, mikrotomok, polarizációs és projectiós készülékek a legjobb minőségben és különféle árakon kaphatók: Optische Werke C. Reichert Wien és Budapest. (L. hird.)

A főhatóanyag a szesz; e mellett tekintetbe jöhet a czikor, mely főleg az aszúborokban, a cersav, mely főleg a piros borokban (0,15–0,25%) s a szabad sav, mely főleg a fehér asztali és peesenyeborokban (0,4–0,7%), foglaltatik tetemesebb mennyiségben,

Hazai közönségesebb fehér asztali boraink 6–8 vol. % szeszt, fehér peesenyeborok 9–12 vol. % szeszt tartalmaznak; közönségesebb piros borok 8–9 vol. %, nemesebbek 91–3 vol. % szeszszel bírnak. Az aszúborok szesztart. 12 vol. %-on felüli; legerősebbek a Sherry, Madeira, Marsala, fehér és piros Port, melyekben 20 vol. %-felül, gyengébbek a Malaga s a Tokai, melyekben 11–17 vol. % között van szesz. A pezsgők szesze 10–12 vol. % közt ingadozik, ezeknél a szénsav is számításba veendő hatás tekintetében. A nálunk még alig szereplő almaborok 5–7 vol. % szeszt tartalmaznak, ezenkívül jelentékeny mennyiségű almasavat.

F) Sörök.

	Viz	CO ₂	Szesz vol. %	Fehérje	Extract anyag	Hamu
Téli sör	91·81%	0·23%	3·21%	0·81%	4·99%	0·20%
Nyári sör	90·71 „	0·22 „	3·68 „	0·49 „	5·61 „	0·23 „
Dupla márcziusi	88·72 „	0·25 „	4·07 „	0·71 „	7·31 „	0·27 „
Porter és Ale	88·52 „	0·21 „	5·16 „	0·73 „	6·32 „	0·27 „

XIX. Acut mérgezések kezeléséről.*)

Gyomron át történt mérgezés eseteiben első dolog a mérget a gyomorból, belekből eltávolítani. A gyomorból eltávolíthatjuk *gyomormosással és hánytatással*. Nagyobb tömeget képező mérges anyagok, p. o. gombák, magvak, bogyók könnyebben távolíttatnak el hánytatással, a poralakú mérgek vagy méregoldatok azonban, p. o. phosphor, arsen, morphin stb. gyomormosással. Kénsav-, salétromsav-, sósav-, kalihíg-, natronhíg-mérgezésnél hánytató rendelkezése nincs szükség, gyomormosás csak puha sondával, a legnagyobb óvatossággal kísérhető meg az első félórán belül (perforatio veszedelem!); később nincs sok értelme és veszedelem nő. Bő víztitítás is indikált, ha a nyelés nem lehetetlen.

Görcsös állapot, trismus esetén csak elővigyázatos szájterpesztés mellett lehet gyomrot mosni; öntudatlanság, coma vagy trismus esetén mindig a mosás s nem a hánytatás indikált az aspiratiós pneumoniák elkerülése végett; mély bódulatban a hánytatók ren-

*) Ezen fejezetett dr. Vámosy Zoltán tanár úr volt szíves átadni és átdolgozni.

Górcsövek, mikrotomok, polarisációs és projectiós készülékek a legjobb minőségben és különféle árakon kaphatók: C. Reichert, Wien és Budapest. (L. hird.)

desen nem is latnak. Addig, míg a gyógytárból hánytatók érkeznek, a hányást a garatnak ujjal, olajos tollal izgatása útján idézzük elő, vagy meleg olajat, olvasztott vaját itatunk (kőrisbogár- és phosphor-mérgezésnél zsírok tiltva vannak); sok meleg víz itatása, burnót, mustárliszt, konyhasó nyelése is czélhoz vezethetnek (az utóbbi corrosívval és hánytató borkővel történt mérgezésnél tilos). Medicinalis hánytatónak legjobb az apomorphinum hydrochlor. (0,01—0,02) bőr alá fecskendése; rendelkezők pulv. ipecac., cupr. sulf., tartar. emet. is. Phosphor-mérgezésnél mindig cupr. sulf. legyen a hánytató. A belekből az esetleg oda jutott mérgeket gyorsan ható hashajtókkal távolítjuk el, a melyek azonban az ismételt magas bélbeöntéseket soha sem teszik fölöslegessé. Kőrisbogár-mérgezésnél, némelyek szerint phosphornál sem szabad hashajtóul ol. ricini-t rendelni. — További feladat, hogy a gyomorban vagy belekben még ottmaradt mérget ártalmatlanná tegyük. Ezt *vegyi ellenszerekkel* (*antidota chemica*) tehetjük meg, melyek a mérget v. vízben oldhatlan vegyületbe, vagy vízben oldható, de a testre ártalmatlan, különösen helybelileg ártalmatlan, vagy az eredeti méregnél kevésbé ártó vegyületbe viszik át. Nem szabad oly anyagokat adnunk ellenszerül, melyek magukban véve is erős mérgek. A vegyi ellenszereket igen gyakran előbb adjuk, mert hamarabb vannak kéznél s azután ürítjük vagy üríttetjük ki a gyomrot és beleket.

Vegyí ellenszerek: kénsav-, salétromsav-, sósav-, eczetsav-mérgezésnél a magnes. usta, natr. bicarb., tojáshéj, kréta, fehérje, tej, szappanvíz; arsén-készítményekkel vagy chromvegyületekkel való mérgezésnél az antidotum arsenici (vasoxydhydrat); oxalsav- és carbol-mérgezésnél az aqua calcis saccharata, calc. carb. praecipitatum, czukormész; kéksav-, cyankalium-mérgezésnél kalium hypermangan., natr. thiosulfat ($\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{500}$ -os) oldata; lúg-mérgezéseknél eczet, citromlé, zsírok; phosphor-mérgezésnél sárga terpentinelaj, cupr. sulfur, kalium hypermanganicum ($\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{500}$ -os) oldatai (l. ezen cz. alatt a vénygyűjteményben); pokolkő-mérgezésnél konyhasó; fém-sókkal mérgezéseknél általában fehérje, tej, carbo animalis, tannin; alcaloidákkal és mérges glycosidákkal mérgezéseknél tannin, jodjodkalium (híg Lugol-oldat), kalium hypermang., carbo animalis.

A vegyi ellenszerek alkalmazása után, ha mérgezési tünetek jelentkeznek (p. o. atropin-, morphin-mérgezésnél), a dynamicus vagy pharmacologicus ellenszerekkel való kezelésnek van helye, a mit a vitalis központok, a szív fenyegetett volta fog főképen irányítani, de a minek okszerűen ki kell terjednie a méreg hatás minden súlyosabb következményének enyhítésére és gyógyítására (gastroenteritis, vesegyulladás, nagy izgalom, görcsök stb.). Hosszú öntudatlanságnál ne feledkezzünk meg a vizelet lecsapolásáról, a vízszükség kielégítéséről (0,9% sós csőrékkel, infúsiókkal) és a tápcsőrékről, a hőcsökkenés meggátlásáról.

*

Femel-készülék, legolcs., legjobb destilláló-apparat. csiramentes, párolt víz előállítására, nélkülözhetetlen gyak. orvosok, bakteriológusok, gyógyszerészek részére. (L. hird.)

Acut mérgezések tünetei és kezelése.

M é r e g	T ü n e t e k	K e z e l é s
Acidum carbolium.	Fájdalom a gyomortájón, hányás, collapsus, coma, carbolszagú fehér pörkök.	Gyomormosás, aqua calis saccharata. krét, cukorinész, fehérjég, ricinus.
Acidum oxalicum és oxalsavas sók.	Hányás, hányadék feketés (haematin), fájdalom a gyomor és epigastriális tájon, bőr hideg, nyirkos, rossz szív működés, hitvány pulsus; arczrángások, izomremegés, sokszor rángógörcsök és eszméletlenség. Később vesegyulladás, uraemia!	Hánytatás, gyomormosás, aqua calis saccharata, kréta, se magn. usta. 2 g. c chlorid 1 ltr. phykonyhasóoldatban vénába életmentő lehet.
Acidum sulfuricum (vitriol). Acid. nitricum. Acidum hydrochloricum. Acid. aceticum. Aconitum vialfajok (Sisakvirág.) Aconitin.	<p>Száj, torok megmart, nyelési képtelenség, fájdalom a gyomor- és hastájón, esetleg peritoneitis tünetei; hányás, csuklás, hasmenés, convulsiók, kicsiny, gyér pulsus, collapsus</p> <p>Tünetek gyorsan fejlődnek ki. Égő érzés a számban, nyálfolvás, cardialgia, hányás, hasmenés, nyelv és ujjak érzéketlenek, hangyamászás, szédülés, mydriasis, vakság, némaság, sükettség, főfájás, arczfájdalmak, pulsus gyér, légzés nehéz, eszméletlenség, görcsök. — Néha az eszmélet megmarad.</p>	<p>Magn. usta, fehér, tej, szappanvíz, övtes gyomormosás. Kréta, natr. bicarb. kevésbé jók, még sok szénsavat felszelenek. Tüneti kezelés. (Antiphlogos excitantia.)</p> <p>Gyomor és belek ürítése. — Ka. p. mang. Carbo animalis, tannin (?) jó. Jódkalium (?) Excitantia (cognac, aeth. camphora).</p>
Aether sulf.	Hypnosis, anaesthesia totalis, asphyxia; ha a szív nem ver, életmentés kétséges. (Esetleg 1 mlgr. adrenalin és erőlyes szívmasszage eredményes.)	Mesters. légzés, ne phrenici villamozás, strychnin nitr. c. feinsók bőr alá fekendése, bőr izgatdörzsöléssel. hid. v. zel, mustárszesz:
Agaricus muscarius (Légygomba. Gomba atropin (muscarin?)	Részegség, bódultság, azaz piro, duzzadt, tág pupilla, látási zavarok, delirium, görcsök, pulsus szapora, kicsi, végül comában halál. Hányás ritka, hasmenés még ritkább.	Hánytatók, esetleg gyomormosás, ricin. Vegyi ellenszer nitr. Szívecxiciantiák.

M é r e g	T ü n e t e k	K e z e l é s
alkaliák (marók), mint kálilúg, natronlúg, ammoniá, maró szóda.	Száj, nyelv duzzadt, vörös, nagy fájdalom a sternum mentén és gyomorban, kólika, nyúlós-véres-alkaliás kémhatású hányadék és székletét, collapsus; ammoniánál göresők.	Ecet, citromlé, zsirok, jéglabdacsok. — Fájdalmak enyhítése opiátokkal. Óvatos gyomormosás.
alkohol és azt tartalmazó italok.	Psychikai és mozgási incoordinatio, hányás, gyér és kicsiny érverés, hányadék s lehellet borszesz-szagú. Súlyos esetben öntadatlanság, reflexhiány, mély coma.	Apomorphin v. gyomormosás. — Szabad levegő, meleg ledörzsölések hideg leöntésekkel. — Excitantia, ol. camphor., coffeinsók, strychnin, nitr. bőr alá fecsk.), erős fekete kávé.
antimon-készítmények, köztük a hánytató borkő.	Emelygés, fémíz, bő expectoratio, csillapíthatlan hányás, fájdalom a nyelésnél, gyomor- és hasfájdalom, hasmenés, choleraszerű szék, szapora, kicsi pulsus, dyspnoe. Hideg bőr, szédülés, coma, ikra izomgöres, convulsiók. Collapsus.	Gyomormosás, tannin, erős orosz tea, fekete kávé, jéglabdacsok, opiátok.
argentum nitricum (pokolkő.)	Marásjelei a szájban, torokban, hányás, a hányadék fehér, majd megfeketedik, hasmenés, gyomor- bélfájdalmak. Később szédülés, convulsiók, hűdés.	Konyhasó, tej; gyomormosás; karlsbadi só.
arsenessav, (arsenicum, egérkő) és más arsen-készítmények.	Kaparó érzés a torokban, szomj, nyelés nehezített, nagy fájdalom a gyomor és alhasi tájakon, hányás, hasmenés, rizslészerű vagy dysenteriaiás székletét, tenesmus, kevés és néha véres vizelet. Szédülés, főfájás, gyenge, szabálytalan, szapora érverés, cyanosis, bőr hideg, ájulások, coma, convulsiók, általános hűdés.	Emetica, gyomormosás, antidotum arsenici, magn. usta in aqua. — Kerülendők alkaliák, fehérje. — Tüneti eljárás.

Pontosan járó órák orvosok részére a legjobb minőségben, részletfizetésre is, kaplatók Magyarország első, legnagyobb és legjobb hírnevű óraiizletében, Brauswetter János műtőrásnál, Szegeden. (L. hird.)

M é r e g	T ü n e t e k	K e z e l é s
Baryum-készítmények (chlorbaryum, szénsavas baryum, baryt-hydrát).	Hányás. nagy hasmenés, rohamos izomgyengeség a teljes bénulásig, gyér és hitvány pulsus, collapsus; főfájás, fülzúgás, szédülés, kettős látás, tág pupilla, ischuria.	Emetica, gyomormosás, natrium sulf. magn. sulf. 2:100 natr. sulfat 1–2 c. adrenalinul vénát életmentő lehet.
Belladonna és készítményei (maszlagos nadragulya). Atropin.	Szárazság szájban és torokban, nyelési nehézség, arczon és a bőrön skarlátpiros foltok, ütőerek erősen lüktetnek, pulsus igen szapora, pupilla igen tág, szemek kidülledtek, accomodatio-zavarok, főfájás, szédülés, bódultság, hallucinatioók, lármás nevetés, jó kedv, furibund delirium, járás nehéz, izomgyengeség. Ritkán heves convulsiók, trismus. Végül mély coma.	Hánytatás, gyomormosás, tannin, jodkalium carboanalis, pilocarpinum. bőr alá (0.02) míg nyálazás és izzadás nem mutatkozik. Nagy adag morphia delir. és görcs szüntetése. Comában szivtonicumok (digitalin, camphor, adrenalin).
Datura Stramonium és készítményei (maszlagos redőszírom).		
Hyosciamus és készítményei, beléndék.		
Cantharides (kőrisbogár). Cantharidin.	Fájdalom a nyelvben, garatban, hárszingban, gyomorban; hólyagok a szájban. Hányás, hasmenés, esetleg véres szék, stranguria, haematuria, fájdalom a priapismus, főfájás, bódulat, delirium, convulsiók. Glomerulo-nephritis, anuria.	Gyomormosás, mucilago gummi arabici, nyákos főzetek, jód, labdacok, morphia bódulat esetén extansok. — Kerüld zsírokat, olajokat, tölgyet! Később erős izzasztás, diuret. salin.
Chlorgáz és savgőzök. Ammonia-gőzök	Spasmus glottidis, kínzó köhöges, fuldoklás, fájdalom a sternum mentén. Haemoptoe. 5–6 óra múlva rohamosan bronchopneumonia, tüdővízenyő.	Friss levegő, natrium bicarb.-spray belélegezése. Ammonia esetén borsavpermeter.
Chloralhydrat.	Mély álm. esetleg reflexhiány. Szívgyengeség, mely szívhűdéssel fenyeget.	Emetica. — Strychninum nitr. coffeinum bőr alá fecsk. Bőrizgatása dörzsöléssel hideg vízzel locsolással, mustárszeszszal.
Chloroform.	Hypnosis, anaesthesia totalis, asphyxia. Ha a szív nem ver, életmentés kétséges.	L. aether.
Cicuta virosa (gyilkos csomorika).	Émelygés, hányás, hasfájdalom, szédülés, bódultság, meiev és tág pupilla, gyenge pulsus, rohamokban epilepsiaszerű görcsök.	Hánytatás, gyomormosás, hashajtók. — Tannin. — Paraldehyd chloralhydrat v. chloroform-narcosis.

M é r e g	T ü n e t e k	K e z e l é s
Cocainsók.	Szédülés, elhalványulás, émelygés, ájulási érzés, praecordialis félelem, légszomj, szapora érverés, szívdobogás, lelki izgatottság, gyengeség, remegés, agrypnia. Súlyos esetekben mydriasis, coma, gyér légzés és érverés.	Gyomormosás, emetica, ka. permang., jodjodkalium. Amylnitrit-belégzés az agyi edénygörcsöt megszünteti. Súlyos esetben a légzés és szív bénulása ellen küzdünk.
Colchionum (őszi kikirítés). Colchicin.	Tünetek 2—3 óra múlva. Égő érzés a szájbán, fojtó érzés a torokban. szomj, gyomorfájás, kólika, hányás, hasmenés, néha véres szék, praecordialis félelem, szédülés, bódultság, delirium, gyengeség, kicsiny, szabálytalan pulsus, gyengébb convulsiók, collapsus.	Hánytatás, gyomormosás, hashajtók. — Tannin, jodjodkalium. Excitantia. Digalen.
Conium maculatum (foltos bűrrök). Coniin.	Szédülés, csekély bódultság, pupilla tág, nyálfolyás, nagy izomgyengeség, clonicus convulsiók, respir. nehéz, pulsus gyér. Néha hányás, hasmenés.	Gyomor kiürítése. — Tannin, jodjodkalium, carbo animalis, excitantia, mesterséges légzés.
Cuprum-készítmények, akár oldhatók vízben, akár nem	Tünetek gyakran órák múlva. Kellemetlen fémérzés a szájbán, émelygés, hányás. Hányadék zöldes v. kékes, kólika, hasmenés, szék gyakran véres, később feketés, tenesmus, főfájás, szédülés, hideg és érzéketlen bőr, delirium, hűdések, néha ictericus bőrszín. Collapsus.	Gyomormosás, bélbeöntések. — Magnesia, usta, fehérics, tej, szőlőcukor, méz, szén. kevés sárga vérű, lúgos, limatura ferri.
Cyanhydrogen-sav (kéksav) Cyankalium. Cyan-fémek.	Görcsös, nehéz, ritka légzés, gyér, gyenge szívverés, érzéketlenség, akaratlagos mozgás hiánya, eszméletlenség, cloricus és tonicus görcsök, pupilla tág, szemek kidülledtek, mozdulatlanok, végül gyorsan kifejlődő teljes bénulás, cyanosis, asphyxia.	Hánytatás, na. thio-sulfat. Kali hypermangan. $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{500}$ -os oldata $\frac{1}{2}$ poharanként még inkább evvel gyomrot mosni. — Mesters. légzés. — Excitans gyógyszerek és eljárások.

Femel-készülék, legolcs., legjobb destilláló-apparat. csiramentes, párolt víz előállítására, nélkülözhetetlen gyak. orvosok, bakteriologusok, gyógyszerészek részére, (L. hird.)

M é r e g	T ü n e t e k	K e z e l é s
Cytisus Laburnum (Aranyeső). Cytisin.	Mint strychnin-mérgezésnél.	L. strychnin.
Digitalis purpurea (Gyüszünke) és készítményei.	Hányás, hasmenés. szapora és irregularis pulsus, myosis. coma, esetleg convulsiók.	Hánytatók. Tannin. Excitansok (pezsg. cognac, camphor, a ther. fekete kávé).
Gombák mérgesek v. romlottak.	Choleraszerű tünetek. — Agyi tünetek. — Collapsus.	Hánytatás. Hashajtó Excitansok (strychnin, coffein bőr a digalen intraven).
Gummi Gutti.	Gyomor- és bélfájdalmak, hányás, igen erős hasmenés. Hányadék, székletét sárga színű. Collapsus.	Hánytatás. Gyomormosás. — Bö Hega féle beöntés. Olaj, f. herje. Collapsus es tén excitantia. Fájdalmak ellen morphi.
Helleborus-vál-fajok (Hunyor).	Salivatio, émelygés, hányás, gyakori hasmenés, szűrés a nyelvben, gyomorfájás, kölika, halványság, szédülés, fülcsengés, delirium, pupilla tág, kicsi pulsus. dyspnoe, somnolentia.	Hánytatás, hashajtó tannin, jódjodkaliur tüneti kezelés, főle opiatok.
Hydrargyrum-készítmények, főleg sublimat.	Fémiz a szájban, hányás, kölika, hasmenés, tenesmus, nyálka czafatos, igen büzös széklet, albuminuria. haematuria, stomatitis, convulsiók, remegés, collapsus.	Hánytatás, gyomormosás, hashajtók, fehérje, tej, csiriz, sző v. aspor, morphin.
Kéjgáz(N ₂ O).	Veszedeelmes tünetek: cyanosis, coma, mely hosszan tart, epileptiform görcsök, delirium a belégzés megszüntetésével, görcsös kinyúlása a testnek, rángások.	Mest. légzés. A nephrenici faradizálás — Izgatók.
Kénhydrogen-gáz (kloaka v. latrina-lég).	Elgyengülés, émelygés, főtájás, ájulás, eszméletlenség, anaesthesia, convulsiók, mydriasis, respiratio és pulsus gyér. Ha sok mérge volt a levegőben: asphyxia. rögtöni halál.	Friss levegő. Mest. légzés, ha szükséges.

Pontosan járó órák orvosok részére, a legjobb minőségben, részletfizetésre is, kaphatók Magyarország első, legnagyobb és legjobb hírnevű írástudójában, Brauns wetter János műhőránál, Szegeden. (L. hird.)

M é r e g	T ü n e t e k	K e z e l é s
Kígyó-méreg		<p>(A végtag ligatúrája. Seb tágitása, kiszívása. Seb kimosása kali hypermanganannal, aqua chlorival. Kiegyetése a sebnak nem czélszerű. Excitansok, alcohol. Hánytatás, hashajtás, tannin (?), cognac, feketekávé.</p>
Nerium Olean- der (Leander levelekkel mérgezés).	Hányás, dysenteriás szék, pupilla tág; kicsiny, kihagyó pulsus, gyenge convulsiók, sopor.	
Nicotin és azt tartalmazó dohány, bur- nót, szivar, pi- pamocok mérgezés.	Torokban fojtó érzés, hányás, vizenyős, néha véres szék, nyálfolyás, hideg és nyirkos bőr, nagy gyengeség, nehéz légzés, ájulás, stupor, remegés, convulsiók, pulsus gyér és arhythmiás.	Gyomorkiürítése, tannin, jodjodkalium, excitantia, (kávé, cognac, coffein, camphor bőr alá, digalen, adrenalin venába), mest. légz.
Opium és ké- szítményei. Morphin.	Szédülés, ellankadás, nagy almosság, bódulat, érzéstelenség, eszméletlenség, izomhűdés, alig érezhető és gyér pulsus; igen gyér, néha Cheyne-Stokes-légzés, hortyogás, pupilla szűk. — Ritkán tonicus görcsök.	Gyomormosás, gyorsan ható hashajtók, ismételt bélmosás. Tannin, jodjodkalium, ka. permangan. Coffein v. erős feketekávé, cognac, camphor, nem szabad elaludni engedni a beteget (sétáltatás), atropin (1—2 mlg.) bőr alá fecskendése.
Phosphor (gyufa).	Hányás (phosphorszagú, sötétben villódzik), gyomor és bélfájdalmak; súlyos esetben nagy főfájás, zsibongás, bénulás, collapsus. Esetleges jobbanlét után a 2. napon májpuffadás, májtáji fájdalom, icterus, véres szék. Vérömlenyek a bőrben, vérzésck. — Sopor. felkiáltások, deliriumok, ált. bénulás.	Cupr. sulf. mint hánytató. Gyomormosás. Ol. terebinth. Kali hypermanganicum $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{500}$ -os oldata. Zsírok, fehérje, tej, tojás kerültesse, de ricinust lehet adni, mint excipiens szerepel.
Plumbum aceti- cum (ólcmezu- kor).	Néhány óra múlva fémíz, égető érzés a gyomorban, tejfehér hányadék, kólika, szorulás, fájdalom és hűdés az alsó végtagokban, szédülés, stupor, pulsus igen gyér (40 körül), néha hasmenés.	Hánytatás, gyomormosás, hashajtók, natr. v. mágnés. sulfuri- cum, natr. phosphor, fehérje, tej, tannin, carbo animalis. Opia- tok.

M é r e g	T ü n e t e k	K e z e l é s
Sabina és Thuja	Hányás, hasmenés, véres szék, vizelési tenesmus, haematuria, hörgő légzés, anaesthesia, eszméletlenség. — (Abortus).	Hánytatás, gyomormosás Hashajtók. Jéglabdacsok, nyákos italok, excitansok.
Savgőzők (lásd chlorgáz).		
Secale cornutum (Anyarozs).	Nyálfolyás, hányás, kólika, hasmenés, szédülés, főfájás, látási zavar, myosis v. mydriasis, gyengeség, pulsus gyér, delirium, bódulat, coma.	Hánytatás, hashajtás gyomormosás. Tannin. Acid. salicyl.
Ergotin.		nagyobb adagai.
Strychnin.	Nagy nyugtalanság, halálfélelem, fájdalmas húzó-érzés a végtagokban, igen élénk érzések, fokozott reflex, végül valami ingerre hirtelen tetanus, trismus. Végül ált. bénulás.	Ha még a beteg uralodik magán, ügyelőzetes figyelmeztetés, bátorítás, biztatás közben gyomormosás hánytatók, tannin, jodjodkalium. Apomorphin (hánytatási célból). — Absolut
Strychnin tartalmú készítmények.		nyugalm, elsötétített szoba, csend. Paraldehyd vagy chloralhydrat, morphin olyan adagokban, hogy hypnosis jöjjön létre. Fenyvegető tetanus esetén gyors chloroformnarcosis, ezalatt gyomormosás, s chloral v. morphin-adagolás.
Szénéleg (világító-gáz, szén-gőz, aknalég).	Főfájás, fülzúgás, szédülés, émelygés. hányás, piros arc, tompultság, izomgyengeség, érzéstelenség, akaratlagos mozgásra képtelenség, ájulás, tonicus és clonicus görcsök, teljes hűdés, asphyxia, coma. Pulsus eleinte szapora, később gyenge, gyér, kihagyó.	Szabad levegő. Meesters. légzés. Excitans eljárás. Éleny-belé-geztetés. — Élenyes víz.
Thuja (l. Sabina)	Égető érzés a szájban, gyomorban, nyálfolyás, hányás, hasmenés, gyomor- és belfájdalom, tenesmus, véres szék, főfájás, szédülés, pupilla tág, pulsus gyenge és gyér, collapsus, nehéz légzés, hőés, viselkedettség, remegés, inugrálás arczfintorok, ritkán tetanus.	Hánytatás, gyomormosás, hashajtók. Jodjodkalium. Tüneti kezelés, főleg fájdalomcsillapítók és excitansok.
Veratrum album (zsáspa) és viride. Sem.		
Sabadillae.		
Veratrin.		

Vesebajoknál, húgyhólyag-
bántalmaknál, köszvénynél,
cukorbetegségnél, az emésztési
és légzési szervek hurutjainál

A BÓR- ÉS LITHIUMTARTALMU

SALVATOR

GYÓGYFORRÁS



kitűnő sikerrel használtatik. Ki-
váló óvszer vörhenynél (scarla-
tina) fellépő vesebántalmaknál.

Húgyhajtó hatása.

Kellemes ízű.

Vasmentes.

Könnyen emészthető.

Teljesen tiszta.

Állandó összetételű.

Különösen oly egyéneknek ajánlatos,
akik ülő életmódjuk folytán *arany-
eres bántalmakban, hasi vérbőrségben,
máj- és veseizgalomban vagy húgy-
savas lerakódásokban, vesehomok és
vesekövek képződésében szenvednek.*

Elsőrangú gyógyvíz és diätetikus ital!

SCHULTES ÁGOST

Szinye-Lipóczi Salvatorforrás-vállalat
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8.

OZOFLUIN

(név törvényesen védve, eljárás szabad. bejel.)

fenyőlevél-készítmény, száraz, szemcsés, könnyen oldódó formában.

Ideális készítmény remek illatu, gyönyörűen fluoreszkáló fenyőlevél-fürdő készítésére a közönséges fenyőlevél-fürdők helyett.

OZOFLUIN a dresdai hygiénikus kiállításon minden érdeklődő elismerését és csodálatát nyerte meg.

Általánosan a legtökéletesebb ilyenfajta készítménynek mondják.

Árak: eredeti doboz á 10 fürdő 7 kor. 50 fill.

$\frac{1}{2}$, „ á 5 „ 4 „ 25 „

Kapható a gyógyszerárakban.

Ha nincs raktáron, tessék közvetlenül a gyárhoz fordulni:

Ozofluin-Centrale
Basel, St. Johannvorstadt 42.

Minták orvosok részére ingyen. — Szanatoriumok, gyógyintézetek, gondnokságok stb. részére különleges árak.

XX. Gyógyhelyek és gyógyvizek átnézete.*

Az alábbiak a nálunk gyakrabban használt bel- és külföldi gyógyvizekre és betegeink által leginkább látogatott bel- és külföldi gyógyhelyekre vonatkoznak.

A gyógyhelyek és gyógyvizek egyszerű felsorolása helyett helyesnek tartottam némi útbaigazító jellemzést is adni. A mennyire javatokat vagy ellenjavatokat bővebb indokolás nélkül adni lehet, igyekeztem azokat is összeállítani. Nagy súlyt fektettem a hazai gyógyhelyekre és ásványvizekre. Fontos nemzetgazdasági és hazafisági szempontok parancsolják, hogy hacsak a beteg igazi érdekeivel megegyeztethető, hazai gyógyhelyet ajánljunk és hazai gyógyvizet rendeljünk, feltéve mindig, hogy a gyógyhelyen a beteg a kellő ellátást méltányos árak mellett megtalálandja, s feltéve, hogy az ajánlandó ásványvíz kezelése a kívánalmaknak tökéletesen megfelel.

I. Klimás gyógyhelyek.

1. Subalpin gyógyhelyek *nyári* tartózkodásra, 1000 méterig.

Hazaiak: *Lucivna* (800 méter magasságban), *Marillavölgy* (790 m.), *Leibicz* (732 m.), *Iglófüred*, *Barlangliget*, (739 m.), *Tátraháza*, (730 m.), *Virágvölgy* *Poprád* mellett (757 m.), *Stoós* (670 m.) *Thurzófüred*, (572 m.) *Koritnyicza* (850 m.). *Tusnád* (650 m.), *Gánóc* (635 m.), *Feketehegy* (632 m.) *Borszék* (882 m.), *Lubló* (955 m.), *Stubnya* (518 m.), *Baldóc* (486 m.), *Szklénó* (382 m.) *Szliács* (360 m.), *Tarcsa* 347 m.), *Bártfa* (319 m.). *Vihnye* (310 m.)

Külföldiek: Nálunk ismertebbek és magyarok által látogatottabbak *Steyrmarkban*, *Karinthiában*, *Salzkammergutban* és *Tyrolban*: *Reichenau* (480 m.), *Gmunden* (417 m.), *Kammer*, *Unterach*, *Mondsee* (470 m.), *Ischl* (484 m.), *Aussee* (650 m.), *Tobelbad* 330 m.), *Pörschach* és *Velden*, mindkettő a *Wörthi tó* mellett (439 m.), *Tarvis* (734 m.), *Zell am See* (752 m.), *Achensee* (930 m.).
Németországban: *Görbersdorf* *Porosz-Sziléziában* (540 m.). *Tüdő*

* Az adatokat *THAN*, *BOLEMAN*, *REIMER*, *DUJARDIN*, *BEAUMETZ*, *HIRSCHFELD* és *PICHLER* munkái, valamint az 1892, és 1894. és 1897. évi magyar balneol. congressusokon tartott előadásain alapján közlöm.

Szénsavas fürdőkészülékek a víznek cseppfolyós szénsavval való telítésére különleges gyártmánya dr. Wágner és Társai bet. társ. czégnak, Budapest, IX., Tinódy-u. 3. (L. hird.)

bajos sanatoriumok: *St. Blasien* a déli Schwarzwaldban (800 m.) sanatorium tüdőbajosok számára. *Reiboldsgrün* az Érczhegységben (688 m.), *Thale*, *Harzburg*, *Suderode*, *Hubertusbad*, *Alexisbad* a Harzban, *Falkenstein* a Taunusban, tüdőbajos sanatorium. *Triberg* (618 m.) és *Budenweiler* a Schwarzwaldban *Berchtesgaden* (580 m.), *Tegernsee* (732 m.), *Kreuth* (512 m.), Felső-Bajorországban.

Svájc számos helyei közül ismertebbek nálunk: *Luzern*, *Interlaken*, *Spiez*, *Aeschi*, *Waeggis*, *Viznau*, *Beatenberg* stb. stb.

2. Alpin gyógyhelyek nyári tartózkodásra. 1000 métertől felfelé a tenger színe felett.

Hazaiak: *Keresztyénsziget* (Kurhans auf der hohen Rinne) Nagy-Szeben mellett (1420 m.). *Csorbai tó* Liptóban, (1350 m.), *Bálványos-fürdő* Tusnád mellett (1053 m.) a torjai Büdös-barlang közelében (csendes, egyszerűen, de újabban jól berendezett hely), *Ó-, Új-, és Alsó-Tátrafüred* (átlag 1000 m.). *Tátralomnicz*, *Felső-Hágy*, *Tátraszéplak*, *Matlárháza* Szepesben, *Biharfüred* (1063 m.).

Külföldiek: Tyrolban: *Niederdorf* (1158 m.). *Toblach* (1250 m.). *Cortina* (1219 m.), *Innichen* (1332 m.). *Misurina*. — Svájcban: *Davos* — két helység *D.-Dörfli* és *D.-Platz* — (1652 m.), *Pontresina* (1828 m.), *Szt-Moritz-Dorf* (1856 m.), *Rigi* (1460 m.), *Bormio* (1396 m.), *Arosa* (1850 m.) *Grindelwald*, *Zermatt*, *Riffelalp*, *Riffelberg*, *Kandersteg*, *Adelboden*, *Wengern*, *Klein Schidegg*, *Mürren*, *Waldhaus-Flims*.

3. Alpin és subalpin gyógyhelyek téli tartózkodásra.

A felsorolandó alpin és subalpin helyek jellege, télen aránylag enyhe és állandó középhőmérsék, tiszta levegő, szélmentesség, az alpin helyeken csekély légnyomás.

a) Alpin helyek.

Hazai: *Tátrafüred*, *Új-Tátrafüred*, *Tátra-Széplak* (1010 m.), *Tátra-Lomnitz*.

Külföldiek: Svájcban: *Davos* (1625 m.) *Samaden* (1740 m.), *Szt-Moritz* (1856 m.). *Grindelwald*, *Chamounix*, *Adelboden*.

b) Subalpin helyek.

Hazai: nincs.

Külföldiek: *Gorbersdorf*, *Falkenstein*, *Reiboldsgrün*, *Wiesbaden*.

Ozofluin, ideális készítmény, remek illatú, pompás fluorescenciát mutató fenyőlevélfürdő előállítására a közönséges fenyőlevélfürdők helyett. (L. szemben levő hirdetést)

Tátra-Széplak magaslati gyógyhely, vízgyógyintézet, szénsavas fürdők, diéta-kúrák, gyógyjavallat: Basedow-kór, idegbajok, reconvalescentia, chlorosis, anaemia, váltóláz, hűlésre való dispositió. (L. hird.)

4. Délen fekvő igen enyhe égaljú helyek téli tartózkodásra.

Hőm. télen 20—40 C. között ingadozik, szélesend, kevés csapadék.

Hazai: nincs.

Külföldiek: *Abbazia, Lovrana* Fiume mellett a tengerparton. *Lussin piccolo, Lussin grande, Arbe, Ragusa, Bozen* és *Gries* Meran mellett, 270 m., 20 C. téli átlag. hőm., *Meran* 319 m., 18 C. téli átlag hőm., derült ég, kevés csapadék, szélesend. *Arco*, a tyroli alpesek déli lejtőjén, 730 m., 370 C. téli átlag. hőm., kissé nedvesebb, mint Meran *Montreux* és *Territet* a genfi tó partján. Még enyhébb égaljúak télen a Riviera di Ponente számos helye (Genuától nyugatra), mint *Pegli, Porto Maurizio, San-Remo, Ospedaletti, Bordighera, Cap d'Ail, Beaulieu, Mentone, Monte-Carlo, Monaco, Nizza, Cannes*, továbbá a Riviera di Levante számos helysége (Genuától keletre), mint *Nervi, Spezzia, Pisa*. Szieziliában látogatott helyek *Catania, Palermo, Taormina*.

5. Tél nélküli helyek.

Cairo, Alexandria, 13° C. átl. hőm. *Algier* 153° C. átl. téli hőm. Nagy napi ingadozások. *Madeira*, portugál sziget (fővárosa *Funchal*), 169° C. átl. hőm. télen, egyenletesen nedves, reggel 8 órá-tól este 6-ig szabadban lehet tartózkodni. *Corfu*.

II. Hidegvíz-gyógyintézetek.

Javalatok e helyen csak nagyon általánosságban állíthatók fel. *Hypochondria, neurasthenia, hysteria* némely alakja, tabes dorsalis idiott gyomor- és bélhurut, idiott csúszos hántahnak, a köszvény némely alakja, idiott syphilis, utógyógymód higanykezelése után test edzése meglülések ellen.

Hazaiak: *Budapesten* számos intézet. Igen kiváló berendezésű és kies helyen fekszik *Marillavölgy* (Krassó-Szörénymegyében

Dr. Gámán Béla diétás intézete *Volosca-Abaziában* gyomor-bélbetegek, vesebajosok, cukorbeteg, köszvényesek, vérszegények, lesoványodottak, lábadozók, ideggyöngék, kimerültek részére. (L. hird.)

Marilla sanatorium ideg- és légzőszervi betegek részére, pneumatikus kamarák, vízgógyintézet, villanyos fény-, hidroelektromos-, forrólég-, oxigén- és szénsavas (naheimi) fürdők. (L. III. sz. hird.)

Abbaziában, Pension Hermitage, legszebb fekvésű elsőrangú magyar otthon a Súdstrandon, üdülő betegek részére kiválóan alkalmas, tulajd.: *Thuryné-Markovics Valerie*. (L. hird.)

Nizza, Hotel Reinischer Hof (Hotel du Rhin) elsőrangú családi szálló, tulajd.: *Th. Baumgartner*. (L. hird.)

Oravicza mellett). *O-, Új és Alsó-Tátrafüred, Tátra-Széplak* (Szepes megyében, Poprádtól 1½ órányira) *Tátralomnicz*, (nagyszabású berendezés). *Stoósz, Fenyőháza, Barlangliget, Rozsnyó, Feketehegy* (Szepes megyében Igló mellett) *Iglófüred, Thurzófüred*, (Gölnicz-bánya mellett), *Lucsivna* (Liptó- és Szepesmegye határán). *Kőszeg* (Dreiszer-féle). Ezekén kívül más fürdőhelyek is be vannak rendezve hidegvízgyógyomódra, így pl. *Parád, Herkulesfürdő, Buziás, Hársfalva, Borszék, Rajecz, Borosznó. Koritnyicza, Bártfa, Balj* stb.

Ausztriában nevesebbek: Giesshübel-Puchstein, Karlsbad mellett, *Grafenberg, Sziléziában. Helenenthal, Bécs* melletti *Badenben. Kaltenleutgeben, Bécs* mellett. *Kreuzen*, hasonló nevű városka mellett, a *Duna* melletti *Grein*hez egy órányira, szép fenyvesek, kitiűnő berendezés. *Priessnitzthal, Mödling* mellett, *Bécs*től nem messze. *Szt-Radegund* Stájerországban, *Gráztól* 1 órányira. *Rohitsch* Steyerországban (n. ott glaubersós források is). *Salzburg-Parsch. Waidhofen a. d. Ybbs* jól berendezett intézet.

Németországban: Boppard (Marienberg és Mühlbad,) a *Rajna* mellett. *Elgersburg, Gotla* mellett. *Godesberg, Bonn* mellett. *Herrenalb, Württembergben Gernsbach* mellett. *Ilmenau, Thüringiában. Königstein,* a *Taunusban. Lauterberg, a Harzban. Leibenstein* Thüringiában. *Dietenmühle és Nerothal, Wiesbaden* mellett. *Wilhelmshöhe, Cassel* mellett stb.

Svájcban: Albisbrunn, Zürich mellett. *Rigi Kaltbad, Schönbrunn* és *Schöneck, a Vierwaldstätti tó* mellett. *Buchenthal, St.-Gallenben* stb.

III. Tengeri fürdők.


Gyógyhatányok: a tengervíz hőmérséke, *NaCl*-tartalma, a hullámvérés, az állandó légmozgás, a lég nedvessége és *NaCl*, valamint ozontartalma, a léghőmérsék egyenletessége. A víz hőmérséke 16—27° C. között ingadozik hely és évszakok szerint; legmelegebb a Földközi-tenger (22—27° C.), után jő az Atlanti oceán (20—23° C.). leghűvösebb az Északi-tenger. A *NaCl* tartalom igen változó; a Földközi-tengerben 0.3—2.6‰ között ingadozik, az Atlantiban 2.5—3.3‰ között, az Északiban 3.0—3.9‰ között, a Keleti tengerben pedig 0.6—2.0‰ között. Évad a nyár és főleg az őszelő. *Javalatok: Bőr* edzése; hajlam hyperidrosisra, meghűlésre, csúzos bántalmakra; utógyógyomód meleg fürdőzés után; hemicrania, idült neuralgiák, neurasthenia bizonyos alakjai, scrophulosis torpida, olygaemia, reconvalescentia, szellemi túlerőltetés. *Ellenjavalatok: Gyomorbántalmak, minden fajta vérzés v. vérzésre*

Iglófüred elsőrendő vízgyógyintézet, gyógyfürdő, Bulling-inhale-torium, szénsavas-, fenyő-, láp- és napfürdők, fekvő-csarnok, terén-kúrák, hizlalo és soványító gyógyomód. (L. hird.)

Ozofluin ideális készítmény, remek illatú, pompás fluorescentiát mutató fenyőlevélfürdő készítésére közönséges fenyőlevélfürdő helyett. (L. hird.)

KRISTÁLY

forrás-ásványvíz.

Természetes hydrokarbonátos ásványvíz-forrás, mely szénsavval telítettik. Az emésztést elősegítő pompás asztali ital. 


Vidékre és **külföldre** **fuvardíjmentes** szállítás.

Kérjen árjegyzést a

Szent Lukácsfürdő Kútvállalattól, Budán.



Szent-Lukácsfürdő téli és nyári gyógyhely, Budán.

Csúsz, köszvény, ideg- és bőrbajok ellen. Iszapfürdők, iszapborogatások, kő- és kádfürdők, külön férfi és női vízgyógyintézet, gőzfürdők és gyógyvízuszodák. 

Szállodák, gondos penzió. Radium-Emanatorium.

VICHY

világhirű források

A francia állam tulajdona.

**Kezelőség: Paris, 24, Boulevard
des Capucines 24.**

Legelső orvosi tekintélyektől ajánlva!

Célestins: Vese-, hügy- és hólyagba-
joknál, köszvény és cukor-
betegség eseteiben.

Grande Grille: Májkólikánál és epe-
köveknél, a hasüreg
szerveiben fellépő pangásnál.

Hôpital: Az összes dyspepsiás zava-
roknál.

Forrástermékek: fürdő-, ivósók és pasztillák.

Lerakatok minden ásványviz-kereskedésben
és gyógyszerárban.

**Csak akkor valódi, ha a kupakokon és cim-
kéken a forrás neve rajta van.** Tessék min-
dig a forrás nevét pontosan megjelölni.

hajlamosság (például tüdőtuberculosisnál), szívbántalmak, edénybajok, agyizgalom, nagyfokú gyengeség, aggkor, zsenge gyermekkor.

Hazai: *Cirkvenitza* és a horvát tengerpart több más helye.

Külföldiek: Ausztriában: *Abbazia*, *Lovrana*, *Volosca* Fiume mellett. *Lussinpiccolo* és *Lussingrande* a Quarnero egy szigetén. A monarchián kívüliek közül ismertebbek: *Lido* szigete Venezia mellett (különösen gyermekeknek kitűnő), *Rimini*, *Castellamare*, *Monaco*, *Nizza*, *Cannes* (Földközi tenger), *Biarritz*, *Arcachon* (Atlanti tenger), *Boulogne*, *Étretat*, *Trouville*, *Dieppe* (La Manche-csatorna), *Wight* szigete, *Brighton*, *Ramsgate* (Anglia), *Ostende*, *Blankenberghe*, *Scheweningen*, *Norderney*, *Sylt*, *Helgoland* (Északi tenger), *Heringsdorf*, *Misdroy*, *Colberg*, *Zoppot*, *Cranz* (Keleti tenger)

IV. Tóparti fürdők.

Hazaiak: A *Balaton* partján lévő összes üdülőhelyek, mint: *Balaton-Füred*, *Siófok*, *Balaton-Földvár*, *Almádi*, *Kenesse*, *Budaörs*, *Rév-Fülöp*, *Szepezd*, *Boglár*, *Palics Szabadka* mellett.

Külföldiek: *A Wörthi-tó*, *Annensee*, *Millstätti-tó*, *Tegernsee*, *Bodensee*, *Vierwaldstätti-tó*, *Thuni-tó*, *Brienzi-tó*, *Zürichi-tó* körüli üdülőhelyek.

V. Gyógyvizek.

1. Egyszerű égvényes ásványvizek.

Leginkább ivógyógymód; néha fürdő. *Javalatok:* gyomor-, bélhurut, gyomorfékely, alhasi pozsga, epekövek, idült icterus, zsírmáj, húgykövek, vesekövek, húgyhomok, idült pyelitis és cystitis, köszvény, diabetes mellit., légutak idült hurutja. — Főhatóanyaga: kettő szén-savas natrium; némely vízben, különösen a hidegekben, sok szabad szén-sav

a) Melegek.

Hazai: *Lipik*. Fürdőhely Pozsegamegyében, Pakrácztól $\frac{3}{4}$ órányira; tulajdonképpen égvényes konyhasós jódos víz, de e helyen is joggal szerepelhet. $1.90/_{00}$ natr. bicarbonicum, kevés konyhasós és jodnatrium Hőm. 64° C. Mint jódos vizet is használják

Külföldiek: *Vichy*. Fürdőhely Franciaországban $4-5/_{00}$ natr. bicarb. Legerősebb forrás a Célestins, kissé gyengébb a

Dr. Szegő gyermek- és hidegvízgyógyint. Abbaziában, felnőttek és gyermekek számára, erősítő, edző, hizláló és soványító kurák egész éven át. (L. hird.)

Schweizerhof gyógyintézet-penzió (Wetzelsdorf, Graz m.), minden modern gyógyeszköz, szabad lég- és napfürdők. (L. hird.)

Grande Grille. Hőm. midőn legmelegebb 45° C. — *Neuenahr*. Fürdőhely Németországban (Rheinpreussen), kevés natr. bicarb. 40° C. hőm. Főforrások: a *Gr. Sprudel* 36° C. hőm., a *Willbrodus*-forrás.

b) *Hidegek.*

Hazaiak: *Szolyvai víz* (Bereg m.), $8\frac{4}{100}$ natr. bicarb. igen sok szabad CO_2 . Mérkőzik minden e nemű külföldi vízzel. Ennél még koncentráltabb a szomszédos *Polenai* és *Olenyovai*. — *Luhí Erzsébet-forrás* és *Luhí Margit-forrás* (Bereg m.), mindkettőben $4\frac{0}{100}$ -os natr. bicarb., középmenyiségű szabad CO_2 . A *Petánczi-víz* olyan, sőt tartalmasabb, mint a *Bilini*. Mindkettőnél erősebb kissé a *bodoki Mathild-forrás*. Mindezen vizek elszállítva használtatnak. *Répáti*. $4\cdot09\frac{0}{100}$ natr. bicarb. sok szab. CO_2 .

Külföldiek: *Krondorfi* (Csehország) $1\frac{5}{100}$ natr. bicarb. igen sok CO_2 . — *Bilini József-forrás* (Csehország), $4\cdot7\frac{0}{100}$ natr. bicarb. — *Bilini Karolina-forrás*, $3\cdot03\frac{0}{100}$ natr. bicarb. és kevés natr. sulf. — *Fachingen* (Németország), $3\cdot5\frac{0}{100}$ natr. bicarb. — *Preblau* (Karinthia) $2\cdot8\frac{0}{100}$ natr. bicarb. — *Obersalbrunn* (Szilézia) $1\cdot7\frac{0}{100}$ natr. bicarb., kevés natr. sulfur. — *Giesshübel-Puchstein* (Csehország.) $1\cdot1\frac{0}{100}$ natr. bicarb., sok szabad CO_2 . Ezen vizek részint elszállítva, részint helyben használtatnak.

Függelék. Egyszerű savanyúvizek.

Nagyrészt diaeteticus célra, vagy mint luxus-vizek használtatnak, de rendelkezjük mint enyhe gyomor- és bélizgatókat, esetleg mint gyenge diureticumokat is. Mindannyi bő szabad CO_2 -tartalmú, míg szilárd alkotórészekben igen szegény.

A számos hazai forrás közül általános forgalomban vannak a *Borszéki borvíz*, *Mohai Ágnes*, *Balatonfüredi*, *Borhegyi*, *Radna-Borbereki*, *Kászon-Jakabfalvi*, *Véghlesi Vera*, *Szlatvini Anna-források* és a *Szántói savanyúvíz*. Különben majdnem minden vidéknek megvan a maga savanyú vize.

Külföldiekre hazánkban nem szorulunk.

2. *Égvényes-konyhasós ásványvizek.*

Főleg ivógyógymód. *Javallatok:* Légutak és emésztőszervek időült hurutjai, vesekő, húgyhomok, pyelitis és cystitis catarrh.

Szlatvini Anna-gyógyforrás lithiumban legdusabb ásványvíz, legkellemesebb üdítő, a legjobb húgyhajtó és húgysavoldó gyógyvíz, nyálkahártya-, hólyag- és tüdőhurutnál kitünően bevált. (L. a szemben levő hird.)

A régi idők óta hírneves, természetes

BILINI SAVANYUVIZ

kiválóan jóízű, dietétikus asztali ital.

Csehország legértelmesebb (natrium-lithium) savanyuvize és orvosok mint régóta bevált gyógyvizet rendelik köszvény, hólyag-, vese-, vizelet-, bél- és gyomorbetegségek, diabetes, haemorrhoidák stb. eseteiben.

Mint diétás ital világhíre van a bilini viznek, mely kimutathatóan 180 esztendő óta küldetik szét mindenfelé.

Elősegíti az emésztést, anélkül, hogy a fölfúvódás kellemetlen érzését okozná, amint azt a szénsavval mesterségesen telített asztali italok teszik. Kitűnő íze általánosan ismeretes, jóízűt, félig megkötött szénsavban való bősége miatt, akkor sem veszti el, ha hosszabb ideig nyitott üvegben áll. Citromnedvvel vagy más gyümölcsnedvekkel vegyítve és cukorporral megevezve, szénsavtartalma következtében, erősen pezsgő italt ad kiválóan fölfrissítő hatással. A bilini savanyuviz kristálytiszt és a prágai német egyetem cs. kir. ált. bakteriológiai vizsgáló intézetnek 1909 március havában megejtett vizsgálata szerint tökéletesen bakteriummentes. A bilini kut-igazgatóság különös súlyt helyez arra, hogy minden egyes üveg kifogástalanul kerüljön a fogyasztóhoz, amit úgy igyekezik elérni, hogy nagy gonddal végezteti az üvegek tisztítását és töltését és hogy az üveget csakis elsőrendű kataloni dugóval zárja el. A cs. kir. helyhatóság arról értesítette a bilini kut-igazgatóságot 1908. július 3-áról kelt 136.682 sz. leiratával, hogy az 1908. május havában az országos egészségügyi felügyelő részéről meglepetésszerűen végzett revízió alkalmával Bilin-Sauerbrunnban a berendezés higiénikus szempontból mintaszerűnek találtatott.

Szlatvini

„ANNA“

gyógyforrás

a legdúsabb lithiumtartalmu
diuretikus gyógyviz.

1000 GRAMM VIZBEN VAN

Szultánnál	---	---	---	0.00894	gramm	lithium
Szolyvainál	---	---	---	0.0189	"	"
Polenainál	---	---	---	0.0221	"	"
Salvatornál	---	---	---	0.02407	"	"
Margitnál	---	---	---	0.0242	"	"
Szlatvininál	---	---	---	0.070326	"	"

Húgyhajtó és húgysavoldó hatása páratlan.
Vesebajoknál, nyákhártyamegbetegedések-
nél, hólyag- és tudőhurutnál, valamint
köszvénynél elsőrangú gyógyító tényező.

Forrástulajdonosok:

MAJUNKE GÉZA UTÓDAI.

Kútkezelőség: Szepesolaszi.

Központi iroda: Rózsahegy.

Budapesti főraktár:

KONKOLY THEGE SÁNDOR

IX. Márton-utca 35/a.

chron., scrophulosis torpida, régi izzadmányok. *Ellenjavalatok*: Lázás állapotok. Főhatóanyagok: kettő szén-savas natrium és konyhasó, szabad szén-sav.

a) Melegek:

Hazai: kiváló a *Lipiki*, mely ép úgy használható, mint az *Emsi*.

Külföldi: *Ems*. Fürdőhely Coblenztől nem messze. Több forrás. Átlag 2‰ natr. bicarb. 1‰ *NaCl*. középmenyiségű szabad CO_2 . Források hőfoka 27.9°C .— 50.4°C .

b) Hidegek:

Hazaiak: *Czigelkai Lajos-forrás* (Sárosm.), 16.7‰ natr. bicarb., 5‰ konyhasó, sok szabad CO_2 . Víz elszállítva használtatik. Erősen sós ízű. *Bikszád*. Fürdő Szatlmár megyében. Több forrás. Átlag 6‰ natr. bicarb. 2.5‰ natr. chlorid. Kevés szabad CO_2 . *Bártfai Orvosforrás*, melynek vizében 4.8‰ natr. bicarb. 1.1‰ natr. chlorid. (kevés szén-savas vasoxgydul 0.4‰). *Dombháti Livia*, hasonló az *Emsi* és *Gleichenbergi* vizekhez. *Stojkai víz*, hasonló a *Niederseltersi*hez. Újabban két kitűnő ilyenmű víz jött forgalomba: a *Málnási Mária-forrás* és a *Málnási Siculia-forrás*; mindkettőben 10‰ körüli natr. bicarb. és $3\text{—}4\text{‰}$ közötti natr. chlorid; előbbiben kevesebb, utóbbiban igen sok CO_2 . Ezek az összes külföldieket nélkülözhetőkké teszik. *Balfi Új forrás*. 0.42‰ natr. bicarb. és 0.3‰ natr. chlorid.

Külföldiek: *Sczawnicza*. Fürdő Galiciában. 3 forrás; legerősebb a *Magdalena-forrás*, melyben 8.4‰ natr. bicarb., 4.6‰ natr. chlorid., középmenyiségű szabad CO_2 . — *Luhatschowitz*. Fürdő Morvaországban. Legerősebb a *Johannisbrunnen*, 8.3‰ natr. bicarb. 3.6‰ natr. chlorid., kevés *NaI* és *NaBr*, középmenyiségű szabad CO_2 . — *Nieder-Selters*. (Németországban). Víz elszállítva, 1.2‰ natr. bicarb. 2.3‰ natr. chlorid. — *Gleichenberg*. Fürdő Stájerországban. Legerősebb a *Constantin-forrás*, 3.5‰ natr. bicarb., 1.8‰ natr. chlorid.; gyengébb az *Emma-forrás*. Sok szabad CO_2 mindkettőben.

3. Glaubersós ásványvizek.

Ivógyógymód. *Javalatok*: Idült gyomor- és bélhurut, gyomor- és bélfekélyek, aranyér, idült májbántalmak, epekő, köszvény, diabetes mellitus, plethora abdominalis, zsírkór. *Ellenjavalatok*: carcinoma, tuberculosis.

Bad Ems. (L. a szemben levő hird.)

Málnási Siculia alkal. sós savanyúvíz a *Selters*, *Vichy*, *Gleichenbergi*, *Bilini* és *Bikszádi* vizeket felülmulja.

a) Melegek.

Hazai megfelelő nincs.

Külföldi: *Carlsbad.* Fürdő Csehországban. 18 hévforrás Legmelegebb a Sprudel. Átlag $2.3^{\circ}/_{00}$ natr. sulfur., $1^{\circ}/_{00}$ natr. chlorid. Elszállítva a Sprudel, Schlossbrunn, Mühlbrunn vize használtatik leginkább. Carlsbadi sót és mesters. sót l. a Vénygyűjteményben Sal therm. Carol. cz. alatt.

b) Hidegek.

Hazaiak. A Marienbadi és Franzensbadihoz hasonló erősségű nincs eddig. A Rohitschit esetleg pótolhatják a *Baldóczi fürdőforrás* és a *Koritnyiczai* vizek, valamint a *Boroszuói* források.

Külföldiek: *Marienbad.* Fürdőhely Csehországban. A Ferdinandsbrunn és Kreuzbrunn vizében átlag $5^{\circ}/_{00}$ natr. sulf. $2^{\circ}/_{00}$ natr. chlor., $1.8^{\circ}/_{00}$ natr. bicarb., igen sok szabad CO_2 . — *Franzensbad.* Fürdő Csehországban. A Salzquelleben $2.8^{\circ}/_{00}$ natr. sulf., $1.4^{\circ}/_{00}$ natr. chlor., $0.9^{\circ}/_{00}$ natr. bicarb. foglaltatik. A többi forrás vasas. — *Rohitsch.* Fürdő Stájerországban, $1.9^{\circ}/_{00}$ natr. sulf., $1.4^{\circ}/_{00}$ natr. bicarb., kevés natr. chlor., sok szabad CO_2 . a Tempel-forrásban; u. a. Styria-forrásban, míg a Donati-forrásban $2.7^{\circ}/_{00}$ a natr. sulf. mennyisége; u. ebben legtöbb a natr. hydrocarb. is. *Tarasp-Schuls.* Fürdő Svájcban (1300 m. m.). Legerősebb a Luciusquelle; $2.1^{\circ}/_{00}$ natr. sulf., $3.6^{\circ}/_{00}$ natr. chlor., $0.8^{\circ}/_{00}$ natr. bicarb., e mellett tartalmaz még $2.4^{\circ}/_{00}$ kétszer szénsavas meszet és $2^{\circ}/_{00}$ kétszer szénsavas ammunt. Vannak vasas forrásai is. — *Elster.* Fürdő Szászországban. A Salzquelleben van $5.2^{\circ}/_{00}$ natr. sulf., $1.6^{\circ}/_{00}$ natr. bicarb., $0.8^{\circ}/_{00}$ natr. chlor. Vannak vasas forrásai is.

4. Keserű vizek.

Ivógyógymód. *Javالاتok:* egyszerű és szokványos székrekedés aranyér, plethora abd., májvérbőség, elhízás.

Hazaiak mindenekfölött állanak. A budai Hunyadi János és Ferencz József vizekben átlag körülbelül $22^{\circ}/_{00}$ natr. sulf. és ugyanannyi magnes. sulf. — *Igmándi víz* Schmiedthauer-féle (Komáromm.) $20-44-55^{\circ}/_{00}$ magn. sulf., $7-13-14^{\circ}/_{00}$ natr. sulf. az egyes forrásokban. Kevés szabad CO_2 .

Erzsébet sósfürdő Budán a Gellérthegy alatt. Fürdőgyógymód főleg a női ivarszervek idült lobos bántalmai eseteiben; hatása

Franzensbad fürdő. (L. hird.).

Franzensbad: Hotel Stadt Leipzig, elsőrendű szálló a Kurparkkal szemben. (L. hird.).

Rohitschi Tempel-, Styria- és Donati-források javal.: idült gyomorhurut, székrekedés, Bright-kór, májbet. köszvény. (L. hird.).

Szt.-Lukácsfürdő téli és nyári gyógyhely Budán.

BAD Ems

gyógyítja a légzési, emésztési, az alsótest szerveinek és a húgyszervek hurutjait, továbbá csúzt, köszvényt, asthmát.

Idény: május 1-től október 15-ig.

Fürdő- és ivókurák, belégzések,
pneumatikus kamarák.

Tájékoztatóval szolgál a gyógybizottság.



királyi



ásvány-
források

KRÄNCHEN

régóta kitűnően beváltak **hurutoknál, köhögésnél, rekedtségnél, elnyálkásodásnál, gyomorsavtúltermelődésnél, influenzánál és következményeinél.** Emsi víz, valódi emsi pasztillák és források mindenütt kaphatók. A beszerzési kimutatja az Emsi Fürdő- és Forrás-igazgatóság.

Követelje a forrás eredeti termékeit és utasítsa vissza a netán helyettük kínált utánzásokat: mesterséges uton előállított emsi forrásvizet és sót.

A természetes karlsbadi sprudelsó

az  egyedüli eredeti karlsbadi só 

Óvakodjunk az utánzatoktól és a hamisításoktól.

ilyenkor mint a meleg sósfürdőké általában. Ivásra szolgál az Erzsébet-forrás, melyben 14‰ natr. sulf. 9‰ magnes. sulfur. **Külföldiekre** nem szorulunk. Gyengébbek és drágábbak a mi vizeinknél.

5. Egyszerű gyenge konyhasós vizek.

Konyhasótartalom nem haladja túl a 15‰-ot. Résztint ivó-, résztint fürdőgyógymód. Némelyik forrásnak sok szabad CO_2 -tartalma is támogatja a hatást. Fürdők, mint erős bőrizgatók szerepelnek. — *Javalatok ivógyógymódra*: idült gyomor- és bélhurut, gyomor- és béltonia, obstipatio habitualis, plethora abdominalis, aranyér, scrophulosis torpida, köszvény, idült fennálló izzadmányok. *Ellenjavalatok*: carcinoma, tuberculosis.

Javalatok fürdők: Idült fennálló izzadmányok, köszvény, scrophulosis torpida, idült rheumatismus, idült neuralgiák, körzeti idegrendszer idült bántalmi. *Ellenjavalatok*: bőrbántalmak, eczemára hajlamos bőr, szív- és edénybántalmak, vértulások az agy felé.

a) Melegek.

Hazai: *Mehádiai Hercules-forrás*. (Mehádián vannak kénes források is.) Fürdő- és ivógyógymód. 19‰ natr. chlor. Hőmérsék 56° C. Vetekedik a legtöbb külföldi fürdőhelylyel.

Külföldiek: *Baden-Baden*. Fürdőhely a badeni nagyhercegségben a Schwarzwald tövében (210 m.). 29‰ natr. chlor. Hőmérsék 40—59° C. között. Ivásra a Hauptquelle szolgál. — *Wiesbaden*. Fürdőhely Németországban a Taunusban (117 m.). Ivásra a Kochbrunn vize használtatik, 68‰ natr. chlor tartalommal; 69° C. hőm.

b) Hidegek.

Hazai: *Csizi víz* (Gömör), elszállítva is használtatik. 15.5‰ natr. chlor., 0.04‰ jodkalium, 0.08‰ bromkalium tartalommal. Mint jódos víz is szerepel. Kiváló gyógyhatású. Fürdőgyógymód helyben. — A Kissingeri vizeket pótolhatja a *Czigellcai Lajos-forrás*.

Külföldiek: *Kissingen*. Fürdő Bajorországban. Az ivásra használt Rákóczy- és Pandur-forrásokban átlag 5.5‰ natr. chlor. és igen sok szabad CO_2 . Fürdőkhöz a többi 10‰ natr. chlor.-ot tartalmazó szénsav-dús források használtatnak. — *Homburg*. Fürdő Majna-Frankfurt mellett a Taunusban (190 m.). Ivásra, a gyengébb Louisenbrunn (3‰ natr. chlor.) és az erős Elisabethbrunn (10‰ natr. chlor.) használtatnak. Fürdőnek más források. — *Dürkheim*. Fürdő Bajorországban. Ivásra a Bleich-

Csizi a kontinens legerősebb jód-, brom fürdője nagy radioaktivitással, ivó, fürdő, hidegvíz, dörzs- és izzasztókúrák. (L. hird.)

Homburg v. d. Höhe, DDr. Pariser-Dammert szanatoriuma (Clara Emilia), gyógyintézet gyomor- és bélbet. részére. (L. hird.)

Kristály-forrásásványvíz étvágyat javít, gyomorrontást megakadályoz.

brunnen vize használtatik, melyben $8\frac{80}{100}$ natr. chlor., $0.0019\frac{00}{100}$ natr. jod. és $0.019\frac{00}{100}$ natr. brom. foglaltatik. Fürdők más forrásokkal készítettnek. Mint jódos víz is szerepel. — *Kreuznach*. Fürdő Németországban. Ivásra az Elisabethquelle használtatik, melyben $9\frac{50}{100}$ natr. chlor., $0.0008\frac{00}{100}$ magnes. jod., $0.03\frac{00}{100}$ magnes. brom. van. A többi források fürdésre használatnak. Mint jódos víz is szerepel. — *Neuhaus*. Bajorországi fürdő. Források $9-18\frac{00}{100}$ natr. chlor.-al, sok szabad CO_2 -al. — *Hall*. Fürdő Felső-Ausztriában. Ivásra a Tassiloquelle vize használtatik. $14\frac{00}{100}$ natr. chlor., $0.05\frac{00}{100}$ magnes. jod. $0.04\frac{00}{100}$ magnes. brom., kevés szabad CO_2 . A források fürdésre is szolgálnak. Mint jódos víz is szerepel.

6. Erős konyhasós vizek.

$15\frac{00}{100}$ -tól $300\frac{00}{100}$ -ig terjedő natr. chlor. tartalommal Ivógyógy-módra nem használatnak, csupán fürdőkre. Az igen tömény vizek megfelelően hígítatnak. Hatást, használatot l. az egyszerű konyhasós vizeknél.

a) Melegek.

Hazai: nincs megfelelő.

Külföldiek: *Nauheim*. Fürdő Németországban (Hessen-Darmstadt). Sok forrás közül a fürdőkhöz a Friedrich-Wilhelms-Sprudel ($29\frac{00}{100}$ $NaCl$, 37° C. meleg) és a Grosser Sprudel ($21\frac{00}{100}$ $NaCl$, 27° C. meleg) használatnak. Gyengébb források ivógyógy-módra szolgálnak. Minden forrásban sok szabad CO_2 — *Oeynhaus*-*Rehme*. Fürdő Németországban (Westphália). Fürdőkhöz használt források $29\frac{00}{100}-35\frac{00}{100}$ $NaCl$ -t tartalmaznak s $26^\circ-33^\circ$ C. melegek, bő szab. CO_2 tartalommal. Hígított vízzel ivógyógy-mód.

b) Hidegek.

Hazánkban sok alkalmas forrás van, különösen Erdélyben. *Felső-Bajom* (Bázna) Kisküküllő m.-ben), *Polhora* (Árvam.), *Szováta* (Maros-Tordam.) sóstavak, *Görgény-Sóakna* (Maros-Tordam.), *Vizakna* Nagyszeben mellett (sóstavak), melyet az állam újabban jelentékenyen fejleszt, *Maros Ujvár* (Alsó-Fehérm.). *Korondi* sósforrásban (Udvarhely m.) 15% natr. chlor. (fürdőnek). A *báznai jódos és bromos sós* újabban nagyon kedvelik hazánkban, épp úgy a *polhorai sós* is. Mindkettő kiszorította úgy a halli, mint a drukai és a kreuznachi sós.

Külföldiek igen nagy számmal vannak. Nálunk ismeretebbek: *Aussee*. Fürdő Stájerországban (650 m.). Vize $344\frac{00}{100}$ $NaCl$ tartalmú; fürdőnek hígítatják. — *Ischl*. Fürdő a Salzkammergutban (484 m.). Fürdőkhöz használt vizet $246\frac{00}{100}-255\frac{00}{100}$

Vöslau gyógyhely szélről védett fekvés subalpin éghajlat, fenyő-erdők, mindenféle fürdők. (L. hird.)

Bad Hall elsőrangú jod-brom-fürdő. (L. hird.)

Szt.-Lukácsfürdő téli és nyári gyógyhely Budán.

NaCl tartalmúak; fürdő-használatra megfelelőleg higítottak ivógyógymód gyengébb, 5—17‰ *NaCl*-ot tartalmazó vizekkel. *Reichenhall*. Fürdő Bajorországban (457 m.). 19 sóforrása van. Az *Edelquelle*ben 228‰ *NaCl*. — *Harzburg*. Fürdő Németországban a Harzban (238 m.). Vize 66‰ *NaCl*-l tartalmaz.

7. Jódos és brómos vizek.

Azon ásványvizek, melyek e cím alatt szerepelnek, aránylag csekély jód- és bróm-tartalmúak. E vizek többnyire konyhasós vizek, néha égvényes-konyhasós vizek. *Javulatok*: torpid sero-phulosis, némely idült bőrbántalom, inveterált syphilis, l. az erős konyhasós vizeknél a *báznai* és *polhorai* sót is.

Mint jódos vizek vannak forgalomban a sok közül a következők:

Hazaiak: melyek kereskedelmi cikket is képeznek: a *Csizi* és a *Lipiki* víz.

Külföldiek: a *Kreuznachi*, *Halli* (Felső-Ausztria), *Dürkheimi* stb.

8. Földes vagy meszes ásványvizek.

Jellegüket tetemesebb kétszer szénsavas mész, kétszer szénsavas magnesium és gyps jelenléte adja meg, míg más sók bennük elenyésző csekély mennyiségben vannak. — E vizek némelyike meleg, mások hidegek, de többnyire sok szabad CO_2 -ot tartalmaznak. — A meleg fürdőkül használatnak u. a. javulatok alapján, mint a tiszta hévizek, miután lényegileg u. a. hatással bírnak. A hidegekkel ivógyógymód: Bright-kór, cystitis és pyelitis catarrhalis chronica, lithiasis, húgyfővény, köszvény, rhachitis, légutak idült hurutja eseteiben. Kitiűnök mint diaeteticus vizek graviditás és lactatio alatt a nagy Ca-szükséglet fedezése céljából. Növő gyermekeknek is czélszerű italok.

a) Melegek.

Hazaiak: *Szklensó* Fürdő Bars megyében (382 m.). Hőm. 37—53.5° C. Fürdő- és ivógyógymód. *Budapest*: *Rácz-fürdő*. Hőm. 43.5° C. Gőzfürdők is. *Rudas-fürdő*. Hőm. 45° C. Gőzfürdők is.

Külföldiek: *Leukerbad* Fürdő Svájcban. (Cant. Wallis 1415 m.) Hőm. 34—51° C. Kénsav. mész 1.3‰. Alpesi klíma. Fürdő- és ivógyógymód. *Bagnères de Bigorre*. Fürdő Franciaországban.

Teuscher dr. gyógyintézete Oberloschwitz-Weisser Hirsch, Dresden mellett, fizik.-diétás gyógmódok ideg-, szív- és bél-betegek részére. (L. hird.)

Kristály-forrásásványvíz étvágyat javít, gyomorrontást megakadályoz.

szágban (Dép. Hautes Pyrenées, 579 m.) Hőm. 18—51° C. Sok forrás; meszes hévvizek mellett kénes és vasas források is.

b) Hidegek.

Hazaiak: Szinnye Lipóczi *Salvator*-forrás. Kereskedés útján palaczkozva árusíttatik el. Kitűnő víz, olyan mint a Wildungeni, *Sultán*, *Szt.-Andrási*. Gyengébb, de még mindig elég Ca tartalmú víz sok van az ú. n. egyszerű savanyú vizek között is. *Baldóczi*.

Külföldiek: *Wildungen*. Fürdő Németországban a Waldeck herczegségben (300 m.). Legerősebb a Helenenquelle, melyben 1.3‰ kétszer szénsavas mész, 1.4‰ kétszer szénsavas magnesium, 0.9‰ natr. bicarbonic., 1‰ konyhasó és sok szabad CO_2 . — *Lippspringe*. Fürdő Németországban. Az Arminiusquelleben 0.6‰ kétszer szénsavas mész, 0.8‰ gipsz, u. a natr. sulf., sok szabad CO_2 és légenyágz. Enyhe klimája folytán különösen tuberculoticusok gyógyhelye. — *Inselbad*. Fürdő Németországban Lippspringe-től nem messze. Földes-konyhasós források sok légenyágzsal. Tuberculoticusok gyógyhelye, mint Lippspringe. — *Weissenburg*. Fürdő Svájcban (896 m.).

Francziaországban látogatottak: *Cransac* (Dép. Aveyron. *Contrexeville* és *Vitel* (Dép. Vosges), *Saint-Armand* (Dép. Nord).

9. Vasas ásványvizek.

A vas mint kétszer szénsavas vasoxydul van jelen, legalább is 0.03‰ mennyiségben. Többször hideg vizek, meleg csak néhány van. *Tiszta vasas savanyú vizeknek* nevezzük azokat, melyekben a kétszer szénsavas vasoxydul és tetemes szabad CO_2 mellett kevés más számbavehető alkatrész van; ezek mellett ismerünk és használunk: *földes-vasas savanyúvizeket*, *érvényes-vasas savanyúvizeket*, *érvényes-konyhasós-vasas savanyúvizeket*, s végül *glaubersós-vasas savanyúvizeket*. A melegek főleg fürdőgyógy-módra szolgálnak, midőn a fürdő hőmérséke s a jelenlevő szabad CO_2 a gyógyhatányok; a kétszer szénsavas vasoxydul a bőrön át föl nem szívódik. A fürdési javalatok nagyrészt olyanok, mint az egyszerű hévvizeknél. Hideg vasas vizekkel főleg ivógyógymód, néhol melegítve fürdőgyógymód is. — Ivógyógymódra a javalatok sokfélék lehetnek a víz vegytartalmához képest. Általánosabb javalatok: chlorosis, olygaemia, általános gyengeség, idült neurosisok vérszegény alapon. Ellenjavalat: lázas bántalmak, tuberculosis, gyomorbántalmak. Előnyös e vizeket ivógyógymódra helyben használni.

Bad Wildungen hólyag- és vesebajosok részére, Helenen forrás és Georg-Victor-forrás. (L. hird.)

Szt.-Lukácsfürdő téli és nyári gyógyhely Budán.

Bad Wildungen

hólyag- és vesebajosok részére.

Látogatók száma 1909-ben 11,653.

ORVOSOK:

1. Dr. Abée; 2. Dr. Born; 3. Dr. Fritz; 4. Dr. Goldberg; 5. Dr. Kaufmann; 6. Dr. Kraft; 7. Dr. Krüger; 8. Dr. Marc titkos egészsz. tanácsos; 9. Dr. Meyer; 10. Dr. Münter; 11. Dr. Reinhold egészsz. tanácsos; 12. Dr. Fritz Rörig; 13. Dr. Schmitz; 14. Dr. Schultheis; 15. Dr. Waldschmidt docens; 16. Dr. Winkhaus.

Helenen-forrás javalt

1. az ugynevezett húgysavas diathesis, vese-homok, köszvény, vese- és hólyagkövek ellen;
2. idült vesegyulladásoknál fehérje kiválasztással vagy anélkül;
3. izgalmi állapotok következtében föllépett hólyaghurut ellen;
4. a vizeletelválasztó szervek vérzésénél, amint azok az említett bajoknál föl szoktak lépni;
5. vesemedenczehurutok eseteiben.

Georg-Viktor-forrás javalt

1. idült hólyaghurutnál, különösen a vizelet alkalescentiájával járó alakjainál.
2. a hólyag gyöngeségi állapotánál, amely részben vizeleti nehézségekben, részint önkéntelen vizelésben nyilvánul;
3. a dűlmirigy és a húgycső folyásánál;
4. női bajok és vérszegénység eseteiben.

1909-ben 1,640.485 üveggel kelt el.

Az orvos uraknak saját használatukra a vizet önáron szállítjuk.

A wildungeni források egyikéből sem termelnek sókat. A kereskedelembe előforduló sók csak **mesterséges készítmények**, a melyekről dr. Fresenius titk. udv. tan. kimutatta, hogy vízben csak **részben** oldódnak.

A fürdő leírását és a víz használati utasítását díjtalanul és bérmentve küldi

Fürstliche Wildunger Mineralquellen A.-G.

Istvánuti Sanatorium és Vizgyógyintézet

Budapest, Hungária-ut 9.
A főváros egyik legegészségesebb pontján ujonnan épült, legmodernebbül felszerelt magángyógyintézet sebészeti, □ nőgyógyászati, belbetegek és idegbetegek részére. Tágas, világos, pazar kényelemmel berendezett betegszobák. Villanyos világítás, központi fűtés, fedett és fűtött folyosók. Két műtőterem, gondos ápolás. Kitűnő ellátás. Állandó orvosi felügyelet. Röntgenlaboratorium. Vegyi és górcsőlaboratorium. Vizgyógykezelés bejáró betegek számára is, orvosi kezelés és felügyelet mellett. Massage. Villanyos fürdők. Fény- és hőfürdő. Szénsavas fürdők. Napfürdő. Az összes elektrotherapeutikus eljárások. Svéd gimnasztika. Prospectus kívánatra. Telefon szám 80 - 01. Igazgató főorvos:

Külön férfi és
női osztály. □□
Mérsékelt árak.

dr. dapsai Dapsy
Victor, operateur.

a) *Melegek.*

Hazaiak: *Vihnye* Fürdő Barsmegyében (310 m.). Víz hőmérséke 35—38° C. főleg fürdőgyógymód, de a források ivógyógymódra is használtatnak. Régi forrásban 0·03‰ kétszer szénsavas vasoxydul, kis mennyiségű szabad CO_2 . Az új artézi forrásban kevesebb a vas. — *Szliács*. Fürdő Zólyommegyében (360 m.). Hideg, langyos és meleg források. Az ivásra szolgáló hideg források közül a József-forrás a legfontosabb, mely tiszta vasas savanyú víz. Vannak langyos, ivásra is használt földes-vasas szénsavdús források is (Lenkey-, Dorottya-forrás). Fürdőül 25—30° C. hőjű források szolgálnak, bő szabad CO_2 tartalommal. Legmelegebb az I. sz. tükröfürdő, mely földes-vasas víz.

Külföldiek főleg Franciaországban találhatók; ilyenek: *Rennes*, *Bagnères de Bigorres*, *Barbolan*.

b) *Hidegek.*

Hazaiak: *Buziás*. Fürdő Temesmegyében. Forrásai vasas savanyúvizek. Ivógyógymód. Fürdők mesterségesen és czélszerűen melegített ásványvízzel. József-forrásban 0·16‰ kétszer szénsavas vasoxydul, tetemes szabad CO_2 . Kissé gyengébb, de még mindig hatalmas vastartalmú a Mihály-forrás. — *Koritnyicza*. Fürdő Liptó megyében (847 m.). Főleg ivógyógymód. A forrásokban kétszer szénsavas vasoxydul 0·084—0·097‰, e mellett tetemes gipsz, kétszer szénsavas mész, kénsavas magnesium és közép mennyiségű szabad CO_2 . — *Borszéki* Kossuth-kút. Fürdő Csikmegyében (882 m.). A Kossuth-kút vize 0·09‰ kétszer szénsavas vasoxydult tartalmaz. Ivógyógymód. — *Új-Lubló*. Fürdő Szepesmegyében (556 m.). A forrásokban kétszer szénsavas vasoxydul 0·04—0·05‰. E mellett tetemes kétszer szénsavas magnesium és mész; igen sok szabad CO_2 . Ivógyógymód. Fürdők is melegített ásványvízzel. — *Parád*. Fürdő Hevesmegyében. A *Clarisse-forrás* tiszta vasas savanyúvíz. Kétszer szénsavas vasoxydul 0·05, dús szabad CO_2 tartalom. — *Előpataka*. Fürdő Háromszék megyében (624 m.). Ivógyógymód. Források égvényes vasas-savanyúvizek. Kétszer szénsavas vasoxydult 0·079 0,096-ig, kétszer szénsavas natriumot 1·1‰—1·2‰-ig, kétszer szénsavas magnesiumot és meszet szintén tetemes mennyiségben, ép úgy szabad CO_2 -at is. — *Tusnád*. Fürdő Csikmegyében (635 m.). Ivóforrásokban 0·1—0·19‰ kétszer szénsavas vasoxydul; ezek közül a Rezső-forrásban 2‰ $NaCl$. A főkút vize, mely szintén vasra szolgál, égvényes sós-vasas savanyúvíz, 0·04‰ kétszer szénsavas vasoxydul és 1·2‰ kétszer szénsavas natrium tartalommal. Melegített vízzel fürdőgyógymód. — *Bártfa*. Fürdő

Buziási Phönix ásványvíz vese- és hólyagbajoknál, a vesemedence idiült hurntjánál és fővény-képződésnél, a légző és kiválasztó szervek hurutos bántalmainál kitűnő hatású. (L. hird.)

Kristály-forrásásványvíz étvágyat javít, gyomorrontást megakadályoz.

Sármegyében (318 m.). Ivógyógymód s mesterségesen melegített ásványvízzel fürdőgyógymód. Források többsége égvényes-sós-vasas savanyúvíz, a lobogó-forrás pedig égvényes-vasas-savanyúvíz, $0.08\frac{0}{00}$ kétszer szénsavas vasoxydullal, $1.6\frac{0}{00}$ natr. bicarb.-al, sok szabad CO_2 -val. Az Orvos-forrás égvényes-sós savanyúvíz $4.8\frac{0}{00}$ natr. bicarb.-al, $1.1\frac{0}{00}$ NaCl -al, kevés vassal. — *Tarcsa*. Vasmegyében (346 m.) kies subalpin vidéken. A *Ferencz-forrásban* $0.07\frac{0}{00}$ vashydrocarbonát. *Károly-forrás* égvényes sós savanyúvíz. Vasláp helyben. — *Gyertyánliget (Kabola-Polyána)* $0.08\frac{0}{00}$ vashydrocarb. — *Korondi* Ivóforrás. $0.053\frac{0}{00}$ vashydrocarb. és $0.33\frac{0}{00}$ natr. hydrocarb. sok szab. CO_2 . Egy másik forrása erős sós víz (l. ott).

Külföldiekre hazánk nem szorul ugyan, de mégis legyenek megemlítve itt a következő ismertebbek: *Spaa*. Fürdő Belginmban. Tiszta vasas savanyúvíz források 0.05 – $0.2\frac{0}{00}$ kétszer szénsavas vasoxydul tartalommal. — *Pyrawarth*. Alsó-Ausztriában, Bécsből nem messze. Tiszta vasas savanyúvíz, szabad CO_2 benne kevés, $0.1\frac{0}{00}$ kétszer szénsavas vasoxydul tartalommal. — *Schwalbach*. Fürdő Németországban, Nassanban. Ivógyógymódra szolgál a Stahlquelle, $0.08\frac{0}{00}$ kétszer szénsavas vastartalommal, sok szabad CO_2 -al. Tiszta vasas savanyúvíz. — *Pyrmont*. Fürdő Németországban, Waldeck hercegségben. A Stahlquelle vize, mely a kereskedésben forgalomban van, $0.077\frac{0}{00}$ kétszer szénsavas vasoxydult tartalmaz és sok szabad CO_2 -at. Gyengébb sokkal a Helenenquelle. Konyhasós ivóforrások is vannak, dús szabad CO_2 tartalommal. Sós fürdők. — *Elster*. Fürdő Szászországban. Sok forrás, melyek — kivéve a Salzquelle-t, mely égvényes glaubersós savanyúvíz kevés vassal — mind glaubersós-vasas savanyúvizek, 0.056 – $0.085\frac{0}{00}$ kétszer szénsavas vasoxydul tartalommal, 2.0 – $5.0\frac{0}{00}$ natr. sulfur.-al és sok szabad CO_2 -al. — *Franzensbad*. Fürdő Csehországban. Számos glaubersós-vasas savanyúvíz-forrás. A Stahlquelle $0.07\frac{0}{00}$ ketted szénsavas vasoxydult tartalmaz. A Salzquelle égvényes-glaubersós savanyúvíz. — *Marienbadi Ambrosiusquelle* olyan, mint a buziási vizek, csakhogy Na_2SO_4 tartalmú

Függelék a vasas vizekhez. Vaszgáliczos vizek.

Kénsavas vasoxydot és oxydult, kénsavas aluminiumot, némelyike arseutrioxydot vagy arsenessavas natriumot is tartalmaz; töményebbek fürdőül, gyengébbek vízzel vagy borral erősen ligítva ivásra is használtatnak, nagyrészt ugyanoly javalatok alapján, mint a tiszta vasas savanyúvizek.

Hazai: *Parádi vasas-arzénes víz* ($0.0067\frac{0}{00}$ As.), hasonló a levicói ivóforráshoz. Fürdő Hevesmegyében.

Külföldiek: *Roncegno*. Fürdő déli Tyrolban (535 m.). Kénsavas vasoxydul $4.2\frac{0}{00}$, kénsavas aluminium $1.3\frac{0}{00}$, arsenes-

Tarcsa gyógyfürdő (a magyar Franzensbad), speciális női és szívgyógyfürdő, világhírű vasláp. (L. hird.)

Szt.-Lukácsfürdő téli és nyári gyógyhely Budán.

A hiteles vegyi elemzések, a geológiai vizsgálatok adatai, kapcsolatban a mintaszerű foglalkozással és kútberendezéssel, valamint a vízkezelés körüli legmodernebb technikai eljárásokkal az **alkalikus sós savanyuvizek** között első helyet biztosítanak a

SZAPLONCAI KORONA

gyógyforrás vizének.

E kitűnő ízű gyógyvíz absolute tiszta, csirmentes. A hasonló irányu legelterjedtebb külföldi gyógyvizeket úgy konyhasó (18.48 gramm), mint natrium-bicarbonat (53.79 gramm) tartalmára nézve lényegesen felülmúlja, szabad szénsav-tartalma pedig legalább háromszor akkora.

Specifikus gyógyhatásu a légző- és emésztőszervek hurutos megbetegedései esetén, főleg gége- és tüdőhurut, gyomorégés, emésztési zavarok, gyomorfekély, sárgaság, vese- és hólyagbántalmaknál, köszvénynél stb.

Főraktár: **BRÁZAY KÁLMÁN** cégnél
BUDAPEST, VIII., BAROSS-U. 43.

Trencsénteplicz

Természetes iszapfürdők
35°—42° C hőfoku kénes
..... források.
Radiumkisugárzások.

Milliók uj építkezések.
Uj fürdők. Uj szállodák.
:::: Uj iszapfürdők. ::::

500 év óta gyógyít: köszvényt, csuizt, benu-
lást, ischiaststb. Hidegviz- és medikomecha-
nikaiintézet. Ivókurák. Termalzuhanyésszén-
savas fürdők. Belégzés. Diätetikus étterem.
Festői szép vidék. Uj tulajdonosok. Egész
évben nyitva. Főidény május 1-én kezdődik.
Junius 15-ig és szeptembertől mérsékelt árak.

Prospektussal
szolgál a Fürdőigazgatóság.

sav 0.067‰ . Mint arsenes víz nagybíró, nemcsak vérszegénység hanem idült bőrbajok, idült idegbántalmak eseteiben is. Ivó- és fürdőgyógymód. — *Levico*. Fürdő déli Tyrolban (520 m.). Az erős vízben, mely fürdőkhöz vétetik 4.9‰ kénsavas vasoxydul. 0.88‰ kénsavas aluminium, 0.0015‰ arsenessavas natrium van; ivóvízben 0.48‰ kénsavas vasoxydul, 0.0016‰ arsenessavas natrium foglaltatik. Javalatok, mint a Roncegno-i víznél. — *Gubertforrás*. (Srebenica Boszniában).

10. Kénes vizek.

Nagyrészüik hévvíz. A kén mint H_2S , CO_2 , azután mint natrium-, kalium-, calcium- és magnesium-kénmáj foglaltatik e vizekben. Tartalmazhatnak e vizek még tetemesebb szabad CO_2 -at is, midőn kénes savanyú vizeknek nevezetnek, továbbá konyhasót, s ekkor konyhasós-kénes vizek, vagy mészsókat, midőn messzes-kénes víz a nevük, végre kettő szénsavas natriumot, ez utóbbiak azután az égvényes-kénes vizek. A meleg vizek főleg fürdő alakjában, néha ivógyógymód céljaira is használtatnak; a hidegek főleg ivógyógymódra szolgálnak, de mesterségesen melegítve fürdők alakjában is alkalmazásba vétetnek.

Javalatok a fürdőkre: idült rheumaticus bántalmak, idült neuralgiák, idült fémmérgezések, körzeti hidegek, csont-caries és necrosis, köszvény, idült fennálló lobos izzadmányok, pityriasis versicolor, prurigo.

Javalatok ivógyógymódra: plethora abdominalis, légutak idült hurutjai, idült fémmérgezések, idült bőrbántalmak.

a) Melegek.

Hazaiak: *Harkány*. Fürdő Baranyamegyében. Fürdőgyógymód. Egyszerű kénes hévvíz. Hőmérsék 62.2°C . — *Budapesten*, a következő fürdők meszes-kénes hévvízű forrásokkal bírnak: melyek főleg fürdésre, de néha ivógyógymódra is használtatnak. *Császárfürdő*. Különböző hőfokú források. Gyógyforrás hőmérséke 59°C . Iszapfürdő is. *Szt-Lukács-fürdő*. Különböző hőfokú források. Buzogó 60°C . Kitűnő iszapfürdő és más gyógyhatányok és berendezések is (pl. hidegvízgyógyintézet) *Margitsziget*. Hőmérséke 43°C . *Városligeti artézi fürdő*. Hőmérséke 73°C . — *Pöstyén*

Szent-Margitszigeti üdítővíz a lezkiválóbb, szénsavval telített ásványvíz, igen kellemes asztali ital. (L. hird.)

Császárfürdő Budapesten, nyári és téli gyógyhely eszosos bántalmak és idegbajok ellen. (L. hird.)

Kristály-forrásásványvíz étvágyat javít, gyomorrontást megakadályoz.

Ozofluin ideális készítmény, remek illatú, pompás fluorescentiát mutató fenyőlevélfürdő készítésére közönséges fenyőlevélfürdő helyett. (L. hird.)

vagy *Pistván*. Fürdő Nyitra megyében. Meszes-kénés hévvíz. Hőmérséke $60-64^{\circ}\text{C}$. Iszapforrások, iszapfürdők. Iszapot el is szállítják házi használatra. — *Varasd-Toplica*. Fürdő Varasd megyében. Meszes-kénés hévvíz. Hőmérséke 57°C . — *Trencsén-Teplitz*. Fürdő Trencsén megyében. Meszes-kénés hévvíz. Hőmérséke $38-40^{\circ}\text{C}$. — *Hercules-fürdő*. Krassó-Szörénymegyében. A Szapáry-, Erzsébet- és Lajos-források konyhasós-kénés hévvizek, $45-48^{\circ}\text{C}$. hőmérsékkel; NaCl -tartalmuk $1.80_{\infty}-3.7_{\infty}$ között. A Herkules-forrás egyszerű konyhasós hévvíz (l. e. cz. a.).

Külföldiekre nem vagyunk utalva. Megemlítenők: *Baden Bécs mellett*, számos földes-konyhasós-kénés hévforrással, melyek hőmérséke $24-26^{\circ}\text{C}$. — *Achen*. Nagy város Németországban. Forrásokban kénvegyületek mellett tetemes mennyiségű konyhasó, natr. bicarb. és kevés natr. sulf. Hőmérsékük $47-55^{\circ}\text{C}$. Ivó-, fürdő- és belehelési gyógymód. — *Schinznach*. Fürdő Svájcban. (Aargau.) Meszes-kénés hévvíz, sok calcium-sulphid. Hőmérséke $25-34^{\circ}\text{C}$. Ivó- és fürdőgyógymód. — Franciaországi nevezetes fürdőhelyek: *Aix les Bains*, *Luchon*, *Barèges*, *Cauterets*, *Eaux Bonnes*, *Eaux Chaudes*.

b) Hidegek.

Hazaiak: *Parád*. Fürdő Heves megyében. A *Csevicze* égvényes kénés savanyú víz, sok szabad CO_2 -al. Ivógyógymód. — *Leibicz*. Fürdő Szepes megyében (754 m.) Egyszerű kénés víz, kevés szabad CO -al. Mesterségesen melegített vízzel fürdőgyógymód. — *Szobráncz*. Fürdő Ung megyében. Konyhasós-kénés savanyúvíz; a főforrásban 6_{∞}NaCl . és közép mennyiségű CO_2 . Ivó- és fürdőgyógymód. *Balfi* Katalin-forrás 0.98_{∞} natr. bicarb. és közép menny. szab. CO_2 .

Külföldiek: *Weilbach*. Fürdő Németországban. Egyszerű kénés víz. — *Nenndorf*. Fürdő Németországban. (Hessen). Meszes kénés víz. — *Enghien*. Fürdő Franciaországban (Seine et Oise dép.). Meszes-kénés víz.

11. Egyszerű hévvizek.

Fürdőgyógymód. Források hőmérséke $22-80^{\circ}\text{C}$. között. A $40-45^{\circ}\text{C}$.-nál melegebbek fürdőzés céljaira lehűtetnek. Hőmérsék szerint hűvösek ($22-28^{\circ}\text{C}$.), langyosak ($28-35^{\circ}\text{C}$.), mele-

Pöstyén Magyarország legkitünőbbben berendezett és legnagyobb gyógyhatású fürdőhelye csúz, köszvény, ischias és izzadmányok ellen, 60°C . természetes meleg kéniszap-források, gyenge szervezetűek részére különleges gyógymód, téli és nyári kúra (L. hird.)

Trencsén-Teplicz, természetes hőfokú 42°C . kénés források köszvény, csúz, bémulás, neuralgia, ischias ellen, diétetikus étterem, hidegvízgyógyintézet. (L. a szemben levő hirdetést.)

Szt.-Lukácsfürdő téli és nyári gyógyhely Budán.

Szent - Margitszigeti GYÓGYVIZ



118.5 méter mély artézi kútból nyert, 43.3° C-ról lehűtött kristálytisza, bakteriummentes kén- (carbonil sulfid) és lithium-tartalmu ásványvíz. Fokozza a gyomor és bél tevékenységét s az epe kiválasztást, javítja az étvágyat, kitűnő eredménnyel használják: gyomor-, bél- és májbajoknál; vese- és hólyagzavaroknál, nemkülönben csúzos és köszvényes megbetegedéseknél.

Szent - Margitszigeti ÜDITŐVIZ

kellemes ízű és egészséges, szénssavval telített **ásványvíz**. Ugy magában, mint borral keverve kedvelt elsőrendű üdítő és szomjait csillapító ital.


A fővárosi közmunkák tanácsa tulajdona.
A Szent-Margitsziget Gyógyfürdő
Felügyelőségének kezelésében
Budapest.

Telefon-szám : 36-52.

Telefon útján adott rendelések
egész nap és éjjel is felvételnek.

Szénsavfürdő-Készülékek

a víznek cseppfolyós szén-
savval való telítésére



Dr. Wágner és Társai

Egyesült Gyárak Részvény-Társaság,
Budapest, IX. ker., Tinódy-utca 3,

különlegességi gyártmánya

!! Számos elismerőlevél !!

Tessék a 267. számú illusztrált ismertetést kérni.

gek (35—40° C.), forrók (40—45° C. Jellemző rendkívüli szegénységük gáztartalomban és szilárd részekben. A *hűvös fürdők* az anyagcserét enyhén fokozzák; a javalatok ezen hatásból indulnak ki. A *langyos hévizek* javalatai igen sokfélék, legtöbb javalatot az idült idegbántalmak szolgáltatják; neurasthemia, hypochondria, hysteria oly esetei, melyek izgalmi tünetekkel járnak, tabes dorsalis, neuralgiák, körzeti hűdések, idült fennálló lobos izzadmányok, különösen medenczebeliek, hosszúra nyúló reconvalescencia, korrai elaggás, általános gyengeség. *Meleg és forró hévizeket* illető javalatok: idült izom- és ízületi rheumatismus, köszvény s ezek következményei, csontcaries és necrosis, idült lobos izzadmányok, súlyosabb neuralgiák (isehias), idült fémmérgezések.

Hazaiak: *Hévíz.* Fürdő Zalamegyében, közel Keszthelyhez. Hőm. 33° C. Iszapfürdők is. — *Krapina-Teplisz.* Fürdő Horvátországban, Varasdmegeében. Hőmérséke 41—43° C. Erdei klíma. — *Daruvár.* Fürdő Szlavóniában, Pozsega megyében. Hőmérséke 42—45° C. Iszap- és lápfürdők is. — *Sztubnya.* Fürdő Turóc megyében (518 m.). Hőmérséke 40—16.5° C. Subalpin klíma. — *Rajecz-Teplisz.* Fürdő Turóc megyében (420 m.). Hőmérséke 33° C. — *Nagyvárad mellett a Szt. László v. Püspök-fürdő* és a *Felixfürdő.* (34—41° C. hőm. különböző források és medenezék). *Menyháza,* Arad megyében (300 m.) 32° C. hőm.

Külföldiek: *Tobelbad.* Fürdő Stájerországban, Grácztól nem messze. Hőmérséke 25—29° C. Erdei klíma. — *Neuhaus.* Fürdő Stájerországban Cilli mellett. Hőmérséke 34—35° C. Enyhe klíma. — *Pfäfers* és *Ragaz.* Fürdők Svájcban. Pfäfers (683 m.) zord klímájú; víz hőmérséke 37° C., mely innen facsőveken Ragazba (521 m.) vezetetik, hol 34° C. Ragaz klímája subalpin. — *Römerbad.* Fürdő Stájerországban (237 m.). Víz hőmérséke 36—38° C. Enyhe klíma, dús növényzet. — *Tüffer.* Fürdő Stájerországban. Hőmérséke a víznek 35—39° C. Erdei klíma. — *Wildbad-Gastein.* Salzburg tartományban (1047 m.). Hőmérséke a víznek 50° C. Alpin klíma. Víz elvezetetik *Hofgasteinban*, a hol szintén vannak fürdők. — *Teplisz-Schönau.* Fürdő Csehországban. Víz hőmérséke 28—48° C. — *Plombières.* Fürdő Franciaországban a Vosges hegységben (44 m.) Hőmérséke a víznek 20—70° C. — *Luxeuil.* Fürdő Franciaországban a Vosges-hegységben. Víz hőmérséke 30—56° C.

Mattoni-féle lápkivonatok

Szénsavas fürdőkészülékek a víznek cseppf. szénsavval való telítésére különleges gyártm. dr. Wagner és Társai bet. társ. czégnek, Budapest, IX., Tinódy-u. 3. (L. hird.)

Kristály-forrásásványvíz étvágyat javít, gyomorrontást megakadályoz.

12. Láp- és iszapfürdők. Fango.

Láp (moor). A turfa egy neme, mely víztől átjárt növényi részek elkorhadása folytán keletkezik. Alkotó részei főleg szerves anyagok: többé-kevésbé ép növényrészek, humus-anyagok, illó szerves savak; szervesetlen sók közül tartalmazhat alkali-sulfatokat, chloridokat, vas-sókat, H_2St , kénammoniót; ehhez képest megkülönböztetünk sós, vasas, kénes stb. lápot.

Iszap. Folyók, források feuekén és mentén a vízben oldott, de abból kicsapódott vagy suspendált anyagok lerakódása folytán képződik. Főleg szervesetlen sókból, kisebb részben alsórendű állatok és növények szerves maradványaiból áll. Az ásványvizek iszapja a víz természete szerint sós, vasas, kénes stb. lehet.

A láp és iszap meleg vízzel hígabb v. sűrűbb péppé keverve fürdő vagy borogatás alakjában nyer alkalmazást. Hatásukat hőmérséküknek (rossz hővezetők) és a bennük foglalt chemiai és mechanikai bőrizgató anyagoknak köszönik. — Javalatok: Idült neuralgiák, körzeti hűdések, idült lobos izzadmányok, különösen a női ivarszervek idült lobos bántalmai, az impotentia némely alakja, idült izületi és izomesúz, köszvény.

Fango. Finom, sötétszürke iszap, mely különösen Battaglia thermáiból rakódik le. Radioactiv. Úgy haszn., mint az iszapot.

Lápfürdők. Hazánkban: Alsó Tátrafüreden, Daruvárott Borszáken, Tarcán, Buziáson, Báznán, Vásártelken, Rajeczfürdőn. — **Külföldön:** Franzensbad, Marienbad, Karlsbad, Elster, Spaa, Pyrmont, Kissingen.

Iszap-fürdők. Hazánkban: Pöstyén, Tencsén-Teplitz, Lukácsfürdő, Császárfürdő, Hévíz.

Fangointézet. Budapesten a Dr. Vándor-féle. Importált fangóból készítik a borogatásokat.

Ozofluin ideális készítmény, remek illatú, pompás fluorescentiát mutató fenyőlevélfürdő készítésére közönséges fenyőlevélfürdő helyett. (L. hird.)

Tarcsa gyógyfürdő világhírű vaslápja a frauensbadival egyenértékű, sőt a marienbadit is jóval felülmúlja és hazánkban a legjobb. (L. hird.)

Pöstyén Magyarország legkitünőbbben berendezett és legnagyobb gyógyhatású fürdőhelye csúz, köszvény, ischias és izzadmányok ellen, 60° C. természetes meleg kénes iszapforrások, gyenge szervezettek részére különleges gyógmód, téli és nyári kúra. (L. a szemben levő hirdetést)

Szénsavas fürdőkészülékek a víznek cseppf. szénsavval való telítésére különleges gyártm. dr. Wágner és Társai betárs. cégnek, Budapest, IX., Tinódy-u. 3. (L. hird.)

60° C forró rádiumos
iszapforrások

Csuz, köszvény, ischias
legelső gyógyhelye

PÖSTYÉN-FÜRDŐ

korszakos ujitásai:

1. Téli-nyári fürdő- és szállópalota.
2. Lakásosztályok thermális fürdőszobával.
3. Fizikai gyógyintézet az új fürdőben.
4. Természetes rádium-emanatórium.
5. Irrigatórium női bajok ellen.
6. Lift, központi fűtés, vacuum-cleaner.
7. Hideg-meleg vízvezeték a lakószobákban.
8. Fürdőzenekar az egész éven át.
9. Pompás új vágparti sétautak.
10. Dietétikus-vegetabilis konyha.

17.000 fürdővendég. 3000 vendégszoba. 22 fürdőorvos.

Prospektust küld a fürdőigazgatóság Pöstyén.
Budapestről 3 óra. Naponként 5 vonat.



Az új Thermia Palace-szálló Pöstyén-fürdőn.

A világ legmodernebb, legtökéletesebb
téli-nyári thermális fürdőpalotája.

Csúz, köszvény, consecutiv neuralgiák, hurutok, női bántalmak, sebészeti utóbántalmak ellen részleges begöngyölítések.

Rádium-
Inhalatorium és
Fango-Gyógyintézet
Budapest
VII. Erzsébet-körút 51.
(Köruti fürdő.)

Battagliai iszap-kezelés.
Gyógyintézeti és házi kezelés.
Fango-eladás.

Vezető orvos: Dr. VÁNDOR DEZSŐ.

XXI. Gyógyszerkülönlegességek és titkos szerek.

A m. kir. belügyminister 90.000/1903. sz. a. szabályrendeletben rendezte a gyógyszerkülönlegességekkel (specialitások) való kereskedést. Készíteni és forgalomba bocsátani csakis azokat szabad, melyekre vonatkozólag a belügyminister nyilatkozott, hogy forgalombahozatalukat tudomásul vette. A melyek \dagger -tel jelölt szert is tartalmazznak, azok „*csakis orvosi rendéltre adhatók ki*“, a minnek adott esetben a tartályon jelezve kell lenni. Minden dobozon v. üvegen a készítmény alkotórész-inek és árának s a készítő v. forgalombahozó nevének rajta kell lenni.

Kétszer keresztezett vagy hasonló hatású szert tartalmazó gyógyszerkülönlegességet rendelő orvosi vényre azt ismételtlen kiszolgáltatni csak az esetben szabad, ha a rendelő orvos az ismétlést „*repetatur*“ vagy „*reiteretur*“ szóval s újabb kelettel s aláírással rendeli el.

Nem keresztezett szert tartalmazó gyógyszerkülönlegességek a közönség részére nyilvános gyógyszerárakból orvosi vény nélkül is kiadhatók.

Nem tartoznak a gyógyszerkülönlegességekhez az organo-therapeuticus és sero-therapeutikus gyógyszerek, mindennemű oltóanyagok és tápszerek.

Alábbi sorozatban közöljük azon gyógyszerkülönlegességek jegyzékét, melyeknek forgalombahozását a m. kir. belügyminiszter 1911. év végéig tudomásul vette.

A miniszterileg tudomásul vett gyógyszerkülönlegességek hivatalos jegyzéke 1911. év végéig.

I. Magyarországiak.

A) Kézi eladásban kiszolgáltathatók:

Abaga creme medicinal. Dr.

Bayer Dezső és t., Budapest.

Anagillia. Hajós Árpád, Arad.

Anodin. Vida Ernő, Temesvár.

Antidol. Vilmos Béla, Debreczen.

Anosmin. Rozsnyai Kálmán, Arad.

Bánáti növénytea. Vértes Lajos, Lugos.

Capsine kenőcs. Dr. Järmay Gyula, Budapest.

Capsicum kenőcs. Szabady János, Budapest.

Capsulae hydrastis canadensis.

Dr. Budai Emil, Budapest.

Calcarin. Skoumal Jenő, Ujszász.

Cascara dragées. Dr. Egger Leó, Budapest.

Cascarin-táblácskák. Czollner Vincze, Székesfehérvár.

Cascarin-tabletták. Halápi Frigyes, Budapest.

China hajszesz. Jenes Vilmos, Budapest.

China vasbor. Leinzinger Gyula, Szeged.

China vasbor (Vinum. chinae

- ferratum). Radanovits Testvérek, Budapest.
- China vasbor. Rozsnyai Kálmán, Arad.
- Clinin-bonbon. Sztraka Ödön, Mohol.
- Clavethyl. Friedrich János, Malaczka.
- Clavethyl. Konez Ármin, Székelyudvarhely.
- Contratussin-pastillák (Past. thymi compos.). Bayer Antal, Budapest.
- Cukrozott cascara-labdacsok. Doby Jenő, Kalocsa.
- Digestol. Pulvis digestivus laxans. Glück R., Budapest.
- Egri víz. Irgalmasok gyógytára. Eger.
- Egyetemes emésztőpor. Konez Ármin, Székelyudvarhely.
- Elixir. ferri albuminati. Pollatsek Bertalan, Budapest.
- Elixirium ferri albuminati. Dr. Rosenberg Sándor, Budapest.
- Elixirium thymi, Bayer A., Budapest.
- Emésztő dessert-labdacsok. Konez Ármin, Szék.-Udvarh.
- Emulsio olei jecoris Coffol. Nagy Albert gyógyszerész, Csanádpalota (a Potio olei jecoris elnevezés helyett).
- Emulsio ol. jecoris. Dr. Egger Leó, Budapest.
- Energin, csukaniájolaj-csokoládé, Szigeti Frigyes és dr. Szilárd Ármin, Pécs.
- Erdélyi fogcseppek. Hintz Zoltán, Marosvásárhely.
- Essentia ferri albuminati. Szüsz István, Budapest.
- Extractum cascarae sagradae siccum. Dr. Egger Leó, Budapest.
- Fagybalzsam. Rozsnyay Kálmán, Arad.
- Dr. Fáykiss szepes-kárpáti növény-cukorka. Koller Norbert, Budapest.
- Dr. Fáykiss-féle szepes-kárpáti növénykivonat. Koller Norbert, Budapest.
- Dr. Fáykiss-féle szepes-kárpáti növény-thea. Koller Norbert, Budapest.
- Felhér fogolaj. Dr. Rosenberg S., Budapest.
- Fogcseppek. Leinzinger Gy., Szeged.
- Forti-féle sebtapasz. Török József, Budapest.
- Gaultheria-kenőcs. Halápi Frigyes, Budapest.
- Glykomaltin. Marberger Gyula, Újpest.
- Dr. Gude A., zamatos mangan vassepton. Dr. Rosenberg Sándor, Budapest.
- Gyógynövénythea. Dr. Stenner Vilmos, Marosvásárhely.
- Gyomor-cseppek. Leinzinger Gy., Szeged.
- Gyomorpor. Hegedűs János, Pozsony.
- Gyomor-thea. Dr. Egger Leó, Budapest.
- Haemogen tabletta. Szüsz István, Budapest.
- Haemogen tabletta cum chinino. Szüsz István, Budapest.
- Hajfestőszer. Leinzinger Gy., Szeged.
- Haschisch collodium. Rozsnyay Kálmán, Arad.
- Hashajtó-cukorka. Lőrinczy László, Békés-Csaba.
- Hashajtó-tabletták. Nits János, Szamosújvár.
- Hoffenreich-féle alkohol-aetherikus növényessentia. Hoffenreich Károly, Budapest.
- Hollandi gyomor-cseppek. Mihlovits István, Debreczen.
- Ichthiolsalicyl. Erényi. Szilvási Gyula, Budapest.
- Inda-kenőcs. Balázsovcics S., Sepsiszentgyörgy.
- Indaszesz. Balázsovcics Sándor, Sepsi-Szent-György.

- Iron, hangyasavas vaselixir.
Pray Valér, Budapest.
- Izzadás elleni por. Friedrich
János, Malaczka.
- Jármay-féle mellthea. Dr. Jármay Gyula, Budapest.
- Jenny-féle cseppek vagy hamburgi essentia. Botfi Kálmán, Sopron.
- Kakukfű-czukorka, Lőrinczy
László, Békéscsaba.
- Kakukfű-gyomorszesz. Lőrinczy
László, Békéscsaba.
- Kakukfű-szirup. Südy István,
Békéscsaba.
- Kali-linimentum. Zoltán Béla,
Budapest.
- Kárpáti gyomorelixir. Szegő és
Hercz, Kassa.
- Kárpáti mellszörp. Molnár Lipót,
Kassa.
- Kárpáti mellthea. Molnár Lipót,
Kassa.
- Kárpáti pasztillák. Molnár Lipót,
Kassa.
- Kárpáti thea. Szegő és Hercz,
Kassa.
- Katona-féle növényessentia-fluid.
Katona Ágoston, Alsódomború.
- Kamphor linimentum. Réthy
Béla, Békéscsaba.
- Király-féle balzsam. Grosz-Nagy-
Ferencz, Debreczen.
- Koronaszesz. Remetey Dezső,
Túrkeve.
- Dr. König Henrik hashajtó pezs-
gőpora. Dr. Szkalla László,
Budapest.
- Lactolecithin. Richter G., Bu-
dapest.
- Lacustris kenőcs. Török József,
Budapest.
- Laxa-tabletták. Leinzinger Gy.,
Szeged.
- Laxans hashajtó-csokoládé.
Konecz Ármin, Székelyudvar-
hely.
- Laxator. Bereczk Péter, Hód-
mezővásárhely.
- Laxinol. Horváth József, Szat-
márnémeti (a Laxatin elne-
vezés helyett).
- Laxo. Molnár Lipót, Kassa.
- Laxol. Korányi Lajos, Budapest.
- Lábizzadás elleni hintőpor. Fabri-
tius Guido, Nagyszeben.
- Lábizzadás elleni por. Belus
Lajos, Nagykanizsa.
- Lecithin granulée. Richter Ge-
deon, Budapest.
- Lecithinol. Richter Gedeon,
Budapest.
- Lehmann-féle arcvíz. Mihalovits
István, Debreczen.
- Levatól. Molnár Lipót, Bpest.
- Liquor ferri albuminati. Belus
Lajos, Nagykanizsa.
- Liquor ferri albuminati. Miha-
lovits István, Debreczen.
- Liquor ferri manganati pepto-
nati. Mihalovits I., Debreczen.
- Liquor ferri manganati pepto-
nati. Rozsnyai Kálmán, Arad.
- Liquor ferri manganati saccha-
rati. Mihalovits I. Debreczen.
- Lobogó. Vots Ottó, Hátszeg.
- Magyar Gölis-por. Doby Jenő,
Kalocsa.
- Magyar gyomorcseppek. Hegedűs
József, Pozsony.
- Magyar turista tapasz. Bayer
Antal, Budapest.
- Mecsek-thea elegy. Frank Sán-
dor, Pécs.
- Mellthea. Leinzinger Gy., Sze-
ged.
- Mercuro crème. Dr. Rosenberg
S. Budapest.
- Dr. Miller-féle 1. sz. mohnövény
felnőttek részére és dr. Miller-
féle mohnövény gyermekek
részére. Róth Vilmos, Brassó.
- Moh-növényselekték. Scholtz
Rezső, Pozsony.
- Dr. Molnár József-féle thea. Dr.
Héderváry Hugó, Budapest.
- Nátha elleni por. Hegedűs Jó-
zsef, Pozsony.
- Neutralis ichthyol gyógyszer-
pan. Kerpel Vilmos, Bpest.

- Neutrális kátrányszappan. Kerpel Vilmos, Budapest.
- Neutrális kéntej gyógyszappan. Kerpel Vilmos, Budapest.
- Narancsvirág-arckréme. Kerpel Vilmos, Budapest.
- Narancsvirág-poudre. Jenes Vilmos, Budapest.
- Novocol-Syrup. Richter G., Budapest.
- Ol. jecoris aselli cum lecithino. Richter Gedeon, Budapest.
- Orthoform-fogvatta. Hegedűs József, Pozsony.
- Összetett mentholszesz. Nagy Imre, Eger.
- Pastillae ferri protoxalati. Megay Artur, Kassa.
- Petrin. Halápi Frigyes, Bpest.
- Phagocithin. Richter Gedeon, Budapest.
- Pilulae cascarae sagradae cum saccharo obductae. Czollner Vince, Székesfehérvár.
- Pilulae ferri protoxalati. Dr. Budai Emil, Budapest.
- Polhorai pezsgő jódsó. Obertli József, Medgyes.
- Pozsonyi gyomorerősítő balzsam. Seehoffer előírása szerint dr. Soltz Aladár és dr. Heim Vendel és fia, Pozsony.
- Pozsonyi Seehoffer növénybalzsam. Földes László, Pozsony.
- Pilulae ferri protoxalati cum quassino. Korányi Lajos, Budapest.
- Pilulae solventes. Rozsnyay Kálmán, Arad.
- Purgáló-tabletták. Dervarits István, Siümeg.
- Purgo baby. Dr. Bayer Dezső, Budapest.
- Purgo fekvőbetegeknek. Dr. Bayer Dezső, Budapest.
- Purgo forte. Dr. Bayer Dezső, Budapest.
- Resogenum cinereum. Pollatsek Bertalan, Budapest.
- Restitutions fluid. Jahner Rezső, Temesvár.
- Santal olajcseppek. Koncz Ármin, Székelyudvarhely.
- Senega hurutpasztillák. Dr. Rosenberg Sándor, Budapest.
- Sideralbumin Richter. Richter G., Budapest.
- Soda-pasztillák. Dr. Egger Leó, Budapest.
- Solvin. Netza-ek Adolf, Bpest.
- Spiritus petrae camphoratus seu Reparatör. Kriegner György, Budapest.
- Spongillia fájdaloműző, csúsz- és köszvény-kenőcs. Koncz Ármin, Székelyudvarhely.
- Szalamiás művészszeletkek. Koncz Ármin, Székelyudvarhely.
- Szájviz. Koncz A., Székelyudvarhely.
- Szepeskárpáti köhögés elleni növénykivonat. Szenthe Lajos, Budapest.
- Székelyhavasi mellthea. Balázsovcics Sándor, Sepsiszentgyörgy.
- Székelyhavasi növényhajszesz. Balázsovcics Sándor, Sepsiszentgyörgy.
- Syrupus aromaticus. Persay Gy., Zalaúova.
- Syrup. ferri album. Dióssy-Wiederhofer. Bayer Antal, Budapest.
- Syrup. malti compos. Szabady Viktor, Mezőkovácslása.
- Tablettae ferri protoxalati. Deér Endre, Budapest.
- Tablettae lecithini Richter G., Budapest.
- Tablettae nucleini. Richter G., Budapest.
- Tablettae physiologicae. Dr. Rosenberg Sándor, Budapest.
- Tannin-csokoládé. Sztraka Ödön, Mohol.
- Telendy-féle izzadás elleni por. László Géza, Máramarossziget.

Tinctura ferri Athenstaedti. Dr. Rosenberg S., Budapest.
 Tokaji cascara-bor. Kriegner György, Budapest.
 Tokaji cascara-bor. Molnár Lipót Kassa.
 Tokaji chinahéjbor. Kriegner György, Budapest.
 Tokaji chinavasbor. Kriegner György, Budapest.
 Tokaji condurango-bor. Kriegner György, Budapest.
 Tokaji pepsin-bor. Janitsáry Iván, Budapest.
 Tordy-féle hollandi három király thea. Budapest.
 Tüdőtű-mellthea. Requini Attila, Budapest.
 Tyúkszemirtó. Belus Lajos, Nagykanizsa.

Tyúkszentapasz. Hegedűs József, Pozsony.
 Unguentum Abaga. Dr. Bayer Dezső és társa, Budapest.
 Unguentum euprocyticum. Megay Arthur, Kassa.
 Universalfluid. Külsőleg bedörzsolésre szolgáló gyógyszerkülönlegesség. Skribanek Kálmán, Temesvár.
 Vasas chininchocoládé. Rozsnyay Kálmán, Arad
 Vinum cola. Dr. Budai Emil, Budapest.
 Vinum cola-condurango. Dr. Budai Emil, Budapest.
 Vinum colae compositum. Radanovits testvérek, Budapest.
 Vinum nervinotonicum. Mihalovits István, Debreczen.

B) Csak orvosi rendeletre szolgálthatók ki.

Arsen-fersan-pastillák. Filó János, Budapest.
 Bastillo-féle fenyősyrop. Hoffenreich Károly, Budapest.
 Biodyn-tabletták. Gréb János, Poprád Alsótátrafüred.
 Brom-fersan-pastillák. Filó János, Budapest.
 Bromlecithin. Richter Gedeon, Budapest.
 Bromofarina. Hoffmann Béla, Budapest.
 Bromopan. Hoffmann Béla, Budapest.
 Brompiskóta. Hoffmann Béla, Budapest.
 Chlorkaliumos fogpép. Dr. Egger Leó, Budapest.
 Choleokinase (Duray és Raby Paris). Kerpel Vilmos, Bpest.
 Cocain-menthol-pastillák. Bayer Dezső.
 Corrosol, injectio intramuscularis. Dr. Egger L., Budapest.
 Damiana-tabletták. Dr. Egger Leó, Budapest.

Diujodin, Pastilli theobromini jodati. Bartha István, Bpest.
 Elixirium Boldo. Dr. Egger Leó, Budapest.
 Elixirium china, coca, kola. Hazslinszky Károly, Budapest.
 Elixirium ferri albuminati arsenicosi forte. Pollatsek Bertalan, Budapest.
 Elixirium ferri albuminati arsenicosi mite. Pollatsek Bertalan, Budapest.
 Elixirium ferri albuminati cum arseno forte. Dr. Rosenberg Sándor, Budapest.
 Elixirium ferri albuminati cum arseno mite. Dr. Rosenberg Sándor, Budapest.
 Elixirium ferri albuminati phosphorici. Pollatsek Bertalan, Budapest.
 Elixirium ferri albuminati cum phosphoro. Dr. Rosenberg S. Budapest.
 Elixirium ferriglycerophosphati. Gréb János, Poprád.

- Emulsio ol. morrhuae c. creosotalo. Muzsa Gy., Budapest.
- Emulsio ol. morrhuae c. hypophosphi. Muzsa Gy., Budapest.
- Ergotina stiptica. Dr. Egger Leó, Budapest.
- Essentia ferri albuminati cum arseno mite. Szűsz István, Budapest.
- Essentia ferri albuminati peptonati. Szűsz István, Budapest.
- Ferrovín. Ursits Dezső, Bpest.
- Ferrovín cum arseno. Ursits Dezső, Budapest.
- Fucus I., II. és III. Hazslinszky Károly, Budapest.
- Giliszta-csokoládé. Sztraka Ö., Mohol.
- Globuli orthoform-menthol-cocain. Pollatsek B., Budapest.
- Guajatin. Jencs Vilmos, Budapest.
- Guarana migrain-pasztillák. Dr. Rosenberg Sándor, Budapest.
- Guarana-pasztillák. Dr. Egger Leó, Budapest.
- Haemogen-tabletta cum natriobromato. Szűsz I., Budapest.
- Hashajtó étvágyczukorkák phenolphthaleinnal. Paczek Jenő, Dévaványa.
- Hazslinszky cocain-pasztillák. Vánca József, Budapest.
- Hexametin. Dr. Budai Emil, Budapest.
- Hypophosphit-tabletták. Dr. Rosenberg Sándor, Budapest.
- Injectio natr. arsenici Ziemssen. Dr. Egger Leó, Budapest.
- Injectio natr. kakodylici. Dr. Egger Leó, Budapest.
- Jodfersan-pastillák. Filó János, Budapest.
- Jujuba-elixir. Hoffenreich Károly, Budapest.
- Kali-sulfoguajakolszörp. Löbl S., Temesvár.
- Kreosot. Dr. Egger Leó, Budapest.
- Dr. Kröczer-féle gilisztacsokoládé.
- Linimenthol. Frankl A., Szeged.
- Liquor ferri albuminati arsenicalis. Mihalovits István, Debreczen.
- Liquor ferri manganati arsenicalis. Mihalovits István, Debreczen.
- Liquor hypnobromid. Glück Rezső, Budapest.
- Liquor thiocoli comp. Eibach Ödön, Budapest.
- Maltocol. Marberger Gyula, Ujpest.
- Menfor. Ursits Dezső, Budapest.
- Menthol-liniment. Löbl Sándor, Temesvár.
- Mercurin. Dr. Egger Leó, Bpest.
- Myrticol. Csatádi Artur, Tátrafüred.
- Nervinol. Barabás Lajos, Budapest.
- Neurolin Balla, (Syr. bromat hypophosphit.). Balla Sándor, Hódmező-Vásárhely (a Neurolin elnevezés helyett).
- Neutralis resorcin salicyl kén-gyógyszappan. Kerpel Vilmos, Budapest.
- Nitroglycerin-tabletták. Dr. Egger Leó, Budapest.
- Nővénylabdacs. Vértés Lajos, Lugos.
- Pántlikagilisztia irtószer. Konec Armin, Székelyudvarhely.
- Pasta dentifricia cum kalio chlorico. Dr. Rosenberg Sándor, Budapest.
- Pasta gummosa codeini. Muzsa Gyula, Budapest.
- Pastillae ferri protoxalati arsenicosi fortes. Megay A., Kassa.
- Pastillae ferri protoxalati arsenicosi mites. Megay Artur Kassa.
- Phosphor-csokoládébonbon. Finy Béla, Hódmezővásárhely.
- Phosphorsavas csokoládé. Finy Béla, Hódmezővásárhely.

- Pilulae ferri protoxalati arsenici.
 Dr. Budai Emil, Budapest.
- Pilulae hydrargyri cinereae 0.25.
 Kerpel Vilmos, Budapest.
- Pilulae hydrargyri cinereae 0.05.
 Kerpel Vilmos, Budapest.
- Pilulae kalii iodati perennes.
 Szöllősi Sándor, Nagymihály.
- Pilulae thiocolli saccharati.
 Frankl Antal, Szeged.
- Salicyl-hintőpor. Filó János,
 Budapest.
- Sarsaparilla jodszörp. Jahner
 Rczső, Temesvár.
- Sideralbumin cum arseno. Rich-
 ter Gedeon, Budapest.
- Solutio kalii sulfoguaiajoli.
 Demeter Kornél, Szászváros.
- Species diureticae. Egger I. Dr.
 Egger Leó, Budapest.
- Species diureticae Egger II. Dr.
 Egger Leó, Budapest.
- Syrupus ferri albuminati bromi.
 cum natrio kakodylico. Ba-
 yer Antal, Budapest.
- Syrup. ferri album. arsenic. forte.
 Dióssy-Wiederhofer Bayer
 Antal, Budapest.
- Syrup. ferri album. arsenic mite.
 Dióssy-Wiederhofer Bayer
 Antal, Budapest.
- Syrupus ferri albuminati bro-
 mati. Bayer Antal, Budapest.
- Syrupus ferri albuminati cum
 phosphor. Bayer A., Bpest.
- Syrupus hypophosphites comp.
 Dr. Egger Leó, Budapest.
- Syrupus hypophosphites comp.
 Krebs Géza, Arad.
- Tabl. extr. hydrastis canadensis
 cum ergotino. Dr. Egger Leó,
 Budapest.
- Tablettae ferri protoxalati cum
 arseno. Dr. Deér Eudre, Buda-
 pest.
- Tablettae ovarii. Richter G.,
 Budapest.
- Tablettae thyreoidae. Richter
 G., Budapest.
- Tablettae tribrom effervescens.
 Tablettae tribromonal efferv-
 escens. Radanovits testvé-
 rek, Budapest.
- Tablettae tonogen suprarenale.
 Richter Gedeon, Budapest.
- Tablettae uvae ursi compositae.
 Frankl Antal, Szeged.
- Tabulae ferri peptonati bro-
 mati. Bleyer Károly, Buda-
 pest.
- Tabulae ferri peptonati cum
 arseno. Bleyer Károly, Buda-
 pest.
- Tabulae polybromatae. Dr. Eg-
 ger Leó, Budapest.
- Tischler dr. szájvize. Pokorny
 G., Marosvásárhely.
- Tonocain suprarenale (5 gm.
 üvegekben). Richter G., Bpest.
- Tonocain suprarenale (üveg-
 phiolákban). Richter Gedeon,
 Budapest.
- Tonogen suprarenale. Richter
 Gedeon, Budapest.
- Vértes-féle Cu. O.-labdac. Vér-
 tes Lajos, Lugos.
- Vértes-féle szalaggilisztá-szer.
 Vértes Lajos, Lugos.
- Vértes-féle vasmész-szörp. Vér-
 tes L., Lugos.
- Vinum coca. Dr. Budai Emil,
 Budapest.
- Vinum coca-cola. Dr. Budai
 Emil, Budapest.
- Vinum coca-cola-condurango.
 Dr. Budai Emil, Budapest.
- Vinum coca condurango. Dr.
 Budai Emil, Budapest.
- Vinum gallo iodatum „Vigo“.
 Dr. Egger Leó és Egger J.,
 Budapest.
- Weigert-féle castoreum bromid.
 Dr. Egger Leó, Budapest.

II. Horvátországiak.

A) Kézi eladásban kiszolgálhatók :

- Antonio balzam. Ključec Ž.
Fužine.
- Antirheuman. Dr. Lehman, Tomislav Stiglic, Irig.
- Artritin. Jurjevč, Ivance.
- Bartulicena ljekovita mast. V. Bartulic Zágráb.
- Biljevni elixir. Fischel, Kaproncza.
- Biljevni sok proti groznici. Brodsky S. Pétervárad
- Capsulae orientales de Gamba. Brodsky S., Pétervárad
- Chinoferin. Mirko Kleščić, Samobor.
- Claven. Hrnjak M. Ivanić tvrdja.
- Crème ideal. Gobetzky A., Osieku.
- Crème Marlit Gobetzky A. Osieku.
- Digestor. Dr. Hiršl B., Zágráb.
- Elsa fluid. E. Feller, Stubica.
- Elsa pilule. E. Feller, Stubica.
- Emulsio ribljeg ulja Ladislav Gayer, Zágráb.
- Energin. A. Gobetzky, Osieku.
- Febrifugo. Jurišić P. Pakrácz.
- Fluid proti kostobolji i reumatizmu. Gobetzky, Osieku.
- Germanova životna esencija, German K., Bjelovár.
- Gonotol. Slavko Zimmerman, Ruma.
- Gyomorseppek. Ključec Žiga, Zágráb.
- Dr. Havličeka čajza želudac. Jos. Grahovac.
- Herbin. Hrnjak M., Sziszek
- Hintőpor. Praunsberger F., Zágráb.
- Illatos chinafluid. Derencsin K., Kaproncza.
- Injection arabique. Brodsky S., Pétervárad.
- Jangonin pilulák. Gayer László, Zágráb.
- Kollodin. Gjurišić J., Vrbovskom.
- Dr. Lehmana irizka pomada za lice. T. Stiglic Irig
- Dr. Lehmana vodica za lice. T. Stiglic Irig.
- Liquor of irom. Žiga Ključec.
- Marijanske želudčane kapljice. Gjurišić J., Vrbovskom.
- Markove kapljice. Redlich E., Zágráb.
- Martial. Ključec Ž., Fužine.
- Mast proti ozebiman. Brodjovin H., Zágráb.
- Mast za djecu „Mirababy crème“ Brodjovin H., Zágráb.
- Mast za djecu. Pečić J., Zágráb.
- Melem protiv kurjik očiju. Benko F., Zemunu.
- Mentholan. Palašek József, Zágráb.
- Menthospirit. Renaldi, Sziszek.
- Nilonal. M. Stakić, Zágráb.
- Nova vukovarska pomada. Franković J., Vukovár
- Osječka pomada. Gobetzky A., Osieku.
- Pakračke želudčane kapljice. Jurišić P., Pakrácz.
- Pastilli purgantes. Hondl J., Ruma.
- Pastilli željeza i haemoglobina. Sušanj P. E., Sušak.
- Pihule chololi. Mittelbach Zs., Zágráb.
- Pihulice proti zubolji. Srnka A., Glini.
- Pomada za lice. Benko F., Zemunu.
- Prašak za lice. Benko F., Zemunu.
- Prašak za probavu. Benko F., Zemunu.
- Reumatis, Žiga Ključec, Zágráb.
- Rusko mazilo. Ključec Zs., Fužine.

Slavonska biljevina. Jurišić P., Pakrácz.

Slavonski biljevni sok proti kašlju. Gobetzky A., Osiekn.
Švedske kapljice. Mittelbach Zs., Zágráb.

Syrupus haemoli guajacolicus sine arseno. (Thymocol Polašek), Polašek József, Zágráb.

Syrupus Kali sulfogujacolicus. Vidale Gusztáv, Andrijevo.

Thermalmast. Fibič, Krapina-Teplić.

Thieryev balzsam. Pregrada.

Thieryev centi-olia mast. Pregrada.

Tinctura guaco. comp. Mittelbach Zs., Zágráb.

Trihol. Dr. Hirschl B., Zágráb.

Trsatske želudčane kapljile. Sušanj P. E., Sušak.

Tussocol. Ladislav Gayer, Zágráb.

Vellofluid. Kelšić M., Samobor.

Voda za lice. Benko F., Zenica.

Zeludačni prah. Fischel A., Koprivnici.

Zeludčana sol. Suhamel E., Koprivnici.

B) Csak orvosok rendeltek:

Pilulae guajacoli comp. c. acido arsenicoso. Brodžovin H., Zágráb.

Syrupus glycerini phosphoricus comp., Polašek József, Zágráb.

Syrupus haemoli guajacolicus cum arseno. (Thymocol c. arseno Polašek) Polašek József, Zágráb.

III. Ausztriaiak.

A) Kézi eladásban kiszolgáltathatók:

Abagacrème medicinal und Ungvetum Abaga odoratum des Apothekers Desiderius Bayer in Budapest.

Abführende Pastillen mit Dihydroxyphthalophenon mit der Wortmarke „Aperen“ der Firma Oppenheimer Sohn u. Co. Ltd. in London; Depot-apotheke des Benno Rothziegel in Wien.

Abführende Phenolphthalein-Cakes mit der Wortmarke „A-B-C-Schütze“ des Apothekers Dr. Grohs-Fligely in Wien.

Abführender Tee mit der Wortmarke „Wilhelm's Tee“ des Apothekers Ferdinand Wilhelm in Neunkirchen.

Abführpillen des Apothekers Karl Brady in Wien.

Ableitende Rhabarberpillen mit der Wortmarke „Elsa“ des Apothekers Eugen Viktor Fellers in Stubica Dolnja (Kroatien).

Abrotanolpastillen des Apothekers Gustav Hell in Troppau.

Agar regulans Helfenberg mit der Wortmarke „Regulin“ der Apotheke des A. Kremel (Pächter Fr. Girsig) in Wien.

Alsol-Zinkoxyd-Streupulver mit Formalinseife mit der Wortmarke „Sudoren“ des Apothekers Paul Köller in Wien.

Ameisensaures Eisenelixir mit der Wortmarke „Iron“ des

- Apothekers Val. Pray in Budapest.
- Anker-Präparate: „Brustpastillen, Clinipillen, Eisenalbuminattinktur, Magenpillen, Magentropfen, Mineralpastillen, Pepsinpillen, Schwefelsalbe, Syrupus, Sarsaparillacomp., Thymolsalbe“, sämtlich mit der Schutzmarke „Anker“ der Apotheke des F. A. Richter in Prag.
- Antiche gocce stomatiche Marca St. Antonio des Apothekers J. Cristofolletti in Görz.
- Aromatische Eisentinktur nach Vorschrift des Dr. Hammer des Apothekers Vinzenz Lassak in Sangerberg (Böhmen).
- Aromatischer Antidolin-Spiritus mit der Wortmarke „Antidol“ aus dem chemischen Laboratorium des B. Vilmos in Debreczen.
- Aromatischer Balsam (Balsamum aromat.) nach Vorschrift des Dr. Müller des Apothekers Dr. E. Friedjung in Wien.
- Aromatische Magnesiatabletten (Magenkautabletten) der Firma Krewel & Co. in Köln am Rhein; Depotapotheke des M. Kris in Wien.
- Aromatisches schmerzstillendes Kräuterliniment mit der Wortmarke „Salviol“ des Apothekers O. Schiedek in Littau (Mähren).
- Aromatisierte Abführtabletten mit Phenolphthalein mit der Wortmarke „Laxatol“ des Apothekers Franz Linde in Melk.
- Auflösender Tee mit der Schutzmarke „Obelisk“ des Apothekers J. Birnbacher in Klagenfurt.
- Badener flüssige Schwefel-Naphthol-Seife n. Badener flüssiger Schwefelextrakt mit Menthol des Apothekers E. Rotter in Weikersdorf bei Baden.
- Balsam des Apothekers A. Thierry in Pregrada; Depotapotheke des K. Brady in Wien.
- Balsamum C l'odii aceto-borosalicylatum mit der Wortmarke „Emolan“ des Apothekers Dr. E. Kolda in Wien.
- Balsamum Collodii menthol-kalijodotannatum mit der Wortmarke „Merolin“ des Apothekers Dr. E. Kolda in Wien.
- Balsam für den Magen nach Dr. Rosa des Apothekers Dr. Karl Fragner in Prag.
- Bal-amisch flüssige Einreibung mit der Wortmarke „Wilhelm's Bassrin“ des Apothekers Ferdinand Wilhelm in Neunkirchen.
- Balsamische Einreibung des Apothekers Eduard Žižka in Dobruška in Böhmen.
- Balsamum camphoromentholi chloroformiatum (Camphoromenthol) des Apothekers Karl Vostrebal in Karolinenthal.
- Banater Kräutertee des Apothekers L. Vértés in Lugos (Ungarn).
- Benzo Bismuth Pastillen mit der Wortmarke „Digestivpastillen“ des Apothekers H. Rüdiger in Prag.
- Benzoe-Pastillen (Halskaupastillen) der Firma Krewel & Co. in Köln am Rhein; Depotapotheke des M. Kris in Wien.
- Benzoe Mentholpastillen des Apothekers Eduard Žižka in Dobruška in Böhmen.
- Berger's Teerpräparate: „Teerkapseln, Teerlikör, Teerpastillen, Teersolution, Teersyrup“ des Apothekers Gustav Hehl in Troppau.

Brom-Fersan-Pastillen des Apothekers Johann Filo in Budapest.

Bromwasser nach Dr. Erlenmeyer des Apothekers A. Moll in Wien.

Camphor-Menthol-Methyl-Salicyl mit der Wortmarke „Levatol“ des Apothekers Molnár Lipót in Budapest.

Capsulae gelatin. cum oleo santali salicylat. cum etxr. dialys. Herniariae glabrae et uvae ursi mit der Wortmarke „Trisantal“ des Apothekers I. Kalous in Kgl. Weinberge.

Capsulae gelatinosae olei santali ostind. cum resina Kawa-Kawa mit der Wortmarke „Gonosan“ der Firma J. D. Riedel A. G. in Berlin; Depotapotheke Dr. Frz. Stöhr in Wien.

Capsulae Kawa-santali mit der Wortmarke „Kawotal“ des Apothekers E. Silberstein in Wien.

Capsulae Cubebo-Kawa-Santali mit der Wortmarke „Santakavin“ des Apothekenpächters Fritz Doskar in Wien.

Capsulae Olei Cedri cavainati mit der Wortmarke „Buccavacedrol“ des Apothekers Dr. Karl Frazner in Prag.

Cascara-Sagrada-Pastillen mit der Wortmarke „Barber“ der Apotheker z. heil. Geist in Wien.

Cascarine-Leprince-Pillen des Apothekers Dr. Leprince in Paris, Depotapotheke des F. Wisinger in Wien.

Cedro-China und Cedro Ferro-China des Apothekers J. Canella in Riva.

Cedro-Ferro-China des Apothekers Luigi Betinazzi in Riva (Südtirol)

Centifoliensalbe des Apothekers

A. Thierry in Pregrada; Depotapotheke des K. Brady in Wien.

Charta balsamica camphorata mit der Wortmarke „Rheumon“ der Apotheke des Thaddäus Paraskovich in Gutenstein.

China-Eisenwein des Apothekers Koloman Rozsnyay in Arad.

China-Kalk-Laktophosph.-Wein mit der Wortmarke „Vial's tonischer Wein“ der Firma Vial freres in Lyon; Depotapotheke des Barber & Rosner in Wien.

Chinin-Eisenpillen des Apothekers Mittelbach in Wien.

20%-iges Chloroform-Camphor-Menthol-Liniment mit der Wortmarke „Antidolorin“ des Apothekers Karl Gassner in Schönlinde.

Colombo-Tabletten der Landchaftsapotheke des Hanns Gutt in Klagenfurt.

Cristalli jodati mit der Wortmarke „Jodo-alina“ der Firma Vettor Pisani in Neapel; Depotapotheke der Apotheker Vidali und Vardabasso in Triest

Desinfektionsflüssigkeiten zur Injektion nach Vorschrift des Doktor Müller: „Nr. 1. Bismuth-Desinfektion, Nr. 2. Alumin-Desinfektion, Nr. 3. Bor-Alumin-Desinfektion“ des Apothekers Dr. E. Friedjung in Wien.

5%-ige desinfizierende spirituöse Formaldehyd Glyz rinfösung mit der Wortmarke „Antisuderin“ des Apothekers Karl Gassner in Schönlinde.

Diachylon-Streupulver (Pulvis aspersorius Diachylon) des Apothekers Gustav Hell in Troppau.

- Dias'ase - Malzextraktpräparate mit Chinineisen in flüssiger und in trockener Form, sowie in Pastillen, mit unterphosphorigsaurem Kalk in Pastillen und trocken, mit unterphosphorigsaurem Kalkeisen flüssig und trocken, sowie in Pastillen, mit Pepsin (4%) trocken und in Pastillen, mit Jodkalium (4%) trocken, endlich mit Lebertrau (33 $\frac{1}{3}$ %) flüssig, sämtliche Präparate mit der Wortmarke „Dias'tasin“, der Firma Hauser & Szobotka in Stadlau, Depota'pothke, S. König in Wien.
- Echter kalifornischer Feigensyrup mit Senna mit der Wortmarke „Califig“ der Firma California Fig Syrup Comp., Depota'pothke des Klemens Twerdy in Wien.
- Eisen-Calisayapulver nach Vorschrift des Dr. Müller des Apothekers Dr. E. Friedjung in Wien.
- Eisenhaltiger Wein mit China des Apothekers Gabriel Piccoli in Laibach.
- Eisenmilchpastillen der österr.-ungar. Milchwerke in Linz a. d. D.
- Eisenmyrrhapillen nach Vorschrift des Dr. Müller des Apothekers Dr. E. Friedjung in Wien.
- Elisir di Rabarbaro ed Erbe der Apotheker Santoni's Erben (Provisor G. E. Torelli) in Trient.
- Elixirum Condurango compositum des Apothekers Eugen Matula in Radomyšl.
- Elixirum Thymi mit der Wortmarke „Contratussin“ des Apothekers Anton Bayer in Budapest, Depota'pothke des M. Kris in Wien.
- Emulsio olei jecoris aselli alb. mit der Wortmarke „Oston“ des Apothekers E. Zifferer in Wien.
- Emulsione di olio di fegato di merluzzo con pancreatina ed ipofosfito di calce der Apotheke Udovicich's Erben (Pächte: Gius, Godina) in Triest.
- Emulsione di merluzzo agli ipofosfiti di calce soda der Apotheke Santoni's Erben (Prov. Mario Santoni) in Trient.
- Emulsione di puro olio fegato di merluzzo con ipofosfiti di calce e soda des Apothekers J. Cannella in Riva.
- Extractum Hippocastani mentholo-salicylatum mit der Wortmarke „Contrheumon“ des Apothekers Dr. Karl Fagner in Prag.
- Extractum Salviae saccharatum comp. mit der Wortmarke „Novotussin“ des Apothekers J. Brady in Wien.
- Extractum Thymi saccharatum mit der Wortmarke „Pertussin“ des Apothekers E. Tasschner in Berlin; Depota'pothke A. Twerdy in Wien.
- Ferrisaccharid-Tabletten der Apotheke des A. Cumpo in Prag.
- Ferro China aromatizzato des Apothekers Rinaldo Tamanini in Trient (Tirol).
- Fersanpräparate (Fersanpulver und Fersanpastillen) der Fersanwerke des Dr. Adolf Jolles in Wien.
- Fluid mit der Marke „Schlange“ des Apothekers J. Kwizda v. Hochstern in Kornenburg.
- Formaldehydsalbe (Ungt. formetoli) 5% und 10% des Apothekers K. W. Bernatzik in Mödling.
- Formalineinreibung mit der

- Wortmarke „Lactoform“ des Apothekers R. Hauke in Wien.
- Fruchtsäure Brausesalz mit der Wortmarke „Antipositin“ der Firma Dr. Wagner & Marlier in Berlin; Depotapotheke des E. Kaiser in Pilsen.
- Glazerinstuhlzäpfchen des Apothekers Eduard Binder in Wien.
- Glycerolatum Protargoli compos. mit der Wortmarke „Viro“ der Berliner Hygienischen Gesellschaft m. b. H in Frankfurt am Main; Depotapotheke J. Scholz in Wien.
- Granulae Lichen. compos. cum extr. boldo sine alcaloido mit der Wortmarke „Scorogéne“ des Laboratoriums Clin Comar & Co; Depotapotheke des C. Brady in Wien.
- Guaninapastillen des Apothekers Karl Brady in Wien.
- Haemoglobinum depuratum liquidum mit der Wortmarke „Kronaematogen“ der Firma Siccio in Berlin, Depotapotheke des E. v. Tongel in Leitmeritz (Böhmen).
- Herbabny's Aromatische Essenz der Apotheke Dr. Alois Hellmann's Witwe Therese Hellmann in Wien.
- Herbabny's unterphosphorig-saurer Kalkeisensyrup der Apotheke Dr. Alois Hellmann's Witwe Therese Hellmann in Wien.
- Hustenstillender Kräutersaft mit der Wortmarke „Wilhelm's Kräutersaft“ des Apothekers Ferdinand Wilhelm in Neunkirchen.
- Ichthyomenthol des Apothekers Simon Edelmann in Bohorodczany.
- Jenny'sche Tropfen (Hamburger Essenz) des Apothekers Koloman Botfy in Sopron.
- 20%ige Jodkalium-Lavendellösung mit der Wortmarke „Delphin“ des Apothekers Karl Gassner in Schönlinde.
- Isovaleryl-Acetyl-Phenolphthalein-Bonbons mit der Wortmarke „Aperitol“ der Firma J. D. Riedel A. G. in Berlin; Depotapotheke des Apothekers Frz. Stohr in Wien.
- Isovaleryl Acetyl Phenolphthalein-Tabletten mit der Wortmarke „Aperitol“, Depotapotheke Franz Stohr in Wien.
- Kali-Linimentum (Zoltánsalbe) des Apothekers Béla Zoltán in Budapest.
- Kalkeisenphosphatpastillen des Apothekers Ed. Žižka in Dobruška.
- Kalkeisensyrup des Apothekers Ludwig Vértés in Lugos (Ungarn), Depotapotheke des Karl Brady in Wien.
- Karlsbader Brausepulver des Apothekers Richard Lippmann in Karlsbad.
- Karlsbader diuretischer Tee des Apothekers Ed. Worliček in Karlsbad.
- Karolinenthaler David's Thee der Apotheke des Karl Vostrebal in Prag-Karolinenthal.
- Kindersalbe (Pasta boroponipholica) mit der Wortmarke „Baby Miracréne“ des Apothekers Brodjovin in Záhřeb.
- Kräuterbalsam des Apothekers Wenzel Libovický in Trebnitz in Böhmen.
- Král Davids Brusttee der Apotheke des Eugen Gvozdanovič in Prag.
- Krewel's Sanguinalpräparate: Liquor sanguinalis und Sanguinalpillen mit Chinin; Depotapotheke des M. Kris in Wien.

- Kuknkskrantsyrup (Syrupus thymi comp.) des Apothekers Stefan Südy in Békés-Csaba.
- Laevolimentum Gaulttherio-mentholicum mit der Wortmarke „Menthosalan Jahr“ des Apothekers K. Jahr in Krakau.
- Lebertran-Chocolade mit der Wortmarke „Energin“ des Apothekers Dr. Friedr. Szilárd in Pécs (Ungarn).
- Lebertranemulsion der Firma Scott & Bowne Ltd. in London, Depotapotheke des F. Steinschneider in Wien.
- Lebertranemulsion mit Eisen mit der Wortmarke „Jecol“ des Apothekers A. Fizia in Graz.
- Lecithin Trockenmilchtabletten mit Phenolphthalein mit der Wortmarke „Visnervin“, Trockenmilchtabletten mit glycerinphosphorsaurem Eisen und Phenolphthalein mit der Wortmarke „Renasc'n“. Tabulettae extracti fici vesiculosi compositae mit der Wortmarke „Vitalito“, Depotapotheke August Kolassa in Wien.
- Lenicet-Präparate: Lenicetpasta, Peru-Lenicetsalbe, Bleno-Lenicetsalbe, Lenicet-Hautcreme, Lenicetsalbe, Lenicetstreupulver 50%, 20%, 10% der chemischen Fabrik Dr. R. Reiss in Berlin; Depotapotheke des H. Bayer in Wien.
- Likier aromatyczny manganoożelazisto-peptonowny (Liquor ferro-mangani peptonati) des Apothekers Dionys Matula in Podgórze.
- Linimenthol des Apothekers A. Frankl in Szeged.
- Linimentum balsamicum nach Dr. Lanée mit der Wortmarke „Balsamit“ des Apothekers Karl Hubáček in Königgrätz.
- Linimentum capsici cum menthol mit der Wortmarke „Capsitol“ des Apothekers O. Maly in Wien.
- Linimentum capsici compositum (Ersatz für Pain-Expeller) mit der Schutzmarke „Anker“ der Apotheke des F. Ad. Richter in Prag.
- Linimentum Gaulttheriae chloroformiatum comp. mit der Wortmarke „Gaulttherio-menthol Biskup“ des Apothekers M. Biskup in Göding (Mähren).
- Linimentum Gaulttheriae compositum mit der Wortmarke „Nerwol“ des Apothekers Dr. Jul. Franzos in Tarnopol.
- Linimentum ichthyol-jodatum compositum mit der Wortmarke „Ichthojod Regner“ der Apotheke des Albert Regner in Ledec (Böhmen).
- Linimentum Junijeri compositum des Apothekers Dominik Koukal in Iglau.
- Linimentum Mentholi des Apothekers Bronislaw Witkiewicz in Potok zloty.
- Linimentum Mentholi balsamocamphoratum des Apothekers Hermann Rubel in Lemberg.
- Linimentum Mentholi mit der Wortmarke „Mentholan“ des Apothekers Jos. Polašek in Zagráb; Depotapotheke des C. Brády in Wien.
- Linimentum Mentholi chloroformatum compositum des Apothekers Franz Sedlaček in Gaya.
- Linimentum Mentholi compositum mit der Wortmarke „Bengnéliment“; Depotapotheke Apotheke z. heil. Geist in Wien.
- Linimentum saponato-camphoratum cum Menthole et Cap-

- sico mit der Wortmarke „Menthocapsol“ des Apothekers Em. Skala in Gross-Seelowitz (Mähren).
- Liquor balsamicus und Pilulae balsamicae mit der Wortmarke „Seehofer“ des Apothekers Paul Rhedtenbacher in Wien.
- Liquor ferri manganati peptonati des Apothekers Kolom. Rozsnyay in Arad.
- Liquor ferro mangani bromopeptonati ohne Alcohol mit der Wortmarke „Brom-Blutan“. Liquor ferro-mangani jodopeptonati ohne Alcohol mit der Wortmarke „Jod-Blutan“. Liquor ferro-mangani peptonati cum China ohne Alcohol mit der Wortmarke „China-Blutan“ Depotapotheke Friedrich Girsig in Wien.
- Liquor Ferro-Mangani peptonati, Liquor Ferro-Mangani saccharati und Liquor Ferro-Mangani peptonati ohne Alcohol mit der Wortmarke „Blutan“, „Marke Helfenberg“; Depotapotheke Alois Kremel in Wien.
- Liquore di salicilato-litino-sodico des Apothekers Raffaele Godina in Triest.
- Liquor Kolae compos. cum Ferro mit der Wortmarke „Kolafer“ der Apotheke Trnkóczy's Erben in Wien.
- Liquor manganoferri peptonati mit der Wortmarke „Pepto-Mangan“ der Firma Dr. A. Gude u. Co. in Leipzig; Depotapotheke des H. Steiden in Wien.
- Lupulinpillen nach Vorschrift des Dr. Müller des Apothekers Dr. E. Frießjung in Wien.
- Luser's Touristenpflaster des Apothekers L. Schwenk in Wien.
- Magenessenz mit der Schutzmarke „Germans Lebens-Essenz“ des Apothekers Koloman German in Belovár (Kroatien).
- Magenessenz, verfertigt in Angsburg von J. G. Kiesow; Depotapotheke des Apothekers H. Elich in Wien.
- Magensalz-Pastillen des Apothekers Julius Schaumann in Stockerau (Niederösterreich).
- Magenstärkender Balsam des Apothekers F. Moro in Rottemann.
- Magentropfen (früher Mariazeller Tropfen genannt) des Apothekers Karl Brady in Wien.
- Magentropfen mit der Schutzmarke „Engel“ des Apothekers Gvozdanović in Prag.
- Magnesiumsuperoxyd-Pastillen mit der Wortmarke „Hopogau“ des Apothekers Johann Harna in Kremsier.
- Malto-Condurango und Malto-Pepsinwein der Firma Svatek & Comp. in Smichow.
- Maltoseweine: Vinum maltosae Condurango, Vinum maltosae Kola-Condurango, Vinum maltosae cum China, Vinum maltosae Chinae ferratum mit der Wortmarke „Fermaltin“, Vinum maltosae cum Pepsino der Firma Friedrich Klöckler in Prag-Lieben.
- Malzpräparate: „Malzextract mit Chinin, Malzextract mit Eisen, Malzextract mit Kalk, Malzextract mit Lebertran“ des Apothekers Gustav Hell in Troppau.
- Mariazeller Magentropfen der Apotheke des Gustav Schopf in Mariazell.
- Menthol-Dragees mit der Wort-

- marke „Bengué“ der Apotheke Dr. Bengué in Paris, Depotapotheke z. heil. Geist in Wien.
- Menthol Gummizeltchen mit der Wortmarke „Menthogom“ des Apothekers E. Silberstein in Wien.
- Menthol-Thymolpastillen des Apothekers Eugen Pavel in Brünn.
- Moospflanzensaft nach Dr. Miller's Nr. 1 und 2 des Apothekers Viktor Roth in Brassó.
- Naplast mentholo-ichthyolopaprikova mit der Wortmarke „Enturin“ des Apothekers Karl Rosenberg in Beraun.
- 20⁰/₀-ge Naphthalanpasta mit der Wortmarke „Sanan I“ und 30⁰/₀-ge Naphthalanpasta mit der Wortmarke „Sanan II“ des Apothekers Karl Gassner in Schönlinde.
- Natrium glycerophosphoricum Mangan-Eisen mit der Wortmarke „Regenerin“ der Firma Dr. Rund, Dr. O. Weil in Frankfurt a. M., Depotapotheke Dr. Grohs Fligely in Wien.
- Netter's Keuchlustensaft mit der Wortmarke „Tussipulsin“ des Apothekers Emanuel Netter in Wien.
- Nentrales Mangan-Eisenpeptonat mit der Wortmarke „Rieche“ der Firma Dr. A. Rieche & Co. in Bernburg, Depotapotheke des C. Brady in Wien.
- Pakrac'er Magentropfen des Apothekers P. Jurišić in Pakrac (Slavonien).
- Pastiglie di Catrame des Apothekerprovisors Numitore Colombis Triest.
- Pastiglie di Catrame und Pastiglie di Cassia alluminata des Apothekers Ruggero Ravasini in Triest.
- Pastiglie di Cassia alluminata der Apotheke Prendini's Erben (Prov. N. Colombis) in Triest.
- Pastilli ammon. chlorat. compositae mit der Wortmarke „Ammomint“ der Zentralapotheke Ernst Gultz in Meran (Apothekenprovisor Mag. Gröbler).
- Pastilli Natrii citrici compos. mit der Wortmarke des Apothekers Gustav Hell in Trianon.
- Pergenol-Mundwassertabletten und Pergenol-Mundpastillen der Firma Dr. H. Byck in Berlin-Charlottenburg; Depotapotheke F. Fiala in Wien.
- Perhydrol-Mundwasser mit der Wortmarke „Hygiea“ des Apothekers Karl Trnka in Kremsier (Mähren).
- Phenolphthalein Agar-Agar-Tabletten mit der Wortmarke „Agarophen“ des Apothekers Dr. v. Gross-Fligely in Wien.
- Pern-Lenicethpulver und Leuceth-Wachsseife in Pulverform mit der Firma Rudolf Reiss in Charlottenburg-Berlin; Depotapotheke Hugo Bayer in Wien.
- Phytinpräparate: Phytin, Phytintabletten, Phytin granules, Phytinum liquidum, Chiniphytin, Fortossan, der Gesellschaft für chemische Industrie in Basel; Depotapotheke des R. Seipel in Wien.
- Pilulae Chololi des Apothekers S. Mittelbach in Zágráb.
- Pillole ferro-reo-clinate antima-

- larische Marca Rosa des Apothekers Giuseppe Salvi in Dernis.
- Pilulae lecithini compositae mit der Wortmarke „Assanator“ (in beiden Packungen) Depotapotheke August Kolassa in Wien.
- Pilulae solventes compositae mit der Wortmarke „Jahr“ des Apothekers K. Jahr in Krakau.
- Pilulae thymoliceae antiobstipantes des Apothekers O. Storch in Kolin (Böhmen).
- Plenulae Blandii-Meilsner, Depotapotheke des M. Zavaros in Wien.
- Polhoraer Champagnerjodsatz des Apothekers Josef Oberthl in Medgyes.
- Potio olei jecoris des Apothekers Albert Nagy in Csanádpalota.
- Prager Haussalbe des Apothekers Dr. Karl Fragner in Prag.
- Pulverete-Präparate: Pillen mit Ferratin und Natr. jodat., Pillen mit Papayotin und Natr. bicarbon., Pillen mit ferri carbonic. oxyd., Pillen mit Menthol und Natr. bicarbon., der Firma Oppenheimer u. Sohn & Cie. Ltd. in London. Depotapotheke B. Rothziegel in Wien.
- Pulvis digestivus laxans mit der Wortmarke „Digestol“ des Apothekers R. Glück in Budapest.
- Purgierpastillen mit der Wortmarke „Dr. Paclmer Laxans“ des Apothekers Dr. Friedrich Sperling in Marienbad.
- Quecksilberresorbin 33 $\frac{1}{2}$ % und 50% der Aktiengesellschaft für Anilin-fabrikation in Berlin, Depotapotheke B. Rothziegel in Wien.
- Radhoſter Kräutertee des Apothekers Wenzel Sitta in Rožnau in Mähren.
- Reichenhaller Solepastillen des Apothekers A. Moll in Wien.
- Reinigender Sarsaparillatee mit der Wortmarke „Delphin“ des Apothekers Karl Gassner in Schönlinde.
- Rein vegetabilisches Abführmittel mit der Wortschutzmarke „Cascarets“ der Firma Sterling Remedy Company in Kramer, Staat Indiana, U. S. A., Depotapotheke des Moritz Kris in Wien.
- Rhabarberhältige aromatische Magentropfen mit der Wortmarke „St. Corona Magentropfen“ des Apothekers Hans Jaitner in Aspang.
- Rote, schmerzlindernde, aromatische Einreibung (Spiritus camphorat. aromat. comp. aether.) der Apotheke V. v. Trnkóczy's Witwe in Wien.
- Rožnauer Moospflanzenzeltchen des Apothekers W. Sitta in Rožnau in Mähren.
- Sal polybromatum effervescens des Apothekers Dr. Egger in Budapest.
- Salbeitabletten des Apothekers K. Hynek, in Prag.
- Salicyl-Milchsäure-Kollodium mit der Wortmarke „Cornin“ des Apothekers Paul Köler in Wien.
- Salimentholsalbe mit der Wortmarke „Samol“ der Apotheke des B. V. Bibns (Provisor K. Pajak) in Wien.
- Sanguinalpillen der Firma Kre-

- wel & Co., in Köln; Depotapotheke des M. Kris in Wien.
- Santal-Beneš in Kapseln des Apothekers Vinzenz Boruvka in Königl. Weinberge.
- Santal-Grötzner in Kapseln der Firma W. Grötzner in Breslau, Depotapotheke Benno Rothziegel in Wien.
- Sapomenthol des Apothekers Eugen Matula in Radomysl.
- Sapo Formaldehydi mit der Wortmarke „Luol“ des Apothekers M. Kris in Wien.
- Saponiment. ichthyol. menthol. comp. mit der Wortmarke „Gichtosan“ des Apothekers Dr. A. Friedrich in Wien.
- Schmerzlinderndes Pflaster mit der Wortmarke „Wilhelms-Pflaster“ des Apothekers Ferdinand Wilhelm in Neunkirchen.
- Scioppo di fosfolattato di calce ferruginoso des Apothekers Peter Andrović in Zara.
- Seidlitzpulver des Apothekers A. Moll in Wien.
- Sennahältiger Abführtee mit der Wortmarke „Mayeur“ und zusammengesetzter sennahältiger Abführtee mit der Wortmarke „Mayeur“ des Apothekers Gottfried Illing in Bozen.
- Slawonischer Kräutersaft des Apothekers P. Jurisić in Pakrac (Slawonien).
- Species aperitivae mit der Wortmarke „Samra“ des Apothekers A. Haas in Pottendorf bei Wien.
- Species Valeriaenae comp. mit der Wortmarke „Nervosan“ des Apothekers Alois Lukesch in Reichenberg.
- Spiritus aromaticus compositus mit der Wortmarke „Irbitolium liquidum“ des Apothekers A. L. Brunzlik in Hengersdorf.
- Spiritus Valeriaenae compos. Helfenberg mit der Wortmarke „Valfin“; Depotapotheke des A. Kremel in Wien.
- Spitzwegerichextrakt-Saft mit Kalkeisen der Apotheke V. v. Trukóczy's Witwe in Wien.
- Stärkungsliniment für Pferde des Apothekers Franz Sedlaček in Gaya (Mähren).
- Steirischer Kräutersaft des Apothekers Josef Purgleitner in Graz.
- Stylus Gaultheriae Mentholi mit der Wortmarke „Dr. Fürst's Gichtstift“ der Apotheke des Dr. Fürst in Gleichenberg.
- Syrupus caricarum compositus mit der Wortmarke „Fügel Jahr“ des Apothekers K. Jahr in Krakau.
- Syrupus jodotannicus phosphoricus mit der Wortmarke „Jecorol“ der Apotheker Barber, Rosner und Dr. Cerkis in Wien.
- Syrupus plantaginis compos. des Apothekers U. v. Trukóczy in Wien.
- Tablettae chocolatae cum Phenolphthaleino mit der Wortmarke „Darmol“ des Apothekers J. Brady in Wien.
- Tablettae extr. casc. sagradae desamar. cum phenolphthaleino mit der Wortmarke „Darman“ der Firma Dr. M. Penselmich in Offenbach am Main; Depotapotheke des C. Brady in Wien.
- Tablettae physiologicae des Apothekers Dr. A. Rosenberg in Budapest.
- Tabulettae Pulv. Liquiritiae cum Phenolphthaleino mit der Wortmarke „Kurin“ der Apotheke B. V. Bibus Erben (Provisor) K. Pajak in Wien.

- Tablettae Uval ursi comp. des Apothekers Anton Frankl in Szeged.
- Tabulaette Extracti Thymi compositae mit der Wortmarke „Primosan“ des Apothekers Hugo Meese in Wien.
- Tabulaetteae Fermocyli compositae mit der Wortmarke „Fermocyl“ der Firma L. u. N. Vial & Uhmann in Frankfurt a/M.; Depotapotheke Apotheke z. heil. Geist in Wien.
- Tabulettæ salis physiologici effervescentes mit der Wortmarke „Regenerol“ der Apotheke z. heil. Geist in Wien.
- Tablettae sal. physiolog. cum Lith. citr. comp. mit der Wortmarke „Solvurat“ des Apothekers A. v. Waldheim in Wien.
- Tabulae plumbi acetic. alum. comp. mit der Wortmarke „Statin“ des Apothekers A. Löw in Wien.
- Tamarindenpastillen des Apothekers Gustav Hell in Troppau.
- Tannobrominkolloidum mit der Wortmarke „Frostin“ der Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation in Berlin; Depotapotheke Beno Rothziegel in Wien.
- Thymomel Scillae des Apothekers Dr. Fragner in Prag.
- Tinctura ferri aperiens mit der Wortmarke „Haemofer“ des Apothekers A. Seewald in Wien.
- Tinctura Ferri manganati comp. mit der Wortmarke „Ferromanganin“ des Apothekers D. Szamatolski in Frankfurt a. M.; Depotapotheke des K. Brady in Wien.
- Tinctura gastrotonica des Apothekers W. Sitta in Rožnau in Mähren.
- Tinctura Guaco composita (Columbian Elixir) des Apothekers S. Mittelbach in Zágráb.
- Tinctura Rhei composita (Magentinktur) des Apothekers Gabriel Piccoli in Laibach.
- Tinctura stomachica purgativa mit der Wortmarke „Herbin“ des Apothekers Maximilian Hrnjak in Szis/ek (Kroatien).
- Tokayer China-Eisenwein des Apothekers G. Kriegner in Budapest.
- Trnkóczy's Hühneraugenpflaster der Apotheke V. v. Trnkóczy's Witwe in Wien.
- Dr. Verdrolis Pastilli Mentholi bromati comp. mit der Wortmarke „Brocamenth“ des Apothekers Viktor Hausser in Klagenfurt.
- Verstärkter Sarsaparilla-Extract nach Vorschrift des Dr. Müller des Apothekers Dr. E. Friedjung in Wien.
- Verstärkter zusammengesetzter Sarsaparillasyrup (Herbabny's Sarsaparillasyrup) der Apotheke Dr. Alois Hellmann's Witwe Therese Hellmann in Wien.
- Verstärkter zusammengesetzter Sarsaparilla-Syrup mit Zusatz von 2% Natr. hydrojodat, mit der Wortmarke „Purjodal“ des Apothekers Dr. Hellmann's Erben in Wien.
- Verzuckerte abführende Pillen der Apotheke der J. Bloch'schen Erben (Ph. Neustein) in Wien.
- Verzuckerte auflösende Pillen mit der Schutzmarke „Obelisk“ des Apothekers J. Birnbacher in Klagenfurt.
- Veterinärpräparate: „Kolikipillen für Pferde, Hundepillen, Grauer Blister, Gelatine-

- Wurmkapseln für Hunde, Resorbierende Salbe, Schweinepulver“ des Apothekers J. Kwizda von Hohenstern in Kornenburg.
- Vino di china ferruginoso Serravallo des Apothekers V. Dr. Serravallo in Triest.
- Vinum chinæ ferratæ comp., mit der Wortmarke China-Laroche ferrugineux. Depotapotheke Eduard Berndt in Wien.
- Vinum chinæ ferr. phosphor. mit der Wortmarke „Haematose“ des Apothekers R. Paul in Graz.
- Vinum Chinæ maltosatum ferratum „Maltosferrochin“, Vinum Chinæ maltosatum „Maltoschin“ u. Vinum Chinæ Sherry maltosatum „Maltoschinsherry“ der Firma Svátek & Co. in Smichov.
- Waldkräutertee des Apothekers E. Šedivý in Prag.
- Wismutsubnitratpastillen mit der Wortmarke „Boz“ der Firma Chem. Fabrik Bonz & Solm in Böblingen in Württemberg; Depotapotheke des M. Zavaros in Wien.
- Wohlriechendes Pflanzenessenzen-Fluid mit der Schutzmarke „Elsa“ des Apothekers Eugen Viktor Feller in Stubica-Dolnja in Kroatien.
- Wohl-schmeckender Lebertran mit der Wortmarke „Gadiol“ des Apothekenpächters F. Laznia in Brunn a. Geb.
- Wohlschmeckendes Ricinusöl mit der Wortmarke „Ricilan“ des Apothekenpächters F. Laznia in Brunn a. Geb.
- Wohlschmeckendes, gelinde wirkendes Abführmittel mit der Wortmarke „Laxigen“ des Apothekers J. Grünthal in Berlin; Depotapotheke C. Brady in Wien.
- Unguentum Salenae mit der Wortmarke „Salena“ der Gesellschaft für chem. Industrie in Basel; Depotapotheke des R. Seipel in Wien.
- Zipser Karpathen-Pflanzenextrakt gegen Husten, des Apothekers Ludwig Szenthe in Budapest.
- Zusammengesetzte Enkalyptus-Essenz der Apotheke J. Purgleitner Prov. A. Fizia in Graz.
- Zusammengesetzte Kohle-Tabletten mit der Wortmarke „Eucarbon“ des Apothekers Franz Trenka in Wien.
- Zusammengesetzte Lecithinrockenmilch-Tabletten mit der Wortmarke „Dr. Hartmann's Nervennahrung Antineurasthin“ des Apothekers August Kolossa in Wien.
- Zusammengesetztes Menthol-Kamferliniment mit der Wortmarke „Magiefluid“ (Veterinärpräparat) des Apothekers Fr. Stohr in Wien.
- Zusammengesetzte Natrium-Glycerophosphattabletten mit der Wortmarke „Regenerin“ des Dr. R. Weil in Frankfurt am Main; Depotapotheke Dr. Gross-Fligely in Wien.

B) Csak orvosok rendelkezésére bocsátottak ki:

- Acidol-Pepsin-Pastillen mit der Wortmarke „Acidol“ der Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation in Berlin; Depotapotheke des B. Rothziegel in Wien.
- Antiseptische Bor-Tanin-Orale mit Oxycinchinalin mit der

- Wortmarke „Borosol“ des Apothekers M. Placzek in Mähr. Ostrau.
- Arsen-Alboferintabletten des Apothekers G. Hell in Troppau.
- Arsoferrin-Tectolettes mit der Wortmarke „Barber“ der Apotheke z. heil. Geist in Wien.
- Atropa-Belladonna-Zigaretten mit der Wortmarke „Antasthmin“ des Apothekers Franz Selmöbling in Prag.
- Auflösende Pillen (Pilulae aperientes) des Apothekers E. Kleewein in Krems.
- Baldrin-Kampfer-Pepsinpillen mit der Wortmarke „Calmyren“ der Apotheke A. v. Grohs Fligel's Erben (Provisor O. Wittek) in Wien.
- Bi-Palatinolis-Kapseln: „1. cum ferro carbonico (capsulae minores), 2. cum ferro carbonico (capsulae majores), 3. cum ferro carbonico et natrio arsenicoso“ der Firma Oppenheim & Co. in London; Depotapotheke Bennó Rothziegel in Wien.
- Bromlecithin des Apothekers G. Richter in Budapest.
- Bromocollsalbe 10% und 20% der Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation in Berlin; Depotapotheke Bennó Rothziegel in Wien.
- Capsulae gelatinosae hydrargyri chloiei cum album. tannic. mit der Wortmarke „Mergal“ der Firma J. D. Riedel in Berlin; Depotapotheke des Frz. Stohr in Wien.
- Capsulae Guajacoli compos. des Apothekers Gustav Hell in Troppau.
- Capsulae Olei Santali cum Phenylsalicylico mit der Wortmarke „Salosin“ der Apotheke des Ad. J. Bachmann in Leitmeritz.
- Cocain-Menthol-Pastillen des Apothekers Dr. D. Bayer in Budapest.
- Cocain-Pastillen des Apothekers Jos. Vánca in Budapest.
- Cuprocitrasalbe mit der Wortmarke „Cuprocitrol“ der Apotheke Anton von Waldheim's Erben (Prov. A. Schürer von Waldheim) in Wien.
- Diastase-Malzextraktpräparate mit Codein in Pastillen und mit Phosphorlebertran, beide mit der Wortmarke „Diastasin“ der Firma Hauser und Sobotta in Stadlau, Depotapotheke S. König in Wien.
- Difluordiphenylsalbe, Difluordiphenylsalbe mit Fluorphenetol mit der Wortmarke „Fluorhenmin“, Difluordiphenylsalbe mit Fluorpseudocumol, der chem. Fabrik Valentiner u. Schwarz in Leipzig-Plagwitz, Depotapotheke Rudolf Hauke in Wien.
- Elksir cinamo sulfognajakolowy des Apothekers Martin Sobel in Stryj.
- Elixirum analgeticum des Apothekers Franz A. Heinz in Wien.
- Elixirum Avenae bromat. comp. mit der Wortmarke „Nervol“ des Apothekers Dr. Szamatolski in Frankfurt am Main; Depotapotheke des V. Bilus in Wien.

Pilulae aperientes Kleewein (Extr. Cascar. sagr., Extr. Rhei chinens. aa 30, Podophyllini, Extr. Bellad. aa 0.50, Pulv. Casc. sagr. qn. s. ut f. pil. No. 50.), évtizedek óta kipróbált és kitűnően bevált laxans. (L. hird.)

- Elixir Kolae triferrati und der Apotheke des V. Lassak in Sangerberg.
- Elixirium Kolae triferratum mit der Wortmarke „Kolaferin“ der Apotheker Dr. Fr. Kolt-scharsch & Co. in Wiener-Neustadt.
- Emulsio Chinini composita mit der Wortmarke „Dr. Fürpass Pneumulsin“ des Apothekers Dr. C. Richter in Wels.
- Extractum Hydrastis-Gossypii-Tabletten mit der Wortmarke „Haemostan“ der Apotheke Dr. Grohs-Fligely's Erben (Provisor O. Wittek) in Wien.
- Ferratin-Arsenpastillen der Apotheke z. heil. Geist in Wien.
- Flechten- und Räudeöl (Veterinärpräparat) des Apothekers J. Kwizda v. Hochstern in Kornenburg nur gegen tierärztliche Verschreibung.
- Flüssige Guajacol-Somatose mit der Wortmarke „Guajacose“ der Firma Friedrich Bayer & Co. in Elberfeld; Depotapotheke M. Kris in Wien.
- Formamin-tabletten der Firma Bauer & Co. in Berlin; Depotapotheke des C. Brady in Wien.
- Formanpräparate (Formanpastillen) der Firma R. A. Lingner in Bodenbach.
- Guajacol-Alboferintabletten des Apothekers G. Hell in Troppau.
- Guajacol-Albuminat mit der Wortmarke „Histosan“ der Fabrik für chem. und diät. Produkte in Schaffhausen; Depotapotheke des Frz. Stohr in Wien.
- Guajacol-Perdynamin der Firma C. Raupenstranch in Wien.
- Guajacolpillen des Apothekers G. Hell in Troppau.
- Haemoglobin-Eisenkaliumbro-mid-Tabletten mit der Wortmarke „Epilepton“ des Dr. R. Weil in Frankfurt am Main; Depotapotheke des Dr. Grohs-Fligely in Wien.
- Helfenberger Bandwurm-mittel der Firma Helfenberg A. G. in Sachsen; Depotapotheke Alois Kremel in Wien.
- Herbabny's unterphosphorigsaurer Kalk-Eisensyrup mit 7% Kalium'sulfogujacolicum mit der Wortmarke „Herbacol“ der Apotheke Dr. A. Hellmann's Witwe, Therese Hellmann (Prov. R. Karp) in Wien.
- Hexamethylentetramin-Salicyl-Valeriana-Syrup mit der Wortmarke „Vesicurin“ des Apothekers Dr. Grohs-Fligely in Wien.
- Hydrargyrum-Sozjodol-Alum-nol-Suppositorien mit der Wortmarke „Vaginal“ der Apotheke von Grohs-Fligely's Erben (Provisor O. Wittek) in Wien.
- Hydrastis-Tectolettes der Apotheke z. heil. Geist in Wien.
- Hypophosphitpastillen des Apothekers Aug. Joh. Scholtz in Wien.
- Indische Hanfzigaretten der Apotheke des Ubald von Trukóczy in Laibach.
- Jod-Alboferin Tabletten Nr. I und II des Apothekers C. Hell in Troppau.
- Jodfersanpastillen des Apothekers Johann Filo in Bpest.
- 10%-iges Kalium sulfogujacolicum-Thymian-Malzextrakt mit der Wortmarke „Guamaltin“ des Apothekers Karl Gassner in Schönlinde.
- Kreosotpillen des Apothekers Gustav Hell in Troppau.
- Krewel's Sanguinalpräparate: Sanguinalpillen mit Jod, mit

- Acidum arsenicos., mit Vanadinpentoxyd.
- Lactolecithin und Lecithintabletten der Apotheke G. Richter in Budapest; Depotapotheke des J. Pserhofer in Wien.
- Lebertranemulsion mit Kalium sulfogruajacol. mit der Wortmarke „Jecol“ mit Kal. sulfogruajacol. des Apothekers A. Fizia in Graz.
- Lenicet-Silberpuder 1% und 0.5% der chem. Fabrik Dr. R. Reiss in Berlin; Depotapotheke des H. Bayer in Wien.
- Lecithin lactobromatum comp. mit der Wortmarke „Brom-Lecikraton“ des Apothekers Em. Lang. in Kgl. Weinberge.
- Lecithin lactojodatum compositum mit der Wortmarke „Jod-Lecikraton“ des Apothekers E. Lang in Kgl. Weinberge.
- Liquor cosmeticus Hydrargyri chlorati mite ozonisati mit der Wortmarke „Huberin“; Depotapotheke des Anton Bayer in Hinterbrühl.
- Liquor hypnobromid. comp. des Apothekers R. Glück in Budapest.
- Liquor ferro mangani peptonati cum arseno ohne Alkohol mit der Wortmarke „Arsenblutan“; Depotapotheke Friedrich Girsig in Wien.
- Maltocol des Apothekers Jul. Marberger in Ujpest.
- Menthol-Cocain-Dragees mit der Wortmarke „Bengué“, der Apotheke Dr. Bengué in Paris, Depotapotheke Barber u. Rosner in Wien.
- Mercurosalicylat mit der Wortmarke „Protector“ der Firma Ernst Weeber, pharm. Laboratorium in Aachen; Depotapotheke des M. Zavaros in Wien.
- Milch-Lecithin und glycerinphosphorsaurer Kalk mit der Wortmarke „Lecikraton“ des Apothekers E. Lang in Kgl. Weinberge.
- Milch-Lecithin und glycerinphosphorsaurer Kalk mit sulfogruajacolsaurem Kali, mit der Wortmarke „Lecikraton c. Kalisulfogruajacol“ des Apothekers E. Lang in Kgl. Weinberge.
- Milch-Lecithin und glycerinphosphorsaurer Kalk mit Eisen mit der Wortmarke „Lecikraton cum Ferro“ des Apothekers E. Lang in Kgl. Weinberge.
- Muiralecithinpillen mit der Wortmarke „Muiracithin“ der Firma Noris, Zahn & Co. in Berlin; Depotapotheke des Karl Heidrich in Wien.
- Oleum Jecoris Aselli jodoferratum aromaticum des Apothekers Dr. Julius Franzos in Tarnopol.
- Oleum Jecoris Aselli cum Lecithino der Apotheke G. Richter in Budapest; Depotapotheke des J. Pserhofer in Wien.
- Oleum jecoris aselli phosphor. mit der Wortmarke „Ostophit“ des Apothekers E. Zifferer in Wien.
- Paglianosyrup der Firmen Girolamo Pagliano in Florenz und Ernesto Pagliano in Neapel; Depotapotheke Dr. V. Serravallo in Triest.
- Paraformtabletten des Apothekers C. Klimitschek in Wiestadt (Schlesien).
- Pasta dentifrica cum Kalio chlorico (Beiersdorfs Kali-

- chloricium-Zahnpasta); Depotapotheke C. Brady in Wien.
- Pastiglie bronchiali des Apothekers J. Cristofolletti in Görz.
- Pastiglie di Codeina des Apothekers Dr. V. Serravallo in Triest.
- Pastilli codeini mit der Wortmarke „Codam“ des Apothekers O. Maly in Wien.
- Pastilli extracti Malti cum codein. muriat. des Apothekers G. R. Camus in Abbazia.
- Pastilli Jodo-Ferratini compositi des Apothekers K. Jahr in Krakau.
- Pastilli Kolanini (Dr. Knebel) der Firma Krewel & Co. in Köln; Depotapotheke des M. Kris in Wien.
- Pastilli Phenacetini cum Guarana et Coffeino mit der Wortmarke „Guarapheninpastillen“ des Apothekers C. Brady in Wien.
- Pastilli pyramidon. c. coffeino citr. mit der Wortmarke „Nervan“ des Apothekers E. Zifferer in Wien.
- Pastylki sulfogwajakolowe z Kodeina des Apothekers Josef Pineles (Provisor Karl Josef Berger) in Lemberg.
- Phenocoll-Tabletten, Phenocollwasser I und II und Piperazin-Phenocoll-Lithiontabletten der chemischen Fabrik Falkenberg in Falkenberg-Grünau bei Berlin; Depotapotheke des K. Brady in Wien.
- Pilulae arsenical. bromat. mit der Wortmarke „Arsobromin“ des Apothekers Dr. Grohs Fligely in Wien.
- Pilulae arsenicales jodatae mit der Wortmarke „Arsojodin“ des Apothekers Dr. Grohs Fligely in Wien.
- Pilulae arsenic. jodat. cum Belladonna mit der Wortmarke „Arsojodin c. belladonna“ des Apothekers Dr. Grohs Fligely in Wien.
- Pilulae Kolae compositae des Apothekers Gustav Hell in Troppau.
- Pilulae Colchici compositae mit der Wortmarke „Scheelin“ des Apothekers Karl Gassner in Schönlinde.
- Pilulae Eucalyptoli compos. des Apothekers H. Banke in Krakau-Zwierzyniec (Galizien).
- Pilulae odontalgicae Anaesthesini compositae mit der Wortmarke „Dentolor“; Depotapotheke A. Löw in Wien.
- Pilulae Thiocoli saccharati des Apothekers Anton Frankl in Szeged (Ungarn).
- Plenulae Blandii Meihnsner cum arseno jodat. und Plenulae Blandii Meihnsner cum phosphoro; Depotapotheke M. Zavaros in Wien.
- Pastilli Theobromini jodati mit der Wortmarke „Dinujodin“ des Apothekers Stefan Barta in Budapest.
- Protargol-Chinosol-Gelatin-Glycerin-Scheidenzäpfchen mit der Wortmarke „Protanimal I“ und Argentum colloidale, Kakaobutter-Scheidenzäpfchen mit der Wortmarke „Protanimal II“ und Argentum colloidale-Kakaobutter-Vaselin salbe mit der Wortmarke „Protanimal IV“ des Apothekers Rudolf von Hillinger in Klagenfurt (Veterinärpräparate). Nur gegen thierärztliche Verschreibung.
- Protargol-Glycerin-Gelatine-Scheidenzäpfchen für Kühe mit der Wortmarke „Protanimal“ des Apothekers Ru-

dolf Rit v. Hillinger in Klagenfurt.

Pulverette-Präparate: Pillen mit Ferratin und Natr. arsenicos., Pillen mit Ferr. carbon. und acidum arsenicos. der Firma Oppenheimer Sohn & Cie. Ltd. in London; Depotapotheke des B. Rothziegel in Wien.

Pulvis Stramonii comp. mit der Wortmarke „Astmol“ der Szamotolski's Engelapotheke in Frankfurt am Main; Depotapotheke Bibus Erben in Wien.

Pulvis Stramonii comp. mit der Wortmarke „Reichenhaller Astmalanpulver“ des Apothekers A. Schmid in Reichenhall-Augsburg; Depotapotheke des C. Brady in Wien.

Pyocanase der Firma Dresdner chem. Laboratorium des K. A. Lingner in Dresden-Bodenbach.

Quecksilberfettseife 33 1/3% mit der Wortmarke „Gynorchisma hydrargyri“ des Apothekers Dr. R. Tscherne in Linz.

Salo-Kawa Cannabis-Santal mit der Wortmarke „Blenorol“ der Apotheke B. Bibus (Provisor Klemens Pajak) in Wien.

Salol-Terpinol Cnbeben-Santal-Kapseln (früher Sandkapseln) mit der Wortmarke „Euen“ des Apothekers Janke in Altona-Hamburg; Depotapotheke Josef Klein in Wien.

Sanguinalpillen mit Natriumcinnamalicum der Firma Krewel & Co. in Köln; Depotapotheke des M. Kris in Wien.

Sarsaparilla-Jodsyrop des Apothekers R. Jahner in Temesvár.

Solutio Lecithini cum ferro comp. mit der Wortmarke „Leciferrin“ der chem. Fabrik

Samotolski in Frankfurt am Main; Depotapotheke Erben Bibus in Wien.

Soluzione aromatica di colchicina des Apothekers Peter Andrović in Zara.

Species Stramonii comp. mit der Wortmarke „Reichenhaller Astmalan-Zigaretten“ des Apothekers A. Schmid in Reichenhall-Augsburg; Depotapotheke C. Brady in Wien.

Sulfognajakol Syrup und **Sulfognajakol Syrup** mit Kola des Apothekers Dr. Heinrich Mikolaseh in Lemberg.

Sulfosotsyrop der Firma Hoffmann, La Roche & Co. in Basel; Depotapotheke des S. Mittelbach in Wien.

Suppositoria analia resina Kawa-Kawa Adrenalini composta mit der Wortmarke „K-Anol“ des Apothekers Emil Silberstein in Wien.

Suppositoria Bismuthi Jodoli cum Zinco comp. mit der Wortmarke „Dolosan“ des Apothekers A. v. Waldheim in Wien.

Suppositorien mit resorcinsulfosauren Wismutoxyjodid mit der Wortmarke „Anusol“ des Apothekers K. Weinreben in Frankfurt am Main; Depotapotheke des M. Kris in Wien.

Suppositoria Sozjodol-Hydrargyri mit der Wortmarke „Bissulin“ (Scheidenzäpfchen für Kühe), **Bacilli Sozjodol-Hydrargyri** mit der Wortmarke „Bissulin“ (Stift für Bullen), (Veterinärpräparate); Depotapotheke E. Netter in Wien (Apothekenprevisor Paul Senft). Nur gegen thierärztliche Verschreibung.

Syrupus aromaticus sulfocreo-
sotic. guajacolicus mit der

- Wortmarke „Pneumocol“ des Apothekers Dr. A. Friedrich in Wien.
- Syrupus bromat. hypophosph. mit der Wortmarke „Neurolin Balla“ des Apothekers Balla in Hódmezővásárhely.
- Syrupus Bromoformii compositus mit der Wortmarke „Rami“ der Firma Fougerat in Paris; Depotapotheke des Rudolf Schober in Wien.
- Syrupus ferri calcii bromat. natr. glycerino-phosphatus mit der Wortmarke „Nerviton“ des Apothekers L. Barabás in Budapest.
- Syrupus glycerinophosphoricus compos. des Apothekers Jos. Polašek in Zágráb; Depotapotheke des C. Brady in Wien.
- Syrupus Guajacoli compos. des Apothekers Gustav Hell in Troppau.
- Syrupus Guajacoli ferratus mit der Wortmarke „Ferrosin“ des Apothekers Ed. Kohn in Jaroslau (Galizien).
- Syrupus guajacolicus sulfonicus compositus mit der Wortmarke „Guajacolin“ des Apothekers W. Supp in Wien.
- Syrupus Haemoli guajacolicus mit der Wortmarke „Thymocol“ des Apothekers J. Polašek in Zágráb; Depotapotheke des C. Brady in Wien.
- Syrupus Haemoli guajacolicus cum Arseno mit der Wortmarke „Thymocol cum arseno“ des Apothekers J. Polašek in Zágráb; Depotapotheke des C. Brady in Wien.
- Syrupus hypophosphyt. compos. des Apothekers Dr. Egger in Budapest; Depotapotheke M. Kris in Wien.
- Syrupus jodotannicus phosphoricus mit der Wortmarke „Jecorol“ des Apothekers A. Bukowski in Warschau; Depotapotheke Barber und Rosner in Wien.
- Syrupus Kalii sulfoguajacolicus mit der Wortmarke „Sorisin“ der Apotheke Herbabny's Erben (Pächter Hanz Scholz) in Wien.
- Syrupus Kalii sulfoguajacolicus codeinatus des Apothekers Gustav Szancer in Skole (Galizien).
- Syrupus Kali sulfoguajacolicus comp. mit der Wortmarke „Tuberin“ des Apothekers Örkény Hugó in Budapest; Depotapotheke E. Zifferer in Wien.
- Syrupus Kalii sulfoguajacolicus plantaginatus codeinatus mit der Wortmarke „Plantocol“ des Apothekers B. Scheinbach in Lemberg.
- Syrupus lacto creosoti solubilis mit der Wortmarke „Sirop Famel“ der Firma P. Famel in Paris; Depotapotheke Jahn und Kaš in Prag.
- Syrupus Pyrenoli compositus mit der Wortmarke „Pyrosin“ des Apothekers Siegbert Geber in Radautz.
- Syrup sulfokreosotowy des Apothekers J. Pineles (Provisor K. J. Berger) in Lemberg.
- Syrupus sulfoguajacolicus compositus mit der Wortmarke „Sirocol“ des Apothekers F. Altenberg in Wien.

Sorisin (Syr. Kalii sulfoguajac.),

Vas-Sorisin (Syr. ferri sulfoguajac.),

Sorisin-Ferrarsenat (Syr. ferri sulfoguajacolarsen). (L. hird.)

Syrupus Kolae compositus des Apothekers Gustav Hell in Troppau.

Syrupus Thiocoli compositus mit der Wortmarke „Sirolin“ der Firma Hoffmann, La Roche & Co. in Basel; Depotapotheke S. Mittelbach in Wien.

Syrupus Thiocolli et Colae comp. mit der Wortmarke „Kalikol“ des Apothekers Heinrich Sternberg in Wien.

Syrupus Thymi compositus mit der Wortmarke „Euferin“ des Apothekers V. Lassak in Sangerberg.

Syrupus Thymi compositus mit der Wortmarke „Pulmonin“ des Apothekers R. Pserhofer in Wien.

Syrupus thymosulfoguajakolowy des Apothekers Kasimir Armatus in Sanislaw (Galizien).

Syrupus valeriano-bromatus compositus mit der Wortmarke „Jahr“ des Apothekers K. Jahr in Krakau.

Tablettae jodi cum arseno et belladonna mit der Wortmarke „Jodarsotropin“ des Apothekers G. Hell in Troppau.

Tablettae sozodol-hydrargyri mit der Wortmarke „Merjodin“ der chemischen Fabrik H. Trommsdorf in Aachen; Depotapotheke des C. Haubner in Wien.

Tabloid-Präparate: Acidum benzoicum comp., Aloin comp., Bland's Pillen c. acid. arsenic., Bland's Pillen c. Aloin. sacch., obd., Bland's Pillen comp., Ferrum c. acid. arsenic. comp., Hypophosphita comp. I. und II., Kalium chloricum c. borace et cocaino comp., Laxativum Livingstone, Phenacetinum comp., Phenacetinum c. chinin comp.,

Sirupus Eastoni (schwach u. stark), Rheum comp. II. der Firma Borroughs Wellcome & Co. in London; Depotapotheke des M. Kris in Wien.

Tabulae natrii amidophenylarsinici comp. mit der Wortmarke „Noton“ der Fabrik C. A. Tielecke in Sehl a. Mosel; Depotapotheke des C. Brady in Wien.

Tabulettae acidi thymnici compositae mit der Wortmarke „Solurotabletten“; Depotapotheke C. Brady in Wien.

Tannocol-Chocoladetabletten der Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation in Berlin; Depotapotheke Benno Rothziegel in Wien.

Theobromin Quebrachotabletten mit der Wortmarke „Dispnon“ der Apotheke A. v. Grohs-Fligely's Erben (Provisor O. Wittek) in Wien.

Thyreothobrominpillen Nr. I. und II. des Apothekers Dr. K. Fragner in Prag.

Tinctura ferri aperiens arseniata mit der Wortmarke „Arsen-Haemofer“ des Apothekers A. Seewald in Wien.

Tinctura ferri aromatica arseni-cosa Athenstaedt der Firma Athenstaedt & Redeker, chemische Fabrik in Hemelingen bei Bremen; Depotapotheke des C. Brady in Wien.

Tinctura ferri sulfoguajacolicum aperiens mit der Wortmarke „Gnajacol-Haemofer“ des Apothekers Adalbert Seewald in Wien.

Trochisci Kali sulfoguajacolicum mit der Wortmarke „Pectorin“ der Apotheke z. heil. Geist in Wien.

Tubuli fumales cum pulvere Lobeliae comp. (Antiasthmatische Zigaretten) mit der

- Schutzmarke „Hirsch“ der Apotheke des Karl Hynek in Prag.
- Überfettete aromat Seifencreme mit 10% Salicylsäure mit der Wortmarke „Rheumasan“ der Firma Chemi-che Werke Fritz Friedländer in Berlin; Depotapotheke des R. Paul in Wien.
- Verbesserter Guajacol-Likör mit der Wortmarke „Pectorin“ des Apothekers Karl Richter in Wels.
- Vinum chinae arsoferr. phosph. mit der Wortmarke „Arsen-haematose“ des Apothekers R. Paul in Graz.
- Vinum iodatum maltosatum der Firma Svátek & Cie. in Smichow.
- Vinum maltosatae Coto Condurango der Firma Friedrich Klöckler in Prag-Lieben.
- Yohimbium-Phosphor-Strychnin-tabletten mit der Wortmarke „Rhome“ des Apothekers Dr. Grohs-Fligely in Wien.
-

GYÓGYSZEREK TÁRGYMUTATÓJA.

(L. = lapszám, R. = vényszám.)

- Abanon L. 51.
 Abrastol l. Asaprol L. 95.
 Abrin l. Jequiritol L. 102.
 Abrotanol L. 51.
 Absinthii herba L. 51.
 Acerdol L. 112.
 Acetal L. 51.
 Acetanilid L. 84. R. 202—205.
 Acetanisidin L. 232.
 Acetonchloroformium L. 51.
 R. 3. 4.
 Acetoncollodium l. Filmogen
 L. 169.
 Acetophenon L. 51.
 Acetopyrin L. 51.
 Acetphenetidin L. 266.
 Acetum L. 52.
 Acetum aromaticum L. 52.
 R. 5, 6.
 Acetum aceticum bisdilutum
 L. 52.
 Acetum pyrolignosum rectifi-
 catum L. 52.
 Acetum Scillae L. 291. R. 957.
 Acetum vini L. 52.
 Acetyl tannin l. Tannigen L. 310.
 Acidol L. 52. R. 7.
 Acidum acetylosalicilicum L.
 52. R. 8—11.
 Acidum arsenicosum L. 53. R.
 190.
 Acidum benzoicum L. 54. R.
 20—25.
 Acidum boricum L. 55. R.
 26—34.
 Acidum camphoricum L. 56.
 Acidum carbolicum L. 56. R.
 35—46.
 Acidum carbol. crudum L. 56.
 Acidum carbol. flavum L. 144.
 Acidum carbolicum liquefactum
 L. 56.
 Acidum cetraricum L. 222.
 Acidum chromicum L. 57.
 Acidum cinicum L. 57.
 Acidum cinnamylicum L. 58.
 R. 47—49.
 Acidum citricum L. 58.
 Acidum glyconicum L. 59.
 Acidum hydrochloricum con-
 centratum L. 58.
 Acidum hydrochloricum dil.
 L. 58. R. 50, 51.
 Acidum jodic. L. 59. R. 52, 53.
 Acidum kakodylicum l. Kako-
 dyl L. 207. R. 697.
 Acidum lacticum L. 59. R.
 54—57.
 Acidum nitricum concentratum
 purum L. 59.
 Acidum nitricum dilutum L. 59.
 Acidum nitricum fumans L. 59.
 Acidum nucleinicum L. 60.
 Acidum oleinicum purissimum
 L. 60.
 Acidum oxynaphtolicum L. 60.
 Acidum phenylicum L. 54. R.
 35—46.
 Acidum phenylo-aceticum L. 60.
 Acidum phenylo-propionicum
 L. 60.
 Acidum phosphoricum L. 60.
 R. 58, 59.
 Acidum pyrogallicum L. 60. R.
 60—64.
 Acidum salicylicum crystallisa-
 tum L. 61. R. 65—79.
 Acidum sozodolicum L. 62.
 Acidum sozolicum L. 95. R.
 252, 253.
 Acidum sulfanilicum L. 62. R.
 80.
 Acidum sulfuricum concentra-
 tum L. 63.
 Acidum sulfuricum dilutum L.
 63.
 Acidum sulfurosum anhydri-
 cum L. 63.
 Acidum tannicum L. 63. R.
 86—101.
 Acidum Thymenicum L. 65.
 Acidum trichloroaceticum L. 65.
 Acocantherae Schimperii lig-
 num L. 65. R. 102.

- Acoin L. 66. R. 103, 104, 105.
 Aconitum germanicum L. 66.
 R. 106, 107.
 Aconitum Napellus. Tubera L.
 66.
 Acopyrin l. Acetopyrin L. 51.
 Actol L. 67.
 Adalin L. 67.
 Adeps lanae hydrosus L. 219.
 R. 749—757.
 Adonis vernalis Herba L. 67.
 Adonidinum L. 67. R. 108—110.
 Adrenalin L. 68. R. 270.
 Aescorcin L. 68.
 Aesculin L. 68.
 Aether aceticus L. 68. R. 353.
 Aether ad narcosim L. 68. R.
 111, 112.
 Aether bromatus L. 68.
 Aether chloratus L. 70.
 Aether depuratus L. 68.
 Aether glycerino-salicylicus l.
 Glycosal L. 174. R. 555—558.
 Aether Petrolei L. 69.
 Aether sulfuricus L. 68.
 Aethoxy-Coffeinum L. 69.
 Aethylchlorid L. 70.
 Aethylidenum bichloratum L.
 69.
 Aethylenum chloratum L. 69.
 Aethylmorphinum hydrochlo-
 ricum L. 69. R. 113, 114, 115.
 116, 117.
 Aethylum chloratum L. 70.
 Agar-Agar L. 70.
 Agarase L. 70.
 Agaricinum L. 70. R. 118, 119.
 Agaricus chirurgorum L. 71.
 Agathin L. 71.
 Agurin L. 71. R. 120, 121.
 Aiodin l. Thyreoidea-készítm.
 L. 316.
 Airol L. 71. R. 122—127.
 Alantol l. Helenin L. 182 R.
 584—587.
 Alboferrin L. 164.
 Albargin L. 72.
 Alcarnose L. 72.
 Alcuenum L. 72.
 Aleuronat-készítmények L. 72.
 Alexipon L. 72.
 Allergin L. 72.
 Allosan L. 73.
 Almatein L. 73. R. 134.
 Aloe L. 72.
 Aloinum L. 72. R. 128—134.
 Alpol L. 74.
 Alsol L. 74. R. 135, 136, 137, 138.
 Althaeae folia L. 74.
 Althaeae radix L. 74. R. 139—
 141.
 Alumen L. 75. R. 143—153.
 Alumen ustum L. 75.
 Aluminium acetico-tartaricum
 l. Alsol L. 74. R. 135—138.
 Aluminium aceticum solutum
 L. 76. R. 155, 156.
 Aluminium aceticum basicum
 pulvis l. Eston L. 155.
 Aluminium borobenzoicum
 tartaricum liquidum L. 305.
 Aluminium caseinicum L. 76.
 Aluminium hydrooxyd. L. 77.
 Aluminium β naphthalo-disulf-
 zinkacetat L. 334. R. 1065.
 Aluminium paraphenolo sulfu-
 ricum l. Sozal L. 299.
 Aluminium subgallicum L. 77.
 Aluminiumsubtannicum L. 310.
 Alumnolum L. 77. R. 157, 158.
 Alynin L. 77.
 Amenyil L. 77.
 Amidoazotoluol L. 77.
 Ammoniaci gummiresina L. 74.
 Ammonii anisati liquor L. 78.
 R. 161, 162.
 Ammonii liquor L. 77.
 Ammonii succini liquor L. 80.
 R. 175, 176.
 Ammonium aceticum solutum
 L. 77. R. 159, 160.
 Ammonium bromatum L. 78.
 R. 163, 164.
 Ammonium carbonicum L. 78.
 R. 165—168.
 Ammonium chloratum L. 79.
 R. 169—172.
 Ammonium chloratum ferrat.
 L. 79. R. 173, 174.
 Ammonium higanychlorid L.
 285.
 Ammonium iodatum L. 79.
 Ammonium sulfoicbthyolicum
 l. Ichthyolum L. 197.
 Amygdalae amarae L. 80.
 Amygdalae dulces L. 80.
 Amygdophaenil L. 80.
 Amylenum hydratum L. 80. R.
 179—183.
 Amylnitrit L. 81. R. 184.
 Amylium nitrosum L. 81. R.
 184.
 Amylium salicylicum L. 81.
 Amyloform L. 82. R. 185.

- Amylum Tritici L. 82.
 Anesin l. Aneson L. 83
 Anaesthaesin L. 82. R. 186—192.
 Anaesthol L. 83.
 Analgen L. 83.
 Aneson L. 83.
 Anestyle l. Aethylmethylchloratum
 L. 70.
 Angelicae radix L. 83.
 Anisum stellatum L. 83.
 Anisum vulgare L. 83.
 Anogon L. 83.
 Antemesin l. Anaesthesin L.
 82. R. 186—192.
 Anthrarobin L. 83. R. 193 - 196.
 Anthrasol L. 84. R. 197—200.
 Antidotum Arsenici. l. 84. R.
 201.
 Antifebrin L. 84. R. 202, 203,
 204, 205.
 Antiformin L. 85.
 Antinervin L. 85.
 Antinosin l. Nosophenum L. 245.
 Antipyrin L. 85. R. 206—211.
 Antipyrinum coffeino-citricum
 L. 86.
 Antipyrinum salicylicum L. 86.
 Antipyrinum tannicum L. 86.
 R. 212.
 Antisepsin L. 86.
 Antispasmin L. 86. R. 213, 214.
 Antithyreoidin serum L. 87.
 Antithermin L. 87.
 Anusol L. 87. R. 215.
 Anytin L. 87.
 Anytol L. 87.
 Aperitol L. 87.
 Apiolum album crystallisatum
 L. 87.
 Apocodeinum hydrochloricum
 L. 87.
 Apolysin L. 88.
 Apomorphinum hydrochloric.
 L. 88. R. 217.
 Aqua Amygdalarum amararum
 L. 80. R. 177, 178.
 Aquae aromaticae L. 88.
 Aqua Calcis L. 89. R. 220, 221,
 222.
 Aqua Calcis saccharata L. 89.
 Aqua carbolisata L. 56.
 Aqua Chlorata L. 88.
 Aqua chloroformiata L. 89.
 Aqua Cinnamomi simplex L. 134.
 Aqua Cinnamomi spir. L. 88.
 Aqua Coloniensis L. 88.
 Aqua Foeniculi L. 88. R. 218, 219.
 Aqua Goulardi L. 272.
 Aqua Laurocerasi L. 89.
 Aqua laxat. viennensis L. 295.
 R. 969—9.0.
 Aqua Menthae pip. L. 88.
 Aqua plumbica L. 272.
 Aqua phagedaenica L. 89.
 Aqua phagedaenica nigra L. 89.
 Aqua Rosarum L. 88.
 Arbutinum L. 235. R. 979, 980.
 Araroba L. 89.
 Arbntin l. Uvae Ursi folia L.
 324.
 Arecolinum hydrobromicum
 L. 90.
 Arenariae rubrae extr. aquos.
 spissum L. 90.
 Arenariae rubrae extract.
 aquos. fluid. L. 90.
 Argentaminum L. 90.
 Argentum citricum. l. Itrol. L.
 200.
 Argentum colloidal L. 90. R.
 226, 227.
 Argentum lacticum l. Actol L.
 67.
 Argentum nitricum fusum L. 91.
 Argentum nitricum cum kalio
 nitrico L. 91. R. 228—240.
 Argilla alba L. 92.
 Argoninum L. 92. R. 241, 242.
 Argyrol L. 92.
 Arheol L. 93.
 Arhovin L. 93.
 Aristochin L. 93.
 Aristolum L. 93. R. 243, 244.
 Arnicae montanae flores L. 93.
 Arnicae montanae folia L. 93.
 Arnicae montanae rhizoma L.
 93.
 Arrhenal L. 94.
 Arsacetin L. 94.
 Arsan L. 94.
 Arsenferratin L. 94.
 Arsenferratose L. 94.
 Arsenicum album L. 53.
 Arsenogen L. 94.
 Arsenophenylglycin L. 94.
 Arsentriferrin l. Arsenogen
 L. 94.
 Arsentriferrin l. Arsenogen
 L. 94.
 Arsycodile Leprince L. 207.
 Arsylin L. 94.
 Arsyual l. Arrhenal L. 94.

- Arterenolum hydrochlor. L. 94.
 Asa foetida L. 95. R. 248—251,
 1052.
 Asaprol L. 95.
 Asepsin l. Antiseptin L. 86.
 Aseptolum L. 95. R. 252, 253.
 Aspidospermin L. 277.
 Aspidii spinulosi extractum
 L. 95.
 Aspidosperminum l. Quebracho
 cortex L. 96.
 Aspirin l. Acidum acetylosali-
 cylicum L. 52. R. 8—11.
 Asterol L. 96.
 Astrolin L. 96.
 Asurol L. 96. R. 254.
 Atophan L. 96.
 Atoxyl L. 96.
 Atropinum boracicum L. 100. R.
 277, 279, 282.
 Atropinum methylobromatum
 l. Belladonna L. 100. R. 288.
 Atropinum sulfuricum L. 99.
 R. 275, 276, 281, 283, 287.
 Aurantii pericarpium L. 96.
 Auro-Natrium chloratum L. 96.
 R. 255.
 Autan L. 97.
 Autoform L. 97.
 Automors L. 97.

Bacillol L. 97.
 Bactoforn L. 97.
 Balsamum canadense L. 97.
 Balsamum Copaivae L. 97.
 R. 256—259.
 Balsamum Peruvian. L. 98. R.
 260—267.
 Balsamum Styrax l. Styrax
 liquidus L. 304.
 Balsamum tolutanum L. 98.
 Balsamum vitae Hoffmanni l.
 Mixt. oleoso balsamica L. 98.
 Barutin L. 99.
 Basicin L. 99. R. 268—270.
 Belladonnae folia L. 99.
 Belloform L. 102.
 Bengué balzsam l. 102.
 Benzacetin L. 102.
 Benzanilidum L. 102.
 Benzoe L. 102.
 Benzolum L. 102.
 Benzonaphtolum L. 102.
 Benzosalin L. 102.
 Benzozol L. 102.

 Berberinum l. Calumbae radix
 L. 114.
 Berberinum hydrochlor. L. 114.
 Berberinum phosphor. L. 114.
 Bctolum L. 103. R. 291.
 Biocitin L. 103.
 Bioferrin L. 103.
 Biogen l. Magn. peroxyd. L. 227.
 Bioglobin L. 103.
 Bioson L. 103.
 Bismal L. 103.
 Bismon L. 103.
 Bismutan L. 103.
 Bismutose L. 106. R. 312.
 Bismuthum β naphtholicum ba-
 sicum L. 103.
 Bismuthum subgallicum l. 104
 R. 292—294.
 Bismuthum subnitric. L. 104.
 R. 295—305.
 Bismuthum subsalicylicum L.
 105. R. 306—309.
 Bismuthum tannicum L. 106. R.
 310, 311.
 Bitumen Fagi l. Pix liquida L.
 271.
 Blatta orientalis L. 107.
 Blenal L. 107.
 Boldo L. 107.
 Boldoa folia L. 107.
 Boldu L. 107.
 Bolus alba l. Argilla alba L.
 92.
 Bulbus Scillae l. scilla 291.
 Boral L. 107.
 Borax L. 238 R. 802—804.
 Borax venetus l. Natr. boricum
 L. 238.
 Borneyval L. 107.
 Boroform L. 107.
 Borovertin L. 107.
 Bromaeethyl. Aether bromatus
 L. 68.
 Bromalin L. 107.
 Bromalum hydratum L. 107. R.
 313, 314.
 Bromglidin L. 108.
 Bromidia L. 108.
 Bromipin L. 108. R. 315.
 Bromkalium l. Kalium brom-
 atum L. 208. R. 702—706.
 Bromocoll L. 108. R. 316, 317.
 Bromofornium L. 108. R. 318.
 Bromopan L. 109.
 Bromopyrin L. 109.
 Bromotan L. 109.
 Bromural L. 109.

Burowi solutio s. liquor L. 109.
 Butyl chloralum hydratum L.
 109. R. 319, 320.
 Butyrum Cacao l. Ol. Cacao
 L. 251.

Cacaol L. 110.

Cadmium salicylicum L. 110.

Cadmium sulfuricum L. 110.

Calamus Acorus Rhizoma L.
 110. R. 321, 322.

Calcaria caustica L. 112. R. 335.

Calcaria chlorata L. 110. R.
 323-326.

Calcaria usta L. 112. R. 335.

Calcium carbonicum nativum
 L. 111.

Calcium carb. praecip. L. 111
 R. 327-330.

Calcium chloratum crystallisa-
 tum L. 111. R. 331-334.

Calcium cresolicum L. 145.

Calcium hypermanganicum L.
 112.

Calcium hypochlorosum L. 110.
 R. 323-326.

Calcium hypophosphit L. 112.

Calcium hypophosphorosum L.
 112.

Calcium lacticum L. 112.

Calcium oxydatum L. 112. R.
 335.

Calcium oxysulfurat sol. L. 113.
 R. 340.

Calcium phosphoricum L. 113.
 R. 336-339.

Calcium sulfuratum L. 113.

Calcium sulfuricum ustum L.
 114.

Calmette serum L. 114.

Calodal L. 114.

Calomel L. 186. R. 601-607,
 1053.

Calomel vapore paratum L. 186.

Calomelol L. 114.

Calumbae radix L. 114.

Campechianum lignum L. 115.

Camphora L. 115. R. 151, 246,
 250, 347-354.

Camphora monobromata L. 116.
 R. 355, 356.

Camphosan L. 117.

Candol L. 117.

Cannabis indicae herba L. 117.

Cannabinum tannicum L. 117.
 R. 357-362.

Cannabinonum L. 117. R. 359.

Cantharides L. 118.

Cantharidinum L. 118. R. 366.

Capilli Veneris frondes L. 119.

Capsici fructus L. 119.

Captol L. 119. R. 367, 368.

Carbo animalis L. 120.

Carbo ligni depuratus L. 120.

Carbo ossium L. 120.

Carbolos kötözőszerek L. 56.

Carboneol L. 120.

Cardamomi fructus L. 120.

Carniferrin l. Ferri praeparata
 L. 164.

Carragaheen L. 119.

Caropan L. 120.

Carpainum hydrochlor. L. 120.

Caryophyllaceae L. 90.

Caryophylli flores L. 120.

Casanthrol L. 120.

Cascaracae sagradac cortex L. 120.
 R. 339.

Cascarine Leprince L. 120.

Cascarillae cortex L. 121.

Castoreum L. 122. R. 377, 379.

Catechu pallidum L. 122. R.
 381-383.

Caseon L. 272.

Cava-Cava l. Piper Methysti-
 cum L. 270.

Cellotropin L. 123.

Centaurii herba L. 123.

Cera alba L. 123. R. 384, 385.

Cera flava L. 123.

Ceratum Cetacei L. 123.

Cerium oxalicum L. 123.

Cerolin L. 123.

Cerussa L. 273.

Cetaceum L. 123.

Cetrarinum L. 222.

Chamomillae vulgaris flores L.
 123.

Charta Hydrarg. bichlor.
 impraegnata L. 190.

Charta sinapisata L. 297.

Chelidonium phosphoricum L.
 123.

Chelidonium sulfuricum L.
 123.

Chelidonium tannicum L. 123.

Chinac succirubrae cortex L.
 124. R. 386, 388.

Chinaphenin L. 128.

Chinaphitol L. 128.

Chinidinum sulfuricum L. 130.

Chinino-aethylo-sulfuricum L.
 129.

- Chininum L. 125.
 Chininum arsenicicum L. 129.
 Chininum bimuriaticum carbamidatum L. 129. R. 410.
 Chininum bisulfuricum L. 126. R. 396, 403, 405.
 Chininum ferro-citricum L. 126. R. 406, 407.
 Chininum glycerino phosphoricum L. 129.
 Chininum hydratum L. 125.
 Chininum hydrobromicum L. 129.
 Chininum hydrochloricum L. 126. R. 352, 295, 399, 400, 402.
 Chininum lygosinatum L. 129.
 Chininum salicylicum L. 129.
 Chininum sulfuricum L. 126. R. 397, 398, 401, 404, 481.
 Chininum sulfur. L. 130.
 Chininum tannicum insipidum Rozsnyai L. 126. R. 408, 409.
 Chinoformin l. Chinotropin L. 130.
 Chinolinum L. 130.
 Chinolinum tartaricum L. 130.
 Chinosol L. 130.
 Chinotropin L. 130.
 Chirol L. 130.
 Chirosoter L. 130.
 Chloræthyl L. 70.
 Chloralamid l. Chloralum formamidatum L. 131. R. 417, 418.
 Chloralbacid L. 130.
 Chloralum formamidatum L. 131. R. 417, 418.
 Chloralum hydratum L. 131. R. 411—416.
 Chloralimidum L. 132.
 Chloralose L. 132.
 Chloralurethan L. 132.
 Chloreton l. Aceton-chloroformium L. 51. R. 3, 4.
 Chloroformium ad narcosim L. 132.
 Chloroformium ad usum externum L. 133. R. 419—424.
 Chloryl l. Aethylum chloratum L. 70.
 Cholelysin L. 134.
 Chorda aseptica L. 134.
 Chrosoformium L. 134.
 Chrysarobinum L. 89. R. 223, 224.
 Cinae flores L. 134.
 Cinchoninum sulf. L. 130.
 Cinnamomni Cassiae cortex L. 134.
 Citarin L. 135.
 Citri pericarpium L. 135.
 Citrophen L. 135.
 Clavin L. 135.
 Cocainum hydrochloricum L. 135. R. 270, 277, 431—442.
 Cocainum nitricum L. 139.
 Codeinum l. Opium L. 255.
 Codeinum hydrochloricum L. 255. R. 872, 873, 874.
 Cocapyrin L. 139.
 Coffeinum L. 139. R. 448.
 Coffeinum citricum L. 139. R. 446, 491.
 Coffeinum natriobenzoicum L. 139. R. 443, 445.
 Coffeinum natrio-salicylicum L. 139. R. 444, 447, 449.
 Cognac L. 140.
 Colchicinum L. 140. R. 450.
 Colchici semina L. 140.
 Collargolum l. Argentum colloidale L. 90. R. 226, 227.
 Collemplastra L. 141.
 Collemplastrum adhaesivum L. 141.
 Collemplastrum saponato-salicylatum L. 141.
 Collemplastrum Zinci oxidati L. 141.
 Collodium L. 141.
 Collodium flexile L. 141.
 Cellyrium adstringens luteum L. 141.
 Colocynthis fructus L. 141. R. 452.
 Colombo radix L. 114.
 Colophonium L. 142.
 Conchininum sulf. L. 130.
 Condurango cortex L. 142. R. 455, 556, 458.
 Conii hydrobrom. L. 142. R. 459, 460.
 Conii maculati herba L. 142.
 Contratussin L. 143.
 Convallariae majalis herba L. 143. R. 461.
 Coronillinum L. 143.
 Coriandri fructus L. 143.
 Cornutinum citricum L. 293.
 Corrosol dr. Egger L. 143.
 Cortex chinae R. 129.
 Coryfin L. 143.
 Coryloform L. 143.
 Coto cortex L. 143.

Crème céleste L. 322.
 Cremor Tartari L. 210. R. 712,
 713, 714.
 Creolin L. 144. R. 465—467.
 Cresol-készítmények L. 144.
 Cresolum crudum L. 144.
 Cresolum purum liquidum L. 143.
 Creta alba L. 111.
 Cristallose L. 145.
 Croci gallici stigmata L. 145.
 Crotonis semina L. 145.
 Crurin L. 146.
 Cubebae fructus L. 146.
 Cucurbitae Peponis semina L.
 146. R. 472.
 Cuprum aluminatum L. 146.
 Cuprum sulf. crystallisatum L.
 146. R. 473—478, 146.
 Cutolum L. 147.
 Cutolum solubile L. 147.
 Cycloform L. 147.
 Cyndri Hydrargyri bichlorati
 L. 185.
 Cystopurin L. 147.

Daturae Stramonii semina et
 folia L. 147.
 Decilan L. 148.
 Decoctum Zittmanni forius L.
 290.
 Decoctum Zittmanni mitius L.
 291.
 Dermasan L. 148.
 Dermatolum l. Bismuthi. sub-
 gallicum L. 104. R. 189, 292—
 294.
 Dermogen L. 148.
 Dermosapol l. 148.
 Desalgin L. 149.
 Desichthol L. 148.
 Desinfectol L. 149.
 Dextrinum L. 148.
 Dextroform L. 148.
 Diabetin L. 219.
 Diaethylketon L. 148.
 Diaphtherin L. 148.
 Diaspirin L. 148.
 Diastase absoluta L. 149.
 Digalen L. 150.
 Digipuratum L. 149.
 Digitalinum L. 150. R. 488, 487.
 Digitalis folia L. 149. R. 481—
 486, 728.
 Digitalis purpurea dialysata
 Golaz titrata L. 150.
 Digitalon L. 150.

Digitalysatum L. 150. R. 489.
 491.
 Digitoxinum cryst. Merck L.
 150.
 Dijodoformium L. 152.
 Dimethylacetal L. 152.
 Dimethyl-aethyl-carbinol L.
 80. R. 179—183.
 Dionin L. 152.
 Dioninum L. 69. R. 113—117.
 Diphtheria-antitoxin l. Serum
 antidiphtheriticum L. 296.
 Diplosal L. 152.
 Dispermin l. Piperazin L. 270.
 Diuretinum L. 314. R. 1009—
 1010.
 Dormiol L. 152. R. 492, 493.
 Doveri pulvis l. Opium L. 255.
 Duobisium sulfur. L. 152.
 Dulcin L. 152.
 Duotal L. 178. R. 572—573.
 Dymal L. 152.
 Dynamogen l. 153.
 Ehrlich-Hatta 606 l. Salvarsan
 L. 288.
 Eigonok L. 153.
 Eka-jodoformium L. 153.
 Ektogan l. Zincum superoxy-
 datum L. 333.
 Electrargol l. Argentum collo-
 idale L. 90. R. 226, 227.
 Electuarium lenitivum L. 295.
 R. 971.
 Eleosacchara L. 153.
 Elixirium acidum Halleri L.
 63. R. 81—85.
 Elixirium Ferr. alb L. 165.
 Emanosal L. 153.
 Emol L. 153.
 Emplastra L. 153.
 Empl. diachylon simplex L.
 153.
 Emplastrum Cantharidum L.
 119.
 Einulsio amygdalina l. Amyg-
 dala dulcis L. 80.
 Emulsio oleosa l. Amygdala
 dulcis L. 80.
 Extr. cannabis indicæ L. 117.
 R. 358—360.
 Emplastrum Cantharidum l.
 cantharides L. 119.
 Emplastrum Cantharidum per-
 petuum L. 119.

- Empl. diachylon simplex L.
 Emplastra L. 153.
 Empl. Hydrargyri L. 153.
 Empl. saponatum L. 153.
 Empl. vesicatorium consuetum L. 119.
 Empyroform L. 154.
 Emulsio amygdalina L. 80.
 Emulsio oleosa L. 80.
 Enophthalmin L. 151.
 Enesol L. 154.
 Enterose L. 151.
 Eosot l. Kreosotum valerianicum L. 217.
 Ephedrinum hydrochloricum L. 154.
 Epicarinum purum L. 154. R. 494—497, 263.
 Epinephrin L. 155.
 Epirenan l. Adrenalin L. 68.
 Equiseti arvensis herba L. 155.
 Ergotina l. Secale cornutum L. 293.
 Ergotina styptica Egger L. 293.
 Ergotinol L. 155.
 Ernutin L. 155.
 Erythrolum L. 155.
 Erythrolum tetranitric. L. 155.
 Erythrophloeinum hydrochloricum L. 155.
 Escalin L. 155.
 Eserinum salicylicum l. Phystostigininum salicyl. L. 269.
 Ester-dermasan l. Dermasan L. 148.
 Eston L. 155.
 Estoral L. 156.
 Eucainum hydrochloricum B. L. 156. R. 498—499.
 Eucainum lacticum B. L. 156.
 Eucalypti folia L. 156.
 Eucalyptolum L. 156.
 Eucasol L. 157.
 Eucerin L. 157.
 Euchininum L. 157. R. 502.
 Eucodin L. 157.
 Encol L. 157.
 Endermolum L. 157.
 Eudoxin l. Nosophen L. 245.
 Eugadolum L. 157.
 Eugallol L. 158.
 Eugenoform L. 158.
 Euguformium L. 158.
 Eulactol L. 158.
 Eulaxans L. 158.
 Eulyptol L. 158.
 Eumenol L. 158.
 Eunorphol L. 158.
 Eumydrin L. 158.
 Eumatrol L. 158. R. 503.
 Euphorinum L. 159.
 Euphorbium L. 159.
 Euphthalminum hydrochloric. L. 159.
 Euphyllin L. 159.
 Euporphin L. 159.
 Eupyrin L. 159.
 Euresol L. 159. R. 504, 505.
 Euretol L. 159.
 Eurobinum L. 159.
 Europhenum L. 160.
 Eurythrolum L. 160.
 Euseopol L. 160.
 Eustenin L. 160.
 Euvaselin L. 160.
 Evonyminum L. 160.
 Exalginum L. 160. R. 506—508.
 Exodin L. 161.
 Extracta fluida L. 161.
 Extracta omnia L. 161.
 Extractum Aconiti L. 66.
 Extr. arenariae rubrae l. Arenariae rubrae extr. L. 90.
 Extr. Aspidii spinulosi l. Aspid. spin. extr. L. 95.
 Extr. Cascarac sagradae siccum L. 120. R. 374.
 Extr. Cascarac sagradae fluid. L. 120. R. 370, 372, 373.
 Extr. Ferri pomati L. 163.
 Extr. Cascarillae L. 121. R. 376.
 Extr. Centaurii L. 123.
 Extr. Chinae fluidum L. 124. R. 387, 393, 394.
 Extr. Chinae Nanning L. 124.
 Extr. Chinae siccum L. 124. R. 389.
 Extractum Filicis maris L. 168. R. 544, 545.
 Extr. fluidum Boldo L. 107.
 Extr. fluidum corticis Gossypii L. 175.
 Extr. fluid. Grindeliae L. 176. R. 563, 565.
 Extr. fluidum Kavae L. 270.
 Extr. fluidum Kolae L. 216.
 Extr. fluidum Quebracho L. 277.
 Extr. fluid. Ustilaginis Maydis L. 324.
 Extr. fluidum Yerbae sanctae l. Yerba santa L. 329.
 Extr. Gentianae L. 172

- Extr. Hamamelidis fluidum L. 181. R. 578.
 Extr. Hydrastis fluidum L. 194.
 Extr. Ilyosciami L. 195.
 Extr. ligni Campechiani L. 115. R. 345, 346.
 Extr. malatis Ferri L. 163.
 Extr. Nucis vomicae L. 247. R. 274, 303.
 Extr. Opii L. 255. R. 852, 854, 856.
 Extr. Piscidia fluid. L. 271. R. 901, 903.
 Extr. Punicae Granati L. 175. R. 561.
 Extr. Quassiae L. 277.
 Extr. Rathaniae depur. L. 278. R. 917—979.
 Extr. Rhei L. 281. R. 933.
 Extr. Scillae L. 291. R. 955, 956.
 Extr. Secalis cornuti spissum L. 293. R. 959, 960.
 Extr. Secalis cornuti siccum pro pulvere L. 293. R. 961, 962.
 Extr. Secalis cornuti fluidum L. 293. R. 963, 965.
 Extr. Taraxaci L. 311.
 Extr. Trifolii febrini L. 319.
 Extr. Aloes L. 72. R. 128—134.
 Extr. Belladonnae L. 99. R. 271—274, 278, 280, 304.
 Extr. Calumbae L. 114.
 Extr. Colocyntidis L. 141. R. 453, 454.
 Extr. Condurango fluid. L. 142. R. 455—458.
 Extr. Conii L. 142.
 Extr. Cubebae L. 146. R. 470, 471.
 Extr. Digitalis liquidum Denzel L. 150. R. 490.
 Faex medicinalis L. 161.
 Farina seminum Lini L. 223.
 Farina seminum Sinapis L. 297.
 Fascia e tela amylo imbuta paratae L. 161.
 Fascia e tela paratae L. 161.
 Fel Tauri inspissatum L. 161.
 Fermentum cerevisiae l. Faex medicinalis L. 161.
 Ferratinum L. 161.
 Ferratogen L. 161.
 Ferratose l. Ferratin L. 161.
 Ferriichthol L. 162.
 Ferricodile Leprince l. Kakodyl-készítmények L. 208.
 Ferri praeparata L. 161. R. 509—543.
 Ferripyrium L. 162.
 Ferroglydine L. 162.
 Ferroplasma L. 162.
 Ferrosol L. 162.
 Ferrosomatoso L. 162.
 Ferrostyptin L. 162.
 Ferrum carb. sacchar. L. 162.
 Ferrum glycerino-phosphoricum L. 163.
 Ferrum hydrogenio reductum L. 162.
 Ferrum kakodylicum L. 163.
 Ferrum lacticum L. 163. R. 333, 339, 327, 132.
 Ferrum natrio-pyrophosphoricum L. 163.
 Ferrum oxalicum oxydulatum crystallis. 164.
 Ferrum oxydatum dialysat. sol. L. 163.
 Ferrum protoxalatum L. 164.
 Ferrum pulveratum L. 162.
 Ferrum sesquichlor. crystallisatum L. 164.
 Ferrum sesquichloratum solut. L. 164.
 Ferrum sulf. oxydulat. L. 164.
 Fersan L. 162.
 Fetroil L. 168.
 Fibrolysin L. 168.
 Filieis maris rhizoma L. 168.
 Filmaron L. 169.
 Filmogen L. 169.
 Filum sericeum hydr. bichlor. impraegn. L. 169, 185.
 Flores Benzoes L. 54. R. 20—23.
 Flores salis ammoniaci martiales L. 79. R. 173, 174.
 Flores sulfuris L. 307.
 Flores Zincii L. 331. R. 1048—1056.
 Fluoroform L. 169.
 Foeniculi fruct. L. 169.
 Fomitin L. 169.
 Formaldehydum solutum L. 169. R. 546.
 Formalin l. Formaldehydum sol. L. 169.
 Forman L. 169.
 Formanilidum L. 170.
 Forineston L. 170.
 Formin L. 324.
 Fortoin L. 170.

- Fortossan L. 170.
 Frangol L. 170.
 Fucol L. 170.
 Fucus Carragaheen L. 119.
 Furunculin L. 170.

G
 Gadol L. 170.
 Galactogen L. 170.
 Galegol L. 170.
 Gallacetophenon L. 170.
 Gallae l. Aluminium subgallium L. 77.
 Gallae L. 77.
 Gallanolun L. 170.
 Gallicin L. 171.
 Gallobromol L. 171.
 Gastrosan L. 171.
 Gaudanin L. 171.
 Gaze carbolatum l. Acid. carbol. L. 56.
 Gaze Hydrargyro nichlorato corrosivo impregnatum l. Hydrargyri praeparata L. 185.
 Gaze jodoformio impraegnatum l. Jodoformium L. 204.
 Gelatina animalis albissima L. 171.
 Gelanthum L. 171.
 Gelodurat-capsulák L. 171.
 Gelonida L. 172.
 Gelsemii radix L. 172.
 Gentianae radix L. 172. R. 548, 549.
 Geosot l. Guajacolum valeria L. 179.
 Glandulae suprarenales l. Organotherapia és Adrenalin L. 259, 68.
 Glandulen l. Organotherapia L. 259.
 Glidin L. 172.
 Globon L. 172.
 Globuli martiales l. Ferrum L. 165.
 Glutoid capsulák L. 173.
 Glutoform l. Glutol 173.
 Glutol L. 173.
 Glycerinum L. 173.
 Glycerolatun L. 173.
 Glycerophosphatok L. 173. R. 550—554.
 Glycosal L. 174. R. 555—558.
 Goa pulvis l. Araroba L. 89.
 Gomenol L. 175.
 Gonorol L. 175.
 Gonosan L. 175.
 Gossypii herbacei cortex radice L. 175.
 Graninis rhizoma L. 175.
 Granati Punicae cortex L. 175. R. 559, 562.
 Grindeliae herba L. 176. R. 564.
 Guaethol L. 177. R. 566—567.
 Guajacolsalol l. Guajacolum salicylicum L. 178.
 Guajacolum L. 177. R. 568—571.
 Guajacolum benzoicum L. 178.
 Guajacolum camphoratum l. Guacamphol L. 177.
 Guajacolum carbonicum L. 178. R. 572, 573.
 Guajacolum cinnamylicum L. 178.
 Guajacolum kakodylicum L. 178.
 Guajacolum phosphoricum L. 178.
 Guajacolum phosphorosum L. 178.
 Guajacolum salicylicum L. 178.
 Guajacolum valerianicum L. 179.
 Guajacylum L. 179.
 Guajakinol L. 179.
 Guajamarum L. 179.
 Guajasanol L. 179.
 Guarana L. 179. R. 574, 575.
 Gummi Arabicum. L. 179.
 Gummi gutti L. 180. R. 576, 577.
 Gummi Kino l. Kino L. 216.
 Gutti L. 180. R. 576, 577.
 Gymnema silvestre L. 180.
 Gynoval L. 180.
 Gypsum ustum L. 114.

H
 Haemalbumin L. 181.
 Haematin albumin L. 181.
 Haematogen L. 181.
 Haematopan L. 181.
 Haemogallolum L. 181.
 Haemoglobin L. 181.
 Haemolum L. 181.
 Haemoneurol l. Glycerophosphatok L. 173.
 Hamamelidis virginicae folia et cort. radix. L. 181. R. 580.
 Hamamelin L. 181. R. 581.
 Hamamelidin L. 181. R. 581.
 Haschisch purum L. 117.
 Heetine L. 182.

- Hedonal L. 182. R. 582, 583.
 Hegonon L. 182.
 Helcosol L. 182.
 Helenin L. 182. R. 584—587.
 Helgotan L. 183.
 Helkomen L. 182.
 Hellebori viridis radix L. 183.
 Helleboreinum L. 183.
 Helmitol L. 183. R. 588.
 Hermophenyl L. 183.
 Heroinum hydrochloricum L. 256. R. 876, 877.
 Hetol L. 183.
 Hetocresol L. 183.
 Hetralin L. 183.
 Hexamethylenetetramin L. 324.
 Hirudin L. 183.
 Hirudo medicinalis L. 184.
 Hirudo officinalis L. 184.
 Holocainum hydrochloricum L. 184.
 Homatropinum sulfuricum L. 100.
 Homatropinum hydrobromicum L. 100. R. 286.
 Homorenolum hydrochloricum L. 184.
 Houthin L. 184.
 Hopein L. 184.
 Hopogan l. Mag. peroxyd. L. 227.
 Hormonal L. 184.
 Hydracetic L. 276.
 Hydrargol l. Hydrargyr. imidosuccin L. 192.
 Hydrargyri praeparata L. 184.
 Hydrargyrol L. 190.
 Hydrargyrum aethylo-chloratum L. 190.
 Hydrargyrum atoxylicum L. 190.
 Hydrargyrum benzoicum oxydatum L. 190. R. 617—619.
 Hydrargyrum bichloratum ammoniatum L. 185. R. 589, 591, 592.
 Hydrargyrum bichloratum carbamidatum solutum L. 191.
 Hydrargyrum bichloratum corrosivum, L. 185. R. 590, 593—598.
 Hydrargyrum bijodatum rubrum L. 186. R. 599, 600.
 Hydrargyrum carbolicum L. 191. R. 620, 621.
 Hydrargyr. chloratum mite vapore paratum L. 186.
 Hydrargyrum chloratum mite sublimatione paratum L. 186. R. 601—607.
 Hydrargyr. colloidal L. 191. R. 622—623.
 Hydrargyr. diphenylic L. 191. R. 620, 621.
 Hydrargyrum formamidat. solutum L. 192.
 Hydrargyr. gallicum L. 192. R. 624.
 Hydrargyr. glutino-peptonatum hydrochl. L. 192.
 Hydrargyr. imidosuccinicum L. 192.
 Hydrargyr. jodatum flavum L. 190.
 Hydrargyr. jodicum oxydatum L. 192. R. 625.
 Hydrargyr. kalium hyposulfurosus L. 192.
 Hydrargyrum kakodylicum L. 190.
 Hydrargyr. oleinicum L. 192.
 Hydrargyr. oxycyanat. L. 192.
 Hydrargyr. oxydatum flavum L. 186. R. 608.
 Hydrargyr. peptonatum L. 193.
 Hydrargyr. purum L. 169.
 Hydrargyr. pyoctanin L. 193.
 Hydrargyr. salicylicum L. 186. R. 609—616.
 Hydrargyr. sozodolicum L. 193. R. 626—629.
 Hydrargyr. sublimatum L. 185. R. 590, 593—598.
 Hydrargyr. tannic. oxydulatum L. 193. R. 630, 631.
 Hydrargyrum thymico-acetic. L. 194. R. 632—634.
 Hydrargyr. Zincum cyanatum L. 194.
 Hydrastininum hydrochloricum L. 194. R. 635—638.
 Hydrastis canadensis rhizoma L. 194.
 Hydrogenii hyperoxydati liquor L. 195.
 Hydromel infantum L. 295. R. 973.
 Hypopyrin L. 195.
 Hygiana L. 195.
 Hyosiami folia L. 195.
 Hyoscinum crystallisatum L. 196. R. 639—643.
 Hypnolum L. 196.
 Hypnon L. 51.
 Hypophosphitek l. Syrup. hypo-

- phosphorosus compositus L. 308.
 Hyrgolum l. Hydrarg. colloid. L. 191. R. 622, 623.
 Ibit L. 197.
 Ichthalbin L. 197.
 Ichthargan L. 197.
 Ichthoform L. 197.
 Ichthyolum L. 197. R. 644—656.
 Ichthyolum desodoratum L. 198.
 Igazol L. 199.
 Indoform L. 199.
 Infusum laxativum L. 295. R. 969, 970.
 Infusum Rhei L. 284. R. 935.
 Infus. Sennae comp. L. 295. R. 969, 970.
 Ingluin L. 199.
 Ipecacuanhae radix L. 199. R. 657—662.
 Iridis florentinae rhizoma L. 200.
 Isarol L. 200.
 Ischaemin L. 200.
 Isoform L. 200.
 Isopral L. 200.
 Isutan l. Bismutan L. 103.
 Itrol L. 200.
 Jaborandi folia L. 201.
 Jalapae tubera L. 201. R. 667.
 Jatrevin L. 202.
 Jequiritol L. 202.
 Jequiritol serum L. 202.
 Jequirity semina L. 202.
 Jodalbacid L. 202.
 Jód ferratin L. 203.
 Jodglydin L. 202.
 Jodipin L. 203. R. 669, 670.
 Jodival L. 203.
 Jod-lecithin L. 203.
 Jodocitin L. 203.
 Jodoformal L. 203.
 Jodoformin L. 203.
 Jodoformium crystallisatum L. 203. R. 671—678.
 Jodoformogen L. 204.
 Jodolen L. 204.
 Jodolum L. 204. R. 679—683.
 Jodomenin L. 205.
 Jodophenin L. 205.
 Jodothyrim l. Thyreoidea-készítmények L. 316.
 Jodophen l. Nosophenum L. 245.
 Jodopyrinum L. 205.
 Jodresorcin sulfosavas bismuth L. 87. R. 215.
 Jodum L. 205. R. 686—689.
 Jodum trichloratum L. 206.
 Johimbin l. Yohimbin L. 329.
 Jothion L. 207. R. 692, 693.
 Juniperi fructus L. 207. R. 694.
 Kakodyl-készítmények L. 207. R. 696—698.
 Kalium aceticum solutum L. 208. R. 699—701. 480, 694.
 Kalium bichromicum L. 208.
 Kalium bromatum L. 208. R. 702—706.
 Kalium carbonicum purum L. 209.
 Kalium carbonicum depuratum L. 209.
 Kalium carbonicum solutum L. 210. R. 707—708.
 Kalium chloricum L. 210. R. 710—711.
 Kalium hydrooxydatum L. 210.
 Kalium hydrotartaricum L. 210. R. 712—714.
 Kalium hypermanganicum L. 211. R. 715—718.
 Kalium hypophosphorosum L. 212.
 Kalium iodatum L. 212. R. 719—725. 686—689.
 Kalium natrio-tartaricum L. 212. R. 726—727.
 Kalium nitricum L. 213. R. 628—730.
 Kalium sozodolicum L. 299. R. 975, 978.
 Kalium stibio-tartaricum L. 213. R. 731—734.
 Kalium sulfoguaiaacolicum L. 214.
 Kalium sulfuratum pro balneo L. 214.
 Kalium sulfuricum L. 214. R. 735.
 Kalium tartaricum L. 215.
 Kalium telluricum L. 215.
 Kamala depuratum L. 215. R. 736—739.
 Kamala venale L. 215.
 Karsan L. 215.
 Kava-Kava l. Piper methysticum L. 270.

- Kelen l. Aethylenum chlorat. L. 69.
 Kephir l. 215.
 Kermes minerale L. 302.
 Kineurin l. Chininum glycerophosphoricum L. 129.
 Kino L. 216.
 Kolae semina L. 216.
 Kolanin L. 216.
 Kresolum l. Cresolum L. 144.
 Kresolum crudum l. Cresolum crud. L. 144.
 Kreolin l. Creolin L. 144. R. 465—467.
 Kreosotal l. Kreosotum carbonicum L. 217.
 Kreosotum L. 217. R. 740—743.
 Kreosotum carbonicum L. 217.
 Kreosotum tannicum l. Tannosol L. 311.
 Kryofin L. 217.
 Kryogenin L. 218.
 Kumys L. 218.
 Kusseinum crystallista. L. 218. R. 747.
 Kusso flores L. 218. R. 744—746.
 Lac sulfuris L. 306. R. 996—999.
 Lactagol L. 218.
 Lactopheninum L. 218. R. 748.
 Lactucarium germanicum L. 219.
 Lactylphenetidin l. Lactophenin L. 218.
 Laevulose L. 219.
 Laminaria L. 219.
 Lana Gossypii depurata L. 219.
 Lana Gossypii Brunsi L. 219.
 Lanolinum anhydricum L. 219.
 Lanolinum L. 219. R. 749—757.
 Lapis divinus L. 146.
 Lapis ophthalmicus L. 146.
 Largin L. 220.
 Lecithin L. 221.
 Lecithinum bromatum L. 221.
 Lenicetum L. 221.
 Lenigallol L. 221. R. 200.
 Lenirobin L. 221.
 Lentin L. 221.
 Leonuri lanati herba L. 221.
 Leucofermantin L. 221.
 Liantralum L. 222.
 Libanol L. 222.
 Lichen Islandicus L. 222. R. 758.
 Lien siccatus l. Organotherapia L. 259.
 Lignosulfit L. 222.
 Ligoine L. 69.
 Limonada solvens L. 274.
 Linctus gummosus L. 180.
 Linimentum ammoniatum L. 77.
 Linimentum saponato-camph. L. 116.
 Linimentum Styracis L. 304.
 Linimentum volatile L. 77.
 Lini semina L. 223.
 Lipanin L. 223.
 Liquiritiae radix L. 223.
 Liquor acid. Halleri L. 63. R. 81—85.
 Liquor aluminium acetici. l. Alumin. acet. liquor. L. 76. R. 155, 156.
 Liquor Ammoniae l. Ammonii caust. liq. L. 77.
 Liquor Ammonii acet L. 77. R. 159, 160.
 Liquor Ammoniae anisati l. Ammon. anis. liq. L. 78.
 Liquor Ammonii ergotini l. L. 155.
 Liquor Ammonii succinici l. Ammonii succin. liq. L. 80.
 Liquor Anodynus Hoffmanni L. 69, 300.
 Liquor Burowi l. Aluminium aceticum sol. L. 76, 155, 156.
 Liquor cresoli saponatus l. Cresolum. L. 144.
 Liquor Ferri albuminati l. Ferri praeparata L. 165.
 Liquor Ferri albuminati saccharatus L. 165.
 Liquor Ferri oxychlorati L. 163.
 Liquor Ferri oxydati l. Ferri praeparata L. 163.
 Liquor hollandicus l. Aethylenum chloratum L. 69.
 Liquor Hydrogenii hyperoxydati l. Hydrogenium hyperoxydatum. L. 195.
 Liquor Kalii acetici l. Kalium acet. sol. L. 208. R. 699—701.
 Liquor Kalii arsenicosi L. 53. R. 12—19.
 Liquor Kalii carbonici l. Kalium carb. sol. L. 210.
 Liquor Kresolisaponatus L. 144.
 Liquor natrii silicici l. Natr. silic. liq. L. 243.
 Liquor plumbi subacetici l. Plumb. acet. bas. sol. L. 272.
 Lithargyrum L. 273.

- Lithio-piperazinum L. 224.
 Lithium benzoicum L. 224.
 Lithium carbonicum L. 224.
 Lithium citricum L. 224.
 Lithium citricum effervesceus L. 224.
 Lithium glycerico-phosphoricum L. 224.
 Lithium iodatum L. 224.
 Lithium salicylicum L. 224. R. 759—760.
 Lithium sulfoichthyolicum L. 225.
 Lithium vanadinicum L. 225.
 Lobelliae herba L. 225.
 Loretinum L. 225.
 Losophanum L. 225.
 Lupuli glandulae L. 225.
 Lycetolum L. 226.
 Lycopodii sporae L. 226.
 Lygosin-Chinin l. Chininum lygosinatum L. 129.
 Lygosin-natrium L. 226.
 Lysargin L. 226.
 Lysidinum L. 226.
 Lysidinum bitaritaricum L. 226.
 Lysochlor L. 226.
 Lysoform L. 226.
 Lysolum L. 226.
 Lysulfol L. 227.
 Magisterium bismuthi L. 104. R. 295—305.
 Magnesia carbonica L. 227. R. 762—763.
 Magnesium carbonicum hydroxydatum L. 227. R. 762—763.
 Magnesium hydrooxidatum in aqua. L. 227. R. 764.
 Magnesium oxydatum L. 227.
 Magnesium peroxydatum mixtum l. magn. peroxid. L. 227.
 Magnesium perhydrol l. Magn. peroxidatum L. 227.
 Magnesia usta L. 227.
 Magnesia usta in aqua L. 227. R. 764.
 Magnesium peroxydatum L. 227.
 Magnesium salicylicum L. 228. R. 765—766.
 Magnesium sulfuricum. L. 228.
 Magolan L. 228.
 Malonal l. Veronal L. 328.
 Maltocol L. 228.
 Malvae folia L. 228.
 Malvae flores L. 228.
 Mammiae siccatæ l. Organotherapia L. 259.
 Mannin Poehl l. organotherapia L. 259.
 Manganum chloratum crystallisatum L. 229.
 Manganum hyperoxydatum L. 229.
 Manna L. 229.
 Mannitum L. 229. R. 767.
 Matico folia L. 229.
 Medinal solubile l. Veronal-natrium L. 328.
 Mel L. 229.
 Mel depuratum L. 229.
 Mellissae folia L. 229.
 Mellin-tápszer L. 229.
 Mel rosatum L. 229.
 Meningococcus-serum L. 230.
 Mensan L. 230.
 Menthae folia L. 230. R. 768.
 Mentholum L. 230. R. 769—777.
 Mercolint L. 231.
 Mercurin l. Hydrargirum L. 189.
 Mercuriol L. 189.
 Mercurius vivus L. 184.
 Mercurocrème L. 231.
 Mercur. praecipit. albus L. 185. R. 589. 591. 592.
 Mesotan L. 231. R. 778, 779.
 Metasol l. Anytin L. 87.
 Metaethyl l. Aethylum chlorat. L. 69.
 Methylacetanilid L. 160. R. 506—508.
 Methacetin L. 232.
 Methylalum L. 232. R. 780—783.
 Methylatropinum bromatum L. 232.
 Methylenum bichlor. L. 232.
 Methylenum chloratum L. 232.
 Methylenum coeruleum L. 232.
 Methylum salicylicum L. 233.
 Methylsulfonal l. Trional L. 319.
 Microcidin L. 233.
 Migraenin l. Antipyrinum coffeino-citricum L. 86.
 Miscella pro solutione calcii oxysulfurati L. 233.
 Mitin L. 233.
 Mixtura chloralo-bromata L. 233.
 Mixtura gummosa l. Gummi arabicum L. 180.
 Mixtura oleoso-balsamica l. Bals. vitae Hoffmanni L. 98.
 Mollinum L. 233.

- Monochloraethan L. 70.
 Monochloral-Antipyrin L. 196.
 Monochlor phenol L. 233.
 Monotal L. 233.
 Morphinum hydrochlor. L. 255.
 R. 862, 864, 865, 867, 868, 870, 871, 875, 310, 281, 287, 180, 149.
 Morphinum methylobromatum L. 255.
 Morphosan l. Morphinum methylbromatum (Opiumná) L. 255.
 Morrhuel L. 234.
 Moschus L. 234. R. 784—787, 1051.
 Mucillago Gummi arabici l. Gummi arabicum L. 180.
 Mucillago Salep L. 285. R. 944, 945.
 Muiracithin L. 234.
 Mutase L. 234.
 Mycodermin L. 235.
 Mydrinum l. 235.
 Mydrol L. 235.
 Myrrha L. 235.
 Myrticol L. 235.
 Myrtilli baceae L. 235.
 Myrtilli fructus L. 235.
 Myrtolum L. 235. R. 788.
 Nafalan L. 236.
 Naftalan L. 236. R. 789—793.
 Naphthalinum purissimum L. 236. R. 794.
 Naphthalol l. Betol L. 103. R. 291.
 Naphthol R. 497.
 α Naphtolcarbolsav L. 60.
 Naphtolum L. 237. R. 795—801.
 Narceinum L. 255. R. 863.
 Narcoform l. Somnoform L. 298.
 Narcotinum l. Opium-készítm. L. 256.
 Narcyl L. 238.
 Nargol L. 238.
 Natrium aceticum crystallisatum L. 238.
 Natrium acetylarsanilicum l. Arsacetin L. 94.
 Natrium arsenilicum l. Atoxyl L. 96.
 Natrium benzoicum L. 238.
 Natrium bicarbonicum l. Natr. hydrocarbonicum L. 239. R. 805—808.
 Natrium boricum L. 238. R. 802—804.
 Natrium bromatum L. 239.
 Natrium carbonicum crystallisatum L. 239.
 Natrium carbonic. dilaps. L. 239.
 Natrium causticum solutum L. 240.
 Natrium citricum neutrale L. 239.
 Natrium glycerino-phosphoric. L. 239.
 Natrium hydrocarbonicum L. 239. R. 805—808.
 Natrium hydrooxydatum L. 240.
 Natrium hydrooxydatum solutum L. 240.
 Natrium hypophosphorosum L. 240.
 Natrium iodatum L. 240.
 Natrium jodicum L. 241.
 Natrium kakodylicum l. Kakodyl-készítmények L. 207. R. 696—698.
 Natrium metavanadinicum l. Natr. vanadinicum L. 243.
 Natrium nitricum L. 241.
 Natrium nitrosum L. 241.
 Natrium nucleinicum L. 241.
 Natrium perboricum L. 241.
 Natrium phosphoricum L. 241. R. 809—812.
 Natrium pyrophosphoricum ferratum l. Ferri praeparata L. 163.
 Natrium salicylicum L. 242. R. 813—816.
 Natrium silicicum liquidum L. 243.
 Natrium sozodolicum L. 299. R. 974, 976, 977.
 Natrium sulfuricum crystallisatum. Glaubersó L. 243.
 Natrium sulfuricum dilapsum L. 243.
 Natrium tartaricum L. 243.
 Natrium telluricum L. 243.
 Natrium thiophenicum L. 243.
 Natrium vanadinicum L. 243.
 Neoarscodile Leprince L. 208.
 Neoform L. 244.
 Neopyrin L. 244.
 Neuraltein L. 244.
 Nesain L. 244.
 Nestlé-liszt L. 244.
 Neurodinum L. 244.

- Neurogen L. 244.
 Neurolin L. 244.
 Neuronal L. 244.
 Neutralon L. 244.
 Niauli oleum l. Gomenol L. 175.
 Niccolum bromatum L. 245.
 Niccolum sulfuric. L. 245.
 Nicotinum salicylic. l. Eudemol L. 157.
 Nirvanin L. 245.
 Nitroglycerinum in spiritu solutum L. 245.
 Nosophenum L. 245.
 Novargan L. 245.
 Novaspirin L. 245.
 Novocain L. 246. R. 259.
 Novoiodin L. 246.
 Novorenal L. 246.
 Nuclein l. Phagocytin Richter L. 266.
 Nutrose L. 246.
 Nux moschata L. 245.
 Nux vomica L. 246.

Ödda L. 248.
 Oleum amygdalarum dulcium L. 80.
 Oleum Anda-Assu L. 251.
 Oleum Anisi L. 248.
 Oleum Aurantiorum flor. L. 248.
 Oleum Cacao L. 251.
 Oleum Cadinum L. 251. R. 839—844.
 Oleum camphoratum L. 116. R. 348.
 Oleum camphoratum l. Camphora L. 116.
 Oleum Caryophyllorum L. 248.
 Oleum Chaulmoograe L. 252.
 Oleum Chenopodii anthelmintici aeth. L. 248. R. 828—829.
 Oleum Chloroformiatum L. 252.
 Oleum Cinnamomi Cassiae L. 248.
 Oleum Cinnamomi Cassiae L. 135.
 Oleum Citri L. 135, 248.
 Oleum Crotonis L. 145. R. 468, 469.
 Oleum Eucalypti L. 156.
 Oleum Fagi empyreumaticum l. Pix liquida L. 271.
 Oleum Foeniculi L. 248.
 Oleum Gaultheriae L. 248. R. 830—832.
 Oleum Gomenoli l. Gomenol L. 175.
 Oleum Gynocardiae l. Oleum Chaulmoograe L. 252.
 Oleum Hyosciami L. 196.
 Oleum Hyosciami folior. coccum l. Hyosciami folia L. 196.
 Oleum Jecoris Aselli L. 252. R. 845—846.
 Oleum Juniperi L. 249. R. 833, 834.
 Oleum Juniperi empyreumaticum L. 251. R. 839—844.
 Oleum Lauri pressum L. 253.
 Oleum Lavandulae L. 249.
 Oleum Lini L. 223.
 Oleum Macidis L. 249.
 Oleum Majoranae L. 249.
 Oleum Martis L. 164.
 Oleum Melaleuca l. Gomenol L. 175.
 Oleum Menthae piper. L. 249.
 Oleum Niauli l. Gomenol L. 175.
 Oleum phosphoratum L. 268.
 Oleum Pini silvestris pro inhalatione L. 249.
 Oleum Ricini L. 253. R. 847, 848.
 Oleum Rosae L. 249.
 Oleum Rosmarini L. 249.
 Oleum Ruscii rectificat. L. 252. R. 849—850.
 Oleum Santali ligni L. 250.
 Oleum Sinapis aethereum l. Sinapis semina L. 297.
 Oxy mel Scillae L. 291. R. 958.
 Oleum Sesami L. 254.
 Oleum Succini rectificat. L. 250.
 Oleum Terebenthinae rectificatum L. 250. R. 835—838.
 Oleum Valerianae L. 250.
 Oleum Sinapis aetherum L. 297.
 Olibanum L. 254.
 Ononidis spinosae radix L. 254. R. 730.
 Oophorin l. Ovarium-készítmények L. 260.
 Opium L. 254. R. 851, 853, 306.
 Opodeldoc L. 116.
 Opothérapie l. Organotherapie L. 259.
 Organotherapie L. 259.
 Orphol L. 259. R. 878.
 Orthoform L. 259.
 Ossin L. 260.
 Ostanxin L. 260.

- Ovadin l. Ovarium-készítmények L. 260.
 Ovaraden l. Ovarium-készítmények L. 260.
 Ovarium-készítmények L. 260.
 Oxaphor l. Oxycamphor L. 260.
 Oxycamphor L. 260. R. 879, 880.
 Oxychloridum Ferri solutum L. 163.
 Oxygaz L. 261.
 Oxygen L. 260.
 Oxytel Scillae l. Scilla L. 291.
 Oxytel simplex L. 261.
 Oxysparteinum hydrochloric. L. 261.

Pancreatinum L. 261.
 Pankreon L. 261.
 Pannae L. 262.
 Pantopon L. 262.
 Papainum L. 262. R. 881—882.
 Papaveris somniferi capsulae L. 262.
 Parabismuth L. 262.
 Parabromacetanilid L. 86.
 Paraffinum solidum L. 263.
 Paraffinum liquidum L. 263.
 Paraform L. 263.
 Paraformaldehyd L. 263.
 Paraldehydum L. 263. R. 883—885.
 Paranephrin L. 263.
 Paraplastok L. 263.
 Parisol L. 264.
 Pasta Guarana l. Guarana L. 179.
 Pastilli nitroglycerini L. 245. R. 819, 820.
 Pastilli santonini l. Cina L. 134. R. 245.
 Pegnin L. 264.
 Pelletierinum sulfuricum L. 175.
 Pelletierinum tannicum L. 175. R. 560.
 Pellotinum hydrochloricum L. 264.
 Pepsinum L. 264. R. 886—889.
 Perco l. Peru cognac L. 266.
 Perdynamium L. 265.
 Pergenol L. 265.
 Perhydrol L. 265.
 Peristaltin L. 265.
 Peronin l. Opium és morphin L. 256.
 Pertussin L. 266.
 Peru-Cognac L. 266.
 Perugen L. 266.
 Pernolum L. 266.
 Peruscabin L. 266.
 Petrolan L. 266.
 Petroleum rectificat. L. 266.
 Petrosapol L. 266.
 Petrosulfol L. 266.
 Phagocythin Dr. Richter L. 266.
 Phenacetin L. 266. R. 890, 891.
 Phenolum l. Acid. carbolicum L. 56.
 Phenyl dimethyl-pyrazolon L. 85. R. 206—211.
 Phenyl hydrarin laevulin sav anhydrid L. 87.
 Phenylurethan L. 159.
 Pbenocollum hydroch. L. 267.
 Phenolphthalein l. Purgó L. 274.
 Phenolum l. 56. R. 35—46.
 Phenolum monochloratum L. 267. R. 892—893.
 Phenolum sulfuricinic. L. 268.
 Phenosal L. 268.
 Phosphatine Fallière L. 268.
 Phosphorus L. 268. R. 894—896.
 Phosphatol L. 268.
 Physostigminum L. 269. R. 897, 898.
 Physostol L. 269.
 Phytin L. 269.
 Picrotoxinum L. 270. R. 899, 900.
 Pilocarpinum hydrochloricum l. Jaborandi folia L. 201. R. 663—666.
 Pil. Blankardi L. 164.
 Pilulae Blauidi L. 163.
 Pilulae ferratae L. 163.
 Pilulae Ferri carbonici L. 163.
 Pilulae Ferri jodati L. 164.
 Pilulae laxantes l. Aloe L. 72.
 Piperazinum L. 270.
 Piperazinum hydrochloricum L. 270.
 Piperidinum bitartaricum L. 271.
 Piperidinum guajacolicum L. 271.
 Piper. methysticum L. 270.
 Piscidae erythrinae cortex L. 271. R. 904.
 Pittylen L. 271.
 Pix Fagi liquida l. Pix liquida L. 271.
 Pix liquida L. 271. R. 905—907.
 Pix liquida betulina L. 253. R. 849—850.
 Placenta sem. Lini L. 223.

- Plasmon L. 272.
 Pleistopon L. 272.
 Plumbum aceticum basicum solutum L. 272. R. 144.
 Plumbum aceticum crystallisatum L. 272. R. 908—909.
 Plumbum carbonicum hydroxydatum L. 273.
 Plumbum oxydatum L. 273.
 Pneumia. L. 273.
 Po de Bahia L. 89.
 Podophyllum L. 273. R. 910—911.
 Potio magnesia citricae effervescent L. 274.
 Potio Riveri L. 210. R. 709.
 Propaesin L. 274.
 Proponal L. 274.
 Protargol l. Argentum protei-nicum L. 92. R. 236—240.
 Proton L. 274.
 Protosal L. 274.
 Protulin L. 274.
 Pulmoformium L. 274.
 Pulpa Tamarindorum depurata l. Tamarindus L. 309.
 Pulvis Doveri s. Pulv. Ipecacuanhae cum Opio l. Opium L. 255.
 Pulvis Goa l. Araroba L. 89.
 Pulvis Gummosus l. Gummi arabicum L. 180.
 Pulvis Liquiritiae compositus l. Sennae folia L. 295.
 Punica Granatum l. Granati Punicae cort. rad. L. 175.
 Purgatin L. 274.
 Purgatol L. 274.
 Purgo L. 274.
 Pulpa Prunorum L. 275.
 Pulvis aërophorus Scidlitzien-sis L. 275.
 Pulvis cinereus L. 189.
 Pulvis Doveri l. Opium L. 255. 154. 298. 300. 302. 311. 343.
 Pulvis Goa L. 89.
 Pulvis Gummosus L. 180.
 Puro L. 275.
 Pyocynase L. 275.
 Pyocyaninum aureum et coeruleum L. 275.
 Pyramidon L. 275. R. 912—913.
 Pyramidonum salicylicum L. 276.
 Pyrenol L. 276.
 Pyridinum L. 276.
 Pyrodin L. 276.
 Pyrogallolum L. 60. R. 60—64.
 Pyrogallolum l. Ac. pyrogall-icum L. 60. R. 60—64.
 Pyrosal L. 277.
 Quabain L. 277.
 Quassiae lignum L. 277.
 Quebracho cortex L. 277.
 Quercus cortex L. 277.
 Quietol L. 277.
 Quillajae cortex L. 277. R. 914—915.
 Radiogen L. 278.
 Radium L. 278.
 Rad Gentiana R. 322.
 Rad Valeriana R. 248.
 Ramisyrupe L. 278.
 Ramogen L. 278.
 Ratanhiae radix L. 278. R. 916.
 Regulin L. 279.
 Renes siccati pulv. l. Organotherapia L. 259.
 Renin-Poehl l. Organotherapia L. 259.
 Reniform L. 279.
 Resaldol L. 279.
 Resina Jalapae L. 201. R. 668.
 Resina Pini burgundica L. 280.
 Resorbinum L. 280.
 Resorcinum L. 280. R. 922—928, 333.
 Rhei rhizoma L. 281. R. 929—932. 936. 130.
 Rheumatin L. 282.
 Rhonol L. 282.
 Rhus aromaticus L. 282.
 Roborat L. 282.
 Roborin L. 282.
 Rodagen L. 282.
 Rodallin L. 316.
 Roob Juniperi L. 207. R. 695.
 Roob Sambuci l. Sambuci fructus L. 289.
 Rosmarini folia L. 283.
 Rubidium ammonium bromid L. 283. R. 937—938.
 Rubidium iodatum L. 283.
 Rubrum scarlatinum s. scarlatinum L. 283. R. 939.
 Sabadillae semina L. 283.
 Sabiniae frondes L. 284.
 Sabromin L. 284.

Saccharinum L. 284. R. 940—943.

Saccharum album L. 284.

Saccharum lactis L. 284.

Saccharum Saturni L. 272.

Sajodin L. 285.

Salacetolum L. 286.

Sal Alembrothi L. 285.

Sal ammoniacum depur. L. 79.

R. 169—172.

Sal anaestheticum L. 285.

Salazolom L. 286.

Sal Carolinum artefactum L.

243. R. 817—818.

Salen L. 286.

Salep R. 153.

Salep tubera L. 285.

Salicin L. 286.

Salicylamidum L. 286.

Salifebrin L. 286.

Saliformin L. 286.

Saligallol L. 286.

Salimenthol L. 286.

Salipyrin L. 86.

Salitum purum L. 286.

Salmiak l. Ammonium chlorat.

L. 79. R. 169—172.

Salochinin L. 287.

Salocoll L. 287.

Salocreol L. 287.

Salolum L. 287. R. 946—951.

Salophenum L. 288.

Salosantal L. 288.

Sal physiologicum L. 285.

Sal Seignettii l. Kalium natrio-
tartaricum L. 212. R. 726—
727.

Sal thermarum Carolinarum l.

Natrium sulfuricum L. 243.

Saluminium insolubile L. 288.

Saluminium solubile L. 288.

Salvarsan L. 288.

Salviae folia L. 288.

Sambuci cymae seu flores L.
289.

Sambuci fructus L. 289.

Samol l. Salimenthol L. 286.

Sanatogen L. 289.

Sanguinal L. 289.

Sanguinarin L. 289.

Sanoform L. 289.

Sanose L. 289.

Santali ligni oleum l. Oleum
Santali ligni L. 250.

Santalol l. Gonorol L. 175.

Santoninum L. 134. R. 425. 426.
427.

Santyl L. 289.

Sapocresol L. 290.

Sapocresolin L. 290.

Sapo durus L. 289.

Sapoform L. 290.

Sapo Kalinus L. 289.

Sapo Kalinus venalis s. viri-
dis L. 290.

Sapolan L. 290.

Sapo medicinalis L. 290.

Sapo picis L. 290.

Sapo sulfuratus L. 290.

Sapo venetus L. 290.

Saprol l. Cresolkészítm. L. 145.

Sarsaparillae radix L. 290. R.
952—953.

Sartol L. 291.

Scammonium Resina L. 291.

Scharlach vörös l. Rubrum
scarlatinum L. 283.

Schleich-féle helybeli érzéste-
lenítés L. 136. R. 428—430.

Scillae bulbosus L. 291.

Scilla siccata L. 291. R. 954.

Scopolaminum hydrobromicum
L. 292.

Scopomorphin l. Scopolamin
L. 292.

Sebum ovile L. 293.

Sebum salycilatum L. 293.

Secacornin L. 293.

Secale cornutum L. 293. R. 964.

Secalin L. 319.

Senegae radix L. 294. R. 966—
967.

Sennae folia spiritu extracta
L. 295.

Sennae Indicae folia L. 295.
R. 968.

Serum antidipteriticum L. 296.

Serum antiscarlatinosum Moser
L. 296.

Serum antistreptococcicum
Marinorek L. 297.

Serum antistreptococcicum
Paltanuf L. 297.

Serum antitetanicum L. 297.

Serum antithyreodinicum l.
Antithyreoidin-serum L. 87.

Sidonal L. 297.

Sidonal Neu L. 297.

Sinapis semina L. 297.

Siran L. 298.

Sirolin L. 298.

Solurool l. Acid. thymineum
L. 65.

Solutio arsenicalis Fowleri l.

- Acidum arsenicosum L. 53.
 R. 12—19.
 Solutio Calcii oxysulfurati l.
 Miscella Calcii oxysulfur. L.
 233.
 Solutio Vlemingckx L. 113, 233.
 R. 340.
 Solutol l. Cresol készítm. L.
 145.
 Solveol l. Cresolkészítmények
 L. 145.
 Soamin L. 298.
 Somagen L. 298.
 Somatose L. 298.
 Somnal L. 298.
 Somnoform L. 298.
 Sophol L. 299.
 Sozal L. 299.
 Sozodolum L. 299.
 Soxleth-féle tápezukor L. 299.
 Sparteinum sulfuricum L. 299.
 R. 979—980.
 Species Althaeae l. Althaeae
 rad L. 74.
 Species amaricantes L. 300.
 Species diureticae L. 300.
 Species laxantes St. Germain
 L. 295.
 Sperma Ceti l. Cetaceum L. 123.
 Sperminum (Poehl) L. 300.
 Spinolum L. 300.
 Spiritus aethereus L. 300.
 Spiritus aethereus ferratus L.
 164, 69.
 Spiritus aetheris chlorati L.
 300.
 Spiritus aetheris nitrosi L. 301.
 Spiritus aromaticus L. 301.
 Spiritus camphoratus l. Camp-
 hora L. 116.
 Spiritus cochleariae L. 301.
 Spiritus concentratiss. L. 300.
 Spiritus dilutus L. 300.
 Spiritus ferri sesquichlorati
 aethereus l. Spir. aethereus
 ferratus L. 164.
 Spiritus formicarum L. 301.
 Spiritus Mindereri L. 77. R.
 159, 160.
 Spiritus salis ammoniaci anisa-
 tus L. 78. R. 161, 162.
 Spiritus saponatus L. 301.
 Spiritus saponis kalini L. 301.
 Spiritus Sinapis l. Sinapis se-
 mina L. 298.
 Spirosal L. 301.
 Stagnin L. 301.
 Stearinum L. 301.
 Stibium sulfuratum auranti-
 cum L. 301. R. 981—983.
 Stibium sulfurat. nigrum L. 302.
 Stibium sulfur. rubrum L. 302.
 Stigmata Maydis L. 302.
 Stovain L. 302.
 Stramonium l. Datura L. 147.
 Strontium bromat. L. 303.
 Strontium iodatum L. 303.
 Strontium lacticum L. 303.
 Strophanti semina L. 303.
 Strichninum Nitricum l. Nux
 vomica L. 246. R. 821.
 Stipticin L. 304. R. 988—989.
 Styptol L. 304.
 Styracol l. Guajacolum cinna-
 mylicum
 Stryrax depuratus L. 302. R. 990.
 Strychninum nitricum L. 246.
 Subcutin L. 305. R. 991.
 Subliman L. 305.
 Succus Liquiritiae depuratus l.
 Liquiritiae radix L. 223.
 Succus liquiritiae venalis l.
 Liquiritiae radix. L. 223.
 Sudoral L. 305.
 Sulfaminolum L. 305.
 Sulfidal L. 305.
 Sulfoform L. 305.
 Sulfoid l. Sulfidal L. 305.
 Sulfonal L. 305. R. 982—995.
 Sulfosot-Syrup Roche L. 306.
 Sulfur auratum antimonii L.
 301. R. 981—983.
 Sulfur collidale l. Sulfidal L.
 305.
 Sulfur depur. L. 307.
 Syr. Kalii sulfogujacolicum l.
 Kalium sulfogujacolicum L.
 214.
 Syr. mannatus l. Senna L. 295.
 Sulfur praecipitatum L. 306. R.
 996—999, 199.
 Sulfur sublimatum L. 307.
 Sulfur sublimatum losum L.
 307. R. 340.
 Suppositoria Glycerini L. 173.
 Suprarenin l. Organotherap.
 es Adrenalin
 Symphorol L. 308.
 Syogol L. 308.
 Syrupus Althaeae L. 308, 74. R.
 142.
 Syr. amygdalinus l. 308, 80.
 Syr. aurantior. L. 308, 96.
 Syrup capill. veneris L. 308.

- Syrup. Cinnamomi L. 408, 135.
 Syrupus citri L. 308.
 Syr. Diacodii L. 308.
 Syrupus Ferri jodati l. Ferri
 praeparata L. 164
 Syrupus hypophosphorosus
 compositus L. 308.
 Syr. Ipecacuanhae L. 308, 199.
 Syrupus Kalii sulfogugjacolici
 L. 214.
 Syr. Liquiritiae L. 308.
 Syrup. mannatus L. 295, 308.
 R. 972.
 Syr. Menthae L. 308.
 Syrupus Menthae piperitae L.
 230.
 Syr. Mororum L. 308.
 Syr. Rhei L. 308.
 Syr. Rubi Idaei L. 209.
 Syrupus Senegae L. 309.
 Syrupus Sennae cum Manna
 l. Syrupi omnes L. 308.
 Syr. simplex L. 309.
 Syzygium yambolanum. L. 309.

 Taca diastase L. 309.
 Tamarindorum fructus L. 309.
 R. 1002.
 Tanargentan L. 309.
 Tannalbin l. 309.
 Tannalum insolubile L. 310.
 Tannalum solubile L. 310.
 Tannigen L. 310. R. 1003.
 Tanninum L. 63. R. 86—101.
 Tanninum albuminatum kera-
 tin l. Honthin L. 184.
 Tannismut L. 310.
 Tannisol L. 310.
 Tannobromin L. 310.
 Tannocoll L. 310.
 Tannoform L. 310.
 Tannon L. 310.
 Tannopin L. 310.
 Tannothymal L. 311.
 Tannyl L. 311.
 Tanosal L. 311.
 Taraxaci radix L. 311.
 Tartarus boraxatus L. 311.
 Tartarus depuratus L. 210. R.
 712—714.
 Tartarus emeticus L. 213. R.
 731—734.
 Tartarus natronatus L. 212. R.
 726, 727.
 Tela acido carbol. inpraegnata
 L. 311, 56.
 Tela depurata L. 311.
 Tela Ilydrargyro bichlorato
 inpraegnata L. 185, 311.
 Tela inpraegnata secundum
 Billroth L. 312.
 Tela jodoformio inpraegnata
 L. 311.
 Terebenthina communis L. 312.
 Terebenthina veneta L. 312.
 Terpinol L. 312. R. 1004, 1005.
 Terpinum hydratum L. 312. R.
 1006—1008.
 Terralin L. 313.
 Testaden L. 313.
 Tetanus antitoxin l. Serum an-
 titetanicum L. 297.
 Tetrachlormethan L. 313.
 Tetrajodpyrrol L. 204.
 Tetronalum L. 313.
 Teucin L. 313.
 Thallinum sulfuricum L. 313.
 Thallinum tartaricum L. 313.
 Thanathol l. Guaethol L. 177.
 Theobrominum natrio-salicyli-
 cum L. 314. R. 1009, 1010.
 Theocin L. 314.
 Theocin-natr.-aceticum L. 314.
 Theolactin L. 314.
 Theophyllin l. Theocin L. 314.
 Thephorin L. 314.
 Thermodinuin L. 314.
 Thigenol L. 314.
 Thilanium L. 315.
 Thiocol L. 315.
 Thiocoli comp. liquor L. 315.
 Thioform L. 315.
 Thiolum L. 315.
 Thiolum liquidum L. 315. R.
 1011—1013.
 Thiolum sicum L. 315. R.
 1014.
 Thiophenum bijodat. L. 316.
 Thiosinamin L. 316.
 Thymacetiin L. 316.
 Thymolum L. 316. R. 1015—
 1017, 187.
 Thymotol l. Tyratol L. 321.
 Thyreoidea-készítmények L.
 316.
 Thyreoidserum l. Antithyreoi-
 din serum L. 87.
 Thyresol L. 317.
 Tiliae flores L. 317.
 Tinctura Absynthii composita
 L. 51. R. 1. 2.
 Tinctura Aconiti L. 66.
 Tinctura Aloes L. 72.

- Tinctura amara* L. 318.
Tinctura Arnicae L. 93. R. 245, 247.
Tinctura aromatica L. 318.
Tinctura Aurantii L. 96.
Tinctura Aurantii pro syrupo L. 96..
Tinct. Belladonnae L. 99. R. 284, 285.
Tinct. Benzoes L. 102. R. 289, 290.
Tinctura Boldo L. 107.
Tinctura Cannabis indicae L. 117. R. 361.
Tinctura Cantharidum L. 118. R. 363, 365.
Tinctura capsici L. 119.
Tinct. Cascarillae L. 121. R. 375.
Tinctura Castorei L. 122. R. 378—380.
Tint. Chamomillae L. 123.
Tinctura Chinae L. 124.
Tinctura Chinae comp. L. 124. R. 390, 392.
Tinctura Cinnamomi L. 135.
Tinctura Colchici L. 141. R. 451.
Tinct. convallariae majalis L. 143. R. 462.
Tinctura Coto L. 143. R. 463, 464.
Tinct. Digitalis L. 149. R. 479, 480.
Tinct. Eucalypti L. 157. R. 500, 501.
Tinct. Ferri acetici aetherea L. 163.
Tinct. Ferri Athenstaedt L. 318.
Tinctura Ferri pomati L. 163.
Tinct. Gallarum L. 170.
Tinct. Gelsemii L. 172. R. 547.
Tinctura Gentianae L. 172.
Tinct. Hamamelidis L. 181. R. 579.
Tinct. Ipccacuanhae L. 199.
Tinct. Jodi L. 206. R. 685, 690, 691.
Tinct. Lobeliae L. 225. R. 761.
Tinct. Malatis Ferri L. 163.
Tinctura Moschi L. 234.
Tinctura Myrrhae L. 235.
Tinctura nervino-tonica Be-stuscheffi L. 164.
Tinctura nucis vomicae L. 247. R. 821—827.
Tincturae omnes l. a megfelelő drogok ezmei alatt.
Tinctura Opii simplex L. 255. R. 855, 859, 869, 353, 341.
Tinctura Opii crocata L. 255. R. 857, 861, 866.
Tinct. Piscidae L. 271. R. 902.
Tinctura Ratanhiae L. 278. R. 920, 921.
Tinctura Rhei aquosa L. 281. R. 935.
Tinctura Rhei Darelli s. vinosa L. 281. R. 934.
Tinct. Rhois aromatic. L. 282.
Tinctura roborans Whyti L. 124. R. 390, 392.
Tinct. sem. Strophanthi L. 303. R. 984—987.
Tinctura Strammonii L. 148.
Tinctura Valerianae aetherea L. 325. R. 1028—1031.
Tinctura veratri L. 327.
Tinctura Zingiberis L. 334.
Tiodin L. 318.
Tolypyrin L. 318.
Tolysal L. 318.
Tonocain suprarenale Richter L. 318.
Tonogen suprarenale L. 318.
Tonol L. 318.
Tragacantha L. 318.
Traumaticin L. 318.
Traumatol L. 319.
Tribromphenol L. 318.
Trieresolum L. 145.
Triferrin L. 164.
Trifolii febrini folia L. 319.
Trigemin L. 319.
Trimethylamin L. 319.
Trinitrin l. Nitroglycerin. L. 245.
Trionalum L. 319.
Triphenin L. 319.
Tropacocain. hydrochlor. L. 319.
Tropon L. 320.
Trygase l. Furunculin L. 170.
Trypanvörös L. 320.
Tuberculoctidin L. 320.
Tubuli acido carb. praeparati L. 320.
Tubuli praep. carbolati L. 56.
Tulase L. 320.
Tumenolum venale L. 320. R. 1018, 1019.
Turiopin L. 320.
Tussolum L. 321. R. 1020.
Tutulin L. 321.
Typhase L. 321.
Tyramine L. 321.
Tyratol L. 321.

- Uncomocomo rhizoma** L. 262.
Unguenta L. 321.
Unguentum acidi boricæ l. **Acid. boricum** L. 55.
Ungu. adipis laeae L. 219, 321.
Ungu. ad scabiem L. 307. R. 1000—1001.
Ungu. album L. 273.
Ungu. aromatic. L. 321.
Ungu. Authenriethi l. **kalium stibiato-tartaricum** L. 213.
Ungu. Cantharidum L. 119, 322.
Ungu. caseini L. 321.
Ungu. Cerussae l. **Plumbum carbonicum** L. 273.
Ungu. cinereum L. 185.
Ungu. cinereum cum resorbino paratum L. 190.
Ungu. contra decubitum L. 322.
Ungu. contra pediculos L. 283.
Ungu. diachylon Dr. **Hebrae** l. **Plumbum oxydatum** L. 273.
Ungu. emolliens L. 322.
Ungu. Glycerini L. 173, 322.
Ungu. Hydrargyri L. 185, 273.
Ungu. kalii jodati cum jodo L. 206.
Ungu. lanolini L. 219.
Ungu. Paraffini L. 263, 322.
Ungu. Plumbi acetici L. 273.
Ungu. Plumbi tannici L. 322.
Ungu. Sabadillæ L. 283.
Ungu. simplex L. 322.
Ungu. sulfuratum L. 307. R. 1000—1001.
Ungu. Zinci oxyd. l. **Zincum ox.** L. 331.
Urea pura L. 322.
Uresin L. 322.
Urethanum L. 322. R. 1021—1024.
Uricedin Stroschein L. 323.
Urisolvin L. 323.
Urocitral L. 323.
Urol L. 323.
Uropperinum L. 323. R. 1025.
Uropherinum benzoicum L. 324.
Uropher salicyl L. 323. R. 1025.
Uropural L. 324.
Uropurin L. 324.
Urosin L. 324.
Urotropin L. 324.
Urotropin. chinicum l. **Chinotropin** L. 130.
Ursal L. 324.
Ustilago Maydis L. 324.
Uvae ursi folia L. 324. R. 979, 980.
- Valerianae radix** L. 325. R. 1028—1031.
Valerydin L. 326.
Validol L. 326. R. 489.
Validolum camphoratum L. 326.
Valisan L. 326.
Valyl L. 326.
Vaselinum cum acido boricæ l. **Acid. boricum** L. 55.
Vaselinum flavum L. 326.
Vasogenum L. 327.
Veratrinum L. 327. R. 1032—1034.
Veratri rhizoma L. 327.
Veratrolum syntheticum L. 328.
Veronal L. 328.
Veronal-natrium L. 328.
Vesipyrin l. **Acetylsabot** L. 52.
Vinum Cascaræ sagradae L. 120. R. 371.
Vinum Chinae l. **Chinae succirubr. cort.** L. 124.
Vinum Condurango l. **Condurango cortex** L. 142.
Vinum Huxhami L. 214.
Vinum Pepsini l. **Pepsinum german** L. 264.
Vinum stibiato-tartaricum l. **Kalium stibiato-tartaricum** L. 214.
Vinum stibiatum L. 214.
Vinum Tokajense L. 328.
Vioform L. 328.
- Xaxaquin** L. 328.
Xerotorm L. 328. R. 1035, 1036.
Xylolum L. 329. R. 1037, 1038.
- Yerba santa** L. 329.
Yohimbinum hydrochloricum L. 329. R. 1039, 1040.
Yoghurt L. 329.
- Zedoariae rhizoma** L. 330.
Zincum acet. L. 330. R. 1041, 1042.
Zincum chloratum L. 330. R. 1043—1046.
Zincum hypermangan. L. 331.
Zincum oxydatum L. 331. R. 1048—1056.

- Zincum phosphoratum L. 332.
 Zincum sozodolicum L. 332.
 Zincum stearinicum L. 332.
 Zincum sulfocarbolieum L. 332.
 Zincum sulfoichtyolic. L. 332.
 Zincum sulfuricum L. 332. R.
 1057—1062.
 Zincum superoxydatum L. 333.

- Zincum valerianicum L. 333. R.
 1063, 1064.
 Zingiberis rhizoma L. 334.
 Zinc-alumnol l. Zinol L. 334.
 Ziniperhydrol L. 333.
 Zinol L. 334. R. 1065.
 Zuckerin L. 334.
 Zymphen L. 334.
-

GYÓGYHELYEK ÉS GYÓGYVIZEK TÁRGYMUTATÓJA.

(L. = lapszám.)

Abbazia L. 381, 378.
Aachen L. 392.
Acheusee L. 377.
Adelboden L. 378.
Aeschi L. 378.
Aix les Bains L. 392.
Albisbrunn L. 380.
Alexandria L. 379.
Alexisbad L. 378.
Algier L. 379.
Almádi L. 381.
Alsó-Tátrafüred L. 394.
Annensee L. 381.
Arbe L. 379.
Arco L. 379.
Areachon L. 381.
Arosa L. 378.
Aussee L. 377, 386.

Badacsony L. 381.
Baden L. 392.
Baden-Baden L. 385.
Badenweiler L. 378.
Bagnères de Bigorre L. 387, 389.
Balaton-Földvár L. 381.
Balatonfüredi víz L. 382.
Balaton-Füred L. 381.
Baldóc L. 388, 377.
Baldóczi fürdőforrás L. 384.
Balf L. 380.
Balfi Új forrás L. 383.
Bálványos fürdő L. 378.
Barbolan L. 389.
Barèges L. 392.
Barlangliget L. 377, 380.
Bártfa L. 377, 380.
Bártfai víz L. 383.
Bázna L. 386, 394.
Beatenberg L. 378.
Beaulieu L. 379.
Berchtesgaden L. 378.
Biarritz L. 381.
Biharfüred L. 378.

Bikszád L. 383.
Bilini Karolina-forrás L. 382.
Bilini József-forrás L. 382.
Blankenberghe L. 381.
Bodoki Matild-forrás L. 382.
Boglár L. 381.
Boppaid L. 380.
Bordighera L. 379.
Borhegyi víz L. 382.
Bormio L. 378.
Borosznó L. 380.
Borszék L. 377, 380, 389, 394.
Borszéki borvíz L. 382.
Boulogne L. 381.
Bozen L. 379.
Brighton L. 381.
Buchenthal L. 380.
Budapest Császárfürdő L. 391.
Buziás 380, 389, 394.

Cairo L. 379.
Cannes L. 379, 381.
Cap d'Ail L. 379.
Castellamare L. 381.
Catania L. 379.
Canterets L. 392.
Chamounix L. 378.
Cirkvenicza L. 381.
Clarisse-forrás L. 389.
Colberg L. 381.
Contrexeville L. 388.
Corfu L. 379.
Cortina L. 378.
Cransac L. 388.
Crauz L. 381.
Császárfürdő L. 394.
Csevicze L. 392.
Csíz L. 385, 387.
Csorbai-tó L. 378.
Czigelkai Lajos-forrás L. 383, 385.

Daruvár L. 393, 394.
 Davos L. 378.
 Dieppe L. 381.
 Dietsenmühle L. 380.
 Dombhádi Livia víz L. 383.
 D. Dörfli L. 378.
 Dürkheim L. 385, 387.

Eaux Bonnes L. 392.
 Eaux Chaudes L. 392.
 Elgersburg L. 380.
 Előpatak L. 389.
 Elster 384, 390, 394.
 Ems L. 383.
 Enghien L. 392.
 Erzsébet sósfürdő L. 384.
 Etretat L. 381.

Fachingen L. 382.
 Falkenstein L. 378.
 Fangóintézet Budapest L. 394.
 Feketehegy L. 377, 380.
 Felix-tüdő L. 393.
 Felső-Bajom L. 386.
 Felső-Házi L. 378.
 Fenyőháza L. 380.
 Ferencz József-víz L. 384.
 Franzensbad L. 384, 390, 394.

Gánóc L. 377.
 Giesshübel-Puchstein L. 382.
 380
 Gleichenberg L. 383.
 Gmunden L. 377.
 Godesberg L. 380.
 Görbersdorf L. 377, 378.
 Görgény-Sóakna L. 386.
 Gräfenberg L. 380.
 Gries L. 379.
 Grindelwald L. 378.
 Guber-forrás L. 391.
 Gyertyánliget L. 390.

Hall L. 386, 387.
 Harkány L. 391.
 Harsthal L. 380.
 Harzburg L. 387, 378.
 Helenenthal L. 380.
 Helgoland L. 381.
 Herkulesfürdő L. 392.
 Heringsdorf L. 381.
 Herkulesfürdő L. 380.
 Herrenalb L. 380.

Hévíz L. 393, 394.
 Hofgastein L. 393.
 Homburg L. 385.
 Hubertusbad L. 378.
 Hunyadi János-víz L. 384.

Iglófürdő L. 377, 380.
 Igmándi víz L. 384.
 Ilmenau L. 380.
 Innichen L. 378.
 Inselbad L. 388.
 Interlaken L. 378.
 Ischl L. 377, 386.

Kaltenleutgeben L. 380.
 Kammer L. 377.
 Kandersteg L. 378.
 Karlsbad L. 394.
 Kászón-Jakabfalvi víz L. 382.
 Kenesze L. 381.
 Keresztyénsziget L. 378.
 Kissingen L. 385, 394.
 Klein Scheidegg L. 378.
 Koritnyicza L. 377, 380, 389.
 Korond L. 386, 390.
 Königstein L. 380.
 Kőszeg L. 380.
 Krapina-Teplitz L. 393.
 Kreuth L. 378.
 Kreuzen L. 380.
 Kreuznach L. 386, 387.
 Krondorf víz L. 382.

Lautenberg L. 380.
 Leibenstein L. 380.
 Leibicz L. 377, 392.
 Leukerbad L. 387.
 Levico L. 391.
 Lido L. 381.
 Lipik L. 381, 383, 387.
 Lippspringe L. 388.
 Lovrana L. 378, 381.
 Lubló L. 377.
 Luchon L. 392.
 Lucivna L. 377, 380.
 Lubatschowitz L. 383.
 Luhi Erzsébet-forrás L. 382.
 Luhi Margit-forrás L. 382.
 Lukácsfürdő L. 394.
 Lussin grande L. 379, 381.
 Lussin piccolo L. 379, 381.
 Luxeul L. 393.
 Luzern L. 373.

Madeira L. 379.
 Málnási Mária-forrás L. 383.
 Málnási Siculia-forrás L. 383.
 Margitsziget L. 391.
 Marienbad L. 384, 394, 390.
 Marillavölgy L. 377, 379.
 Maros-Ujvár L. 386.
 Matlárháza L. 378.
 Mehádiai Herkules-forrás L. 385.
 Menyháza L. 393.
 Mentone L. 379.
 Meran L. 379.
 Misdroy L. 381.
 Misurina L. 377.
 Mohai Ágnes-víz L. 382.
 Monaco L. 379, 381.
 Mondsee L. 377.
 Montreux L. 379.
 Monte-Carlo L. 379.
 Mürren L. 378.

Nauheim L. 386.
 Nenndorf L. 392.
 Nerothal L. 380.
 Nervi L. 379.
 Neuhaus L. 386, 393.
 Niederdorf L. 378.
 Nieder Selters-víz L. 383.
 Nizza L. 379, 381.
 Norderney L. 381.

Obersalzbrunn L. 382.
 Oeynhausen-Rehme L. 386.
 Ospedaletti L. 379.
 Ostende L. 381.

Palermo L. 379.
 Palics L. 381.
 Parád L. 380, 389, 390, 392.
 Pegli L. 379.
 Petánczi víz L. 382.
 Pfäfers L. 393.
 Plsa L. 379.
 Pistyán L. 392.
 Plombières L. 393.
 Polhora L. 386.
 Porto Maurizio L. 379.
 Poutresina L. 378.
 Portsach L. 377.
 Pöstyén L. 391, 394.
 Preblau L. 382.
 Priessnitzthal L. 380.
 Püspök-fürdő L. 393.
 Pyrawarth L. 390.
 Pymont L. 390, 394.

Ráczfürdő L. 387.
 Szt. Radegund L. 380.
 Radna-Borbereki víz L. 382.
 Ragaz L. 393.
 Raguza L. 379.
 Rajeczfürdő L. 394.
 Rajecz-Teplitz L. 393.
 Ramsgate L. 381.
 Reiboldsgrün L. 378.
 Reichenau L. 377.
 Reichenhall L. 387.
 Rennes L. 389.
 Répáti víz L. 382.
 Rév-Fülöp L. 381.
 Riffelalp L. 373.
 Riffelberg L. 378.
 Rigi L. 380, 378.
 Rimini L. 381.
 Rohitsch L. 380, 384.
 Roncegno L. 390.
 Rozsnyó L. 380.
 Römersbad L. 393.
 Rudasfürdő L. 387.
 Saint-Armand L. 388.
 Salzburg-Parsch L. 380.
 San-Remo L. 379.
 Schweningen L. 381.
 Schinznach I. 392.
 Schönbrunn L. 380.
 Schöneck L. 380.
 Sczawnicza L. 383.
 Siófok L. 381.
 Smaden L. 38.
 Spaa, L. 390, 394.
 Spezzia L. 379.
 Spiez L. 378.
 Stojkai víz L. 383.
 Sztosz L. 377, 380.
 Stubnya L. 377, 393.
 Suderode L. 378.
 Schwalbach L. 390.
 Sylt L. 381.
 Szántói savanyúvíz L. 382.
 Szepezd I. 381.
 Szinnye Lipóczi Salvatorforrás
 L. 388.
 Szklenő L. 377, 387.
 Szlatvini Anna források L. 882.
 Szliács L. 377, 389.
 Szobráncz L. 392.
 Szolyvai víz L. 382.
 Szováta L. 386.
 St. Blasien L. 378.
 Szt. László fürdő L. 393.
 Szt. Lukácsfürdő L. 391.
 Szt. Moritz-Dorf L. 378.

- Taormina** L. 379.
Tarasp-Schuls L. 384.
Tarcsa L. 390, 394, 377.
Tarvis L. 377.
Tátrafüred L. 378, 380.
Tátraháza L. 377.
Tátralomnic L. 378, 380.
Tátraszéplak L. 378, 380.
Tegernsee L. 378.
Teplitz-Schönau L. 393.
Territet L. 379.
Thale L. 378.
Thurzöfűred L. 377, 380.
Toblach L. 378.
Tobelbad L. 377, 393.
Trencsen-Teplitz L. 392, 394.
Triberg L. 378.
Trouville L. 381.
Tusnád L. 389, 377.
Tüffer L. 393.

Uj-Lubló L. 389.
Unterrach L. 377.

Varasd-Toplica L. 392.
Városligeti artézi fürdő L. 391.

Vásártelek L. 394.
Véghlesi Vera viz L. 382.
Velden L. 377.
Vichy L. 381.
Vihnye L. 377, 389.
Villhelms Höhe L. 380.
Virág-völgy L. 377.
Vitel L. 388.
Vizakna L. 386.
Viznau L. 378.
Volosca L. 381.

Waeggis L. 378.
Waidhofen L. 380.
Waldhaus-Flims L. 378.
Weilbach L. 392.
Weissenburg L. 388.
Wengern L. 378.
Wiesbaden L. 378, 385.
Wigth sziget L. 381.
Wildbad-Gastein L. 393.
Wildungen L. 388.

Zell am See L. 377.
Zermatt L. 378.
Zoppot L. 381.

TARTALOM.

	Lap
Előszó a X-ik kiadáshoz	3
Orvosi rendtartás	5
Vényszerkesztési jegyzetek	8
Némely mértékről	16
Cseppszám-tábla	18
Czélszerűtlen és veszélyes gyógyszerkeverékek	18
Robbanó keverékek	20
Fürdők	20
Bőr alá fecskendésre használt szerek oldatainak töménysége	22
Belégzésre használt szerek oldatainak töménysége	24
Doses maximales	25
Kivonat a kézi gyógytárakra vonatkozó belügym. rendeletből	28
Az orsz. betegápolási alap stb. költségére való rendelés szabályzatának kivonata. (1898. évi 99.000. sz. belügym. szabrend.)	29
Kivonat a vénykészítésnél előforduló gyógyszerészi munkadíjak és edények hiv. árszabványából	37
Gyermeekgyakorlatban fontosabb és hatékonyabb szerek adagolása	39
Vénygyűjtemény	50
Betegek asztala	334
Az egészséges és beteg gyermek étrendje	350
Hogy táplálja és gondozza az anya kisdedét?	355
Tápanyagok és élvezeti anyagok értékét feltüntető táblázatok	358
Acut mérgezések kezeléséről	368
Gyógyhelyek és gyógyvizek átnézete	377
Gyógyszerkülönlegességek és titkos szerek	395
Gyógyszerek tárgymutatója	423
Gyógyhelyek és gyógyvizek tárgymutatója	447

Hirdetések jegyzéke.

Lap		Lap	
Gyógyszerkészítmények.		Elixir Deret	V
Adrenal-Poehl	LX	Emésztőpor-Dr. Gölis	475
Adrenalin-Clin	V	Enesol-Clin	V
Albargin	C	Ergot. Stypt.-Egger	LVII
Alboplast-Bayer	XXII	E-ter-Dermasan	XXIX
Algocratin	470	Eulaxan tabl. dr. Stankay	456
Alsol	XV	Eumictine	XXXV
Anaemin	XII	Extr. Chinae Nanning	XXIV
Anestile-Bengué	XIII	Extr. Thymi Kern	XXVII
Antralapis	466	Ferricodile	XXXV
Antramel	466	Ferrocodile	XXXV
Arsan	I	Ferroglidine	I
Arsanaenim	VII	Fersan	II
Arsoferrin tekt.	X	Formamint	472
Arsycodile	XXXV	Forman	465
Baby-crème, puder, szap.	XXII	Foszfor-csok. bonb. Finy	468
Bardella	463	Gelodurat	XLVIII
Benguéliment	XIV	Gilisza-csokoládé-Sztraka	XLI
Biocitin	E	Glycerophosphat-Robin	IX
Biovar-Poehl	LX	Glycomaltin	XLIII
Blutan	LXV	Guajacol-Perdynamin	LII
Brom-Fersan	II	Guipsine	XXXV
Bromglidine	I	Gyomorpor-Barella	XXVI
Bromone Robin	IX	Haemalbumin-Lecithin	XXXIV
Capsules-Cognet	458	Haematicum-Glausch	XLV
Carboxol	XIX	Haematogen-Hommel	XXXIII
Cascarine-Leprince	XXXV	Hg-glidine	I
Cerebrin-Poehl	LX	Hydrastis-tektolettes	X
China-Ferr-Drage Nagy	460	Hydropyrin	XII
Clinin-bonbon-Sztraka	XLI	Hyperol	XII
Chloraethyl-Bengué	XIII	Ichthyol	464
Chloraethyl dr. Robisch	466	Jodfersan	II
Contratussin	XXII	Jodglidine	I
Corrosol Egger	XXVIII	Jodone Robin	IX
Digitalisat-Bürger	XXXI	Jogadin	XLIX
Diujodin	469	Joricin	I
Dragées-Bengué	XIII	Kalmopyrin	XII
Electrargol-Clin	V	Kawotal	462
Elix. Condur. pept.	XXVII	Kakodyls. natr.-Clin.	V
		Kola-diet.készítm.-Stoll	XXXVII

Lap	Lap
Kolozsvári gyógyszappa- nok LV	Pil. aperientes Kleewein. LIV
Lactobacilline XXV	Pil. du Dr. Sejournet. XXXV
Lecithin-Clin V	Pil. kali jod. perennes . 469
Lecithin-Perdynamin . . . LII	Piperazin-Midy LIII
Lecithin-Richter XII	Pivako XX
Lenicet XXIX	Proteoferrin XII
Lenirenin XXIX	Pyramidon. C
Liqueur Laville V	Regenerol X
Liqu. ferro mang. Helfenberg LXV	Regulin LXV
Liquor thiorobin comp. Eibach . . . hátsó boríték	Reniin-Poehl LX
Lycetol dr. Egger . . . XXVIII	Reparator-Kriegner. . . XXI
Lysoferm XXXIX	Rheumasan XXIX
Magnospirin XLVIII	Rhomnol XXXV
Maltocol XLIII	Robiol 466
Maltolecin LXXX	Sagrada-Barber X
Mammin-Poehl LX	Sagradabor-Liebe . . . VII
Mattan F	Sal. polybrom. eff. Egger XLIV
Menthocapsol-Skala . . . XL	Salus fert. szappan . . . LVI
Menthol-fogszippan- Sztraka XLI	Sanitol fogápoló . . . 464
Mercurocreme XLII	Salicyltannarabin . . . XIX
Metharsinate V	Salunguene Bengen . . . XIX
Modiscop L	Santonin giliszta-esok. . . XLI
Mycodermin 0—	Sapoformal XIX
Myrticol-Csatádi . . . XLIV	Scorogéne V
Natr. kakod. inj. Egger XXXVI	Sirop Famel XXXVIII
Neo-Arsycodile XXXV	Sol. kalii sulfog. Demeter LVIII
Neurogen XIX	Solurool V
Neurolin-Balla XLVII	Sorisin XVI
Noffke old. bongiek . . . 467	Sperminum-Poehl LX
Novocain C	Spir. petrae camph. Krieg- ner XXI
Novocol XII	Strophantin-Catillon . . LXII
Novorobiol 466	Strophantus-Catillon . . LXII
Nucleatol Robin IX	Suprarenin C
Nuclearsitol Robin . . . IX	Syr. hypophosph. Egger LXIII
Nural XVII	Syrgol 476
Ozoniment Bergen. XIX	Tab. cacaot. phosphor. . XLII
Ozofluin. IV, LXXXIV	Tab. ferri protox. Dr. Déer 471
Pancréatine Defresne . . . L	Tannin-csokoládé-Sztraka XLI
Pandigitale Houdas . . . XXX	Thaolaxine XVIII
Pankreon 459	Thiarsol. V
Pegnin C	Thiorobin comp. liqu. Eibach hátsó boríték
Pepsorthin 458	Thyreoidin-Poehl LX
Peptonate de fer Robin. . IX	Tinct. ferri Athenstaedt . XV
Peroxygenol XII	Tonocain XII
Phosphotal-Clin V	Tonogen XII
	Uroballan LIX
	Urocol LXVI

	Lap
Urol	LXVI
Valerianate Pierlot	XXX
Valofin	LXV
Valyl.	C
Vas-foszf. csok Finy	468
Vegetalin	X
Vesicaesan labd.	LXVII
Vin. chinae c. ferro-Krieg- ner	XXIII
Vin. myrt. med. Coraides	460
Vin. pepsini-Kriegner	XI
Vin et Syroup Nourry	V

Tápszerkészítmények.

Diasana	473
Dupla malátasör	LXXI
Glasner-tápsz. czukorbet. részére	474
Hygiama a lapok alsó szélén	
Karlsbadi kétszersült- Bayer.	LXX
Leurose	LXXIV
Maggi-tápkészítm.	LXIX
Maláta kivonatpor Liebe	VII
Perdynamin	LII
Plasmon	474
Rüger erő-kakao	468
Sanatogen	472
Simons-kenyér	472
Székely-f. gyógytej	LXXXII
Unicum-likör	LXX
Thum-kávé	LXXIII

Gyermek-tápszerek.

Alimentum Theinhardt a lapok alsó szélén.	
Bu-Co	LXXIX
Herkules gyermek-tápsze- rek	474
Kaiser ster. gyermeklisztje	473
Kufeke-gyermekliszt	LXXVII
Loetfland-féle gyermektáp- szerek	LXXVI
Mellin-tápszer	LXXVIII
Nestle-gyermekliszt	LXXV

	Lap
Nentralis tápszer	VII
Phosphatine-Falières	LXXXI
Ramogen	LXXXIX
Székely gyermektej	LXXXII

Ásványvizek.

Bilini savanyúvíz	LXXXVII
Giesbühler	A
Karlsbadi sprndelsó	XC
Kristályvíz	LXXXV
Málnási Mária-forrás	486
Salvator	LXXXIII
Saplonczai korona-forrás	XCIII
Szlatvini Anna forrás	LXXXVIII
Szt-Margitszigeti gyógyvíz	XCIV
Vichy-források	LXXXVI
Wildungeni források	XCI

Gyógyhelyek.

Abbazia, Pens. Hermitage	489
Buziás	489
Császár-fürdő	490
Csiz-fürdő	490
Ems	LXXXIX
Franzensbad	491
Franzensbad Hotel Stadt Leipzig	491
Hall	492
Iglófürdő	493
Lipik	493
Nizza, Rhein. Hof	492
Pöstyén	XCIV
Radein	494
Rohitsch-Sauerbrunn	XI
Szent Lukácsfürdő	LXXXV
Tarcsa	495
Tátra-Széplak	495
Trencsénteplicz	XCIV
Vöslau	491

Gyógyintézetek.

Bad Kreuzen szanat.	494
Chiemsee szanat.	G
Gámán dr. diet. int. Vo- losca	486

	Lap		Lap
Glück dr. vízgyógyint. . .	485	Brauswetter, órák . . .	VI
István-úti szanatorium . .	XCII	Erdély és Szabó, labor. felsz. .	479
Marilla-szanatorium . . .	III	Femel deszt. kész. . . .	478
Obersteiner tr. szanat. . .	483	Gen. Dental Mfg. Co., fog-	
Pariser-Dammert DDr.		zománcz	LXVIII
szanat. Homburg	II	Hugershoff, labor. berend. .	480
Purkersdorf szanatorium .	484	Keleti, műszerek	496
Priesnitz szan. Gräfenberg .	487	Lehner, orh. cipők	481
Schömberg szanatorium . .	470	Libál és März, látsz. cik-	
Schweizerhof szanat. . . .	484	kek	482
Steinhof orsz. gyógyint. . .	483	Oltókivonat-Bayer	462
Szegő dr. szan. Abbazia . .	485	Reichert, görcsövek . . .	XXXII
Tenscher dr. szanatoriuma .	488	Stölle gyógyszerüveg . . .	480
Vándor dr. Fango-gyógy-		Szücs bőrbutor	XXXII
intézete	XCVIII	Teufel, sebészi és testgy.	
		czikkek	LXI, LXIV
		Wagner dr. és tsai, szén-	
		savfürdő-kész.	XCVI
		Windler, sebészi műszerek .	B
		Zeiss, görcsövek	477

Különfélék.

Bernartzik injekt. folg. .	VIII
Bpesti takarékp. és zálogh.	482



Új hashajtó

Nem különlegesség

Dr. Sztankay Aba vegyészeti laboratoriumának újabb készítménye:

Tablettae Eulaxans dr. Sztankay

(Név törvényesen védve.) 0·2 és 0·1 gr-os cukrozott tablettákban előállítva. Az Eulaxansnál a hashajtó hatást a gyomorsav behatása alatt képződő molekuláris változást nem szenvedett phenolphtalein idézi elő, így hatása összehasonlíthatóan jobb, mint a raktározott, s molekuláris változáson átment phenolphtaleiné

Oly egyéneknél, kik állandó obstipációban szenvednek, azon intervallumok, melyek az egyes hashajtó gyógyszerek bevételei közt vannak, Eulaxans használatánál folyton hosszabbodnak. Raktárak Budapesten: Török József, Radanovits Testvérek gyógyszertárában, Thallmayer és Seitz, Kochmeister Frigyes utódai nagydrogista cégnél. Wienben: Bruno Raabe cégnél.

Orvos uraknak kísérletezésre anyagot szívesen küld

Dr. SZTANKAY ABA
vegyészeti laboratoriuma, Bát, Hontmegye.

TARTÓS, SZÁRAZ ÉLESZTŐKÉSZÍTMÉNY!

„MYCODERMIN“

Sörélesztő hideg légárammal szárítva, mi által az élesztősejtek érintetlenül tartatnak; ennek folytán a legnagyobb vegyi aktivitás, melynek hatása úgy kísérletileg, valamint klinikailag megállapítottatott következőknél: Furunculosis, Acne, Folliculitis, Prurigo, Impetigo, némely Eczemák, Urticaria, Anthrax. Továbbá a Mycodermin elterjedt alkalmazást talál: Habitualis Obstipatio, Diabetes, Vaginalis és Cervicalis Leukorrhoea és hasonló tüneteknél.

Kimerítő irodalmat és próbákat az orvos uraknak ingyen és bérmentve küld magyarországi képviselőnk.

CHEMISCHE FABRIK
J. BLAES & Co.,
LINDAU, BAYERN.

Heveny és idült bronchitis, bronchorrhoea, bronchiektasia, bronchopneumonia eseteiben a



Capsules Cognet



melyek tiszta eucalyptol-, jodoform- és kreosotból állanak, megszüntetik a secretiót és gyorsan gyógyuláshoz vezetnek. — Tüdőtuberkulózisnál föltartóztatják a betegségi folyamat előrehaladását, gyorsan javítják a táplálkozást, megszüntetik a lázat és elősegítik a sebesedések behegedését.

Gyógyszerkészít-
mények gyára:

A. Cognet & Cie,

Paris 43 rue de Saintonge 43 Paris.

PEPSORTHIN

Ez az orvosi utasítás szerint készült gyomorszer semmiképen sem akar univerzális gyógyszernek tekinteni, hiszen ilyen szer nincsen és bizonyos okokból nem is létezhet. A **Pepsorthin** csak az emésztő folyamat elősegítője akar lenni heveny és idült gyomorhurutoknál megzavart gyomornedv-képződéssel, akár önálló betegségről van szó, akár más idült bajok következményes betegségeiről. Ezekben az esetekben a **Pepsorthin** tudományosan megokolt összeállítása következtében, különösen az orvos kezében igen jó szolgálatokat fog tenni, ellentétben egynémely úgynevezett univerzális gyomorszerrel, melynek hatásosságát semmiféle elfogadható, tudományos bizonyíték nem igazolja. A Pepsorthin egyedüli készítői **SAUTER'S LABORATORIEN, Aktien-Ges. Genf (Schweiz), Paris, 49. rue de Paradis, Bellegarde (Ain, France)** Kapható a gyógyszertárakban.

Pankreon

D. R. P. 128419 és külföldi szabadalmak.

Javalt a gyomorbélhuzam, az epeutak (*icterus catarrh.*), a hasnyálmirigy összes megbetegedéseinél, a fölszívódás elősegítésére: kachexiánál (*tuberculosis, carcinoma ventriculi*), a lábbadozás időszakában, az aggkorban, *lej- és hízlalókúráknál*. Étrendi hibák következményeinek megelőzésére és az emésztés szabályozására *érelmeszesedés, morbus Basedowi, angina pectoris, hemicrania gastrica* eseteiben.

Diagnosticum pankreatogen betegségek (*diarrhoea, steatorrhoea*) kikutatására.

Stomachicum ideges emésztési zavaroknál, étvágyhiánynál, alkohol- és nikotinkároknál.

Eredeti csomag 25, 50, 100 és 200 negyedgrammos tablettával. — **Csecsemők részére:** Rp. Pankreon pulv. 0,1—0,5 hozzákeverendő minden tejadaghoz. Hasmenés, atrophia, mindenféle táplálkozási zavarok eseteiben. A súlygyarapodás gyorsítására. Irodalom és minta díjtalanul.



**Akt.-Ges. Chemische Fabrik
Rhenania, Aachen**

Lerakat: Vereinigte Drogen-Grosshandlungen
G. & R. FRITZ — PEZOLDT & SÜSS AKT.-GES. WIEN,
1., Bräunerstr. 5. Eladás csakis gyógyszertárak részére.

Vinum myrtillosum medicinale (Cornides)

Fekete áfonya gyógybor készítményünk-
ről a sok közül következő vélemények érkeztek be:

Dr. Hirschler Ágoston úr egyet. rendk. tanár:

„Számos betegemnél idült bélhurut, ideges hasmenés eseteiben, gyenge
bélhurutos gyermeknél kiváló eredményeket tapasztaltam a készítmény
alkalmazásával.“

Dr. Bossányi Béla úr kir. tan., Szt-Lukács-fürdő főorv.:

„Flascám évek óta szenvedett bélzavarokban, miáltal táplálkozása
felette fogyatékos volt. Az áfonya-bor 2 1/2 havi használata után a javulás
feltűnő. Szerénél legintósbabnak tartom azt, hogy a gyomorra kedvező-
leg hat, míg a többi bélhurut elleni szerek a gyomor működését kedve-
zőtlenül szokták befolyásolni.“

Cornides és Társai Konzervgyár IGLÓ.

1 üveg ára 1 kor. 60 fill. ♦ 5 üveg bérmentve 8 kor.

Kapható gyógyszerárakban.

Anaemia, chlorosis, neurasthenia, kachexia,
marasmus eseteiben a legjobb haematicum,
tonicum és roborans a



China-Ferr- Dragé Nagy

orig. Készíti: Elek és Nagy „Apostol“
gyógyszertára Budapest, József-körút 64. sz.

Forgalombahozatal a m. kir. belügyminiszter 29,882. b. 1906. sz. alatti rendelettel engedélyezve.

Elixir ferri glycerophosphati Gréb

Szintelen, igen kellemes ízű, könnyen asszimilálódó vaskészítmény. Tartalmaz szörpalakban legalkalmasabb szállításban Fe, Na, Ca glycerophosphat-sókat. Rendelhető az összes coefficientekkel együtt, mint: Acid-arsenic 0.01 és 0.02, Extr. nuc. vom. 0.10, Arsacetin 0.10, Kal. sulfogruajac. stb.

Ára egy üvegnek 2 korona

Adag 3-szor naponta gyermek-, illetve evőkanállal. Gyógyjavallatok: Chlorosis, anaemia, anorexia, latens tbc., neurasthenia, morb. Basedowi és idegbetegségek esetében, valamint gyengén fejlett gyermekek erősítésére kiválóan alkalmas.



Tablettae Biodyni Gréb

(Tablettae ferri glycerophosphati) Életerő-tabletta (bios=élet, dynamos=erő) szerves vas és glycerophosphát sókat tartalmazó erősítő és tápláló szer tabletták formában csokoládé-bevonattal. Pro dosi: Fe, Ca, Mg, Ma, Na és Chinin glycerophosphát-sói 0.10.

Egy doboz ára (50 db) 3 kor.
Gyógyjavallatok mint az Elixirnél.

Főraktár:

GRÉB JÁNOS

:: „Justitia” gyógyszerháza ::
Budapest, V., Lipót-körút 7.

Telefonszám: 127—14.

Oltó-kivonat

❖ Oltó-por ❖

Oltó-tabletták

:: „Bayer“ védjeggyel. ::

Az összes európai gyárak között a mi gyárunk készíti a legnagyobb mennyiséget.

Sajtfesték. ❖ Vajfesték.

**Gebrüder Bayer,
Augsburg (Bayern)**

A bécsi Klinikák therapiájában ajánlott készítmény!

A legtokéletesebben megtisztított Oleum Santali ostindicum és Resina Kawa-Kawa $a+b$ (új eljárás szerint előállítva) 5+1 arányban zselatina - kapszulákban á 0.30.

KAWOTAL

törvényesen védve. 

a legkiválóbb intern antigonorrhoeicum

Eredeli dobozokban à 50 Kapszula. . . . K 2.75

Olcsó pénztári csomagolásban à 30 Kapszula K 1.60

Használathban van elsőrendű cs. kir. egyetemi klinikákon, kórházakban, cs. kir. katonai kórházakban és a monarchia legtöbb betegpénztáránál. **Kawotal** erőlyesen fájdalomcsillapítóan hat, a kifolyást csökkenti és megrövidíti, komplikációkat megakadályoz, fokozza a vizelet aciditását, Cystitisnél a vizelet gyors derülését ercdményczi és megszünteti a dysuriát. A helyi kezelés legjobb segítő szere. A betegek igen jól tűrik, nem izgatja a vesét, nem okoz emésztési zavarokat, sem felbőfőgést. Irodalom és minták az orvos uraknak szívesen küld a főlerakat.

Erzherzog Karl-Apotheke, Wien, II/8.

Óvakodjunk az utánzatoktól!

Bardella

Dr. v. Bardeleben bismutos égési pólyája

A legolcsóbb kötöszert! Határtalan ideig eltartható!

Sokszorososan díjazva és kitüntetve.

A legelső orvosi autoritásoktól kitünőnek elismertetett mindenfokú égéseknél és leforrázásoknál,

a fájdalom azonnal esillapodik és a gyógyulás gyorsan megindul, a nélkül, hogy szükség volna gyakori kötésváltoztatásra.

Gyakorló orvosok ezenfelül ajánlják

nedvező eczema ellen (még ha chronikus is)

lábszárfekélyek ellen,

nyílt fagydagاناتok, fagyások ellen,

gyermekek bőrfelmaródása, bőrhorzsolódása ellen,

főlfekvések ellen, újszülöttek köldökkötéséhez legkényelmesebb és legbiztosabb kötelék gyulladások megakadályozására, nem kell többé olaj, kenőcs, puder!

bőrlzgalmak ellen, melyek diabetes, oltások, rovarcsípések, pemphigus, Röntgen-sugárzás és urticaria következtében léptek fel.

Mindenféle sebesedéseknél (szúrt és szakított sebek, bőrhorzsolódások stb.) a Bardella azonnal alkalmazható asept. kötöző-szer!

Sok klinikán, kórházban, tűzoltóknál, postánál, vasutnál általánosan használatban.

Kapható a gyógyszerárakban à 1.90. 1.20 és —.70 korona.

Raktárak: Budapesten Török József gyógyszerháza,

„ Prágában B. Fragner gyógyszerháza,

„ Wienben G. & R. Fritz-Pezoldt & Süß, A. G.

NB. Absolut értéktelenebb utánzások miatt tessék mindig így rendelni: **Bardella gross, mittel vagy klein.**

Minden pólya záróvédjegyén (vörös láng) rajta **kell** lenni **Dr. v. Bardeleben** kézírásos neve, a szürke kartonon pedig a készítő gyógy-

szerező neve:

Apotheker Br. Schmidt-Bremen.

Dr. Halász-féle

SANITOL

(Szájviz, fogpor, fogkrém, fogkefe).

Az egyetlen, biológiai alapon előállított, a száj, torok és fogak épéleti resistenciáját biztosító ideális hatású, végtelen kellemes ízű száj- és fogápoló szerek. Legkíválób fogász orvosaink véleménye szerint az egyedül megbízható, orvostudományos alappal bíró készítmények. Kapható mindenütt.

ICHTHYOL

Az általunk előállított speciális kénkészítmény sikere sok úgynvezett pótszert hozott életbe, mely a **mi Készítményünkkel nem azonos** és amelyek azonfelül egymástól is különböznek, amire vonatkozólag mi minden egyes esetben bizonyítékot tudunk nyújtani. □ □ Minthogy ezek az állítólagos pótszerek nyilvánvalóan a mi „**Ichthyol**“ és „**Sulfo-ichthyolicum**“ jegyeinkkel visszaélve egyes esetekben

hamisan **Ichthyol** vagy

Ammonium sulfo-ichthyolicum névvel

vannak jelölve, dacára annak, hogy ezen néven csak a mi speciális készítményünk, mely egyedül és kizárólag szolgált alapul az összes klinikai kísérleteknek, értendő, tisztelettel kérjük szíves értesítését arra az esetre, ha valahol ilyen csempészés történik, hogy azt bíróság üldözhesse.

**ICHTHYOL-GESELLSCHAFT
CORDES, HERMANNI & CO
HAMBURG**

Forman

Chlormethylmenthyläther

NÁTHA ELLEN! Klinikailag kipróbáltatott és az orvosok valóságosan ideális náthaellenes szernek jelentették ki. Influenzánál mint védő- és enyhítőszer nagyon ajánlják.

Forman-nal átítatott vatta mint náthaellenes vatta jön forgalomba és alkalmazása igen egyszerű. Kis golyócskát készítenek belőle és ezt vezetik be a mellső orrnyílásba. A fejlődő gőzök a légvételek alkalmával az orrgaratüreg lobosodott részeit érik és azonnal enyhítően és könnyebbítően hatnak. A vatta bevezetését az orrnyílásba szükség szerint megismétlik óránként vagy félóránként, kevésbé súlyos esetekben csak kétszer-háromszor napjában. Ha alkalmazása idejében történik, a hatás gyors és biztos.

Egy doboz Forman-vatta ára a gyógyszerárban 40 fillér.

Minta és irodalom szívesen díjtalanul.

**Dresdener Chemisches Laboratorium
Lingner, Dresden.**

Fióktelep Magyarország és Ausztria részére:
K. L. Lingner, Bodenbach a. E.



Chloraethyl Dr. Robisch pro narcosi
Robiol (Cocain-Suprarenin)
Novo-Robiol (Novocain-Paranephrin)
Steril injekciók Érzéstelenítő szerek
ampullákban sebészeti és fogorvosi célokra

Tessék árjegyzéket kérni:

Képviselők:

Fritz-Petzold & Süss A.-G. Wien, I.
Dr. G. Robisch, München, Thorwaldsenstr. 27

ANTRAMEL

eddig utól nem ért hatásával
világhírré tett szert.

ANTRALAPIS

epe-, vese- és hólyagkövek ellen.
Ezen új specifikum jó hatását
számos orvosi vélemény-nyilat-
kozat bizonyítja.

Sanin - Gesellschaft

m.b.H. Fabrik ch. pharm. Praeparate


Koetzschenbroda-Dresden

GONORRHOEA ELLEN

(Urethritis anter. et post., Prostatitis chron.)

NOFFKE törv. védett **OLDÓDÓ BOUGIE**-jai dr. H. LOHNSTEIN szerint:

c. BOROPHENYL-ALUMIN $2\frac{0}{100}$, c. ALBARGIN $0\cdot5-10\frac{0}{100}$, c. ARGENT. NITR. $0\cdot25-5\cdot0\frac{0}{100}$, c. SANOFORM $33\frac{1}{3}\frac{0}{100}$, c. RESORCIN-TANNIN \overline{aa} $5\cdot0\frac{0}{100}$, 4–6 mm. vastagságban dr. Lohnstein magán- és poliklinikáján és a boroszlói kir. egyetem bőrgyógyászati osztályán igen jó sikerrel használtatnak. — Ajánlom továbbá Noffke oldódó bougie-jait c. $1-10\frac{0}{100}$ Protargol, c. $2-10\frac{0}{100}$ Argonin, c. $1-5\frac{0}{100}$ Largin.



FOGAMZÁS ELLEN:

Noffke könnyen oldódó, antisept. biztonsági pessariumai a tampon-speculum-mal az os ext. uteri elé hozva a legjobb, legolcsóbb és legkényelmesebb anticoncipiens. A szer összetétele az orvos urakkal közöltetik. Ár: 20 db 4 kor., 12 db 3 kor. A tampon-speculum ára 5 kor. (Csak egyszeri költség.)

Minden dobozon rajta van a védjegy.

Napilapokban **nem** hirdetünk. Az orvos uraknak előnyárak. Mintadobozok 5 darabbal és irodalom az orvos uraknak ingyen és bérmentve.

Kaphatók gyógyszerárakban **csakis** a czég (Ritterstrasse 120.) megnevezésével orvosi rendelvényre, a hol nem kaphatók, tessék a főelárúsítótól: **TÖRÖK JÓZSEF** gyógyszerész-től, Budapest, VI. kerület, Király-utca 12. szám, hozatni.

HEINRICH NOFFKE, GYÓGYSZERÉSZ
BERLIN SW., YORKSTRASSE 19.

✱ A csukamájolaj legjobb pótléka! ✱

RÜGER'S Kraft Schokolade Kakao



Bester Ersatz
für Lebertran
nach Vorschrift des
Herrn Prof. Dr. v. Mehring

OTTO RÜGER

KAIS. u. KÖNIGL.



HOFLIEFERANT

BODENBACH - DRESDEN

RÜGER

erő-kakao ✱ erő-csokoládé

Dr. Mering tanár elő-
írása szerint.

RÜGER OTTO

Dresden és Bodenbach

Kapható a következő czé-
geknél: Kochmeister Fri-
gyes, Budapest, Török J.
Bpest, VI., Király-u. 12.,
Detsinyi Frigyes, Buda-
pest, V., Váci-körút. Vezér-
képviselő: Dinner Mór,
Budapest, VII., Síp-u. 17.

A Finy-féle foszfor-csokoládé bon- bon és vas-foszfor-csokoládé bonbon

oly készítmények, melyek a foszfor és vastartalom pontosságára, tartósságára, de főképp kiválóan kel-
lemes íze és összeállítására nézve felülmulja mind-
azon rendelési módokat és hasonló készítménye-
ket, melyek az angolkór és görvélykór gyógyke-
zelésénél és fogzásnál eddig alkalmazást nyertek.
A foszfortartalom pontosságáról és megbízható-
ságáról dr. Lengyel Béla egyetemi tanár és dr.
Molnár Nándor vegyész hivatalos bizonyítványai
tanúskodnak. A bonbonok darabja $\frac{1}{2}$ milligramm
tisztá foszfort és 2 centigramm tejsavas vasat
tartalmaznak. Adagolás reggel és este egy darab.

Készítője: FINY BÉLA gyógyszerész, Kispesten.

Kapható minden gyógyszertárban.

PILULAE KALII JODATI PERENNES

Szóllósi 0·20. Eltartható, cukorral obdukált, nem hygroskopikus, székesfővárosi vegyészeti intézet vizsgálata szerint szabad jód- és jodsavmentes jodkészítmény. ❀❀

**Jodismus még erre disponált
egyéneknél sem képződik.**

Ajánlva : Prof. Korányi, Prof. Havas, Prof. Irsai,
Dr. Török, Dr. Tauszk stb. egyetemi tanár urak által.

Kapható minden gyógyszerárban. Ára 2·60 K

DIUJODIN

Pastilli theobrominijodati Szóllósi



Tartalmaz : 0·30 gr. Diuretint, 0·20 gr. Kal.
jod-ot. Javalva : Arteriosclerosis, Nephritis
chronica, Angina pectoris, Miocarditis esetei-
ben Napi adag 3—5 pastilla. Ára 2 kor. 50 fill.



**Főraktár : Szóllósi Sándor Glória-gyógyszertár,
Budapest, VII., Wesselényi-u. 60. Telefon 58-80,**

Algocratin

Legújabb időben mint kitűnő specifikum dysmenorrhoea ellen és különbözően fájdalomcsillapító neuralgiáknál, migräneknél, ischiásnál stb. jól bevált. **Algocratin** Phenylamidoxanthin ostyacsapsulákban állik az adagonként 0.80 cgr. Megbízható anti-pyreticum, analgeticum és antineuralgicum a szív és gyomorra való káros hatás nélkül. — Eredeti dobozokban a gyógyszerterákiákban csak orvosi rendelésre kapható. — Franciaországban, román vidéken és Amerikában legjobban bevezetve, fényesen véleményezve és többszörösen kitüntetve, Ausztriában kitűnő eredménytel kipróbálva. 1 eredeti doboz ára 3 K 80 fill. — készítő: E. Lancosme, Pharmacia de 1. classe, Paris, Avenue d'Antin 71. Minták és irodalom a képviselő által: Gaston Humeau, Wien, III., Erdbergstrasse 63. Főraktár: Pollatsek Bertalan gyógyszerész, Dorottya-utca és Fürdő-utca sarkán.

Sanatorium Schömburg.



Württemberg—Schwarzwald
650 méter a tenger színe felett.

Magán gyógyintézet

tüdőbetegek részére
klimatikus gyógyhely Wild-
bad mellett. Nyári és téli ku-
rák. 3 orvos. Vezető orvos
dr. Koch. Prospektust küld
az igazgatóság.

SZERENCSES ÖSSZETÉTEL KÉNYELMES ALAKBAN.

A Tabl. Ferri Protoxal Dr. Deér

sine et c. Arseno.

A hazai és külföldi klinikusok a Ferrum protoxalatumot (ferro oxalát) méltán a leghatásosabb vaskészítménynek tartják a szegényvérűség, sápadtság, étvágytalanság és az általános gyöngeség eseteiben. Ezt a kitűnő készítményt tablettáim, arsen és hatásos keserűanyag mellett ideálisan tiszta és kényelmes alakban tartalmazzák. Elváltozást nem szenvednek, mint a Blaud-labdacsok, a gyomorban pedig könnyebben mállanak szét, mint a külföldi ú. n. dragées-k. Kis alakjuk a bevételt könnyűvé teszi. Ezen kitűnő tulajdonságaik és olcsóságuk miatt Kétly és Jendrassik professzor, Dieballa docens urak és mások a legmelegebben ajánlották.

Kaphatók minden gyógyszerárban. Egy üveg ára 100 drb tablettával 2 kor. Rendelési mód: Rp. Tabl. ferri protox. Deér vagy Tabl. ferri protox. c. ars. Deér lag. orig. Használati mód: a tablettákból naponta a reggeli, ebéd és vacsora közben arányosan elosztva 3—6, esetleg emelkedőleg nyolc tablettá veendő. A készítményt megfelelő adagolásban gyermekek is veszik. Könnyen emészthetők, székrekedést nem okoznak. A fogakat nem támadják meg.

Mintával szívesen szolgál

a „JÓ PÁSZTOR” gyógyszerár

Budapest, IX., Soroksári-utca 11—13.

SANATOGEN

a fehérje és phosphor lerakódását eszközli, az oxydatio energiáját fokozza, az anyagcserét élénkíti, így tehát a leghatásosabb erősítő szer. Az orvos uraknak kíváncsra kísérletezési anyag és irodalom rendelkezésre áll.

Formamint-tabletták

a száj és torok fertőtlenítésének hatásos módja.

INDIKATIÓK:


angina, stomatitis, mandulatályogok, pharyngitis, vörheny, difteria, kanyaró, mumps, szamárhurut.

BAUER & CO.

SANATOGEN-
WERKE BERLIN SW. 48



Kiváló orvosi szaktekintélyek
a bel- és külföldön a malátás
rozsból készült



Simons-kenyeret

az étrendi gyógykezelés nagyszerű nyereségének nyilvánították. Simons-kenyér valóságosan ideális specifikum székrekedés ellen és diabetesnél is igen ajánlható. Kapható minden jobb csemegekereskedésben, vagy közvetlenül a gyártótól

Simonsbrotfabrik, Wien-Kagran X.



Szétküldés naponta egy postacsomag
2.40, 2.70, 3.— koronáért bérmentesen.



**Fontos az orvos
uraknak 60% ol-
dódó szénhidrá-
tot tartalmaz**

Kaiser sterilizált gyermeklisztje

(a használatban levő gyermeklisztek között a legmagasabb szá-
zalék). Ára félkilós doboz 1.80 K. Ezen tökéletessége következtében
mindig beválik rossz tápláltság, hányásos hasmenés, bélhurut és
diarrhoea eseteiben. Egészséges és beteg gyermekek részére a
legkönnyebben emészthető és tápláló hozzátétel a tejhez. Orvosi
irodalom és minta díjtalan.



DIASANA

a legkönnyebben oldódó és legtökéletesebb növényi táplálék dr.
Ferd. Keppler (Stuttgart) szerint. A marhahús rótléka, táplálóereje
másfélszer akkora. Szoptatós nőknél fokozza a tejképződést. Diasana
ne hiányozzék egy betegágyban. Magában is fogyasztható, vagy
hozzátétel minden ételhez, italhoz. Orvosi irodalom és minta díj-
talan. Ára: félkilós doboz 2.40 K. Fr. Kaiser, Bregenz (Vorarlberg).

PLASMON

(a tej fehérjéje és tápláló sói).

Oldékony, iztelen és szagtalan, olcsó.

Az első állami és városi kórházakban (katonai kórházakban, tébolydákban, népgyógyintézetekben stb.) állandóan használatban van. Javalatok: mindazok az esetek, ahol könnyen emészthető és nem izgató táplálék, illetve fokozott táplálás kívánatos. Adagolás: evőkanalankint levesekben, pépekben, tejben, kakaóban stb. használati utasítás szerint. Nagyban árak kórházaknak és orvosoknak ad usum proprium.

Plasmon-Kakao, Plasmon-csokoládé, Plasmon-zabkakao,
Plasmon - biskuits, Plasmon - kétszersült. Vas - Plasmon.

Minta és irodalom díjtalanul

Plasmon-Gesellschaft m. b. H.

Neubrandenburg i. M.

Kapható gyógyszerárakban és drogériákban.

Az összes létező tápszerek czukorbetegeknek

Több mint 150 fajta diabetikai kenyér, kétszersült, főzelék, italok, lisztek, czukorkák stb. stb.

Herkules gyermektápszerek

Herkules maláta kétszersült, piskóta, tapióka, malátakivonat, zabliszt, zabdara, malátakávé.

csász. és kir. **Glasner** udv. szállító
Budapest, VI. ker., Király-utca 56. szám.

Dr. Göllis-féle egyetemes emésztő-por

— (1857 óta kereskedelmi cikk). —

Étrendi szer, kitűnő hatása van különösen nehezen emészthető ételek feloldására, valamint az általános emésztésre és így a test táplálására és erősítésére is. Naponta kétszer használva (evés után egy kávéskanálnyit téve a nyelvre s a szokásos itallal leöblítve), kedvező hatást gyakorol a hiányos emésztés következtében fellépő jelenségeknél. minők: gyomorégés, nyálkaképződés, székrekedés, aranyeres bántalmak és altesti pangás stb.

Ásványvízgyógyomódnál mint elő- vagy utókúra vagy egyidejűleg a gyógyomóddal kitűnő hatást fejt ki.

Minden doboznak dr. Göllis pecsétjével és a bejegyzett védjeggyel kell lezárva lenni s mindenkor határozottan dr. Göllis-féle emésztő-por kérendő a vétel alkalmával.



A dr. Göllis-féle egyetemes
emésztő-por központi szét-
küldése BÉCS, I., Stefans-
platz 6 (Zwettlhof).



Főraktár: Budapest, Király-utca 12. és Andrassy-út 26.
TÖRÖK JÓZSEF GYÓGYSZERTÁRA.

Egy nagy doboz ára . . . korona 2.52
Egy kis doboz ára . . . korona 1.68

SYRGOL

Specificum für

Gonorrhöe - Therapie

und

ophthalmologische Praxis,

ein Silberpräparat, bakteriologisch mehrfach geprüft und klinisch und praktisch erprobt; übertrifft die anderen Silberpräparate durch rasche und reizlose Wirkung.

Anwendung: In wässriger Lösung

Injektionstherapie: 1-4 ‰

Einträufelungen ins Auge: 2-5 ‰

Wissenschaftliche Abhandlungen und Proben stehen zu Diensten


A.-G. vormalis B. SIEGFRIED

Chemische Fabrik

ZOFINGEN (Schweiz)




UJ IDŐK




Szépirodalmi, művészeti és társadalmi képes hetilap.

Szerkeszti HERCZEG FERENCZ

Kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy-út 16. szám.




!! Mutatványszám ingyen !!



ZEISS

GÓRCSÖVEK

mindenféle tudományos
és műszaki vizsgálathoz.




Abbe-féle REFRAKTOMETER, tudomá-
nyos és műszaki célokra. Spektroskópok.
„M16“ árjegyzéket bérmentesen küldünk.

CARL ZEISS

Bécs, IX/3. Ferstelgasse 1. Ecke Maximilianplatz

GYÁRAK: **GYŐR** JÉNA, RIGA,
& LONDON



F. & M. Lautenschläger
Berlin N. 39.

királyi udvari szállítók

Femel desztilláló- készülék

FONTOS UJSÁG!

a gyakorló orvos,
a bakteriológus,
a gyógyszerész,
a vegyész részére

orvosságok, injectiós oldatok,
Salvarsan-oldatok készítésére

Bővebbet a 183. sz. prospektusban

UJ IDŐK

Szépirodalmi, művészeti és
társadalmi képes hetilap.

Szerkeszti HERCZEG FERENCZ

Kiadóhivatal: Budapest,
VI., Andrássy-út 16. szám.

!! Mutatványszám ingyen !!

Bacteriologiai műszerek

ú. m.:

thermostat, centrifuga,
sterilisátor, górcső,

:: Bunsen-égők, ::

üveg, porcellán-főzőedények,
pipetták, büretták stb.

megbízhatóan és előnyösen beszerezhetők:

ERDÉLY ÉS SZABÓ

laboratoriumi felszerelések

:: és tanszerek gyára ::

B U D A P E S T,

VIII. ker., Baross-utca 21. sz.

:: (Központi klinika mellett.) ::

Mechanikai gyár. :: Üvegfúvó-műhely.

:: Árjegyzék ingyen. ::

FRANZ HUGERSHOFF

LEIPZIG

Karolinenstr. 13.

○○○

5 állami díj.



MOSKAU

Roschdestwensky-

:: Boulevard ::

Haus Mattern.

Készülékek gyógyszervegyészeti és bakteriologiai laboratoriumok részére.

Centrifugák, fehérje-mutatók, sterilizátorok, haematokrit, ér lökés-ellenőrző, tonometer, haemofotográf, görcső stb. — Jegyzék ingyen.

STÖLZLE C. FIAI

üvegyáarak részvénytársaság,
Budapest, VI., Király-utca 50.

Ajánlja a legjobbnak elismert gyártmányait, u. m.:

gyógyszerüvegeket,

különlegességi és illatszer-üvegeket, üvegdugós, por- és folyadéküvegeket. Lamprecht-féle csepegtető-üvegeket. Állandó nagy raktár rumos és más palaczkokban. Kitűnő gyártmány szikvíz-és gazeuse palaczkokban. Árjegyzék ingyen és bérmentve. Ha egy új cikk forgalombahozására egy még nem létező különlegességi üveget óhajt bevezetni, kérjen tőlünk rajzokat, mintákat és árajánlatot.

ULTREFORM

a legjobb háztartási befőttes üveg! Fölül-
mulja az összes e téren létező rendszert.



A detailed advertisement for 'Schmerzlosel' orthopedic shoes. The central text 'Schmerzlosel' is written in a large, ornate script. Above it, a banner reads 'ORTHOPÄD · MÜTZIPESZ ·'. Below the main text, another banner says 'BUDAPEST'. To the left, a laurel wreath encircles several exhibition medals from various international fairs (e.g., 1889, 1893, 1897, 1903, 1906, 1910, 1913, 1914, 1917, 1920, 1923, 1925, 1927, 1929, 1931, 1933, 1935, 1937, 1939, 1941, 1943, 1945, 1947, 1949, 1951, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025). To the right, a banner reads 'VIII. BAROSS-UTCA I. SZÁM.'. At the bottom, a pair of feet is shown wearing the advertised shoes.

Gyár: MISPEST. Telefon 6.

Ajánlja orthopädiái műcipő-készítményeit a mélyen tisztelt orvos urak és a nagyérdemű közönség becses figyelmébe. Készít az eddig még senki más által oly tökéletesen ki nem állított lúdtalpbetétes dongaláb, lólab és bármiféle hibás, rendellenes vagy érzékeny lábra való cipőt. Czégem és munkám kitünő voltáról tanuskodik azon számos kitüntetés, melynek birtokában vagyok, valamint azon tény, mely szerint az összes budapesti kornazak ebbeli szükségleteit évek óta én fedezem.

A czég készítményei: Mindennemű rendellenes lábra megfelelő műcipők. Különlegességünk: Saját rendszerű lúdtalpbetétes műcipőink, melyek az orvosi kar részéről a legelőnyösebben ajánlatnak.

Budapesti Takarékpénztár és Országos Zálogkölcson r.-t.

Irodái: VI., Andrassy-út 5 (saját ház).

Befizetett részvénytőke 20 millió korona.

Elfogad betéteket takarékbetéti könyvecskék és pénztári jegyek ellenében, valamint folyószámlán (check-számlán).

Leszámitol váltókat és előleget nyújt értékpapirokra.

VÁLTÓ-ÜZLETE megbízásból teljesíti mindenféle értékpapírok vételét és eladását a legelőnyösebb feltételek mellett s foglalkozik minden a váltóüzletek keretébe tartozó üzletágakkal.

M. kir. osztálysorsjegyek főelárusító helye Andrassy út 5.

Engedélyez törlesztési kölcsönöket földművelésre, valamint bérházakra és pénzintézetektől engedmény útján átvállal jelzálogilag biztosított követeléseket esetről esetre megállapítandó legelőnyösebb feltételek mellett.

TELEFONSZÁM 99-56

OPTIKUS

LIBAL ÉS MÄRZ

= BUDAPEST =
VI., Teréz-körút 54. sz.

Cégtulajdonos :
MÄRZ KÄRÖLY.

Nyugoti pályaudvarral szemben
Podmaniczky-utcai sarokházban.
Törzsüzlet alapított 1846.

Ájánlanak: hőmérőket, szemüvegeket, orrcsüptetőket, távcsöveket, látcsöveket, rajz- és mérőeszközöket. Szemészeti műszerek és szemüveg-szekrények. — Orvos uraknak 10%-os engedmény.

PRIVAT-HEILANSTALT

Für Nerven- und Gemüths-
kranke ∅ Von Prof. H. Ober-
steiner ∅ Zu Ober-Döbling
:: (Wien, XIX. Bezirk). ::

STEINHOF

ORSZÁGOS GYOGYINTÉZET

WIEN XIII.



Legnagyobb és legmodernebb berendezésű gyógy- és ápoló-intézet ideg- és elmebetegek részére (hatósági kezelésben). Legtökéletesebb berendezés neurasthenia, hysteria, hypochondria, ideges állapotok, morphinismus, kokainismus, alkoholismus stb. gyógykezelésére 10 a legnagyobb kényelemmel berendezett pavillon, külön gyógyház mechano-, elektro- és hydrotherapiás gyógyeszközökkel, téli uszoda, társalgó- és éttermek, billiárd-, dohányzó- és zenetermek, színház, házi zenekar, központi fűtés, villanyvilágítás.

Penzió-árak: lakás, fűtés, világítás, ellátás (naponta 4 étkezés), orvosi kezelés, ápolás és felvigyázás fejében naponta 1. osztály 20 kor., II. osztály 10 kor. Prospektus díj-talan és bérmentve. Telefon 33202. A villamos vasút állomása.

Sanatorium

Purkersdorf

Bécs mellett ✱ Idegbajok és belső betegségek ellen. Hízoló és étrendi gyógymódok. Legújabb gyógyeljárások. Egész éven át nyitva. 5 orvos.

Főorvos:

Stein Lajos dr. csász. tanácsos.

„SCHWEIZERHOF“

:: szanatorium és penzió ::

WETZELSDORF (Graz mellett)

idegbetegek részére.

Az összes modern gyógytényezők, remek szabad lég- és napfürdő-berendezések. Saját vízvezeték, csatornázás, derítő-berendezés. Egész éven át

:: nyitva. Prospektusok. Két orvos. ::

Em. Primarius : Dr. J. von Scarpatetti.

Dr. SZEGŐ KÁLMÁN

szanatóriuma és vízgyógyintézete
felnőttek és gyermekek számára

ABBÁZIÁBAN.

Erősítő-, edző-, hízlaló- és soványító-
kúrák egész éven át.

Összes vízgyógyászati gyógyeszközök, szén-
savas fürdők, villanyos rekeszes fürdők, forró-
lég-fénykezelés, Zander-gépek, légfürdők.

Felvétetnek gyenge, hurutokra hajlamos
egyének, szívbeteg, izületbeteg, anyag-
cserezavarokban szenvedők, idegbeteg
stb.

Telefon 15-39.

DR. GLÜCK



SZANATÓRIUMA ÉS
VÍZGYÓGYINTEZETE

BUDAPEST, Városligeti-fasor 11. sz.

Felkérésénél és berendezésénél fogva idegbe-
tegeknek, üdülést keresőknek stb. legjob-
ban ajánlható. — Egész éven át nyitva. —
Vízgyógykezelés, massage elektrotherapia. —
Frenkel-Goldscheider-féle tabes-kezelés. — Vil-
lanyos fényfürdők. — Szénsavas fürdők. —
Dietetikus gyógmódok (Weir-Mitchell-féle
hizlalógyógmód, — czukorbetegkezelés, — sová-
nyító kúrák stb.). — Állandó orvosi felügye-
let. — Kitűnő ellátás. — Mérsékelt árak. —
Prospektus.

Igazgató-főorvos: DR. GLÜCK GYULA.

Dr. GÁMÁN BÉLA



DIETÁS INTÉZETE



VOLOSCA-ABBAZIÁBAN.

Közvetlen a tenger partján, zaj-, por- és füstmentes, kényelmes és kellemes családi otthon. Felvétetnek gyomor- és bélbeteg, vesebajosok, cukorbeteg, köszvényesek, vérszegények, lesoványodottak, lábbadozók, ideg-
 ❧❧ gyöngék, kimerültek. ❧❧

DIETÁS ÉS FIZIKÁLIS KEZELÉS.
 RÁDIUM INHALATORIUM.

MÁLNÁSI MÁRIA-FORRÁS

természetes alkalikus sós savanyúvíz.

Javallatok : a légutak és az emésztőszervek idült hurutjai, vesekő, húgyhomok, pyelitis és cystitis catarrh. chron., scrophulosis torpida, régi izzadmányok.

Bókay tanár e könyv 383. oldalán a következőket írja:

A Málnási Mária-forrás kitünő égvényes konyhasós hideg ásványvíz, mely az összes külföldieket nélkülöz-
 □ hetővé teszi. □

BAD KREUZEN

vizgyógyintézet és szanatorium

Felső-Ausztriában — Vasuti és gőzhajó-állomás: „Grein-Bad Kreuzen“, a nyugoti vasut „Amstetten“ állomásán keresztül is. — Posta- és táviró-állomás, interurban-telefon az intézetben. — Mindennemű villamos kúrák. — Villamos 2 és 4 rekeszű fürdők — Fénysugárzás, Röntgen-átsugárzás és Röntgen-fotografia. — Szénsav-, levegő, napfürdők. — Száraz forró levegőfürdő. — Massage és vibrációs massage. — Mindennemű étrendi kúrák: hizlaló és soványító kúrák, diabetes étrend, vegetáriánus és tejdiéta — Gyógytornászat és aparato therapia. — Teljes ellátás szobával és gyógykezeléssel 9 koronától feljebb. — Idény május 1-től októberig.

Felvilágosítással szívesen szolgál a fürdőkezelőség és

dr. med. Fritz Fleischanderl,

az intézet vezető-orvosa.

Téli cím: Wien, VIII/2. Albertgasse 3.

S • PRIESNITZ- SZANATORIUM GRÄFENBERG 620 m. t. sz. f. Oest. - Schlesien.

Bel- és idegbetegek és üdülésre szorulóknak részére. Fiziko-dietétikus gyógy módok. Egész éven át nyitva.

**Főorvos: HATSCHEK Dr.,
egészségügyi tanácsos.** ●

Dr. Teuscher szanatoriuma

OBERLOSCHWITZ-WEISSER HIRSCH
DRESDEN MELLETT.

Fizikális dietétikus gyógymódok

ideg-, szív-, anyagcsere-, gyomor-, bélbetegek és
üdülésre szorulóknak részére. Radium-emanatio. —
Két orvos.

Tulajdonos: Dr. med. H. TEUSCHER.

:—: Prospektusok. — Modern berendezések. :—:

TÉLI KURÁK.

THERAPIA

a gyógyító tudományok könyvtára. 

I. Az idegbetegségek gyógyítása, írta dr. Moravcsik E. E. tanár. Függelékül: Az elmebetegség gyógyítása, írta dr. Fischer I. Kötve 6-40 K. II. A szembetegségek gyógyítása, írta dr. Goldzieher Vilmos tanár. Kötve 6-40 K. III. A hörgők, a tüdő és mellhártya betegségeinek gyógyítása, írta dr. Székely Ágost tanár. Kötve 7 K. IV. A sebészeti gyógyítás általános része, írta dr. Schächter M. tanár. Kötve, 6-40 K. V. A szív betegségeinek gyógyítása, írta dr. Hasenfeld A. Kötve 6-40 K. VI. Az ízületi bántalmak gyógyítása, írta dr. Weiss E. A vér betegségeinek gyógyítása, írta dr. Körmöczy E. Kötve 7 K. VII. A gyermekbetegségek gyógyítása (I. rész, Fertőző betegségeket írta dr. Brück M. 6-40 K. VIII. A végtagok sebészeti bántalmaival), gyógyítása, írta dr. Makara Lajos tanár, 7 K. IX. A női betegségek gyógyítása, írta dr. Neumann Sz., 8 K. X. A gyermekbetegségek gyógyítása (II. rész. Nem fertőző bántalmak), írta dr. Berend Miklós. XI. A bőrbajok gyógyítása, írta dr. Justus Jakab. XII. A gyomor betegségeinek gyógyítása, írta dr. Szerb Zsigmond. — A Therapia 12 kötetének előfizetési ára izléses, tartós, egész vászonkötésben, ha a gyűjtemény teljesen és egyszerre rendeltetik meg: 72 K. (Egyenként a kötetek ára magasabb.) Ez összeg 3 K-ás részletben is törleszthető.

ABBAZIA PENSION HERMITAGE.



Legszebb fekvésű első-
rangú **magyar** otthon
a SÜDSTRANDON.

Üdülő betegek részére

TULAJDONOS: kiválóan alkalmas. ✱
THURYNÉ MARKOVITS VALERIE.

MUSCHONG J. ÉS TÁRSA

Buziási gyógyfürdője

a legdúsabb természetes szénsavas
források, ásványvíz-töltőtelep.

Specifikus gyógyfürdő:

Szívbántalmaknál, női bajoknál, hólyag- és vese-
bajoknál, kő- és fővenybetegségeknel, a légutak, az
emésztő- és kiválasztószervek hurutos bántalmainál.
Sápkór, vérszegénység, görvély- és angolkór, álta-
lános gyengeség és a női ivarszervek idült bajainál.
Fürdőidény: május hó 15-től szeptember hó végéig.

CSÁSZÁRFÜRDŐ BUDAPESTEN

Nyári és téli gyógyhely, az Irgalmasrend kezelése alatt. Kénes hévvízű gyógyforrásai páratlanok. Ezek a források bőségesen táplálják vizükkel az intézet valamennyi fürdőjét, u. m. : a gőzfürdőt és népgőzfürdőt, az egyes és közös, de külön női és férfi-iszapfürdőket (iszapborogatások), márványkád-, porcelánkád- és kőfürdőket, török- és horganykád-fürdőket, valamint a hőlég-, szénsavas- és villamos-víz-fürdőket. Ezekből a dúsgyógytorrásokból kapja vizét a kontinensen egyedül álló női és a férfi-uszoda is. A Császárfürdő kiváló gyógyítóereje nemcsak csúszos bántalmak és idegbajok ellen, hanem sok más betegségnél is általánosan elismert. Ivókúrája kitűnő gyógyhatású hurutos légzőszerveknél és altesti pangásoknál. Lakószobái kényelmesek; berendezésük a különböző igényekhez van szabva. Jutányos árak. Minden tekintetben szoliditás. Gyógy- és zenedíj nincsen. Prospektust ingyen és bérmentve küld



AZ IGAZGATÓSÁG.

ESIZ-FÜRDŐ

a kontinens legerősebb jódbrom-fürdője
nagy radioaktivitással.

Prof. dr. br. Korányi Frigyes egyetemi tanár által görvélyes mirigybajok, ízületi és bőrmegbetegedések, görvélyes szem-fülbántalmak, a syphilis és annak kései alakjainál, csonthártya- és csontbántalmak, a női betegségek, csúszos-köszvényes idült lobok, angolkór és gerinczagy-hűdéseknel stb. javálva.

Ivó-, fürdő-, hidegvíz-, dörzs- és izzasztó-kúrák, szénsavas fürdők. Olcsó és kellemes tartózkodás, minden kényelem.

HÁZI-KÚRA GYANÁNT A ESIZI VIZ SPECIFIKUM.

Felvilágosítást készséggel nyújt a fürdőigazgatóság.

A világ legelső és leghíresebb lápfürdője

FRANZENSBAD

Az osztrák-magyar monarchia legkiválóbb szív-gyógyfürdője

a legalkalmasabb tartózkodási hely gyöngé, beteges gyermekek részére, nir a legerősebb aczélforrásokkal, könnyen emészthető vasas savanyúvizekkel, égvényes glaubersós vizekkel, szénsavdús lithion-forrásokkal.

14 ásványvíz-forrás, 4 nagy városi fürdőintézet kizárólag természetes szénsavdús aczel-, sós- és folyó-fürdőkkel, gyógyerejű lápfürdőkkel, gőz- és forrológ-fürdőkkel, kád- és fényfürdőkkel. Medico-mechanikus Intézet, Inhalatorium. Röntgen-készülékek.

A kontinens legnagyobb, minőség tekintetében utól nem ért lápftelepe (80 millió köbméter). Idényenkint 150.000 lápfürdő.

Javalt: Vérszegénység, sápadtság, görvélykór, csúz, köszvény eseteiben, a légző-, emésztő- és húgyszervek hurutjánál, szokványos székrekedésnél, idegbetegségeknel, neurastheniánál, hysteriánál, női betegségeknel, exsudatumoknál, szívhajoknál, szívgyengeségnél, idült szívizomiobnál, billentyűbántalmaknál, szívneurosisoknál, szívelzsirosodásnál.

Idény május 1-jétől szeptember 30-ig. Fürdési idő április 15-től november 30-ig. Elő- és utóidényben olcsóbb szobaárak. Prospektust díjtalanul küld a polgármesteri hivatal. Franzensbadnak, a barátságos „kertváros“-nak, kitünő hygienikus intézményei vannak: magaslati forrásvízvezeték stb. és egy világfürdő minden kényelme megtalálható ott. Érdekes környék, gyönyörű egyenes sétautakkal, több mint 100 kilométer hosszúságban.

FRANZENSBAD.


HOTEL STADT LEIPZIG.

Régi jóhírű, elsőrangú családi szálloda, a gyógy-sétánnyal szemben, a fürdők és gyógyforrások közvetlen közelében. A legmodernebb kényelemmel berendezve. A szálló szolgálja minden vonat érkezésekor a pályaházban található.

— Villanyos világítás. Lift. —

Elsőrangú étterem elismert kitünő konyhával. Magyar beszéd.

Anders G. szálló-tulajdonos.

BAD HALLFELSŐ-
AUSZTRIA.**Elsőrangú jod-brom-fürdő.**

Legrégibb és leghatásosabb jodforrás
 ===== Európában. =====

Női betegségek, izzadmányok, idült
 lobok, köszvény, csúz, görvélykór,
 szerzett és veleszületett bujakór és
 következményes betegségei, stb. stb.

— Idény május 1-étől október 1-ig. —
 Dr. R. v. Gerstl szanatóriuma télen át
 is nyitva áll. — Felvilágosítással szolgál a

FÜRDŐKEZELŐSÉG.

N I Z Z A**Rheinischer Hof**

(Hotel du Rhin).

Elsőrangú családi szálloda.

150 ágy. Legszebb központi déli fekvés. Meleg-
 vízfűtés. Két felvonó. Lakosztályok fürdővel
 Teljes ellátás (három étkezés külön tálalva,
 fűtés, villanyos világítás) 10 franktól feljebb
 Távirati cím: Rhinotel Nice. A tisztikar szállí-
 tója. Th. Baumgartner, tulajdonos.

IGLÓFÜRED.

ELSŐRENDŰ VÍZGYÓGY- INTÉZET. GYÓGYFÜRDŐ.

580 m. magasan, ősfenyvesek közepén, a déli Szepességen. Széltől védett hely. Vasuti állomás Igló. Idény május 15-től október 1-ig. Modern, tökéletesen felszerelt vízgyógyintézet. Szigorúan individualizált mérsékelt vízgyógyimódok a fürdőorvos személyes felügyelete alatt. Dr. Bulling-féle inhalatorium. Szénsavas-, fenyő-, láb- és napfürdők. Fekvőcsarnok Oertel-féle terrain-kúra. Hízaló és sovánvitó gyógymódok. Villanvozás. **Massageok.** Pensio: lakás és teljes ellátás 32 K-tól. Kitűnő konyha 160 kényelmes szoba 1-20 - 6 K-ig naponta. Képes prospektussal szívesen szolgál Iglófüröd gondnoksága.

Fürdőorvos: Dr. Lorenz Hugó, Budapestről.

Elsőrangú fürdőhely.

LIPIK

Szlavóniában.

Vasút-, posta-, telefon- és táv-
irdaállomás.

Egyetlen égvényes-, konyhasós-, jódtartalmú hévvíz (67° C.) Európában.

Páratlan gyógyhatású a gyomor, tápcsatorna és a vizeleti utak összes hurutos megbetegedései, diabetes mellitus, húgysavas áttétel, köszvény, csúsz és ischias, csonttörések, vese-, gyermek- és alkati bajok ellen

Ivókúra, hévvizes fürdők, vízgyógyintézet, inhalatorium, szénsavas fürdők. Villamos gyógymód.

A fürdőhelyen 10 kiváló orvos működik. Kívánatra prospektussal és bővebb értesítéssel szolgál a Fürdőigazgatóság.

BAD RADEIN

STEIERMARK

Ivókúrák alkal. savanyúvizekkel („Radeini gyógyforrás“ stb.). Természetes szénsavas-fürdők, izzasztó kamarák stb. Kitünően bevált köszvény, húgydara, húgyfőveny, hólyag- és vesebajok, hurutos bántalmak stb. eseteiben. *~~~~~*

Subalpin-éghajlat.

Fenyőerdők.

Vöslau gyógyhely.

45 percznyire Wientől (Südbahn), szélről védett fekvésben a Harzberg tövében, 3 nagy lév-úszótó, természetes zuhanó-, hullám-, lév-, zuhany-, gyógyszeres (fenyő-, só- stb.) kád- és szénsavas fürdők, hidegvíz-, tej-, savó-, szőlő- és terrén-gyógymódok, gyógytorna. Nap-, homok- és családi fürdők.

Akratotherma 24° C. Idény márcziustól novemberig.



:: :: Kimerítő ismertetést küld :: ::



a fürdőigazgatóság.

TARCSA-GYÓGYFÜRDŐ : VAS-: MEGYE.

(A MAGYAR FRANZENSBAD.)

SPECZIÁLIS NŐI ÉS SZIVGYÓGYFÜRDŐ.

Hidegvízgyógyintézet. Világhírű vaslápja a franzensbadi-
val egyenértékű, sőt a marienbadit is jóval felülmulja
és hazánkban a legjobb. Természetes szénsavas für-
dők. -- Glaubersós vasas és lithion tartalmú alkalikus
sós források. Páratlan gyógyhatású: vérszegénység,
csúsz, húgysavas diathézis, idegbajok, a vese, hólyag,
emésztési és légzőszervek hurutos bántalmával ellen.
Füüdőorvosok: Dr. Bartha Kornél, v. tanársegéd és dr.
Glück Gyula. — Évad május 15-től szeptember végéig.
Vasut, posta-, távirda- és telefon-állomás. Közvetlen
vasuti közlekedés, Tarcsa-Füüdő felirattal.
Villany-illat, fenyvesek közötti jászolok

TÁTRA-SZÉPLAK

magaslati gyógyhely 1010 mtr. t. f. magasságban fekszik
a Magas-Tátra déli lejtőjén, fenyvesek közepette.

GYÓGYESZKÖZÖK: a magaslati klimán kívül,
teljes vízgyógyintézet, szénsavas fürdők, terrain-
gyógymód systematikus emelkedéssel bíró utakon,
villanyozás (galvan. farad.) és diéta (hizlaló és
fogyó) kúrák. — Svéd gyógygymnastika és
massage.

GYÓGYJAVALLATOK: Idegbajok, Basedow-féle
kór, Reconvescentia, útógyógymód ivó- és ther-
mál-kúrák után. — Sáp-kór, vérszegénység. Vál-
tóláz. Hülésre és légutak hurutjaira való dispositió.
Mérsékelt árak. — Bővebb felvilágosítással szol-
gál a füüdőorvos: dr. GUHR MIHÁLY, vagy a
Füüdőigazgatóság Tátra-Széplak.

Nyári és téli idény.

KELETI J.

Budapest, IV., Koronaherceg-u. 17.

Gyár (villamerőre berendezve) IV., Himző-utca 5.

Külföldi műszerekből (Weiss London, Collin Páris, Lautenschläger Berlin) Zeiss Jena műszerekből nagy raktárt tartok. ~~~~~

Gyakorló orvos uraknak havi részletfizetésre vagy évi számlára

áremelés nélkül szállítok legjobb és legmegbízhatóbb gyártmányú teljes orvosi műszer- és bútorberendezéseket. ~~~~~

Gyáram különlegességei:

Teljes kórházi berendezések, orvossebészeti műszerek, cs. és kir. szab. sérvkötők, orthopaediai gépek, villamos orvosi készülékek, műszerszekrények, mütő- és vizsgáló-asztalok, mosdók, irrigator-állványok, gőz-sterilizátorok köt- és műszerek részére. Javításokat, dynamizálásokat és angol műköszörülést jutányos ár mellett eszközölök. Tessék árjegyzéket kérni! Nagyobb megrendeléseknél tessék külön árajánlatot kérni. ~~~~~

